

中医处方心诀

霍元鼎著

山西人民出版社

R 28

86

中 医 处 方 心 訣

霍 鼎 元 編 著

山西人民出版社

一九五七年，太原

内 容 提 要

本书将散见各处的古方四五百则加以系统集中的编录，按症查考，极为方便，可作为中医临病手册。

本书不仅采用了歌诀的形式，而且对每一处方的作用都有具体说明，并对其中主要药物的性质和作用，也都作了具体的分析。这样既便于了解，也便于记忆。

中 医 处 方 心 跋

霍 鼎 元 编著

*

山西人民出版社出版 (太原并州路七号)

山西省书刊出版业营业登记证晋出字第2号

太原印刷厂印刷 山西省新华书店发行

*

开本：787×1092毫米 1/32·4 $\frac{5}{8}$ 印张·86,000字

一九五六年十一月第一版

一九五九年七月太原第二次印刷

印数：9,086—25,117册

统一书号：14088·2

定 价：四角五分

中醫處方心訣 目錄

傷寒方詩歌	(一)	厥陰方	(三〇)
太陽方上	(二)	厥陰方續	(三一)
太陽方中	(三)	陰陽易差后勞復病方	(三二)
太陽方下	(四)	雜病方詩歌	(三三)
太陽救誤變症方	(五)	瘧濕暎病方	(三四)
陽明方上	(六)	百合狐惑阴阳毒方	(三七)
陽明方中	(七)	瘡病方	(四〇)
陽明方下	(八)	中風歷節方	(四二)
少陽方上	(九)	血痹虛勞方	(四四)
少陽方中	(十)	肺痿肺痈咳嗽上氣方	(四五)
少陽方下	(十一)	奔豚方	(五二)
太陽方	(十二)	胸痹心痛短氣方	(五三)
少陰方	(十三)	腹滿寒疝宿食方	(五四)

五脏风寒积热方	(七三)
淡饮啜啜方	(五九)
消渴小便不利淋病方	(六三)
水气病方	(六五)
黄疸病方	(六八)
惊悸吐衄下血方	(七〇)
呕吐哕下利方	(七一)
疮痈瘍瘍浸淫病方	(七七)
跌蹶手指臂肿轉筋狐疝蛲虫方	(七九)
妇人妊娠病方	(八〇)
妇人产后方	(八三)
妇人杂病方	(八七)
小儿疳虫齶齿方	(九一)
附二) 十药神方	(二二九)
(附二) 白喉喉瘧驗方	(二三六)

附方詩歌

傷寒方詩歌

太陽方上

手太陽小腸
是太陽歸狀。

桂枝湯

發熱自汗是傷風，桂草生姜芍藥蓬。頭痛項強浮緩脉，必須稀粥合成功。

桂枝、芍藥、生姜各三錢，炙草一錢，大枣四枚，水煎溫服。須臾啜稀粥，溫復取微似汗。桂枝為君，色赤入心生血，得自汗之苦以和之，為陰陽調和之劑。蓋因桂草辛甘化陽，芍草苦甘養陰，美佐桂枝行陽，姜桂芍藥行陰故也。且此方本不發汗，借熱粥之力，充胃氣以達于肺，令風邪从皮毛而解，不伤氣血，調和榮衛，為諸方之冠！

桂枝二麻黃一湯

汗出不徹邪還襲，如燒頭來時氣難。桂枝湯二一麻黃，表后脉洪借此輯。
桂枝二錢三分，芍藥、生姜各一錢，炙草、麻黃各七分，杏仁十六個，大枣一枚。先煎麻黃去

沫，后入諸藥溫服。

桂枝麻黃各半湯

面熱身痒感雖輕 小汗輕施顧謝榮
麻黃桂姜芍藥草 減之各半定方名
桂枝一錢三分，芍藥、生姜、炙草、麻黃各六分，杏仁七枚，大枣一枚半。先煮麻黃去沫，入諸藥煎溫服。

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝厚朴杏仁湯 諸喘皆須疎利方
誤下喘成還用此 去邪下氣本相當
即桂枝湯加厚朴一錢半，杏仁十四枚。

桂枝加附湯及桂枝加桂湯

太陽誤下遂拘急 湯本桂枝加附入 更有核起作奔豚
桂枝加附子湯，照桂枝湯加附子一錢；桂枝加桂湯，照桂枝湯加桂三錢。又加桂枝者，取味重則能达下也。

茯苓桂枝甘草大枣湯

欲作奔豚臍下悸 八錢茯苓桂枝四 二甘四棗水甘瀉 直伐腎邪安內志
取水搗三百遍，名甘瀉水。用甘瀉水三杯入諸藥，煎七分溫服。此方安腎鎮水使水不凌心。补脾制水，使水不泛溢。

桂枝甘草湯

父手冒心因過汗 心下悸動欲得按 桂枝芍藥合辛甘 敗汗安心固汗漫

桂枝四錢，炙草二錢，水煎服。辛从甘化，陽中有陰，故能補陽以止汗，生心液而定悸。

桂枝去芍藥及桂枝去芍藥加附子湯

桂枝去芍因胸滿 脉促令平舒上院 若稍惡寒陽內弱 速加附子不容緩
此症胸滿是陰氣凝聚。減去芍藥，意在急散。若微惡寒者，又加附子以助姜桂之力，汲汲扶陽。

桂枝加芍藥生姜人參新加湯

汗余身痛脉沉迟 痛本陰凝氣不支 姜芍人參三味入 桂枝湯旧化新奇
桂枝、人參各三錢，芍藥、生姜各二錢，炙草二錢，大棗三枚，水二杯半，煎八分溫服。余同桂枝湯法。此方加人參以助姜桂芍之力，俾通而不痛也，絕非以陰濟陰。

五苓散

不解而煩熱且渴 澤苓桂朮猪苓末 积水留垢借此行 方曰五苓表里存
澤瀉二兩六錢，猪苓、茯苓、白朮各十八錢，桂朮半兩，共為末，白飲和服方寸七，今用三錢，日三服，多飲暖水，汗出而愈，重解表也。

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝服后或又下 心滿發熱強痛怕 甘苓白朮芩芍姜 表里邪除小便化
茯苓、白朮、生姜、白朮各三錢，大棗三枚，炙草二錢，水煎溫服，小便利、則愈。此方因心

滿加白朮，宜注意！

一四一 太陽方中

麻黃湯

太陽脈緊喘無汗 身痛腰痠必惡寒 麻桂為君甘杏佐 邪从汗散一時安
麻黃三錢 桂枝二錢 炙草二錢 杏仁三十粒 水二杯半 先煮麻黃至杯半 去沫 入諸藥同煎至八分 温服 复取微似汗 內經云：寒淫于內，治以甘熱，佐以辛苦，此方得之。

大青龍湯

浮緊惡寒兼發熱

身疼煩躁汗難止 麻黃桂杏甘草姜

石膏助勢青龍變

麻黃六錢 桂枝、炙草各二錢 杏仁十三粒 生姜三錢 大棗四枚 石膏四錢 先煎麻黃去沫 入諸藥煎溫服 取微似汗 汗多者以溫粉補之 溫粉即白朮、吳茱萸、川芎、白芍為末 米粉和朴之 方中因喘是慤郁其氣 气降不得 故用杏仁之苦 以降氣止喘 煩躁 是熱傷其氣 無津不能作汗 故特加石膏之甘 以生津除煩

小青龍湯

素常有飲外邪湊

麻桂細辛更夏枯 五味收金甘芍和

青龍小用翻江走

麻黃、芍藥、乾姜、炙草、桂枝各二錢 牛夏一錢半 五味、細辛各二錢 先煮麻黃去沫

后入諸藥煎服。此方小大汗而長手利水，如小龙乘雷雨而蒼海也。微利去麻黃加葵花，今以茯苓代之，更穩；渴去半夏加括萎根二錢；呃去麻黃加炮附子一錢；小便不利、小腹滿，加茯苓三錢，渴去麻黃加杏仁十三枚。

麻黃杏仁甘草石膏湯

麻黃杏仁石膏草

外散內涼喘汗好

从来濕病有良方

宜向風寒外搜討

麻黃四錢，杏仁十六枚，炙草二錢，石膏八錢。先煮麻黃去沫，后入諸藥煎溫服。此方治溫

病。

小建中湯

二三日內煩而悸 尺退榮虛又須記

桂枝倍芍加飴糖

湯名建中溫補治

即桂枝湯倍芍藥，入飴糖解服，嘔者不可用以甜故也。此陰陽平補之神方。

桂枝二越婢一湯

熱多寒少脉微弱

多治熱兮寒治略

芍桂麻膏甘枣姜

桂枝越婢善裁度

桂枝、白芍、麻黃、生姜、炙草各一錢七分，石膏三錢，大棗三枚。先煮麻黃去沫，納諸藥同煎，溫服。比上小建汗之方，更輕。

麻黃連翹赤小豆湯

瘍熱在里黃遂發 渗泄之中兼疏越

麻翹甘豆杏梓皮

更加姜枣莫恍惚

麻黃、連翹、生姜、炙草各二錢，赤小豆三錢，大棗三枚，生梓白皮二錢，如無以茵陳代

之，以潦水二杯半，先煮麻黃至二杯，去沫，大諸藥煎八分，溫服。潦水，無根水也。

桃仁承氣湯

寒本傷榮多蓄血

桃仁承氣濕邪熱

硝黃甘草桂枝宜

譁語如狂斯切切

桃仁二十六粒去皮尖，大黃四錢，甘草、桂枝各二錢。水煎，去渣，入芒硝二錢，煎微沸，

溫服。桃仁直达血所，桂枝分解外邪，即抵當症之輕者。

抵當丸及抵當湯

脉見沉微症發狂，熱瘀小腹硬而脹，抵當兩劑分平峻。蟲蛭桃仁共大黃

水蛭、蟲虫各三十个，大黃三錢，桃仁七个，熬制照下方，水一杯半，煮七分，溫服，不再不服。水蛭用石灰炒過再熬，蟲虫去足各七个，大黃三錢酒洗，桃仁十二枚去皮尖，研末為丸，水一杯煮取七分服，啐時當下血，不下血再服。抵者抵其巢穴也，當者當其重任也。蛭者水蟲之善飲血也，蟲者陸虫之善飲血也，水陸并攻，同氣相求，更佐桃仁之推陳致新，大黃之瀉滌熱邪，故名抵當也！啐時者周時也。

太陽方下

桂枝附子湯及桂枝附子去桂加白朮湯

桂枝附子姜甘草

身體疼痛風濕拘，小便自利大便堅

去桂加朮潤枯槁

桂枝附子姜甘草，身體疼痛風濕拘，小便自利大便堅，去桂加朮潤枯槁。

桂枝四錢，附子、生姜各三錢，炙草二錢，大枣三枚，水煎服。虛弱家反不如附子只用一錢半至二錢。此風勝于濕之主方也。桂附湯 前方去桂枝加白朮四錢，此又濕勝于風之主方也。桂附去桂加白朮湯

甘草附子湯

桂枝甘草化表風

附子白朮驅里濕

甘草冠此三味前

义取緩行勿迫急

甘草炙，附子炮、白朮各三錢，桂枝四錢，水二杯，煎一杯，溫服，得微汗則解。若大汗出，風去而濕仍在，病反不除，故緩行徐解。

甘草干姜湯及芍藥甘草湯

吐逆煩躁又咽干

甘草干姜服卽安

厥慾足溫繫仍回

更行芍藥一方資

炙甘草四錢，炮姜二錢，水煎服。

甘草乾姜湯

芍藥、炙草各四錢，水煎服。

芍藥甘草湯

開承氣湯見陽明

四逆湯見少陰

太陽救誤變症方

真武湯見少陰

茯苓桂枝白朮甘草湯

吐下氣冲弦陣陣

沉緊脉候

發汗身振振搖動

症類真武更輕些

苓桂朮甘

湯急进

茯苓四錢，桂枝、炙草、白朮各二錢，水煎服。朮草和脾胃，以运津液；桂苓利膀胱，以布气化。

五苓散

見大陽上

茯苓甘草湯

甘草、茯苓、姜桂枝

悸而汗出兩般施

症渴

五苓散

口必渴

辨症分明用勿疑

茯苓、桂枝、炙草各三錢，生姜三錢。水煎服。此方治發汗后汗出不止，則亡陽。重即當與真武湯，其稍輕者，當與苓桂朮甘湯，更輕者則與此湯。蓋三方同用茯苓以鎮汗大泄，引腎水之上泛，故真武佐以回陽附子，此方則佐以桂枝甘草斂汗。

四逆湯

見少陰

芍藥甘草附子湯

陽氣素虛宜建中 遷行發汗惡寒沖

回陽附子朴陰芍

甘草和諧榮衛通

芍藥、炙草各三錢，附子一錢，水煎服。此因汗亡陽而惡寒也。然亡氣中之陽用四逆湯，血中之陽用此湯，惡寒而厥宜四逆湯，惡寒而不厥宜此湯。

白虎湯及白虎加人參湯

白虎知甘米石膏

陽明大渴汗消滔

自汗則熱甚不經，非石膏不治

加參補氣生津液

熱退

亡陽此最高

石膏八錢，知母三錢，炙草二錢，粳米四錢，水二杯，煮米熟湯成，大約一杯，溫服。前方加人參錢半。亡陽症有二：下焦之陽虛飛越于外而欲上泄，則用參附等藥以回之，中焦之陽盛滿奔于外而欲上泄，則用石膏以降之。

多桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

火劫慄狂躁不安，亡陽散亂浮脉看，牡龍蜀漆生姜入，桂草相和救逆丹。

即桂枝湯去芍藥，加蜀漆二錢，牡蠣四錢，龍骨三錢。先煮蜀漆，後入諸藥煎溫服。少陰汗出亡，腎中之陽，宜真武四逆散救逆。陽明火盛，誤服桂枝之熱，大汗不止，亡其胃陽，宜用石膏以滋之。此乃火逼汗亡心陽，故用安神之品以鎮之。

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝主外龍牡內，炙草調和內外配，火逆下之本不堪，燒針煩躁詎堪耐。

桂枝一錢，炙草二錢，牡蠣、龍骨各三錢，水煎服。龍牡重滯之質，得桂枝始神其用。

桂枝人參湯

外症未除數下之，理中湯內桂枝施，誤攻致利兼心痞，朴散合成內托奇。

桂枝、炙草各二錢，白朮、人參、乾姜各一錢半，水二杯半，先煮四味，取一杯半，去滓，入桂枝，煮八分服。桂枝后煮，取其外越散邪。

調胃承氣湯

細嚼承氣湯口服

大陷胸湯

短氣燥煩邪上結 大黃甘遂芒硝泄 陽邪下早陷胸中 蕩滌苦寒內除熱
大黃二錢，芒硝一錢，甘遂末三分，水一杯，先煮大黃至六分，去渣，入芒硝，煮一二沸，納甘遂末，服得快利，勿再服。與承氣湯有上下之分。

大陷胸丸

陷邪迫处于心胸 倚則難寬勢欲昂 藜蘆大黃硝杏合 別尋蜜遂煮丸攻
大黃四錢，藜蘆子熬芒硝、杏仁各一錢半，搗為丸，如彈子大，每用一丸，入甘遂末三分，白蜜入半匙，水一杯，煮半杯，溫服，一宿乃下，如不下更服，以下為度。

小陷胸湯

不按自痛大結胸 小結脉浮按始痛 黃連半夏括蔞仁 痰沸驅除膈內空
黃連一錢，半夏二錢，括蔞實三錢。水二杯，先煮括蔞實至一杯余，入二味，再煮至七分服，微下黃涎，止后服。大承氣所下者燥屎，大陷胸所下者蓄水，此方所下者黃涎，涎者輕于蓄水而未成水也。

十枣湯

胸胁滿痛徒干嘔 水飲結搏成巨藪 甘遂芫花大戟末 十枣湯調涎痰否
芫花熬甘遂 大戟各等分，異籠杵末合和之。水二杯，先煮大枣十枚至七分，去渣，

納藥末，強人服八九分，羸人服五六分，平旦溫服。若下少，病不除，明日更服，加三分，利后糜粥自食，峻藥不可輕用！

文蛤散及文蛤湯

文蛤散原只一味 变散為湯七物兼 麻杏甘石姜枣加 金匱采來誠足貴
即文蛤一味為散，以沸湯和服二錢。此散取其殼能軟堅，利皮膚之水，內能滋陰止胸中之煩。金匱有文蛤湯，方用文蛤、麻黃、石膏、杏仁、甘草、生姜、大枣七味。文蛤非五倍子，其散主治渴欲飲水不止者。

三物白散

三物白散用三奇 桔梗相兼貝母宜 巴豆熬成白飲下 胸前寒實一時离
桔梗、貝母各四錢三分，巴豆一錢二分，去心熬黑，余各為末，以白飲和服八分，羸者減之，病在膈上必吐，病在膈下必利，不利必进热粥一杯，利不止进冷粥一杯。

大黃黃連泻心湯

汗下倒施邪遂痞 黃連加入大黃里 取汁只用麻沸湯 氣味輕清存妙理
大黃二錢，黃連一錢，以麻沸湯漬之，須臾絞去渣，溫服。此方主治虛痞，取其氣味俱清，不大瀉下而得攻之妙也！

附子泻心湯

氣痞惡寒兼汗出，三黃加入附子吉。回陽瀉痞不相妨，始識長沙法度密。
大黃二錢酒洗，黃連、黃芩俱炒各一錢，附子一錢，另煮取汁，以麻沸湯瀆三黃，須臾去
渣取汁，納附子汁合和，溫服。

生姜泻心湯

腹內雷鳴心下痞，生姜芩半干姜美。黃連甘草枣同煎，輔正人參功莫比。

生姜二錢，炙草、人參、黃芩各錢半，半夏一錢，大枣三枚，乾姜、黃連各五分，水煎服。

治痞不外瀉心湯，在太陽以生姜解肌為君，在陽明以甘草和中為君，在少陽以半夏升清降濁為
君，推少陽半表半里之意，邪氣盛則為實痞，陽明心下痞，余处無汗，惟心下有汗，厥
上浮者，以大黃、黃連瀉心湯主之。若因痞而復惡寒兼汗出，是寒熱相搏而成痞，以附子瀉
心湯主之。

厚朴生姜甘草半夏人參湯

發汗之后實邪戢，腹猶脹滿虛邪入。厚朴生姜草夏參，除脹補虛各安輯。

厚朴、生姜各四錢，炙草二錢，半夏二錢半，人參五分，水煎服。此方妙在厚朴除滿，余藥
補虛助胃。

赤石脂禹余糧湯

利在下焦防滑脫，禹余石脂兩相遏。理中未效此方奇，未止還从小便达。

赤石脂、禹余糧各二兩六錢，水三杯半，煎一杯服，日三服。二石皆土之精氣所結，故