

数理化自学丛书

代 数

第 三 册

数理化自学丛书编委会
数学编写小组编

上海科学技术出版社

数理化自学丛书

代 数 (第三册)

数理化自学丛书编委会

数 学 编 写 小 组 编

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路450号)

北 京 出 版 社 重 印

北京市新华书店发行

北京印刷二厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 12.25 字数 270,000

1963年12月第1版 1979年1月第1次印刷

书号: 13119-544 定价: 0.81 元

目 录

重印说明

第一章 不等式 1

§ 1.1 不等式的概念 1

§ 1.2 绝对不等式和条件
不等式 4

§ 1.3 不等式的基本性质 7

§ 1.4 一元一次不等式组 13

§ 1.5 一元二次不等式 22

§ 1.6 分式不等式 31

*§ 1.7 一元二次不等式组 37

*§ 1.8 高次不等式 40

§ 1.9 不等式的其他一些
性质 44

*§ 1.10 无理不等式 53

§ 1.11 不等式的证明 55

§ 1.12 关于绝对值的不等
式 59

本章提要 70

复习题一 73

第二章 函数和它的图象 77

§ 2.1 常量和变量 77

§ 2.2 函数 82

§ 2.3 函数的定义域 85

§ 2.4 函数的值 89

§ 2.5 平面上的直角坐标
系 91

§ 2.6 函数关系的表示法 98

§ 2.7 函数的图象的绘制 102

本章提要 105

复习题二 106

第三章 一次函数 109

§ 3.1 函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 109

§ 3.2 函数 $y=kx+b$
($k \neq 0$) 122

§ 3.3 根据已知条件确定
一个一次函数 129

§ 3.4 方程 $ax+by+c=0$
的图象 132

§ 3.5 二元一次方程组的
图象解法和解的组
数 137

本章提要 140

复习题三 141

第四章 二次函数 143

§ 4.1 函数 $y=ax^2+bx+c$
($a \neq 0$) 143

§ 4.2 二次函数的图象 144

§ 4.3 二次函数图象的作
法 153

§ 4.4 根据已知条件确定
二次函数 156

§ 4.5 二次函数的性质 159

§ 4.6 利用二次函数的图
象解一元二次方程 167

§ 4.7 利用二次函数的图象
解一元二次不等式 170

*§ 4.8 一元二次不等式的解 的讨论	173
本章提要	178
复习题四	179
第五章 有理指数的幂函 数	182
§ 5.1 函数 $y = a^x$	182
§ 5.2 函数的一些重要性 质	185
§ 5.3 函数 $y = x^{-1}$	192
§ 5.4 函数 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$	195
§ 5.5 函数 $y = x^{\frac{1}{2}}$ 和 $y = x^{\frac{1}{3}}$	198
§ 5.6 反函数	201
§ 5.7 单值函数和多值函 数	205
本章提要	209
复习题五	210
第六章 指数函数和对数函 数	212
§ 6.1 指数概念的扩展	212
§ 6.2 指数函数	216
§ 6.3 对数	226
§ 6.4 对数函数	231
§ 6.5 关于对数的定理	238
本章提要	244
复习题六	246
第七章 常用对数	249
§ 7.1 常用对数	249

§ 7.2 对数表	255
§ 7.3 常用对数的求法	258
§ 7.4 反对数表	267
§ 7.5 利用对数进行计算	270
§ 7.6 对数的换底公式	273
本章提要	276
复习题七	276
第八章 指数方程和对数方 程	279
§ 8.1 指数方程	279
§ 8.2 对数方程	284
*§ 8.3 指数方程和对数方程 的图象解法	290
*§ 8.4 指数和对数方程组	292
本章提要	295
复习题八	295
第九章 数列	297
§ 9.1 数列	297
§ 9.2 等差数列	307
§ 9.3 等比数列	318
§ 9.4 等差中项和等比中 项	327
*§ 9.5 数列的极限	333
*§ 9.6 无穷递缩等比数列	344
*§ 9.7 化循环小数为分数	349
本章提要	352
复习题九	354
总复习题	359
习题答案	368

第一章 不 等 式

在日常生活、生产实际和科学研究中,我们不但要考察量与量之间的相等关系,也要考察量与量之间的不等关系。反映在数学里,我们不但要研究等式,并且也要研究不等式。

在代数第二册里,我们曾学习过关于不等式的一些初步知识。这一章里,我们将在复习这些知识的基础上,系统地学习关于不等式的知识。

§1.1 不等式的概念

1. 实数大小的比较 我们知道,两个实数 a 与 b 之间,总存在,而且只存在,下面三种关系中的一种:

(1) a 大于 b , 记做 $a > b$;

(2) a 小于 b , 记做 $a < b$;

(3) a 等于 b , 记做 $a = b$ 。

我们还知道,要比较两个实数 a 和 b 的大小,只要考察它们的差就可以了,就是:

如果 $a - b$ 是正的,那末 $a > b$, 如果 $a - b$ 是负的,那末 $a < b$, 如果 $a - b$ 是零,那末 $a = b$;

反过来,如果 $a > b$, 那末 $a - b$ 是正的, 如果 $a < b$, 那末 $a - b$ 是负的, 如果 $a = b$, 那末 $a - b$ 是零。

用式子来表示,就是:

设 a, b 为两实数,

$$\begin{aligned} \text{如果 } a-b \begin{cases} >0, \\ <0, \\ =0, \end{cases} \quad \text{那末 } a \begin{cases} >b, \\ <b, \\ =b, \end{cases} \\ \text{反过来, 如果 } a \begin{cases} >b, \\ <b, \\ =b, \end{cases} \quad \text{那末 } a-b \begin{cases} >0, \\ <0, \\ =0. \end{cases} \end{aligned}$$

在上面所讲的式子里, $a > b$ 和 $a < b$ 这两个式子是用不等号“ $>$ ”和“ $<$ ”把两个实数 a 和 b 联结起来构成的, 它们都叫做不等式; $a = b$ 是用等号“ $=$ ”把两个实数 a 和 b 联结起来构成的, 它叫做等式.

2. 代数式的值的大小比较 有时候, 我们也要比较两个代数式的值的大小. 这时, 可以根据一个代数式的值大于、小于、或者等于另一个代数式的值, 而分别用符号“ $>$ ”, “ $<$ ”, 或者“ $=$ ”把它们联结起来. 在前两种情况下, 就组成了不等式; 在后一种情况下, 就组成了等式. 例如

$$3+2>4, \quad a+1<a+2$$

等等都是不等式;

$$3+2=5, \quad (a+1)^2=a^2+2a+1$$

等等都是等式.

因为单独用一个字母或数字所表示的数, 也可以看做是代数式, 所以我们说:

用不等号“ $>$ ”或者“ $<$ ”把两个代数式联结起来所成的式子叫做不等式; 用等号“ $=$ ”把两个代数式联结起来所成的式子, 叫做等式.

象比较两个实数的大小一样, 比较两个代数式的值的大小, 也只要考察它们的差就可以了.

例 1. 比较 $(x+3)(x-5)$ 和 $(x+2)(x-4)$ 的大小.

$$\begin{aligned}
 \text{【解】} \quad & (x+3)(x-5) - (x+2)(x-4) \\
 &= (x^2 - 2x - 15) - (x^2 - 2x - 8) \\
 &= -7 < 0, \\
 \therefore \quad & (x+3)(x-5) < (x+2)(x-4).
 \end{aligned}$$

例 2. 比较 $(x^2+1)^2$ 和 x^4+x^2+1 的大小.

$$\begin{aligned}
 \text{【解】} \quad & (x^2+1)^2 - (x^4+x^2+1) \\
 &= (x^4+2x^2+1) - (x^4+x^2+1) \\
 &= x^2.
 \end{aligned}$$

(1) 如果 $x=0$, 那末 $x^2=0$, 这时有

$$\begin{aligned}
 & (x^2+1)^2 - (x^4+x^2+1) = 0, \\
 \therefore \quad & (x^2+1)^2 = x^4+x^2+1.
 \end{aligned}$$

(2) 如果 $x \neq 0$, 因为不等于零的任何实数的平方都是正数, 所以 $x^2 > 0$. 这时有

$$\begin{aligned}
 & (x^2+1)^2 - (x^4+x^2+1) > 0, \\
 \therefore \quad & (x^2+1)^2 > x^4+x^2+1.
 \end{aligned}$$

注 上面这两种情况, 合在一起可以写做

$$(x^2+1)^2 \geq x^4+x^2+1.$$

这个式子表示 $(x^2+1)^2$ 的值不小于 x^4+x^2+1 的值.

象这种用符号“ $\geq$ ”(读做大于或等于)或者“ $\leq$ ”(读做小于或等于)把两个代数式联结起来的式子, 也叫做不等式. 为了区别, 我们把用符号“ $>$ ”或者“ $<$ ”联结而成的不等式叫做严格不等式, 而用符号“ $\geq$ ”或者“ $\leq$ ”联结而成的不等式叫做非严格不等式.

例 3. 比较 $(a-1)^2$ 和 a^2+1 的大小.

$$\begin{aligned}
 \text{【解】} \quad & (a-1)^2 - (a^2+1) = (a^2-2a+1) - (a^2+1) \\
 &= -2a.
 \end{aligned}$$

因为字母 a 可能表示正数或负数, 也可能表示零, 所以要分做三种情况来考察:

(1) 如果 a 是正数, 那末 $-2a$ 就是负数, 这时有

$$(a-1)^2 < a^2 + 1.$$

(2) 如果 a 是负数, 那末 $-2a$ 就是正数, 这时有

$$(a-1)^2 > a^2 + 1.$$

(3) 如果 a 是零, 那末 $-2a$ 也是零, 这时有

$$(a-1)^2 = a^2 + 1.$$

上面讨论的三种情况, 合在一起可以写做

$$(a-1)^2 \begin{cases} < a^2 + 1 & \text{如果 } a > 0, \\ > a^2 + 1 & \text{如果 } a < 0, \\ = a^2 + 1 & \text{如果 } a = 0. \end{cases}$$

习 题 1.1

比较下列各题中两个代数式的值的大小:

1. $(a-5)(a-7)$ 和 $(a-6)^2$.

2. $(a+1)(a^2-a+1)$ 和 $(a-1)(a^2+a+1)$.

3. $(x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$ 和 $(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$,
($x \neq 0$).

4. $a^2 + b^2$ 和 $2ab$.

【提示: 按照 $a=b$ 或者 $a \neq b$ 分别考察.】

5. $(\sqrt{x}-1)^2$ 和 $(\sqrt{x}+1)^2$.

§ 1.2 绝对不等式和条件不等式

在上节的例 1 中, 我们看到不论字母 x 表示什么实数, 不等式

$$(x+3)(x-5) < (x+2)(x-4)$$

总能成立. 在例 2 中, 我们看到当 $x \neq 0$ 的时候, 不等式

$$(x^2+1)^2 > x^4 + x^2 + 1$$

才能成立, 而当 $x=0$ 的时候, 这个不等式就不成立.

如果不论用什么数值代替不等式中的字母，它都能够成立，这样的不等式叫做绝对不等式。如果只有用某些范围内的数值代替不等式中的字母，它才能够成立，这样的不等式叫做条件不等式。

例如，不等式

$$(x+3)(x-5) < (x+2)(x-4)$$

和

$$a+1 > a-2$$

都是绝对不等式；而不等式

$$(x^2+1)^2 > x^4+x^2+1$$

和

$$(a-1)^2 < a^2+1$$

都是条件不等式。

两边都不含有字母而能够成立的不等式，也叫做绝对不等式。例如

$$5 > 3, \quad -5 < -3$$

等等，都是绝对不等式。

例1. 判断下列这些不等式中，哪些是绝对不等式，哪些是条件不等式？哪些不能成立？

$$(1) \sqrt{2} > 1.4; \quad (2) x^2+1 > 0;$$

$$(3) x^2+1 < 0; \quad (4) x+1 < 0.$$

【解】(1) 因为不等式 $\sqrt{2} > 1.4$ 的两边都不含有字母，并且 $\sqrt{2} = 1.414\cdots$ 的值确实大于 1.4，所以这个不等式是绝对不等式。

(2) 因为不论 x 是什么实数， x^2 都不是负数，因此 x^2+1 的值总大于零。这就是说，不论 x 是什么实数，不等式 $x^2+1 > 0$ 总能成立，所以这个不等式是绝对不等式。

(3) 因为不论 x 是什么实数， x^2+1 的值总大于零，所以不论用什么数值代替 x ，不等式 $x^2+1 < 0$ 都不能成立。

(4) 因为只有用比 -1 小的值代替 x , 不等式 $x+1<0$ 才能成立, 所以这个不等式是条件不等式.

在含有字母的不等式中, 求出字母应当取什么范围内的数值才能使不等式成立, 这个手续叫做解不等式. 这里的字母叫做不等式的未知数, 所求出的使不等式能够成立的未知数的那些数值范围, 叫做不等式的解.

从上面所举的例子中, 可以看到不等式的解可能有三种不同情况:

(1) 任何实数都是不等式的解: 例如任何实数都是不等式 $x^2+1>0$ 的解. 这种不等式就是绝对不等式.

(2) 只有某些范围内的实数是不等式的解: 例如只有比 -1 小的实数是不等式 $x+1<0$ 的解. 这种不等式就是条件不等式.

(3) 任何实数都不是不等式的解: 例如任何实数都不是不等式 $x^2+1<0$ 的解. 通常我们说这个不等式没有解.

例 2. 通过观察, 确定下列各不等式的解:

(1) $x^2<0$; (2) $(x-1)^2>0$; (3) $(x-1)^2+1>0$.

【解】(1) 不论 x 是什么实数, x^2 的值不能小于零, 这个不等式没有解.

(2) 只要 $x\neq 1$, $(x-1)^2$ 的值总大于零, 所以这个不等式的解是除去 $x=1$ 以外的全体实数, 也就是

$$x<1 \text{ 或者 } x>1.$$

(3) 不论 x 是什么实数, $(x-1)^2$ 的值都不能是负数, 因此 $(x-1)^2+1$ 的值总大于零. 所以这个不等式的解是全体实数.

习 题 1.2

1. 应用比较不等式左右两边两个代数式值的大小的方法, 证明下

列各不等式是绝对不等式:

$$(1) (x+1)(x-5) < (x-2)^2;$$

$$(2) (a+1)\left(a^2 + \frac{1}{2}a + 1\right) > \left(a + \frac{1}{2}\right)(a^2 + a + 1).$$

2. 通过观察, 确定下列各不等式的解:

$$(1) x^2 > 0;$$

$$(2) (x+1)^2 < 0;$$

$$(3) \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0;$$

$$(4) (x+1)^2 > 0.$$

3. 把下列不等式中左边的式子先配方化成 $(x+m)^2 + k$ 的形式, 再确定它的解:

$$(1) x^2 - 2x + 3 > 0;$$

$$(2) x^2 - x + 1 < 0;$$

$$(3) x^2 + 3x + \frac{9}{4} > 0;$$

$$(4) x^2 + x + \frac{1}{4} < 0.$$

§1.3 不等式的基本性质

对于等式来说, 我们已经知道它具有下面这些基本性质:

(1) 如果 $a=b$, 那末 $b=a$; 反过来, 如果 $b=a$, 那末 $a=b$. (相等的对称性)

(2) 如果 $a=b$, $b=c$, 那末 $a=c$. (相等的传递性)

(3) 如果 $a=b$, 那末 $a+c=b+c$.

(4) 如果 $a=b$, 那末 $ac=bc$.

类似地, 不等式也有下面这些基本性质:

性质 1. 如果 $a > b$, 那末 $b < a$; 反过来, 如果 $b < a$, 那末 $a > b$.

这个性质叫做不等的对逆性. 利用这个性质, 以后当我们研究不等式的时候, 只需研究用一种不等号 (例如用大于号 “ $>$ ”) 联结起来的不等式的性质, 就可以推出用另一种不等号 (例如用小于号 “ $<$ ”) 联接起来的不等式所具有的性质.

性质 2. 如果 $a > b$, $b > c$, 那末 $a > c$.

这个性质叫做**不等式的传递性**. 利用这个性质, 我们可以从一个不等式过渡到另一个不等式.

例如, 从不等式 $\pi > 3$ 和 $3 > 2\sqrt{2}$, 可以得出不等式

$$\pi > 2\sqrt{2}.$$

性质 3. 如果 $a > b$, 那末 $a + c > b + c$.

这个性质指出: 不等式的不等号两边加上一个相同的数, 仍旧得到一个不等式, 并且这个不等式与原来的不等式有相同的不等号.

例 1. 已知 $a + b > c$, 求证 $a > c - b$.

【证明】 在不等式 $a + b > c$ 的不等号两边同加上 $-b$, 得

$$a + b + (-b) > c + (-b),$$

$$\therefore a > c - b.$$

这个例子指出: 不等式中任何一项可以把它的符号变成相反的符号后, 从一边移到另一边.

过去我们在解一元一次不等式的时候, 就经常应用到这一法则(移项法则).

例 2. 解不等式 $3x - 1 > 2x$.

【解】 把不等式中含有 x 的项移到不等号的左边, 常数项移到不等号的右边得

$$3x - 2x > 1,$$

$$\therefore x > 1.$$

上面关于不等式的三个基本性质, 都是很明显的. 现在我们进一步来研究在一个不等式的不等号两边同乘以一个数(正数、负数、或者零)的时候, 将会产生怎样的结果. 我们先来看下面的例子.

例 3. 已知 $a > b$, 比较 ac 和 bc 的大小.

分析 要比较 ac 和 bc 的大小, 只要考察它们的差 $ac-bc$, 就是 $(a-b)c$ 是什么样性质的数就可以了. 根据已知条件 $a>b$, 可以知道差的一个因式 $a-b$ 一定是正数, 因此, 差 $(a-b)c$ 是正数、负数或者是零, 要根据 c 是正数、负数或零来确定.

【解】 $ac-bc=(a-b)c.$

$\because a>b, \therefore a-b$ 是正数.

(1) 如果 c 是正数, 那末因为两个正数的积仍是正数, 所以 $(a-b)c>0$, 这时 $ac>bc$.

(2) 如果 c 是负数, 那末因为一个正数与一个负数的积是负数, 所以 $(a-b)c<0$, 这时 $ac<bc$.

(3) 如果 c 等于零. 那末 $(a-b)c$ 等于零, 所以

$$ac=bc.$$

上面的例子, 指出了不等式的第四个基本性质.

性质 4. 如果 $a>b$, 那末

$$ac \begin{cases} > bc & (\text{当 } c>0 \text{ 的时候}), \\ = bc & (\text{当 } c=0 \text{ 的时候}), \\ < bc & (\text{当 } c<0 \text{ 的时候}). \end{cases}$$

过去, 我们在解一元一次不等式的时候, 也经常应用到这个性质.

例 4. 解不等式:

$$2(x+1) + \frac{x-2}{3} > \frac{7x}{2} - 1.$$

【解】 在不等式的两边同乘以 6, 得

$$12(x+1) + 2(x-2) > 21x - 6,$$

就是

$$14x + 8 > 21x - 6.$$

移项, 得

$$14x - 21x > -6 - 8,$$

就是

$$-7x > -14.$$

在上式的两边同除以 -7 （就是乘以 $-\frac{1}{7}$ ），得

$$x < 2.$$

答：原不等式的解是 $x < 2$ 。

为了讲法上的方便，当同时研究两个或几个不等式的时候，如果这些不等式里，每一个的左边都大于右边，或者每一个的左边都小于右边，那末就把这些不等式叫做同向不等式。例如不等式

$$3x-1 > 2x, \quad 3x-2x > 1 \quad \text{和} \quad x > 1$$

是同向不等式。如果两个不等式里，一个不等式的左边大于右边，而另一个不等式的左边小于右边，那末就把这两个不等式叫做异向不等式。例如不等式

$$-7x > -14 \quad \text{和} \quad x < 2$$

是异向不等式。

这样，我们也可把不等式的基本性质4说成：

不等式的两边同乘以一个正数，那末得到和原不等式同向的不等式；如果同乘以一个负数，那末得到和原不等式异向的不等式；如果同乘以零，那末得到一个等式。

注意 等式的两边同乘以一个相同的数，不论是正数、负数或者零，结果总是一个等式，但不等式的两边同乘以一个相同的数，就须要根据乘数的性质来确定它的结果。

所以在应用不等式的这一性质的时候，首先必须要考察用来乘不等式两边的数（或者代数式的值）究竟是正数，是负数，还是零，否则就容易发生错误。

***例5.** 解关于 x 的不等式

$$mx-2 > x-3m. \quad (1)$$

【解】 移项得

$$(m-1)x > 2-3m. \quad (2)$$

因为 $m-1$ 可能是正数或负数, 也可能是零, 所以需要研究三种情况:

(1) $m-1>0$, 这时 $m>1$. 在不等式(2)的两边同乘以正数 $\frac{1}{m-1}$, 得

$$x > \frac{2-3m}{m-1}.$$

(2) $m-1<0$, 这时 $m<1$. 在不等式(2)的两边同乘以负数 $\frac{1}{m-1}$, 得

$$x < \frac{2-3m}{m-1}.$$

(3) $m-1=0$, 即 $m=1$. 这时不等式(2)成为

$$0x > -1$$

的形式. 很明显, 不论 x 是什么实数, 这个不等式都能成立.

综合上面三种情况, 我们得到不等式(1)的解是:

$$x \begin{cases} > \frac{2-3m}{m-1}, & \text{如果 } m>1, \\ < \frac{2-3m}{m-1}, & \text{如果 } m<1, \\ \text{是全体实数,} & \text{如果 } m=1. \end{cases}$$

习 题 1.3

1. 求证:

(1) 如果 $a>b$, $b>c$, 那末 $a>c$;

(2) 如果 $a>b$, $b=c$, 那末 $a>c$;

(3) 如果 $a=b$, $b<c$, 那末 $a<c$.

[解法举例: (1) $\because a>b, b>c,$

$$\therefore a-b>0, b-c>0.$$

今

$$a-c=(a-b)+(b-c),$$

因为两个正数的和仍旧是正数, 所以 $a-c>0$, 由此可知 $a>c$.]

2. (1) 如果 $a>b$, $c=d$, 是否一定能得出 $ac>bd$, 为什么?

(2) 如果 $ac>bc$, 是否一定能得出 $a>b$, 为什么?

(3) 如果 $a<b$, 是否一定能得出 $ac^2<bc^2$, 为什么?

(4) 如果 $ac^2<bc^2$, 是否一定能得出 $a<b$, 为什么?

(5) 如果 $\frac{a}{c^2}<\frac{b}{c^2}$, 是否一定能得出 $a<b$, 为什么?

[解法举例: (1) 不一定. 因为 c 和 d 可能同时是正数, 也可能同时是负数, 也可能同时是零. 根据不等式基本性质 4, 只有在第一种情况下, 才能得到 $ac>bd$ 这一结论.]

3. 比较下列各组中两个代数式的值的大小:

(1) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$ 与 $6+2\sqrt{6}$;

(2) $(\sqrt{6}+1)^2$ 与 $6+2\sqrt{6}$;

(3) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$ 与 $(\sqrt{6}+1)^2$.

4. 解下列各不等式, 并且在数轴上表示出它们的解:

(1) $3[x-2(x-1)]<4x$;

(2) $5-\frac{x}{3}<\frac{7}{2}-\frac{4x+1}{8}$;

(3) $x-\frac{x-1}{2}>\frac{2x-1}{3}-\frac{x+1}{6}$;

(4) $(x-\sqrt{2})^2>(x+\sqrt{2})^2$;

(5) $5(x-1)-x(7-x)<x^2$;

(6) $(x+1)^2<(x-1)^2$;

(7) $(x^2+1)(2x-3)>(x^2+1)(3x-4)$;

* (8) $3x^2-2x<x^3-6$.

[解法举例: (7) $\because x^2+1>0$.


原不等式两边同除以 x^2+1 , 得

$$2x-3>3x-4,$$

移项得

$$-x>-1, \therefore x<1.$$

将这个解表示在数轴上, 如下图. 它是从 1 这一点开始向左的那一部分数轴, 但不包括 1 这一点.]



*5. 解下列关于 x 的不等式:

- (1) $ax + b^2 > bx + a^2$ ($a < b$);
- (2) $mx - n^2 < nx - m^2$ ($m < n$);
- (3) $k(x-1) > x-2$;
- (4) $(p-q)x < p^2 - q^2$ ($p \neq q$);
- (5) $mx - 3 > 2x + m$.

§ 1.4 一元一次不等式组

在解一些具体问题时,有时根据问题中的条件,未知数的数值范围,需要同时满足几个不等式. 例如: 某天的天气预报, 当天最低温度是摄氏 16 度, 最高温度是摄氏 22 度, 如果用 x 表示当天温度度数, 那末 x 可以取值的范围, 需要同时满足下面这两个不等式:

$$\begin{cases} x \geq 16, & (1) \\ x \leq 22. & (2) \end{cases}$$

我们说, 不等式 (1) 和 (2) 组成一个不等式组.

不等式 (1) 的解, 可用数轴上从表示数 16 的点 A 开始向右的射线 AX 来表示. 不等式 (2) 的解, 可用数轴上从表示数 22 的点 B 开始向左的射线 BX' 来表示. 这两条射线的公共部分是线段 AB (图 1.1).




图 1.1