

新 中 藥

民國十九年九月出版
民國廿三年七月四版

新
中
藥

(每冊實價大洋一元二角)

編纂者 黃 逸

總發行所 醫學書局

上海梅白克路二〇四號

寄售處 作者書社

上海福州路

彙文書局

上海河南南路

印刷者 人文印書館

山海關路二二九號

電話三四七八七號



版權
所有



南京中医药大学图书馆版权所有

新中藥序言

甚矣！今日中藥之衰頹也，任外人之侵略與國人之漠視，而業藥者，雖知保守舊法，炮製而已，未有絲毫謀改良之心，以振興我國產之藥物者，斯誠中藥之末運也已！雖然，我中藥之發現於東亞也，迄今四千餘載，首自神農嘗百草，以療民病，歷代以降，經先哲之苦心研究，討探之所得，著述羣經，流傳今世者，雖更僕數，如梁陶弘景之名醫別錄，與藥錄，劉宋雷斅之雷公炮炙論，北齊徐之才之對藥，魏李當之之李氏藥錄，吳晉之吳氏本草，唐之唐新本草，孫思邈之千金食治，陳藏器之本草拾遺，李珣之海藥本草，蕭炳之四聲本草，楊損之之刪繁本草，李含光之本草音義，杜善方之本草性事類，南唐陳士良之食性本草，蜀之蜀本草，宋之開寶本草，日華諸家本草，嘉祐補註本草，元經史證類大全本，金張元素之潔古珍珠囊，元李杲之用藥法象，王好古之湯液本草，吳瑞之日用本草，胡仕可之本草歌括，朱震亨之本草衍義補遺，明之重刊本草，徐彥純之本草發

揮周憲王之救荒本草，甯憲王之庚辛玉冊，汪穎之食物本草，甯原之食鑑本草，汪機之本草會編，陳嘉謨之本草蒙筌等，各述心得，各證功用，加訂補註，煞費苦心，至明神宗萬曆六年，李時珍會參各家名著，實行精密調查，于是蔚然巨觀之本草綱目始得告成，列藥凡二千餘種，每種敘述其釋名、產地、形態、採集、性味、功用、炮製、佐使、禁忌、畏反等，條分縷析，詳盡靡遺，若將此四千餘載之學術，數百餘輩先哲肝腦之結晶，坐視其散失淪亡，不亦大可惜乎？或曰：『夫藥物之存廢與否，咸以治病之效能偉大與否而定，今日中藥治病之效能，確遜於西藥多矣，雖有四千餘載之歷史，棄之又何足惜哉？』其不知中西相隔幾萬里，氣候既不同，人類之體質亦各異，以西藥治西人，固效速而功偉，以西藥治華人，則反是矣，此由於氣候與體質之不同，未可以強求適合也，至於西藥性猛而中藥性緩者，無非精製與不精製之別耳，中藥取自動植礦諸質，西藥亦復葢是，惟中藥僅取其原料，西藥必提其精華也。西人之於藥也，以化學分析其成分，施動物試驗其功用，然後用機械提煉其精華而精製之，回視中藥之炮製諸法，因陋就簡，與西藥截然不同，然

亦未嘗不可效法西藥而精製之；實緣國民乏團體研究之精神，政府無經濟之協助，以至老景頹唐，行將淘汰，益任外人之捆載海外，經提精製後，復售諸我邦。（如德商怡豐公司之Eugenol，日本三昌洋行之Macrin等）我國人無不欣然而爭購之，彼布滿原野，俯首卽是之原料，反棄而不取，此非大可怪耶？余不忍目覩中藥之淪亡，頗有志欲從而改進之，提倡之，以冀保存四千餘載之學術，挽回數十萬之利權，奈我國之藥物殷繁，個人精力有限，未能一一取而研究，茲搜羅效能確鑿，而切實合用之藥物百餘種，詳表其化學成分及生理作用，集成編，付諸剞劂，深願邦人君子，手執一編，讀之而有所興起，共謀策進之方，則行將湮沒之中藥，或有復興之一日，斯則著者區區之苦衷也，惟著者學識淺陋，復乏參考，誤謬之處，知所不免，竊冀讀者，曲諒譴陋，惠賜糾繩，以匡不逮也。

民國十八年十二月黃勞逸敬序

目錄

健胃劑

黃連 良薑 肉豆蔻 茴香 龍膽 丁香 木香 橙皮 方解石 苦參

白芥子 甘松香 竹節人參 葎草 蒲公英 生薑 菖蒲 麥芽

強壯劑

人參 藥木 牡蠣 何首烏 肉桂 龍眼 丹參 鹿角 大棗 雲母 白

石英 鹿角膠 無花果 青礬 槲櫟

興奮劑

番木鱉 麝香 龍腦 樟腦 靈貓香 茶 菸葉 甘松 乳香 白蘞 胡

椒 白楊皮 龍涎香

麻醉劑

薄荷 苡蓉 獨活 茵芋 烏頭 威靈仙 鬧羊花葉 鴉片 蔓陀羅華

薰草子 白芷

收斂劑

訶黎勒 五倍子 釀醋 玫瑰花 側柏葉 蘇木 兒茶 金櫻子 蜜陀僧

瀉下劑

大黃 巴豆 蘆薈 鼠李子 朴硝 槐花青 藤黃 桑椹 蓖麻子 石斛

精製硫 大麻

祛痰劑

半夏 杏仁 天花粉 萊菔 貝母 甘草 遠志 蘇合香 蒜頭 安息香

通經劑

鬱金 紅花 澤蘭 牡丹皮 當歸 白頭翁 野苢菜

利尿劑

郁李仁 厚朴 茯苓 薏苡仁 金雀花 白朮 葱白 葡萄 防己 華澄
茄

發汗劑

甜苦草 麻黃 礪砂 薄荷

解熱劑

黃芩 金雞勒 常山 荊芥 犀角 水仙花

殺蟲劑

綠青 石榴根皮 相思子 檳榔子 大楓子 鉤吻 貫衆 石灰 蘇合香
使君子 大蓼 爐甘石 礪石 礪砂

變質劑

砒石 雄黃 水銀 食鹽 丹砂 硝石 昆布 輕粉 粉霜

止血劑

鹿角膠 石決明 金盞花 綠礬 粉錫 珊瑚 烏賊骨 明魚膠 白蠟

黃蠟

新中藥

健胃劑

黃連 *Radix Coptidis*

別名 王連 支連 川連

產地 我國之四川、雲南、貴州。

種屬 毛茛科之黃連屬，爲 *Coptis japonica* 之根。

形態 形細長，有輪皺，四周生鬚根，色棕黃。

性味 呈弱酸性反應，味極苦。

成分 主要素爲 Berberine $C_{20}H_{17}NO_4$, Hydrastine $C_{21}H_{21}NO_6$ 。

作用 加增胃液之不足，使消化機能抗進，又能刺激脈管運動之中樞神經，而使腸壁之脈管收縮，如與痢病菌相遇，有制其繁殖力，并能阻止其本身之活動力。

醫治 胃酸缺乏之消化不良症、初期赤痢、慢性腸炎、漏膿眼。

用量 每次0.2 gm 至 1.5 gm

用法 內服取水煎飲、外用水煎洗患處。

忌症 胃酸過多之消化不良症。

反藥 與黃芩、龍骨、連翹、滑石等配合、反菊花、芫花、玄參、白蘚、款冬花、豬

處方 和黃芩、黃柏、知母、甘草、治急性胃炎、佐槐花、枳殼、乳香、沒藥、治初期赤痢、合黃芩、茯苓、白朮、澤瀉、大黃、枳實、治胃酸缺乏之消化不良症、同菊花、桑葉、治漏膿眼。

良薑 *Galanga*

別名 高良薑 蠻薑

產地 我國之福建、廣東二省產者爲著。

種類 屬 荷科、爲 *alpinia galangas* 之地下莖。

形態 圓柱形、如萊菔、長二寸許、闊四五分、外面多節環、且有細皺紋、表面被薄皮、色褐

赤、內部色白。

性味 呈酸性反應、味極辣、有香氣。

成分 主要素爲 Kamferid $C_{16}H_{12}O$ 、 H_2O 、Galangin、Alpinin、餘爲揮發油、澱粉等。

作用 能刺激胃壁神經、使消化機能抗進、亦能刺激腸壁血管、使之收縮、傷寒霍亂等菌遇之、即感強烈之刺激而死。

醫治 初期虎列拉、橫隔膜驚攣、急性腸加答兒。

用量 每次 0.5gm 至 4.0gm。

用法 煎服。

忌症 腎臟炎。

反藥 石灰、蛤殼、蜆殼。

處方 同半夏、白茯苓、陳皮、甘草、治胃液缺乏症、和當歸、草豆蔻仁、治胃痛、佐白芍、蘇木、

治急性腸加答兒。

肉豆蔻 Semen Myristicae

別名 肉果 迦拘勒

產地 我國之廣東。

種類 屬豆蔻科，爲 *myristica fragrans* 之果中之核。

形態 形卵圓、面平滑、包有褐黑色之厚殼、有多數橫枝狀縱線、間有網形之小脉、內藏灰褐色之薄膜仁、仁之表面有褐色之網狀隆起、中心稍呈白色。

性味 呈弱酸性反應、味稍辣、氣辛香。

成分 主要素爲揮發油。

作用 用小量能促進胃液之分泌、使消化力增加、用大量能增加心臟跳動、漸呈麻醉狀、或由麻醉狀態而成血尿而死。

醫治 神經性食慾缺乏、直腸炎。

用量 每次 0.3gm 至 1.0gm.

用法 搗碎吞服。或煎飲。

忌症 胃出血、胃液溢。

反藥 鐵質。

處方 同人參、補骨脂、吳萸、砂仁、治神經性食欲缺乏、和陳皮、藿香、甘草、治直腸炎。

茴香 *Semen Faeniculi*

別名 蘘香子

產地 我國之廣西、雲南、貴州。

種類 繖形科之多年生草。爲 *Faeniculum capillaceum* 之實。

形態 長二分許之圓柱狀、色灰黃、尖端有圓錐形之柱頭、易分裂。

性味 呈酸性反應、味略辛、氣芳香。

成分 主要素爲 *Anethol* $C_{10}H_{12}O$ 。

作用

能刺激胃腸之血管、使精神奮興、全身血液流動增速。

醫治

神經衰弱之消化不良症。

用量

每次 1.0gm 至 5.0gm。

用法

煎水飲、或研末服。

忌症

便秘。

醫治

大黃。

處方

合荔枝核、山藥、白芍、甘草、白茯苓、焦米、治神經衰弱之消化不良症。

龍膽 *Radix Gentiane*

別名

陵游

產地

我國之四川、

種類

龍膽科之多年生草、爲 *gentiana lutea* 之根、

形態

長約十浬、闊五耗、有不整齊之輪節、色灰褐、周圍生副根、橫斷面亦呈褐色。

性味 呈弱酸性反應、味略苦、

成分 Gentiopicrin $C_{20}H_{36}O_{12}$, Gentianose $C_{33}H_{66}O_{33}$, Gentsin $C_{14}H_{10}O_5$, Sugar.

作用 助胃液分泌之不足、以促進消化之功能、并能激腸壁神經、使腸之微血管收縮、且含有糖質、能助長酵素之作用。

醫治 慢性胃粘膜炎。

用量 每次1.0gm 至 5.0gm.

用法 煎服。

忌症 胃液溢、便秘。

反藥 鐵質、防風、地黃、鉛粉、銀質。

處方 合犀角、洋蘆薈、川連、連翹、銀花、寸冬、知母、甘草、治慢性胃粘膜炎。

丁香 *Caryophylli*

別名 丁子香 雞舌香

產地 我國之廣東番禺。

種類 桃金娘科之常綠喬木爲 *jambosa Caryophyllus* 之花蕾。

形態 莖長三寸、闊一分、莖瓣缺裂四個、截片爲三角形、質柔韌似革、有濃褐色脂肪樣之光澤、實尖端分二房、中包藏多數之卵子。

性味 呈弱酸性反應、味稍辣、氣芳香。

成分 主要素爲 $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$, Methyl-eugenol $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$, Isocougerol $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$, Vanillin $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3$, Methyl-vanillin $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_3$, 餘爲單甯酸、樹脂、樹脂等。

作用 能使胃黏膜充血、令人覺餓、并能促進胃液之加增、使胃之蠕動迅速、又能刺激腸壁神經、使腸之蠕動加增、及被吸收而入血管內、能收血中之氮、更能增白血球之數、使大腦及主要神經皆受激動而興奮、心臟之跳動亦同時抗進、與霍亂菌相遇、能停止