

湯液本草

R2  
12

元 王好古著

湯 液 本 草

人民衛生出版社影印

# 湯 液 本 草

開本：850×1168 / 32

印張：2  $\frac{7}{8}$

元 王好古 著

人 民 衛 生 出 版 社 影 印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

· 北京崇文區綏子胡同三十六號 ·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

統一書號：14048·0981      1956年9月第1版—第1次印刷  
定 價： 0.40 元      (北京版) 印數： 1~12,000

## 內容簡介

本書是一本簡要的本草書，為元、王好古所著。所謂「湯液」者，即相當於「煎劑」的意義；由於中醫在內科治療中大多採用內服「煎劑」，因此本書名為「湯液本草」。

全書共分上、中、下三卷。上卷為總論，首列「五臟苦欲補瀉藥味」，說明各藥性味對於人体的影响，從而概括地介紹用藥的原則；次敘「藥類法象」「用藥心法」，都是引用元代名醫李杲關於藥物學的一種論說，主要是用中醫陰、陽、寒、熱、表、裡等基本理論來說明各藥性味、作用、用法等問題。最後所附的「五宜五傷」和「七方十劑」等是作者關於用藥宜忌和方劑配合上的研究心得。卷中及卷下，載列藥物二百多種，分成草、木、果……等九大部，每藥之下，各有「氣味」、「性能」、「主治病症」等項，所有論據除引用「神農本草經」以下各家本草書外，特別增入當代名醫李杲、張元素的學說。因此本書雖然所載藥物不多，但包含着一部份我國本草學在宋、元時代的新成就。故對研究古代本草學，本書實有參考價值。

湯液本草序

世皆知素問爲醫之祖。而不知軒岐之書。實出於神農本草也。殷伊尹用本草爲湯液。漢仲景廣湯液爲大法。此醫家之正學。雖後世之明哲有作。皆不越此。予集是書。復以本草正條各從三陰三陽一二經爲例。仍以王病者爲元首。臣佐使應次之。不必如編類者。先玉石。次草木。次蟲魚。以上中下三品爲門也。如太陽經當用桂枝湯。麻黃湯必以麻黃桂枝爲主。本方中餘藥後附之。如陽明經當用白虎湯。必以石膏爲主。本方中餘藥後附之。如少陽經當用三禁湯。必以柴胡爲主。本方中餘藥後附之。如太陰少陰厥陰之經。所用熱藥。皆倣諸此。至於金匱祖方。湯液外定爲常制。凡可用者。皆雜附之。或以傷寒之劑。改治雜病。或以權宜之料。更療常疾。以湯爲散。以散爲圓變。易百端。增一二味。別作他名。減一二味。另爲殊法。醫壘元戎。陰證略例。癥論萃英。錢氏補遺等書。安樂之法。湯液本草統之。其源出於潔古老人。珍珠囊也。其間議論出新意於法度之中。註奇辭於理趣之外。見聞一得。久弊全更。不特藥品之咸精抑亦疾病之不悞。大橫不至。壽域可期。其湯液本草歟。

湯液本草序

神農寘百草。立九候。以正陰陽之變化。以救性命之危札。以爲萬世法。既簡且要。殷之伊尹宗之。倍于神農。得立法之要。則不害爲湯液。漢張仲景廣之。又倍於伊尹。得立法之要。則不害爲確論。金匱。梁古老人派之。又倍於仲景。而亦得盡法之要。則不害爲奇証。累古倍於仲景。無以異。仲景之倍於伊尹。仲景之倍於伊尹。無以異。伊尹之倍於神農也。噫。宗之廣之派之。雖多寡之不同。其所以得立法之要。則一也。觀潔古之談。則知仲景之言。觀仲景之言。則知伊尹之意。亦命書闕一不可矣。成無己明理方例云。自古諸方皆不出於神農矣。所以先本草。次湯液。次傷寒論。次伊尹之法。伊尹本神農之方。醫帙之中。特爲縝細。參合古法。不越毫末。實大聖之所作也。文潞公藥準云。歲浸遠難可考。憑仲景方最爲衆方之祖。是仲景本伊尹之法。伊尹本神農之方。醫帙之中。特爲縝細。參合古法。不越毫末。實大聖之所作也。文潞公藥準云。惟仲景爲群方之祖也。昔唐宋以來。得醫之名者。如王叔和。葛洪。孫思邈。范汪。胡洽。朱奉議。王朝奉。錢仲老人。張元素。遇至人。傳祖方。不傳之妙法。嗣是其子。

雲岐子張壁東垣先生李杲明之皆祖長沙張仲景湯液。惜乎世莫能有知者。予受業於東垣老人故敢以題。丙午夏六月王好古書。

劉禹錫云。神農本經以硃書名醫別錄以墨書傳寫既久。硃墨錯亂。遂令後人以爲非神農書。以此故也。至於素問。本經議者以爲戰國時書。加以補亡數篇。則顯然非太素中語。宜其以爲非軒岐書也。陳無擇云。王叔和脉訣即高陽生剽竊。是亦後人增益者雜意也。何以知其然。予觀劉元賓註本雜病生死歌後之也。本即少八句。觀此八句不甚滑溜。與上文書意重疊。後人安得不疑。與本草硃書雜亂。素問之補亡混敍。何以異哉。宜乎識者非之。繼而紛紜不已也。吾不知他時誰爲是正。如元賓與潔古詳究而明確。

其中凡有所疑而不古者削去之。或不復註而直書本文。吾不知爲意易曉不必云耶。爲非聖賢之語而辯之耶。二者必居一於此。又啓玄子註素問恐有未盡。以硃書待明者改刪增益。傳錄者皆以墨書其中。不無差誤。如刺熱論註五十九刺。首云王註。竟啓玄子之自謂乎。此一篇又可疑也。兼與靈樞不同。以此經比之素問八十九刺何者爲的。以此觀之。若是差別。勞而無益。學者安所適從哉。莫若以金匱考之。仲景所不言者。皆所不取。則正知真見定矣。盧若論血枯舉太素云。此得之年少時大脫血而成。又舉子死腹中穢物不消。又舉犯月水入房。精與積血相射。入於任脉留於胞中。古人謂之精積。元豐中雄州陳邦藩收一方治積精及惡血淹留。胞冷絕脈。驗者甚多。其意與內經相近。烏賊魚骨本治漏下。與經汁不斷。蓋去淹留惡血。古人用此皆本草法。予觀方註條云。古人用此皆本草法一句。何其知本哉。以是知軒岐之一法哉。故知張伯祖之學皆出於湯液。仲景師而廣之。迄今湯液不絕矣。晉唐宋以來號明醫者。皆出於神農也。又知伊尹湯液不出於軒岐。亦出於神農也。皆之一字至甚深廣也。豈獨烏賊斷汁之一法哉。故知張伯祖之學皆出於湯液。仲景師而

於此至今大定間潔古老人張元素及子雲岐子張壁東垣李杲明之三老者出想千百載之下無復有之也何以知其然蓋當時學者雖多莫若三老之實絕也。昔戊申仲夏晦日王好古書于家之草堂。

五方之正氣味制方用藥附

東垣先生用藥心法

隨證治病藥品

用藥凡例

東垣報使

諸經嚮導

製方之法

用藥各定分兩

用藥酒洗曝乾

用藥根梢身例

用圓散藥例

升合分兩

君臣佐使法

治法綱要

藥味專精

湯液煎造

古人服藥活法

古人服藥有法

察病輕重

海藏老人湯液本草

五宜

五傷

論藥所生

服藥可慎

天地生物有厚薄堪用不堪用

氣味生成流布

七方

十劑

氣味厚薄寒熱陰陽升降圖

升降者天地之氣交

用藥升降浮沉補瀉法

五味所甲

藥類法象

海藏 王好古 類集

新安 吳中珩 校正

五臟苦欲補潤藥味

肝苦急。急食甘以緩之。甘草欲散。急食辛以散之。川芎。以辛補之。細辛。以酸瀉之。芍藥。虛以生薑陳皮之類補之。經曰虛則補其母。水能生木。腎乃肝之母。腎水也。苦以補腎。熟地黃黃藥是也。如無他證。

錢氏地黃丸主之。實則白芍藥瀉之。如無他證。錢氏瀉青丸主之。實則瀉其子。心乃肝之子。以甘草瀉心。

心苦緩。急食酸以收之。五味子。欲軟急食鹹以軟之。苦确。以鹹補之。澤瀉。以甘瀉之人參黃芪甘草虛以炒鹽補之。虛則補其母。木能生火。肝乃心之母。輕則導赤散。

肝木也。以生薑補肝。如無他證。錢氏安神丸主之。實則甘草瀉之。如無他證。錢氏方中重則瀉心湯。

之母。以炒鹽補心。實則以枳實瀉之。如無他證。以瀉黃散瀉之。肺乃脾之子。以桑白皮瀉肺。

肺苦氣上逆。急食苦以瀉之。荊子皮。一作黃芩。欲收急食酸以收之。白芍藥。以辛瀉之。桑白皮。以酸補之。五味子。虛則五味子補之。如無他證。錢氏阿膠散補之。脾乃肺之母。以甘草補脾。實則桑白皮瀉之。如無他證。以瀉白散瀉之。腎乃肺之子。以澤瀉瀉之。腎。

腎苦燥。急食辛以潤之。知母黃藥欲堅。急食苦以堅之。知母。以苦補之。黃藥。以鹹瀉之。澤瀉。虛則熟地。

黃黃藥補之。腎本無實不可瀉。錢氏止有補腎地黃丸。無瀉腎之藥。肺乃腎之母。以五味子補肺。以上五臟補瀉。內經臟氣法時論中備言之。欲究其精詳看本論。

臟腑瀉火藥

黃連瀉心火

木通瀉小腸火

黃芩瀉肺火

黃連佐之柴胡瀉肝火

柴胡瀉肝火

黃連佐之柴胡瀉膽火

石膏瀉胃火

知母瀉腎火

黃藥瀉膀胱火

柴胡瀉三焦火

黃芩佐之

以上諸藥各瀉其火。不惟止能如此。更有治病  
合爲君。合爲臣處。詳其所宜而用。勿執一也。

味之薄者爲陰中之陽。味薄則通。酸苦鹹平是也。味

之厚者爲陰中之陰。味厚則泄。酸苦鹹寒是也。氣之  
厚者爲陽中之陽。氣厚則發熱。辛甘溫熱是也。氣之  
薄者爲陽中之陰。氣薄則發泄。辛甘淡平涼寒是也。

輕清成象

味薄茶之類

本乎天者親上

之

重濁成形

味厚大黃之類

本乎地者親下

之

氣味辛甘發散爲陽

酸苦滯伏爲陰

清陽發腠理

清之清者也

清陽實四肢

清之濁者也

濁陰歸六腑

濁之濁者也

濁陰走五臟

濁之清者也

藥性要旨

苦藥平升

微寒平亦升

甘藥平降

甘寒瀉火

苦寒瀉熱

苦甘寒瀉血熱

東垣先生藥類法象

用藥法象

天有陰陽

風寒暑濕燥火

三陰三陽上奉之

溫涼寒熱四氣是也。溫熱者天之陽也。涼寒者天  
之陰也。此乃天之陰陽也。

地有陰陽

金木水火土

生長化收藏下應之辛甘淡

酸苦鹹者地之陰也。此乃地之陰陽也。

調胃之甘

用藥升降浮沉補瀉法

肝膽

味辛補酸瀉 氣溫補涼瀉

肝膽之經前  
後寒熱不同

入求責法

逆順互換

心小腸

味鹹補甘瀉 氣熱補寒瀉

二焦命門補  
陽同

脾胃

味甘補苦瀉 氣溫涼寒熱補瀉

各從其  
宜

入求責法

逆順互換

肺大腸

味酸補辛瀉 氣涼補溫瀉

腎膀胱

味苦補鹹瀉 氣寒補熱瀉

水去則榮散，穀消則

五臟更相平也

一臟不平所勝平之此之謂也

故云安穀則昌絕穀則亡

水去則榮散，穀消則

衛亡榮散衛亡神無所居又仲景云

水入於經

其血乃成穀入於胃脈道乃行

故血不可不養

衛不可不溫血溫衛和榮衛將行常有天命矣

五味所用

苦泄

甘緩

酸收

鹹軟

淡滲泄

辛散

藥類法象

風升生

味之薄者陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是

也

防風

純陽性溫味甘辛

氣微溫

升麻

氣平味微苦

柴胡

氣平味苦辛

羌活

味苦甘平

氣微溫

葛根

氣平味甘

味甘

氣平

麻靈仙

味苦甘平

氣溫

葛根

氣平味苦辛

味甘

氣平

中之陽所以清頭目

在地之陰也陰當下行何謂發汗而升上經云

味之厚者乃陽中之陰故

茯苓淡爲在天之陽也陽當上行何謂利水而泄下

經云氣之薄者乃陽中之陰所以茯苓利水而泄下

然而泄下亦不利乎陽之體故入手太陽麻黃苦爲

在地之陰也陰當下行何謂發汗而升上經云味之

薄者乃陰中之陽所以麻黃發汗而升上然而升上

亦不利乎陰之體故入手太陰附子氣之厚者乃陽

中之陽故經云發熱大黃味之厚者乃陰中之陰故

經云泄下粥淡爲陽中之陰所以利小便茶苦爲陰

中之陽所以清頭目

升陰陽

味之厚者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

降陰

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

升陽

味之薄者乃陰中之陽

氣微溫

氣平

氣平

氣平

獨活氣微溫

味苦甘平

細辛氣溫

味大辛

桔梗氣微溫

味甘辛

大麥芽氣溫

味甘鹹

桃仁氣溫

味甘苦

紫草氣寒

味苦

白芷氣溫

味大辛

藁本氣溫

味大辛

風黏子氣平

味辛

蘇木氣平味甘鹹

一作味酸

燥降收氣之薄者陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平

寒涼是也

茯苓氣平

味甘

滑石氣寒

味甘

瞿麥氣平

味甘

車前子氣寒

味甘

澤瀉氣平

味甘

猪苓氣寒

味甘

大麥氣寒

味甘鹹

葛根氣微寒

味大辛

薄荷氣溫

味苦辛

天麻氣平

味苦

滑石氣寒

味甘

五味子氣溫

味酸

桑白皮氣寒

味苦酸

燈心草氣平

味甘

烏梅氣平

味酸

牡丹皮氣平

味苦

天門冬氣寒

味微苦

白芍藥氣微寒

味酸

麥門冬氣寒

味微苦

地骨皮氣寒

味苦

枳殼氣寒

味苦

琥珀氣平

味甘

連翹氣平

味苦

枳實氣寒

味苦酸

木通氣平

味甘

黑附子氣熱

味大辛

烏頭氣熱

味大辛

乾薑氣熱

味大辛

滑石氣寒

味甘

瞿麥氣平

味平

澤瀉氣平

味甘

桂枝氣熱

味甘辛

大黃氣寒

味苦

黃芩氣寒

味苦

白豆蔻氣熱

味大辛

生地黃氣寒

味苦

黃連氣寒

味苦

紅藍花氣溫

味辛

石膏氣寒

味辛

草龍膽氣寒

味大苦

當歸氣溫

味甘

知母氣寒

味大辛

茵陳氣微寒

味苦平

川練子氣寒

味苦平

防已氣寒

味大苦

瓜蔞根氣寒

味苦

半夏氣平

味辛平

山梔子氣寒

味微苦

陳皮氣溫

味微苦

青皮氣溫

味甘

香豉氣寒

味苦

地榆氣微寒

味甘鹹

柏榔氣溫

味辛平

人參氣溫

味甘

杏仁氣溫

味甘平

阿膠氣微溫

味甘辛

標本陰陽論

七

此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

夫治病者當知標本以身論之則外爲標內爲本陽爲標陰爲本故六腑屬陽爲標五臟屬陰爲本此臟腑之標本也又臟腑在內爲本各臟腑之經絡在外爲標此臟腑經絡之標本也更人身之臟腑陰陽氣血經絡各有標本也以病論之先受病爲本後傳流病爲標凡治者必先治其本後治其標若先治其標後治其本邪氣滋其其病益畜若先治其本後治其標雖病有十數證皆去矣謂如先生輕病後茲生重病亦先治輕病後治重病如是則邪氣乃伏蓋先治本故也若有中滿無間標本先治中滿謂其急也若中滿後有大小便不利亦無間標本先利大小便次

治中滿謂尤急也除大小便不利及中滿二者之外皆治其本不可不慎也從前來者爲實邪從後來者爲虛邪此子能令母實母能令子虛是也治法云虛則補其母實則瀉其子假令肝受心火之邪是從前來者爲實邪當瀉其子火也然非直瀉其火十二經中各有金木水火土當木之分瀉其火也故標本論云本而標之先治其本後治其標既肝受火邪先於肝經五穴中瀉榮心行間穴是也後治其標者於心經五穴內瀉火少府穴是也以藥論之入肝經藥

爲之引用瀉心火藥爲君是治實邪之病也假令肝受邪是從後來者爲虛邪虛則當補其母故標本論云標而本之先治其標後治其本既受水邪當先於腎經湧泉穴中補水是先治其標後於肝經曲泉穴中瀉水是後治其本此先治其標者惟其至理亦是先治其本也以藥論之入腎經藥爲引用補肝經藥爲君是也

五方之正氣味制方用藥附

東方甲風乙木其氣溫其味甘在人以肝膽應之

南方丙熱丁火其氣熱其味辛在人以心小腸三焦包絡應之

中央戊濕其本氣平其無氣溫涼寒熱在人以胃應之

西方庚燥辛金其氣涼其味酸在人以肺大腸應之

北方壬寒癸水其氣寒其味苦在人以腎膀胱應之

人乃萬物中之一也獨陽不生獨陰不長須稟兩儀之氣而生化也聖人垂世立教不能渾說必當分析以至理而言則陰陽相附不相離其實一也呼則因經五穴內瀉火少府穴是也以藥論之入肝經藥

陽出吸則隨陰入。天以陽生陰長。地以陽殺陰藏。此上說止明補濕用藥君之一也。故曰主病者爲君。用藥之機會。要明輕清成象。重濁成形。本乎天者親上。

本乎地者親下。則各從其類也。清中清者清肺以助其天真。清中濁者榮華勝理。濁中清者榮養於神。濁中濁者堅強骨髓。故至真要大論云。五味陰陽之用。

辛甘發散爲陽。酸苦湧泄爲陰。淡味滲泄爲陽。鹹味湧泄爲陰。六者或收或散或緩或急或燥或潤或軟或堅。各以所利而行之。調其氣使之平也。詳見本論。

### 東垣先生用藥心法

#### 隨證治病藥品

如頭痛湧用川芎。如不愈。各加引經藥。

太陰川芎

陽明白芷

少陽柴胡

如頂顛痛。湧用藁本去川芎。

少陰細辛

厥陰吳茱萸

如肢節痛。湧用羌活。去風濕亦宜用之。

太陽川芎

少陽柴胡

如腹痛。湧用芍藥。惡寒而痛加桂。惡熱而痛加黃芩。

太陰葛根

少陰細辛

如心下痞。湧用枳實黃連。

太陰葛根

少陽柴胡

如肌熱及去瘍者。湧用黃芩。肌熱亦用黃芩。

太陰葛根

少陽柴胡

如腹脹。用薑制厚朴。

一本有  
芍藥

少陽柴胡

如虛熱湧用黃芩。止虛汗亦用。

如腸下癟。往來潮熱。日脯潮熱。湧用柴胡。

如脾胃受濕。沉困無力。怠惰好卧。去痰用白朮。

如破滯氣用枳殼。高者用之。夫枳殼者損胃中至高之氣。二三服而已。

如破滯血用桃仁蘇木。

如補血不足。湧用甘草。

如去痰。湧用半夏。熱痰加黃芩。風痰加南星。胸中寒痰。痞塞用陳皮白朮。多用則瀉脾胃。

如腹中窄狹。湧用蒼朮。

如調氣湧用木香。

如補氣湧用人參。

如和血湧用當歸。凡血受病者皆宜用當歸也。

如去下焦濕腫及痛。并膀胱有火邪者。必湧酒洗防己。草龍膽黃藥知母。

如去上焦濕及熱。湧用黃芩。爲肺火故也。

如去滯氣。用青皮。勿多服。多則瀉人真氣。

如去滯氣。用乾葛。伏苓。禁半夏。

如渴者。用乾葛。伏苓。禁半夏。

如喘者用阿膠。

如宿食不消湏用黃連枳實。

如胷中煩熱湏用梔子仁。

如水濁湏用白朮茯苓芍藥。

如氣刺痛用枳殼看何部分以引經藥導使之行則可。

如血刺痛用當歸詳上下用根梢。

如瘡痛不可忍者用寒苦藥如黃蘖黃芩詳上下用

根梢及引經藥則可。

如眼痛不可忍者用黃連當歸身以酒浸煎。

如小便黃者用黃檗數者澁者或加澤瀉。

如腹中實熱用大黃芒硝。

如小腹痛用青皮。

如莖中痛用生甘草梢。

如驚悸恍惚用茯神。

如飲水多致傷脾用白朮茯苓猪苓。

如胃脘痛用草豆蔻。

凡用純寒純熱藥必用甘草以緩其力也。寒熱

相雜亦用甘草調和其性也。中滿者禁用。經云

中滿者勿食甘。

### 用藥凡例

凡解利傷風以防風爲君。甘草白朮爲佐。經云辛甘發散爲陽。風宜辛散。防風味辛及治風通用。故防風爲君。甘草白朮爲佐。

凡解利傷寒以其草爲君。防風白朮爲佐。是寒宜甘發也。或有別證於前隨證治病藥內選用分兩以

君臣論。

凡眼暴發赤腫以防風黃芩爲君。以瀉火。以黃連當歸身和血爲佐。無以各經藥用之。

凡眼久病昏暗以熟地黃當歸身爲君。以卷活防風爲臣。甘草甘菊之類爲佐。

凡痢疾腹痛以白芍藥甘草爲君。當歸白朮爲佐。下血先後以三焦熱論。

凡水濁以茯苓白朮爲君。芍藥甘草爲佐。

凡諸風以防風爲君。隨治病爲佐。

凡嗽以五味子爲君。有痰者以半夏爲佐。喘者以阿膠爲佐。有熱無熱以黃芩爲佐。但分兩多寡不同耳。

凡小便不利黃蘖知母爲君。茯苓澤瀉爲佐。

凡下焦有濕草龍膽防己爲君。甘草黃蘖爲佐。

凡病漏以蒼朮防風爲君，甘草芍藥爲佐，詳別證加減。

凡諸瘡以黃連當歸爲君，甘草黃芩爲佐。

之。

已上皆用藥之大要，更詳別證於前隨證治病。

藥內逐旋加減用之。

東垣報使

太陽

羌活

下黃藥

陽明

白芷升麻

下石膏

少陰

柴胡

下青皮

太陰

白芍藥

下黃藥

少陰

知母

下黃藥

厥陰

青皮

柴胡

小腹膀胱屬太陽

藁本羌活是本方

三焦膽與肝包絡

少陽厥陰柴胡強

陽明大腸無足胃

葛根白芷升麻當

太陰肺脾中焦起

白芷升麻葱白鄉

脾經少與肺經異

升麻芍藥白者詳

少陰心經獨活王

腎經獨活加桂良

通經用此藥爲使，更有何病到膏肓。

已	足	脾	圖	導	需	經	太	肺	手	寅	南星	蓼花	升麻	桔梗	檀香
代赭石	草薢	益智	防風	當歸			阿膠	山藥	白芍	升麻	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗
赤茯苓	黃芪	黃芪	當歸	當歸			丁香	麥門冬	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
麻仁	蒼朮	蒼朮	當歸	當歸			桑皮	桑皮	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
甘草	白术	白术	當歸	當歸			杏仁	杏仁	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
半夏	膠船	膠船	當歸	當歸			白芷	白芷	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
	延胡索	延胡索	當歸	當歸			知母	知母	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
	縮砂	縮砂	當歸	當歸			施子	施子	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
							黃芩	黃芩	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
							石膏	石膏	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
							木瓜	木瓜	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
							藿香	藿香	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
							升麻	升麻	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍
							芍藥	芍藥	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍	桔梗	白芍

升麻 白芷 麻仁 秦艽 薩白  
白石脂 縮砂 白石脂爲使 肉豆蔻 石膏

沙參 白术 柴胡 熟地黃 牡丹皮  
敗醬

青皮 柴胡

手太陽經

足少陽經

導圖

嚮圖

足太陽經

足少陽經

導圖

手太陽經

導圖

足太陽經

子臍圖

半夏

草薢

柴胡

申酉足太陽經圖

未戌手太陽經圖

辰戌足陰經圖

亥午手陰經圖

巳未足太陽經圖

子卯手太陽經圖

丑未足陰經圖

戌申手陰經圖

酉亥足太陽經圖

午戌手太陽經圖

卯酉足陰經圖

丁香 薑蔻 縮砂 防風 石膏  
知母 白术 神曲 葛根 烏藥  
半夏 蒼朮 升麻 白芷 葱白  
川芎 柴胡 青皮 热地黃  
黃耆 地骨皮 石膏 細辛 附子

麻黃 大黃 連翹 茵陳  
桂枝 連翹 茵陳

白芍 石膏 朱砂 藥石

青皮 川芎 柴胡

連翹 柴胡下青皮

申酉足太陽經圖

未戌手太陽經圖

辰戌足陰經圖

亥午手陰經圖

巳未足太陽經圖

子卯手太陽經圖

丑未足陰經圖

戌申手陰經圖

酉亥足太陽經圖

午戌手太陽經圖

卯酉足陰經圖

草龍膽 葛翹子 阿膠 龜板  
山茱萸 代赭石 紫蘇梗 當歸  
青皮 代赭石 紫蘇梗 白朮  
縮砂 赤石脂爲使 赤茯苓 羌活  
白朮 生地黃 赤茯苓 羌活  
青皮 生地黃 赤茯苓 赤芍脂  
桂枝 代赭石 紫蘇梗 白朮  
澤瀉 代赭石 紫蘇梗 白朮  
桂枝 滑石 茵陳 阿膠  
黃耆 茵陳 阿膠 桃仁  
羌活 白朮 桃仁 桃仁  
麻黃 猪苓 當歸 皂角  
澤瀉 滑石 茵陳 柴胡  
桂枝 茵陳 阿膠 桃仁  
黃耆 茵陳 阿膠 桃仁  
羌活 白朮 桃仁 皂角  
麻黃 猪苓 當歸 柴胡

沙參 白术 柴胡 熟地黃 牡丹皮  
敗醬

青皮 柴胡

心	午	少陰	經	陽	腎	陰	少陰	心
麻黃	桂心	當歸	生地黃	黃連	赤茯苓	細辛	熟黃芩	附子
代赭石	紫石英	梔子	獨活					
知母	黃芩	地骨皮	阿膠	豬膾				
桔梗	玄參	敗醬	牡蠣	烏藥				
山茱萸	天門冬	猪苓	澤瀉	附子				
檀香	甘草	五味子	茱萸	白朮				
丁香	獨活	桔梗	益智	知母				
	或用桂枝梗或用砂豉		使君子					
附子	沉香	益智	黃耆					
沉鬱								

### 製方之法

夫藥有寒熱溫涼之性。酸苦辛鹹甘淡之味。各有所能。不可不通也。藥之氣味。不比同時之物。味皆鹹其氣皆寒之類是也。凡同氣之物。必有諸味同味之物。必有諸氣互相氣味。各有厚薄。性用不等。製其方者。必且明其爲用。經曰。味爲陰。味厚爲純陰。味薄爲陰。中之陽。氣爲陽。氣厚爲純陽。氣薄爲陽中之陰。然味厚則泄薄。則通氣薄。則發泄。厚則發熱。又曰。辛甘發散爲陽。酸苦湧泄爲陰。鹹味湧泄爲陰。淡味滲泄爲陽。凡此之味。各有所能。然辛能散結潤燥。苦能燥濕。

堅軟鹹能軟堅。酸能收緩。收散。甘能緩急。淡能利竅。故經曰。肝苦急。急食甘以緩之。心苦緩。急食酸以收之。脾苦濕。急食苦以燥之。肺苦氣上逆。急食苦以泄之。腎苦燥。急食辛以潤之。開腠理。致津液。通其氣也。緩急食甘以緩之。肺欲收。急食鹹以收之。腎欲堅。急食苦以堅之。凡此者是明其氣味之用也。若用其味。必明其氣之可否。用其氣必明其味之所宜。識其病。隨其證而製其方也。是故方有君臣佐使。輕重緩急。君臣大小。反正逆從之制也。主治病者爲君。佐君者爲臣。應臣者爲使。用此隨病之所宜。而又贊成方而用之。君一臣二奇之制也。君二臣四偶之制也。君二臣三奇之制也。君二臣六偶之制也。去咽嗌近者奇之。遠者偶之。汗者不奇。下者不偶。補上治上制之以緩。補下治下制之以急。急者氣味厚也。緩者氣味薄也。薄者少服而頻食。厚者多服而頓食。又當明五氣之鬱。木鬱達之謂吐。令條達也。火鬱發之謂汗。令躁散也。土鬱壅之謂下。無壅滯也。金鬱泄之謂解表。泄小便也。水鬱折之謂制其衝逆也。通此五法。乃治病。

堅軟鹹能軟堅。酸能收緩。收散。甘能緩急。淡能利竅。故經曰。肝苦急。急食甘以緩之。心苦緩。急食酸以收之。脾苦濕。急食苦以燥之。肺苦氣上逆。急食苦以泄之。腎苦燥。急食辛以潤之。開腠理。致津液。通其氣也。緩急食甘以緩之。肺欲收。急食鹹以收之。腎欲堅。急食苦以堅之。凡此者是明其氣味之用也。若用其味。必明其氣之可否。用其氣必明其味之所宜。識其病。隨其證而製其方也。是故方有君臣佐使。輕重緩急。君臣大小。反正逆從之制也。主治病者爲君。佐君者爲臣。應臣者爲使。用此隨病之所宜。而又贊成方而用之。君一臣二奇之制也。君二臣四偶之制也。君二臣三奇之制也。君二臣六偶之制也。去咽嗌近者奇之。遠者偶之。汗者不奇。下者不偶。補上治上制之以緩。補下治下制之以急。急者氣味厚也。緩者氣味薄也。薄者少服而頻食。厚者多服而頓食。又當明五氣之鬱。木鬱達之謂吐。令條達也。火鬱發之謂汗。令躁散也。土鬱壅之謂下。無壅滯也。金鬱泄之謂解表。泄小便也。水鬱折之謂制其衝逆也。通此五法。乃治病。