

續修四庫全書



《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一〇二一・子部・醫家類

醫學綱目四十卷（卷二十八至卷四十）〔明〕樓英撰……………一

新刊醫林狀元壽世保元十卷〔明〕龔廷賢撰……………三二七

# 醫學綱目

二

〔明〕樓英撰

據上海圖書館藏明嘉靖四十  
四年曹灼刻本影印原書版框  
高一九三毫米寬三〇二毫米

醫學綱目卷之二十八

腎膀胱部

腰痛 胎前腰痛 產後腰痛 脊痛脊

強

大法

六元正紀論云太陽所至為腰痛又云巨陽即太陽也  
虛則頭項腰背痛足太陽膀胱之脈所過還出別下項循  
肩膊內挾脊抵腰中故為病項如板挾脊痛腰似折痺不  
可以曲是經氣虛則邪客之痛病生矣夫邪者是風熱濕  
燥寒皆能為病大抵寒濕多而風熱少然有房室勞傷腎  
虛腰痛者是陽氣虛弱不能運動故也經云腰者腎之府  
轉搖不能腎將敗矣宜腎氣丸尚香丸之類以補陽之不  
足也膏梁之人久服湯藥醉以入房損其真氣則腎氣熱  
腎氣熱則腰脊痛而不能舉久則髓減骨枯發為骨痿宜  
六味地黃丸滋腎丸封髓丹之類以補陰之不足也靈樞

腎虛

入醫學綱目卷之二十八

云腰痛上寒取足太陽陽明上熱取足厥陰不可俛仰取  
足少陽蓋足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹經所  
過處皆能為痛治之者當審其何經所過分野循其空穴  
而刺之審何寒熱而藥之假令足太陽令人腰痛引項脊  
尻背如重狀刺其郛中太陽二經出血餘皆倣此故執一  
方治諸腰痛者固不通矣

久痛開

如久腰痛必用官桂以開之方止腹脇痛亦然  
燥腎丸治肝腎損及脾損穀不化腰痛不起者神效  
治法

實法

立安丸治五種腰痛補腎又治脾氣

破故紙

續斷

乾木瓜

牛膝酒

杜仲

右為細末蜜丸如桐子大每服五十九鹽湯或酒任下

又方治五種腰痛

狗脊 萹薹

兔絲子

右為細末煉蜜如桐子大每服三十九用草薹二兩酒  
浸三日取酒服藥空心食前

細杜仲治風冷傷腎腰痛不能屈伸并補腎虛取杜仲  
一斤切姜汁製炒斷絲用好酒二升浸十日每服三四合  
日四五服一方為末溫酒調一錢空心服

驗治腰痛用破故紙炒為末溫酒下三錢  
右杜仲牛膝萹薹破故紙治腰痛例

本治腎虛腰痛不能轉側腰茸丸  
腰茸一兩鹿角一兩上菖香兩  
右為末以羊腎一對用酒浸茸去膜研如泥和丸如  
桐子大陰乾如羊腎少入酒糊佐之每服三五丸溫

酒或鹽湯下  
戊戌年八月淮南大水城下浸漬者連月予忽臟腑不調  
腹中如水吼數日調治得愈自此腰痛不可屈折雖洗面  
亦相妨服藥不效如是凡三月予後思之此必水氣陰  
虛腎經感此而得乃灸腎脘三七壯服此藥

壬治腰痛鹿角去止皮取白者熬令黃為末酒服之  
日三特禁生魚餘不禁新者良陳不佳角心中黃處亦不  
中服大神良藥去 治腰痛羊腎為末酒服二方寸七  
日三服本茸云羊腎補

右鹿茸鹿茸羊腎治腰痛例  
補腎丸治腎虛腰痛累效

烏藥葉 側柏葉  
右酒蒸晒乾為末為丸如桐子大

經治腎虛脚無力生栗子入袋盛懸乾每日平明吃十餘顆次吃諸腎粥

腰大疼

腰痛脈大者腎虛

杜仲 龜板 黃栢 知母

右為末猪脊髓為丸

補陰九治陰虛性急腰痛者

龜板 黃栢 知母 側柏葉

右為末地黃膏為丸

腰腿濕痛

龜板酒炙 黃栢酒炒 青皮錢 生甘草錢

右為末研姜一大片次入前藥末一錢研細以蒼耳汁

盪起煎令沸服之

腰腿疼痛

敗龜板酒炙 黃栢酒炒 蒼耳各一兩

區栢酒炒 威靈仙酒浸 蒼耳各一兩

右為丸以黑薑汁兼四物湯加陳皮生甘草生薑一片煎吞下

又方

龜板酒炙 黃栢酒炒 白芍各一兩

陳皮 威靈仙 知母 蒼耳

蒼耳耳各半 右為末蜜丸服

濕熱腰痛大便泄

龜板酒炙 楮皮炒 蒼朮 滑石各半

芍藥酒炒 香附酒炒 右為末粥丸如內傷白朮山查湯下

蒼朮湯治濕熱腰腿疼痛

右為末粥丸如內傷白朮山查湯下

蒼朮湯治濕熱腰腿疼痛

蒼朮三錢去濕 防風一錢 黃栢一錢

右作一服水煎空心服

右龜板黃栢知母治腰痛例

牛膝酒治腎傷風毒攻刺腰痛不可忍者

牛膝 川芎 羌活 地骨皮

五加皮 蒼朮 甘草 海桐皮

生地兩

右到以絹袋裹入好酒二斗浸二七日夏三五宿每服

一盃日三四盃長令酒氣不絕為佳一法入杜仲一兩

炒絲斷

六味地黃丸治腎虛腰痛方見

婦人患腰痛此血分有熱

白芍錢 生地錢 當歸尾錢 黃栢半錢

白朮錢 黃芩半錢 木通錢 甘草稍分

川芎錢 右分四帖煎取食前熱服

右地黃治腰痛例

治腰痛 杜仲 枸杞根

右三味咬咀好酒三斗漬之納罐內密封投於銅器中

煮一日服之無節取醇為度

義一姪婦瘧疾初安因衝風又發腰痛白濁已與參朮

枳榔半夏等補方又教以煨牡蠣一錢木通五分炒栢三

分粗末入前方同煎

痢後腰痛兩腳無力

痢後腰痛兩腳無力

痢後腰痛兩腳無力

痢後腰痛兩腳無力

痢後腰痛兩腳無力

痢後腰痛兩腳無力

痢後腰痛兩腳無力

痢後腰痛兩腳無力

痢後腰痛兩腳無力

陳皮 半夏 白芍 茯苓  
 蒼朮 當歸 黃芩 白朮  
 甘草 炙 一

右作一服姜三片食前服

婦人月經行後腰痛為虛詳氣血虛於補氣血藥中加杜仲側柏葉等藥

仲側柏葉等藥

虛勞腰痛少腹拘急小便不利入味腎氣散主之

治腰痛用葦臺仙丹溪云葦臺仙治痛之要藥為細末

每服二錢猪腰子一隻批開搽藥在內濕紙煨熟五更細

嚼熱酒下千金方用葦臺仙末一錢溫酒調下逐日以微

利為度病人稍虛禁酒

本治腰痛氣滯藥基子

牽牛不以多少用新瓦火燒亦便以牽牛頓在瓦上自

然一半熟一半生不得撥動取頭末一兩入硫黃一分

同研勻分三服每用白麩一匙水和捏作基子五更初

以水一盞煮熱連湯送下痛住即止未住隔日再作子

嘗有此疾每發只一服痛止

治腰痛不可忍用牽牛不以多少研取頭末去滓不用

取大蒜每一瓣擘開入巴豆肉一粒在內用濕紙裹定煨

令蒜熟去巴豆將蒜研細和牽牛為丸如桐子大每服五

九醋湯茶空心食前草虛實服

治五般腰痛

胡桃肉 五瓣去皮 五靈脂 黑牽牛 炒

白牽牛 炒 狗脊 半兩 草薢 三錢 沒藥 三錢

巴豆 五粒用濕紙裹

右件為末將前胡桃膏酣糊丸如桐子大每服十五丸

風腰疼茸淋無灰酒下 氣腰疼煨葱白酒下 血

腰疼當歸酒下 打撲腰疼蘇木酒下

趙進道病腰疼一年不愈診其兩手脈沉重有力以

通經散下五七行次以杜仲去粗皮細切炒斷絲為末每

服三錢猪腰子一枚薄批五七片先以椒鹽塗去腥水搽

藥在內畏以荷葉以濕紙敷重封文武火燒熟臥細嚼

溫酒送下每旦以無比山藥丸一服數日而愈

獨活寄生湯治腎氣虛弱冷臥濕地腰腿拘急筋骨攣

痛或當風取涼過度風邪流入脚膝為偏枯冷痺緩弱痰

痛或腰痛牽引脚重行步艱難

獨活 桑寄生 杜仲 牛膝

細辛 秦艽 茯苓 桂心

防風 芍藥 人參 甘草 一兩

當歸 芍藥 乾地黃 各二兩 方用續斷

右為粗末每服三錢水二大盞生姜五片同煎至七分

食前服

難防風湯治傷寒後腰痛或皮肉痛痺腿膝疼痛行履艱

難不可俛仰

防風 麻黃 桂枝 杜仲 各七

牛膝 五加皮 丹參 芍藥 羌活

附子 當歸 芍藥 羌活

續斷 兩

右咬咀每服五錢水一盞半姜一錢同煎食前服

頃川芎肉桂湯下未年冬曹通甫自河東來有役人小程宿於寒濕之地腰痛不能轉側兩脇搖急作痛月餘不愈腰痛論中所說皆為足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二症屬少陽膽經外絡脈病皆宜去血絡之凝乃愈其內經有云冬三月禁不得針只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血以此方主之

羌活半錢 柴胡一錢 獨活五分 肉桂

羌活半錢 防風 漢防已各三分 桃仁五箇去

川芎一錢 歸稍 甘草一錢 炒麩五分

右吹咀水酒煎去查食遠熱服

無小續命湯加炒去皮桃仁治風腰痛最妙方見中

積散加桃仁治寒濕腰痛最効方見後

不賣字類考文

千杜仲酒治腎脈逆小於寸口膀胱虛寒腰痛胸中動通四時用之方

杜仲 地黃各四 草薢 羌活

天雄 蜀椒 芎藭 桂心

防風 泰元 烏頭各三 五加皮

石斛各五 細辛三 瓜蒞根 地骨皮

續斷炒 桔梗 甘草

右十九味吹咀以酒四斗漬四宿初服五合加至七八合日再

本治久患腰痛

石甜瓜一兩出

冬瓜仁 枳殼 附子炮五 冬瓜皮

右為細末每服四錢溫酒調下臨臥時服服日只午後

中時先可晚食由時後不可食卑候臨臥服平日膏梁厚味之人腰痛皆是濕熱陰虛治見前陰虛想如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也於羌活勝濕湯中加黃柏一錢附子五分蒼朮二錢羌活勝濕湯獨活湯治因勞役得腰痛如折沉重如山

羌活錢二 防風 獨活 肉桂各三

甘草錢二 歸稍錢五 桃仁十五 連翹錢五

漢防已 黃柏 澤瀉 大黃各錢

右吹咀每服五錢如麻頭大酒半盞水一盞去查熱服立愈

羌活湯治腰膝無力沉重

羌活錢三 防風五分 甘草生熟各五分 草薢

黃柏 葛根各五分 砂仁一錢 陳皮六分

知母五分 黃芪二錢 蒼朮 升麻

獨活 柴胡各一

右為粗末作二服水二盞煎至一盞去查空心熱服

仲腎着湯治身重腰冷如水痛重如帶千錢方見

丹脈瀆者瘀血用補陰丸中加桃仁紅花補陰丸方

世橋核散治腰痛諸般滯氣

山查子一兩 橘核錢五 破故紙二兩 乳香錢

玄胡索 菴藷 沒藥 五加皮

右為末酒調下

雲如神湯治男子婦人腰痛

玄胡索 當歸 桂心 杜仲各錢

右為末溫酒調下三錢甚者不過數服

無桃仁酒治腎虛風勞所傷... 用桃仁麩皮炒去皮... 每服一錢七熱酒調下有汗即愈

地龍湯治腰脊痛或打撲傷損... 經中令人腰脊痛或脛膈臂膊中痛不可忍... 莫塞塞不通

中桂分 桃仁分 羌活分 獨活 甘草分 黃柏分 麻黃分 地龍分

蘇木分 歸稍錢 右為粗末勿服五錢水二盞煎三盞去滓食遠熱服

無橘核酒治打撲腰痛惡血瘀著痛不可忍... 皮研細每服二錢七酒調服或用猪腰子一箇去筋膜破開入藥同葱白茴香鹽濕紙裹煨熟細嚼溫酒下

熟大黃湯治墜墮兩到腰痛不能屈伸

大黃切如生薑切如 右同炒今焦黃以水一盞浸一宿五更去查服天明取

下如雞肝者即惡物也 丹徐贊大年六十因墜馬腰痛不可轉側六脈散大重取

則弦小而長稍堅予以為惡血雖有未可驅逐且以補接為先遂令煎蘇木人參黃芪川芎當歸陳皮甘草服至半月後漸散大飲食亦進遂與前藥調下自然銅等藥服一月而安

治老人因擲撲腰痛

蘇木分 人參分 歸頭身錢 黃芪分 陳皮分 木通分 木香分

右研桃仁九枚下接膏藥

食積腰痛

龜板酒 栢葉酒 香附錢 辣芥子 右酒糊丸煎四物湯加陳皮甘草一分吞下

痰積腰痛二陳湯加南星 食積痰積如脈有力者宜下

山對氣腰痛香茶內滴入菜油數點頓服

素北風生於冬病在腎論在腰... 少陰所謂腰痛者少陰者腎也十月萬物陽氣皆傷故腰痛也

太陽所謂腰痛者正月太陽寅寅太陽也正月陽氣出在上而陰氣盛陽未得自次故腫腰腫痛也

腰痛皆屬腎虛治法並見前陰陽虛條

腰痛項強腰似折項似拔衝頭痛乃足太陽經不行也

羌活勝濕湯主之

羌活 獨活錢一 藁本 防風錢一

蔓荊子分 川芎分 甘草分 右件咬咀都作一服水二盞煎去一半去查溫服食後

運氣腰痛有五 一曰寒經云水鬱之發... 二曰濕經云太陰司天濕氣下臨腎氣上從當其時反腰

以熱劑是也 三曰寒濕雜合經云太陰司天之政終之氣寒大舉濕大化病關節禁固腰腫痛治以燥熱是也



刺腰痛引少腹控眇不可以仰取腰尻分間經文三出  
此其一也繆刺論云腰痛引少腹控眇不可以仰息刺  
腰尻之解兩脚之上是腰論以月死生為病數發針立  
已左刺右右刺左又骨空論云腰痛不可以轉搖急引  
陰卵刺八膠與痛上臥在腰尻分間此三節經文大同  
小異通一法也又足厥陰之脈是動則病腰痛不可以  
俛仰瘡疝少腹腫視盛虛熱寒陷下調之此則證同法  
異

陽維之脈令人腰痛痛上拂然腫刺陽維之脈脈與太陽  
合滿下間去地一尺所林註云承

飛陽之脈令人腰痛痛上拂然甚引悲以恐刺飛陽之  
脈在內踝上五寸少陰之前血陰維之會穴在內踝上廉  
肉分間

同陰之脈令人腰痛痛如小錘居其中拂然腫刺同陰之  
脈在外踝上經骨之端為三疔下註云陽

解脈令人腰痛痛而引肩目眩然特遺洩刺解脈在膝  
筋肉分間郄外廉之橫脈出血血變而止王註云膝外所  
處筋肉高起則郄中之肉分也當取郄外廉有血絡橫見  
乃止蓋此脈外廉筋肉  
分間即委陽穴是也

散脈令人腰痛而熱甚生煩腰下如有橫木居其中甚  
則道洩刺散脈在膝前骨肉分間絡外廉脈為三疔註  
謂地機穴皆非也既云膝前骨肉分間絡外廉脈當在  
三理陽陵泉二穴上之骨上與膝分間是穴機刺三疔也

昌陽之脈令人腰痛痛引膺目眩然甚則反折舌卷不  
能言刺內筋為二疔在內踝上大筋前太陰後上踝二寸  
所王註云太陰穴在內踝上二寸

刺腰痛引眇眇有三此其一也若痛引肩遺洩者刺解

脈在郄外廉筋肉分間委陽穴也若痛引項脊欲俯上  
者刺足太陽委中出血也  
解脈令人腰痛如引帶常如折腰狀善恐刺解脈在郄中  
結絡如黍米刺之血射以黑見赤血而已王註云郄中  
會陰之脈令人腰痛痛上漯漯然汗出汗乾令人欲飲飲  
已欲走刺直陽之脈上三疔在踠上郄下五寸橫居視其  
盛者出血王註云承筋穴也禁不可刺可灸三疔  
肉里之脈令人腰痛不可以效效則筋縮急刺肉里之脈  
為二疔在太陽之外少陽絕骨之後王註云分肉穴也在  
如後同身寸之二分筋肉分間  
脈陰之脈令人腰痛腰中如張弓努弦刺厥陰之脈在臑  
踵魚腹之外循之累累然乃刺之其病令人善言嘿嘿然  
不慧刺之三疔陽穴分也

腰痛上寒不可顧刺足陽明 上熱刺足厥陰 不可以俛  
仰刺足少陽 中熱而喘刺足少陰刺郄中出血 臑中血  
絡 腰痛上寒不可顧刺足陽明 上熱刺足太陰  
刺腰痛為取足太陽郄中問六法郄中問者膝後屈處  
兩筋之間橫文臑內也太陰正經二法刺郄中央出血  
解脈二法刺郄中橫文出血循絡一法刺郄上數寸出  
血會陰一法刺郄中下五寸出血也

羅張仲文傳神仙灸法療腰痛重痛不可轉側起坐艱難及  
冷痺脚筋急不可屈伸灸曲踠兩文頭左右脚四處各  
三壯每灸一脈二火齊下艾炷燒至肉初覺疼使用二  
人兩邊齊吹至火滅午時着灸至人定已來臑臑自動一  
二行或轉動如雷聲其疾立愈此法神效不可量也  
王腎虛腰痛 腎喻取法以杖量臑平去 人中 委

中  
 撮腰強痛 命門後二十七壯十四壯 崑崙崑崙之氣  
 猶忽然氣滯腰疼不可俯仰 志室志室之氣 行間行間之氣  
 脊內引痛不可屈伸 近上痛合谷 近下痛崑崙 復溜  
 腰脊俱痛不可忍 風池 合谷 崑崙  
 桑又法 風池 承山 合谷 呂細 三間  
 東腰脊如痠 湧泉 陰谷 京骨 行間  
 集腰閃到氣痛 尺澤 委中 人中 陽陵泉 束骨 崑崙 下窮  
 羅腰痛不可俯仰轉側難身寒熱倍多身羸面黃黑足冷不仁腰重如石 腎輸腎輸之氣 中膂輸中膂輸之氣 腰輸腰輸之氣  
 孤腎虛腰痛久不已 肩井 腎輸腎輸之氣 腰痛刺  
 之不定者刺八膠八膠之氣 大虛腰痛刺而復發腰重不能舉體可刺委中動脈出血  
 潔腰痛在身之前足陽明原穴 身之後足太陽原穴 身之側足少陽原穴  
 甲腰痛脊急脇中滿小腹堅急志室主之 腰脊痛惡寒少腹滿墜瘡閉下重不得小便胞肓主之 腰痛散寒俯仰急難陰痛下重不得小便秩邊主之 腰脊痛強引背少腹俯仰難不得仰息脚痿重尻不舉滿赤腰以下至足清不仁不可以坐起膀胱論主之 腰痛不可以俯仰中膂內論主之 腰脊痛尻脊股瘡寒大痛虎則血動實則并熱痛痔痛尻腫大便直出扶承主之 腰痛頸項痛歷節汗出而步履牽複不仁膈中痛飛陽主之 大腸實則腰背痺寒痺筋面眩痛虛則鼻衄巔疾腰痛熾然

汗出令人飲食欲走承筋主之 腰痛不可舉足距中蹶後痛脚痿僕參主之 腰痛不能舉足少壯若下車踏地脛中矯矯然申脈主之 腰痛如小錘居其中憊然腫痛不可以欬欬則筋縮急諸節痛上下無常寒熱陽輔主之 腰痛控牽少腹及股卒俯不得仰刺氣街 腸臍肘寒腰痛不得臥手三里主之 腰痛大便難湧泉主之 腰痛不可轉側章門主之 腰痛少腹痛陰包主之 腰痛不利如癱瘓瘦意恐懼氣不足腸中愒怏太衝主之 腰痛足痛而清泄善嘔舉跳舉上窮主之 腰痛怏怏不可以俯仰腰以下至足不仁入脊腰背寒次窮主之 腰痛大便難食泄腰尻中寒中窮主之 腰痛小腹痛下窮主之 腎腰痛不可俯仰陰陵泉主之  
 八醫學綱目卷六  
 去  
 膈閃着腰疼  
 氣海氣海人一身之氣 子瘦人五分三補三補今人腎上三痛 又停停針候二十五息 依前進針令人覺覺其大若手進針三息 從外腎熱氣上入小腹出針神効 腰痛上寒實則脊急長強主之  
 素腎脈搏堅而長其色黃而赤者當病折腰腰脈 帝曰有病脈者診右脈沉而眩左脈浮而暈不然病主何在岐伯曰冬診之右脈固當沉緊此應四時左脈浮而暈此逆四時在左當主病在腎頭暈在肺當腰痛也能能痛 字衍 按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也微論 黑色粗理及耳後陷耳偏一邊高者善病腰痛經云黑色粗理者腎大腎大則善病腰痛不可以俯仰又云耳偏高者腎偏傾腎偏傾則苦腰尻痛是也  
 腎憊及盛怒傷志則腰失強不能轉搖而死經云腎者腰

之府轉播不能腎將傾矣得強者生失強者死又云腎盛怒而不止則傷志志傷則善忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色天死於季夏是也

胎前腰痛

雲通氣散治妊娠腰痛狀不可忍此藥神效用破故紙不以多少瓦上炒香熟為末嚼胡桃肉一箇空心溫酒下三錢

五加皮散治妊娠腰痛不可忍或膝痛此散

杜仲四兩 五加皮 阿膠炙 防風

狗脊 川芎 白芍 細辛

草薢各三 杏仁八分 炒去

右咬咀以水九升煮取二升去渣下膠作三服

五加皮丸治妊娠腰痛不可忍者此丸

續斷炒 杜仲兩半 芍藥 獨活各三

五加皮 狗脊 草薢 芍藥

訶子肉各四

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下四十九日三

丹仁六錢 有胎腰痛

白朮錢四 陳皮錢三 黃仁錢二 人參

條芩 川芎 地黃 歸尾各二

甘草些

右分四貼水酒煎服

大紫酒治妊娠腰痛如折用大黑豆二合炒令香熟以酒

一大盞煮取七分去豆空心頓服

木治胎動腰痛捨心或下血取葱白不拘多少溫酒汁飲之

天治妊娠腰痛背痛及覆不得產實治妊娠卒腰痛俱用鹿角長六寸燒令赤酒中焯再燒再焯以角碎為度取酒飲之鹿角為末服方寸匕

產後腰痛

肘牽腰痛不安或腰痛胎轉捨心下血不止用葛蒲汁酒一升服之 妊娠卒胎動不安或但腰痛或胎轉捨心或下血不止艾葉一把如雞子大以酒四升煮取二升分為二服良

產後腰痛

保治血癖腹乃刺刺腰痛用四物湯細末三兩加酒煮玄

胡索細末二兩每服三錢酒下

雲紫金丸治產後惡寒不快腰痛小腹如刺寒熱腹痛久有瘀血月水不調亦可治心痛與失笑散同

五靈脂炒 真蒲黃各等分

右以好米醋調五靈脂末煨火熬成膏干次以蒲黃末

搜和丸如櫻桃大每服一二丸水與童便各半盞煎至

七分至藥化溫服之少頃再進一服惡露即下及有瘀

血成塊月信不利者並用酒磨下

生地黃湯治產後腰疼腹中餘血未盡流為足腫不食

生地汁升 芍藥 甘草兩二 丹參兩四

生薑合 生姜汁合

右切以水三升煮取一升去滓入地黃汁蜜姜汁微火

煎一二沸一服三合日二夜三利一二行愈

產後惡露方行忽然漸少斷絕不來腹中重痛者此由

血滯宜桃仁湯如有大痛處必作癰疽當以癰疽法治之

桃仁湯方

桃仁 蘇木 生地各半 蜜虫去足

水經

右為粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服無時  
候惡露下即住服

脊痛脊強

灸刺脊痛脊強有三法

其一取督脈經云督脈之別名曰長強別走太陽實則脊  
強版之所別也

其二取足太陽經曰厥挾脊而痛者至項頭沉沉然目眩  
眩然腰脊強取足太陽胸中血絡是也

其三取小腸經云小腹控臍引腰脊上衝心邪在小腸取  
之盲原以散之刺太陰厥陰以下之取巨虛下廉以去之  
是也

脊脊并腰疼 人中口含水突刺入三分  
委中 人中口含水突刺入三分

腰脊強不得俯仰刺脊中舉脊內廉痛便難陰痿不用  
少腹急引陰及脚內廉內陰谷主之 男子脊急目赤支

溝主之 腰脊強四肢解墜善怒咳少氣鬱然不得息厥  
逆肩不可舉陽乃痿身聾章門主之

耳高者腎高腎高則苦脊脊痛不可以俯仰  
腎脈緩甚為折脊

寒熱二厥

寒厥手足冷

熱厥手足熱

產後寒厥

不收為痿厥

足痿

王太僕云厥者氣逆上也世謬傳為脚氣讀此始知其病  
上古稱之為脚氣也經曰寒厥者手足寒也曰熱厥者手  
足熱也曰痿厥者痿病與厥雜合而足弱痿軟無力也曰

痺厥者痺病與厥病雜合而脚氣頑麻腫痛也曰厥逆者  
即前寒厥熱厥痿厥痺厥風厥等氣逆上而或嘔吐或迷  
悶或脹或氣急或小腹不仁或蒸不知人所謂脚氣衝  
心者是也

寒熱二厥

大法

丹治厥因痰者用白木竹瀝 因氣虛血虛者用四物四

君子 熱厥用承氣湯 外感用雙解散加姜竹瀝

素黃帝曰厥之寒熱者何也岐伯對曰陽氣衰於下則為  
寒厥陰氣衰於下則為熱厥帝曰熱厥之為熱也必起於

足下者何也岐伯曰陽氣起於足五指之表陰脈者集於  
足下而聚於心故陽氣勝則足下熱也帝曰寒厥之為

寒也必從五指而上於膝者何也岐伯曰陰氣起於五指  
之裏集於膝下而聚於膝上故陰氣勝則從五指至膝上

寒其寒也不從外皆從內也

帝曰寒厥何為而然也岐伯曰前陰者宗筋之所聚

少秋冬則陰氣盛而陽氣衰此人者質壯以秋冬奪於所

用下氣上爭不能復精氣溢下邪氣因從之而上也氣因

於中陽氣衰不能滲榮其經絡陽氣日損陰氣獨在故手

足為之寒也

帝曰熱厥何如而然也岐伯曰酒入於胃則絡脈滿而經

脈虛脾主為胃行其津液者也陰氣虛則陽氣入陽氣入

則胃不和胃不和則精氣竭精氣竭則不榮其四肢也此

人必數醉若飽以入房氣聚於脾中不得散消氣散而

酒氣與穀氣相

搏於脾於中故熱通於身內熱而渴赤也夫酒氣盛而慄

搏於脾於中故熱通於身內熱而渴赤也夫酒氣盛而慄

搏於脾於中故熱通於身內熱而渴赤也夫酒氣盛而慄

搏於脾於中故熱通於身內熱而渴赤也夫酒氣盛而慄

搏於脾於中故熱通於身內熱而渴赤也夫酒氣盛而慄

悍腎氣日衰陽氣獨勝故手足為之熱也厥論寒熱二

二厥治

子相西華李政之病寒厥其妻病熱厥前後十餘年其妻服道遙散十劑終無可效一日命予診之二人脈皆浮大而無力政之曰吾手足之寒時時清以熱湯清而不能止吾婦手足之熱終日沃以冷水沃而不能已者何也予曰寒熱之厥也此皆得之食飲食縱嗜慾遂出內經厥論證之政之喜曰內經其理書也十年之疑今而釋然縱不服藥愈過半矣僕曰熱厥者寒在上也寒厥者熱在上也寒在上者以溫劑補肺全熱在上者以涼劑清心火分取二藥令服之不輒不旬日政之詣門謝曰寒熱厥者皆愈矣

針灸

靈厥逆為病也足暴清胸若將裂腸若將以刀切之煩而不能食脈大小皆清暖取足少陰清取足陽明清則補之溫則瀉之顛狂

寒厥手足冷

寒厥脈沉數實為熱東垣治中書貼合公脚膝尻臂背冷脈沉數有力用黃柏滋腎丸再服而愈又治中書左丞姚公茂上熱下寒用既濟解毒湯良愈丹溪治呂宗信腹有積塊足冷至膝用大承氣加減下之愈此皆寒厥有熱也微沉細 羅征南副元帥大咸木兒年六十秋七月征南予從之過楊州千里時仲冬病自利完穀不化臍腹冷痛足胛寒以手搔之不知痛痒常燒石以溫之亦不得煖予診之脈沉細而微予思之年高氣弱深入敵境軍務煩冗朝夕形寒飲食失節多飲乳酪履於卑濕陽不外固由是清濕襲虛病起於下故胛寒而逆內經云感於寒而受病微則為咳

盛則為泄為痛此寒濕相合而為病也法當急退寒邪之邪峻補其陽非灸不能病已先以大艾炷於氣海灸百壯補下焦陽虛次灸三里各三七壯治胛寒而逆且接引陽氣下行又灸三陰交以散足受寒濕之邪遠處方云寒濕所勝治以辛熱濕滯於外平以苦熱以苦熱之以附子大辛熱助陽退陰溫經散寒為君乾姜官桂大熱辛甘亦除寒濕白朮半夏苦辛溫而燥脾濕故以為臣人參草薤蔥甘草大溫中益氣生薑天辛溫能散清濕之邪葱白辛溫能通上焦陽氣故以為佐又云補下治下制以急急則氣味厚故大作劑服之不數服瀉止痛減足胛漸漸溫潤其飲食十日平復明年秋過襄陽值霖雨閱旬餘前症復作再依前灸添陽輔各灸二十壯再以前藥投之數服愈加減白通湯治形寒欲冷大便自利完穀不化臍腹冷痛

足胛寒而逆

附子炮去 乾姜炮 官桂去 甘草炙  
草薤剉 半夏洗 人參 白朮炒  
右剉每服五錢水二盞半生薑五片葱白五莖煎一盞三分去查空心宿食消盡溫服  
寒厥皆屬腎虛經云腎藏志志不足則厥又云腎虛則清厥意不樂又云下虛則厥又云諸厥固泄皆屬於下是也靈 黃帝曰少陰之脈獨下行何也岐伯曰不然夫衝脈者五臟六腑之海也五臟六腑皆稟焉其上者出於臍臍滲諸陽滲諸精其下者注少陰之大絡出於氣衝循陰股內脈入臍中伏行脊骨內下至內踝之後屬而別其下者並于少陰之經滲三陰其前者行出跗屬下循跗入大指間滲諸絡而溫肌肉故別絡結則跗上不動不動則厥厥

則寒矣逆順肥瘦痛〇經云逆絡空聚火所治之蓋以治之或暴瀉之也  
運氣寒厥有二

一曰寒經云水平氣曰靜順靜順之紀其病厥又云歲水太過寒氣流行邪害心火燥悸陰厥又云歲金不及炎火乃行復則病陰厥且移是也

二曰寒濕經云太陰司天之政天氣下降地氣上騰民病寒熱是也

雜方 子治丈夫脚腰冷不隨不能行方上醇酒三斗水三斗合着甕中溫漬至膝三日止冷則甕下當着灰火勿令冷

靈厥而寒甚骨廉而下寒過於膝下陵三里陰絡所過得之留止寒入於中推而行之經下者火則當之經絡堅緊火所治之不知所苦兩躄之下男陰女陽良工所禁針論畢矣經云兩躄之下 寒厥取足陽明少陰于足皆

留之病經云 右灸刺寒厥二法補虛也經云足少陽之別名曰光明去踝五寸別走厥陰下絡足跗實則厥取之所別此法瀉實也又經云亂于臂肱則為四厥取之先去血脈後取其陽明少陽之榮輸此法治亂氣不補不瀉但徐出入導氣也

恒經云厥在於足宗氣不下脈中之血凝而留止非火調弗能取之  
澀身熱如火足冷如水可灸陽輔穴又云肝瘦冷絕骨取之

甲厥甚取太陰陽明動者之經 足厥喘逆足下清至膝湧泉主之 寒厥及熱煩心少氣不足以息陰濕痒痛不可以食飲肘擊支滿喉中焦乾渴魚際主之 膝以下至

足清不仁不可以坐起尻不舉腰膕主之

熱厥手足熱

陰虛 肝司承叔平生脚自蹠以下常覺熱冬不可加綿於上常自言曰我貧稟壯不怕冷予曰此足三陰虛宜斷慾事以補養陰血庶乎可免笑而不答年方十七患痿半年而死

手足煩者小便三升盆中溫漬手足

產後寒厥

腳氣頰麻腫痛為痺厥

脚氣頰麻腫痛為痺厥 屬於下然亦有二馬一則自外而感一則自內而致其治法自應不同故詳而論之其為病也有證無名脚氣之稱

自晉蘇敬始關中河朔無有也惟南方地下水寒其清濕

之氣中於人必自足始故經曰清濕襲虎則病起於下或者難曰今茲北方其地則風土高寒其人則腠理緻密而復多此疾者豈是地濕之氣感之而為邪答曰南方之疾自外而感者也北方之疾自內而致者何也言之北方之人常食潼乳又飲酒無節過傷而不厭且潼乳之為物其氣味則潼乳其形質則水也酒醴亦然人之水穀入胃胃氣蒸騰其氣與味宜之於經絡化之為血氣外榮四末內注五臟六腑周而復始以應刻數焉是謂天地之紀此皆元氣充足脾胃之氣無所傷而然也苟元氣不充則胃氣之本自弱飲食既倍則脾胃之氣有傷既不能蒸化所食之物其氣與味亦不能宣暢旁通其水濕之性流下而致之其自外而入者止於下脛腫而痛自內而致者乃或