

临床医学多选题丛书

外科题解



辽宁科学技术出版社

LINCHUANG YIXUE DUOXUANTI CONGSHU

8107/02

R6-44

3

2

临床医学多选题丛书

外科题解

主 编 苏正身

外科分册 何三光

主 编 段志泉

辽宁科学技术出版社

一九八四年·沈阳



B089078

临床医学多选题丛书

外科题解

Waiké Tíjiě

主编 苏正身

外科分册主编 何三光 段志泉

辽宁科学技术出版社出版 (沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行 沈阳市第一印刷厂印刷

开本: $787 \times 1092 \frac{3}{32}$ 印张: $11\frac{3}{4}$ 字数: 260,000

1984年11月第1版 1984年11月第1次印刷

责任编辑: 刘 刊 插图: 夏志平

封面设计: 吴风旗

印数: 1—55,000

统一书号: 14288·42 定价: 1.60 元

编者（依姓氏笔画为序）

王俊科	王继铭	任继尧	何三光
刘同才	杨智山	李厚泽	谷春久
剑树贤	段志泉	袁翼华	夏志平

前 言

为了帮助医学院校的学生、教师和医院的医师了解多选题考试方法,熟悉多选题类型,提高分析问题和解决问题的能力,提高教学和医疗质量,编了这套《临床医学多选题丛书》。本书从近年日本医师国家考试题和国内高等医学院校部分内科、外科、妇产科、儿科试题中,编选了两千余个有代表性的试题,并从疾病的病因、病理、诊断、治疗等方面作了扼要而系统的解说。

本书包括内科、外科、妇产科、儿科四个分册。在问题的编排上,参照各科现行的全国通用教材的顺序,对其中符合教学大纲所规定必须掌握的内容,在问题的左上角标明*号,以利于医学生查阅。在问题的选择上,以常用的A、B、C、K类型多选题为主。A类试题,又称最佳回答题;B类试题,又称配伍题;C类试题,又称比较选择题;K类试题,又称复合是非题。由于A类和K类试题用途较为广泛,故选收的比例大些。应用试题多用简短病例,有的安排些图表,以衡量临床能力。在问题的解说上,力求反映医学的最新进展,作到理论联系实际,主次分明,重点突出。

目前,国内外出版的多选题试题较多,本书只着重于选编

适合医学生、教师和临床医师学习，应用较广，内容较新，具有代表性的试题，以便对衡量教学和医疗质量、选拔培养人才以及开展医学教育研究等方面，发挥一定的参考作用。

在本书的编写过程中，曾蒙赵文义同志积极支持，深表感谢！

本书的选题以及对问题的解说，由于编者水平所限，不足之处在所难免，诚恳地希望广大读者批评指正。

编 者

一九八四年二月

多选题答题说明

多选题按A、B、C、K类题型各有其固定答法：

A型题（最佳回答题）

每一道题由一段叙述性主体和四至五个备选答案组成。解题时，只许从A、B、C、D、E备选答案中选择一个最适当的答案，并把答卷相应位置上的字母涂抹，表示正确回答。

例如：哪一项是主动脉瓣狭窄症时常见的？

A、肩手综合征(Shoulder—hand Syndrone)

B、脑脓肿

C、脑栓塞症

D、脑血栓症

E、晕厥发作

本题的正确答案为E。

B型题（配伍选择题）

试题开头先列出A、B、C、D、E五个备选答案，而阿拉伯序码是考题。解题时注意：如果这道题只与答案A有关，则把答卷相应位置上的A涂抹；如果这道题只与答卷B有关，则把答卷相应位置上的B涂抹。余类推。每个答案可以选择一次或一次以上，可以一次也不选择。

例如：A、生胃酮

B、胃复胺

C、丙谷胺

D、甲氰咪胍（甲氰咪胺）

E、氢氧化铝

1. 与壁细胞 H_2 受体结合，抑制胃酸和胃蛋白酶的分泌以治疗消化性溃疡。

本题的正确答案为D。

2. 能促进胃粘液分泌、胃粘膜细胞的更生和粘膜的愈合。

本题的正确答案为A。

C型题（比较选择题）

试题开头列的是A、B、C、D四个备选答案，接着用阿拉伯序码标明试题。答题时注意：如果这道题只与答案A有关，则将答卷相应位置上的A涂抹；如果这道题只与答案B有关，则将答卷相应位置上的B涂抹；如果这道题与答案A和B有关，则将答卷位置上的C涂抹；如果这道题与答卷A和B无关，则将答卷相应位置上的D涂抹。

例如：A、胸骨左缘第三肋间舒张期杂音

B、脉压增大

C、两者均有

D、两者均无

1. 主动脉瓣狭窄

本题的正确答案为D。

2. 主动脉瓣关闭不全

本题的正确答案为C。

K型题（复合是非题）

一、每一道题由一个主体和四个叙述组成。解题时，先判定考题所提供的①、②、③、④的叙述答案中，哪些与主体有关，同时还必须明确哪些与主体无关，然后从事先固定编好的

五组备选答案中选择一组作为正确答案。五组答案都用阿拉伯序码标记。日本这类题特别多，其五组备选答案的组合是：A ①、③、④ B ①、② C ②、③ D 只有④ E ①~④全部。

例如：下列哪项检验值，在老年时降低或减少？

- ①肺活量
- ②血清白蛋白
- ③空腹血糖
- ④细胞外液量

如果这道题只与答案①、③、④有关，则将答卷相应位置上的A涂抹；

如果这道题只与答案①、②有关，则将答卷相应位置上的B涂抹；

如果这道题只与答案②、③有关，则将答卷相应位置上的C涂抹；

如果这道题只与答案④有关，则将答案相应位置上的D涂抹；

如果这道题与答案①、②、③、④全部有关，则将答卷相应位置上的E涂抹。

本题的正确答案为B。

二、每一道题由一个主体和五段叙述组成。其五组的备选答案有两种：

- 1. A ①、② B ①、⑤ C ②、③ D ③、④ E ④、⑤
- 2. A ①、②、③ B ①、②、⑤ C ①、④、⑤
- D ②、③、④ E ③、④、⑤

例1：关于结核菌素反应，哪一项是正确的？

- ①投予抗结核药，反应减弱
- ②BCG接种后约4周阳转

③ 类肉瘤病时，多阴转

④ 发红范围直径在15mm 以下者为阴性

⑤ 阴性可否定结核病

A ①、② B ①、⑤ C ②、③ D ③、④ E ④、⑤

本题的正确答案为 C

例 2：关于石棉肺哪项是对的？

① 易合并肺癌

② 易合并胸膜炎

③ 多伴合并结核和矽肺

④ 在胸部 X 线照片上可见卵壳状钙化灶

⑤ 在胸部 X 线照片上可见胸膜斑块

A ①、②、③ B ①、②、⑤ C ①、④、⑤

D ②、③、④ E ③、④、⑤

答法同上，即只与哪组阿拉伯序码有关，就把答卷相应位置上的字母涂抹。

本题的正确答案为 B

我国目前 K 型题的答案组合是：A ①、②、③ B ①、③
C ②、④ D ④ E ①、②、③、④ 具体答法见本书答案。

目 录

问题	1
总论（1～90问）	1
麻醉（91～147问）	18
普通外科疾病	30
颈部、甲状腺、乳腺疾病（148～180问）	30
疝、阑尾炎、肠梗阻（181～216问）	36
胃、十二指肠疾病（217～253问）	43
大、小肠、肛门疾病（254～284问）	51
肝、胆、胰、脾疾病（285～336问）	57
骨科疾病（337～436问）	70
泌尿外科疾病（437～496问）	86
胸外科疾病（497～556问）	99
心血管外科疾病（557～584问）	113
神经外科疾病（585～634问）	121
答案	131
题解	135
总论	135

麻醉	162
普通外科疾病	186
颈部、甲状腺、乳腺疾病	136
疝、阑尾炎、便秘	201
胃、十二指肠 疾病	201
大、小肠、肛门疾病	234
肝、胆、胰、脾疾病	247
骨科疾病	272
泌尿外科疾病	295
胸外科疾病	312
心血管外科疾病	348
神经外科疾病	354

问 题

总 论

*【问题 1】高压蒸气灭菌应维持：

A、100℃，1.30kg/cm² 压力，30分钟。

B、115℃，1.15kg/cm² 压力，30分钟。

C、121℃，1.05kg/cm² 压力，30分钟。

D、130℃，1.00kg/cm² 压力，30分钟。

E、110℃，1.25kg/cm² 压力，30分钟。

*【问题 2】关于灭菌，哪项是正确的？

①亚麻类，用高压蒸气灭菌。

②对手术器械灭菌，使用无菌室。

③对内窥镜灭菌，使用乙烯氧化物气体。

④对手术野皮肤的灭菌是困难的。

A ①、③、④ B ①、② C ②、③ D ④ E ①~④

*【问题 3】穿无菌手术衣和戴无菌手套后，必须保持的无菌地带，除双上肢外还需包括：

A、整个胸、腹、背部。

B、整个胸、腹、背、肩部。

C、腰部以上的前胸及后背。

D、腰部以上的前胸及侧胸。

E、腰部以上的前胸及肩部。

【问题 4】形成手术后低氧血症 (hypoxemia) 的原因

是哪项?

- ①术中过度换气。
- ②功能的残气量(FRC)增加。
- ③发生微小肺不张(micro telectasis)。
- ④心搏出量的减少。

A ①、③、④ B ①、
② C ②、③ D ④ E
①~④

***【问题 5】**防止术后肺不张，
下列哪项是错误的?

- A、术前锻炼深呼吸。
- B、急性上呼吸道感染病人，应先控制感染。
- C、防止术后呕吐物吸入。
- D、及时用镇咳剂控制咳嗽。
- E、嗜烟者术前一周禁烟。

***【问题 6】**手术后肺部感染及肺不张的常见原因是：

- ①长期吸烟。
- ②吸气功能不足。
- ③支气管分泌物堵塞。
- ④肺间质水肿。

A ①、②、③ B ①、

③ C ②、④ E ①~④

***【问题 7】**预防手术切口感染的措施是：

- ①严格遵守无菌技术要求。
- ②操作细心，严密止血。
- ③缝合严密，不留死腔。
- ④术后常规应用抗菌素。

A ①、②、③ B ①、
③ C ②、④ D ④ E
①~④

【问题 8】关于输血，哪项是正确的?

- ①市场上卖的抗A血清是蓝色的。
- ②A B O式及R h式血型一致时，可省略配血交叉试验。
- ③血红蛋白量 12 g /升以下，不适合做供血者。
- ④采血后96小时以后的，叫保存血。

A ①、③、④ B ①、
② C ②、③ D ④ E
①~④

【问题 9】保存血，哪项是正

确的?

- ①血液凝固第Ⅶ因子是低值。
- ②血浆中 K^+ 减少。
- ③ pCO_2 是低值。
- ④保存血,一般在4~6℃保存。
- ⑤冷冻血,能保存一年以上。

A ①、②、③ B ①、②、⑤ C ①、④、⑤ D ②、③、④ E ③、④、⑤

【问题10】经静脉输高热量液体,哪项是正确的?

A、补蛋白质主要是使用血浆。

B、通常由肘正中静脉注入。

C、长期进行治疗的病例,如发现粘膜皮肤移行部发疹,首先怀疑铜不足。

D、输液从20%葡萄糖液开始。

E、从导管前端到穿刺部皮肤,有时能查出常在菌。

【问题11】在特殊营养法中,主要适合于经血管营养法

的,是下列哪项?

- ①持续性昏迷。
- ②上消化道手术后。
- ③小肠广泛围切除术后。
- ④各类大肠炎术后。

A ①、③、④ B ①、② C ②、③ D ④ E ①~④

【问题12】关于代用血浆,哪项是正确的?

①为均一分子量的胶质物质溶液。

②在体内被代谢为能源。

③胶质渗透压由其分子浓度决定。

④不用于脱水的治疗。

⑤容易蓄积于网状内皮系。

A ①、②、③ B ①、②、⑤ C ①、④、⑤ D ②、③、④ E ③、④、⑤

*【问题13】肾功能损害时不宜用哪种药物?

A、氯霉素

B、新生霉素

C、万古霉素

D、利福平

E、金霉素

*【问题14】肝功正常、肾功减退时，用哪种抗菌素影响不大？

A、多粘菌素

B、卡那霉素

C、先锋霉素

D、四环素

E、红霉素

*【问题15】抗肿瘤的烷化剂类药物为：

A、阿糖胞苷

B、甲基胍

C、喜树碱

D、马利兰

E、抗癌锑

*【问题16】对放射线高度敏感的肿瘤有：

A、直肠癌

B、精原细胞瘤

C、食管癌

D、肺癌

E、肾透明细胞癌

*【问题17】低渗性缺水时容易血压下降，是因为：

A、体液丢失多

B、因缺钠血管张力低下

C、细胞外液减少，有效血循环量下降

D、缺钠缺水

E、以上都不是

*【问题18】等渗性缺水病人血清 Cl^- 为110 毫当量/升 (381mg%)，哪种液体最合适？

A、5 % 葡萄糖等渗盐水

B、复方氯化钠溶液

C、等渗盐水

D、平衡液

E、低分子右旋糖酐

*【问题19】胃幽门梗阻，频吐， CO_2CP 78vol%，用哪种液体最好？

A、平衡液

B、5 % 葡萄糖溶液

C、右旋糖酐

D、等渗盐水

E、10 % 葡萄糖溶液

*【问题20】高渗性缺水早期的主要表现是：

A、狂躁

B、眼窝凹陷

C、尿少

D、口渴

E、皮肤弹力减退

***【问题21】** 高渗性缺水的治疗一般用:

- A、单用等渗盐水
- B、等渗盐水和氯化钾
- C、5%葡萄糖溶液
- D、5%葡萄糖盐水
- E、复方氯化钠溶液

* * *

- A、急性胃肠炎剧烈吐泻
- B、大量出汗
- C、肠梗阻
- D、克尿塞类药物引起大量利尿
- E、肝硬化腹水大量放液后

***【问题22】** 低渗性缺水的常见病因

***【问题23】** 高渗性缺水的常见病因

***【问题24】** 输液后水中毒的表现是哪项?

- ①神志混乱
- ②共济失调
- ③惊厥昏迷
- ④面色苍白

A ①、②、③ B ①、

③ C ②、④ D ④ E

①~④

【问题25】 哪项是正确的?

- ①呼吸性酸中毒时, 血清 Cl^- 无变化。
- ②代谢性硷中毒时, 血清 K^+ 进入细胞内。
- ③呼吸性硷中毒时, 血清 Ca^{++} 下降。
- ④硷中毒时, 血红蛋白携带氧的功能减少。

A ①、③、④ B ①、

② C ②、③ D ④ E

①~④

***【问题26】** 代谢性酸中毒纠正后易发生:

- A、低钠血症
- B、高钾血症
- C、低钾血症
- D、高钠血症
- E、低氯血症

***【问题27】** 下列哪项是正确的?

- ①手术后容易引起低钾血症。
- ②刚手术后容易引起代谢性酸中毒。
- ③刚手术后容易引起血糖