

全国中草药新医疗法展览会

技术资料选编

（皮肤、五官、口腔疾病）

1970 · 北京

全国中草药新医疗法展览会
技术资料选编

（皮肤、五官、口腔疾病）

1970 · 北京

目 录

皮肤病

化脓性皮肤病·····	(1)
头癣·····	(3)
手癣与脚癣·····	(4)
湿疹·····	(5)
荨麻疹·····	(8)
水田皮炎·····	(9)
神经性皮炎(附:顽癣)·····	(12)
牛皮癣·····	(15)
玫瑰糠疹·····	(20)
白癜风·····	(20)
酒渣鼻·····	(21)
腋臭·····	(22)
斑秃与脱发·····	(22)
慢性溃疡·····	(23)
类天疱疮·····	(25)
硬皮病·····	(26)

眼科疾病

重症肌无力(眼睑)·····	(27)
急性结膜炎·····	(27)
角膜疾病·····	(29)

青光眼·····	(31)
视网膜脉络膜炎·····	(32)
夜盲症·····	(33)

耳鼻咽喉疾病

中耳炎·····	(35)
鼓膜穿孔·····	(37)
鼻衄·····	(38)
副鼻窦炎症·····	(39)
急性扁桃体炎·····	(39)
咽炎·····	(42)

口腔疾病

龈炎与口炎·····	(45)
牙痛·····	(47)
牙周炎与牙髓炎·····	(51)
麻醉拔牙·····	(53)

皮 肤 病

化脓性皮肤病

主治：化脓性皮肤病。

方药及制法：1.六合丹：大黄、黄柏各三两，白及、亮煤炭各一两八錢，薄荷叶、乌梅肉各一两五錢，白芷六錢。上药共研细末，加面粉五錢混匀。用时以蜂蜜适量调匀成黑色粘稠性糊膏。

2.化腐丹：片松香、红粉、煅石膏各四錢，麝香六錢。共研细末。

3.琥珀膏：琥珀渣四錢，红粉八錢，东丹二两，生粉三兩二錢。共研细末，用生菜油调匀，搅拌均匀成清浆糊状。

用法：疮肿未化脓时，于病灶及其周围涂六合丹半厘米厚，涂药的范围应大于病灶浸润边缘外2~3厘米。涂药后复盖棉纸，以防脱落。脓肿已成穿破后，于溃瘍面撒少许化腐丹，而病灶周围及表面仍围以六合丹。当脓液排除将尽，可在撒化腐丹后之潰瘍面上貼琥珀膏，促使生肌欽口。琥珀膏上盖一油纸，再把六合丹如前涂上。以上敷药法，每天换药1~2次，直至痊愈。后期如无红肿，只是潰瘍面未愈合，则只用化腐丹及琥珀膏，不再涂六合丹。疮肿较大、较深者可于六合丹中加入20%葱绒，以加强其渗透作用。

疗效：治疗疖、疔、疽、丹毒、脓毒血症、蜂窝组织炎等共7100例，有不同程度的疗效。

材料来源：四川医学院附属医院。

主治：脓疱疮（黄水疮）。

方药：星星草一把。

用法：用其花，炒黑存性，研细，用香油调成糊状，擦患处。每日一次，连擦三至五次，皮肤即发干，以后逐步恢复正常。

疗效：治52例，32例痊愈，18例好转，2例无效。

病例：高××，女，55岁。患头部黄水疮2年，治疗无效。用上方四次即愈。

材料来源：河北省高邑县卫生院。

注：星星草为禾本科植物大画眉草 *Eragrostis ciliaris* (All.) Link，其同属植物画眉草 *E. pilosa* (L.) P.B. 与小画眉草 *E. poaeoides* Beauv. 亦作星星草入药。

主治：脓疱疮（黄水疮）。

方药：黄柏、石膏各一两，红升丹二钱，枯矾四钱。

制法及用法：将上药研细末，用麻油或食油调敷患处，每天一至二次，外敷后，2~3天局部见新皮时，不可停药，需连用5~7天，用量酌减。如局部情况严重，可同时服牛黄消炎丸，或外用方剂中加轻粉二钱（不可内服）。

疗效：治疗52例，有显效。

病例：周××，男，38岁。后颈部生黄水疮，用抗菌素治疗无效，后用本法治疗，连敷六次痊愈。

材料来源：江苏省常熟县淼泉公社卫生院。

注：红升丹是以汞与其他物质用升华法加工制成的，主含氧化汞、硝酸汞等。

头 癣

主治：头癣。

方药：蜂房一个，蜈蚣二条，明矾适量。

用法：明矾研末，入蜂房孔中，连同蜈蚣置瓦片上文火烤焦，共研细末，麻油调匀外擦。

疗效：治疗93例，痊愈49例，近期有效率90%。

材料来源：湖北省崇阳县。

主治：头癣。

方药：优质明矾一斤半，火煨成枯矾，研细过筛，嫩松香三两，鲜板油（猪油）半斤。

制法：将松香研粉包入板油内，用松明柴（即有红赤色油的松柴）点燃板油，使松香板油熔化滴下，冷却后加入枯矾，调匀备用。

用法：将油涂于患处使之结痂，隔天将痂揭去再涂，不能用水洗，以免影响疗效。须连续治疗三至四次。

禁忌：忌食鱼、虾、蟹、酒、羊肉等。包扎时宜用纱布，不可用塑料布。

疗效：治疗80余例，效果显著。

病例：计××，女，8岁。患癞痢头3年，遍及整个发区，屡治无效。用上方三至四次后痊愈。

材料来源：浙江省黄岩县。

主治：头癣。

方药：及己三两，羊蹄根一两，百部根一斤。

用法：共研细末，加适量麻油调搽患部。用药前应将头发、头痂剃光，用温开水洗净，方可用药，每天一至二次，连续10天为一疗程。

疗效：治疗5例，均痊愈。

病例：李××，女，1岁半。自1969年5月以来患头癣，结痂，出水，瘙痒，用上方搽患部四次，观察一星期，出水、瘙痒停止，痂落痊愈。

材料来源：江西省景德镇市洪源公社卫生所。

注：1.及己为金粟兰科植物 *Chloranthus serratus* (Thunb.) Roem. et Schult.

2.羊蹄根为蓼科植物羊蹄 *Rumex japonicus* Meisn. 的根。

3.百部根为百部科植物蔓生百部 *Stemona japonica* (Bl.) Miq. 的块根。

手癣与脚癣

主治：手癣，脚癣。

方药：野生地叶（狗奶棵）适量。

用法：取鲜叶洗净，直接在患处揉搓；或将叶捣烂，取汁抹患处。每日二次，连用5天。

疗效：治疗手、足癣共30例，均痊愈。

材料来源：河北省高邑县药材公司。

主治：脚癬。

方药：鲜桃树嫩叶，适量。

用法：捣烂外敷患处，每晚一次，连用二至三次。

疗效：治疗10例，痊愈5例，好转5例。

材料来源：江西省广昌县。

湿 疹

主治：湿疹。

方药：炒吴茱萸一两，乌贼骨七錢，硫黄二錢。

制法及用法：共研细末备用。湿疹患处渗出液多者撒干粉；无渗出液者用蓖麻油或猪板油化开调抹，隔日一次，上药后用纱布包扎。

疗效：治疗1100余例，系统观察138例，痊愈111例，好转21例，无效6例，有效率95.7%。一般用药5~6天见效。

病例：施××，男，33岁。患两下肢湿疹12年、全身性湿疹一年余，经常流水，痛痒难忍，久治不愈，用上药6天痊愈。

材料来源：河北省邢台地区人民医院。

主治：湿疹。

方药：硫黄、枯矾各三两，煅石膏一斤，青黛一两，冰片五分。

用法：共研细末，瓷瓶收贮，用时以菜油调擦患处。每

日擦二次。

疗效：治疗1000余例，一般连擦3天见效。

材料来源：湖北省武昌县。

主治：湿疹。

方药及用法：1.地榆水：地榆一两，加水两碗，煎成半碗，用纱布沾药液湿敷。

2.皮湿Ⅰ号膏：地榆面、煅石膏面各二十两，枯矾一两，研匀，加凡士林三十至四十两调膏外敷。

3.皮湿Ⅱ号膏：地榆面十五两，密陀僧面三十两，研匀，加凡士林三十至四十两调膏外敷。

疗效：共治60例，其中用地榆水加皮湿Ⅰ号膏治疗30例（包括急性16例，脂溢性10例，婴儿湿疹4例），结果痊愈14例，基本痊愈10例，好转、无效各3例；用皮湿Ⅰ号膏及Ⅱ号膏分别治疗慢性湿疹共30例，结果痊愈9例，基本痊愈13例，好转2例，无效6例。以皮湿Ⅱ号膏对慢性湿疹之疗效较好。

材料来源：卫生部中医研究院。

主治：湿疹。

方药：白藜，水杨梅，三角泡。

用法：取上药各适量煎水外洗，后用干粉撒患处，每天两次。

疗效：共治11例，全部治愈。一般用药3天即愈。

材料来源：广西百色县防治院。

注1.白藜为五加科植物三加 *Acanthopanax trifoliatum*

(L.) Merr. 以全株入药。

2. 水杨梅为茜草科植物水团花 *Adina pilulifera* (Lam.) Franch. 以全株入药。

3. 三角泡为无患子科植物小果倒地铃 *Cardiospermum halicacabum* L. var. *microcarpum* (Kunth.) Bl. 以全株入药。

主治：湿疹。

方药及用法：大飞扬二斤，青凡木四斤，毛麝香半斤，加水45000毫升，煎成15000毫升。根据湿疹部位及其范围用水剂加热坐浴、湿敷或外涂。有感染者加用穿心莲，每次二片，每天三次。

疗效：治疗急性湿疹5例，慢性湿疹42例，阴囊湿疹12例，皆痊愈。

材料来源：广东省广州市第六人民医院。

注：1. 大飞扬为大戟科植物飞扬草 *Euphorbia hirta* L.

2. 青凡木为大戟科植物 *Breynia fruticosa* (L.) Hook. f.

3. 毛麝香为玄参科植物 *Adenosma glutinosum* (L.)

Druce

主治：湿疹。

方药及制法：湿疹散：老红高粱一斤，乳香、没药各一两，冰片一钱。将高粱炒炭存性，研细，加后三味共研为细末和匀。

用法：用花椒油（将香油煮开，放入少量花椒炸糊后捞出，待油凉后即成）调和药末涂于患处，每日一次，连用三次。

材料来源：河北省藁县礼明庄公社。

主治：湿疹，皮炎。

方药：扫毒霜：甘草粉10~20克，樟脑1克，苯佐卡因2克，对羟基苯甲酸乙酯适量，香霜（水包油型乳剂）加至100克。

用法：外敷患处，每日一至三次。

材料来源：重庆医学院第三附院。

荨 麻 疹

主治：荨麻疹，湿疹。

方药：地龙。

制法：取干地龙1000克洗净，在水浴上煎取两次，混合过滤，用95%酒精沉淀蛋白两次，滤除沉淀，滤液加0.5%石炭酸为防腐剂，加注射用水至1000毫升，灌装高压消毒即成100%地龙注射液。

用法：肌注，每日一至二次，每次2~3毫升，先作皮试。可配合外科消炎合剂：金银花、蒲公英各二两，穿山甲、皂刺各四钱，水煎服。

疗效：治疗荨麻疹54例，53例痊愈，1例无效；湿疹37例，28例痊愈，7例好转，2例无效。

病例：徐××，女，成人。患腋窝部湿疹，并蔓延到四肢、面部、下颌等处，经注射硫代硫酸钠等无效，改用地龙针剂注射并内服外科消炎合剂，注射第一针后不痒，二针后分泌物显著减少，开始结痂，3~4针后脱痂，5针痊愈。

材料来源：江西省棉纺织厂印染厂。

主治：荨麻疹。

方药：勒姑红菌（或枫木红菌）五钱，地金钱、青麻仁（或大麻仁）各二钱，竹蒿草头一两，红花五分。

用法：两次煎服，可连服数天。

疗效：治疗20例，全部治愈。

材料来源：广西东兴县防治院。

注：竹蒿草头为禾本科植物铺地黍 *Panicum repens* L.

主治：荨麻疹。

方药：狗仔花。

用法：取鲜叶捣烂，加适量水外擦。

疗效：治疗9例，皆痊愈。

材料来源：广西天峨县防治院。

注：广东的狗仔花为菊科植物夜香牛 *Vernonia cinerea* (L.) Less. 广西天峨县未送检标本，是否相同，待考。

水田皮炎

用途：防治水田皮炎。

方药：黄柏（干品）、白屈菜各一斤，狼毒、贯众各半斤，草乌半两。

制法：将上药水煎1小时，滤取药液。药渣再水煎两次，每次半小时。合并滤液，浓缩成500克。趁热加松香、大车油各500克，搅拌成膏，放冷待用。

用法：外用，涂于皮肤患处。

效果：预防效果：对34人观察，每人右侧肢体涂药，左侧不涂药。涂药右侧肢体无一发病，左侧肢体发病28人。上药预防效果显著。

治疗效果：发病的28人分两组，治疗组12人，发病后第一天始，每天于患处涂药，睡前洗去。对照组16人，观察自然病程。治疗组平均病程3.2天，对照组平均病程6.3天。

材料来源：辽宁省沈阳医学院。

用途：防治水田皮炎。

方药及制法：1.鲜羊蹄、车前草各半斤，加水三至五斤，煎至一斤，滤液备用（加食盐少许防腐）。

2.鲜羊蹄半斤，射干二两，加水二斤，煎至一斤，滤液备用（加食盐少许防腐）。

3.野薄荷一两，野苏子、野辣椒各五两，蒲公英、艾叶各一斤，加水五斤煎至一斤，滤液备用（加食盐少许防腐）。

用法：涂擦患处皮肤。

效果：用上法预防，1970年发病率降低至10%（往年90%）。治疗62例，38例收到止痒效果。

材料来源：辽宁省沈阳市东陵区深井子公社。

用途：预防水田皮炎。

方药：水田皮炎防护液：聚乙烯醇缩丁醛3.9克，苯二甲酸二丁酯3.9克，漆片3.9克，松香4.9克，酒精82毫升。

用法：在表皮涂一薄层，干燥后方可下水。

效果：试用10万余人，效果较好。

材料来源：辽宁省本溪市。

主治：水田皮炎。

方药：墨旱莲草。

用法：将上药搓烂外擦手脚，擦至皮肤稍发黑色，略等干后即可下水劳动。每天在上工前后擦一次，即可预防手脚糜烂。已经手脚糜烂的也可用此药，2~3天治愈。

疗效：防治2947例，效果较好。

材料来源：江苏省高邮县。

主治：水田皮炎。

方药及制法：雄黄、大枫子各一两，梅片二分（或樟脑粉二分），熟石灰粉五钱。共研细末。

用法：先用青凡木捣烂或用苦楝树皮（或刺苋菜）泡开水洗患处，然后撒上药粉。

疗效：治疗1000多次，轻者1天，重者3~4天痊愈。

材料来源：广东省揭西县卫生站。

主治：水田皮炎，神经性皮炎，蚊子咬伤。

方药：苦楝根皮（或枝叶，春夏用枝叶，秋冬用根皮）、大柳树枝叶、号筒杆全草、天青鱼胆各五斤，九里光二斤，旱烟杆、花椒树根各二斤半，明矾半斤，食盐三两。

制法：上药加水100斤，煎至20斤，滤液备用。

用法：用药水外擦患处。

疗效：治疗500余人，疗效显著。

材料来源：湖南省武冈县教卫组。

注：1.号筒杆为罂粟科植物博落迴 *Macleaya cordata* (Willd.) R.Br.

2.九里光为菊科植物千里光 *Senecio scandens* Buch.-Ham.

主治：水田皮炎。

方药：松节、艾叶各适量。

制法：上药制成松艾酒精。

用法：涂抹患处。

疗效：治疗140多人，大部涂抹一至二次即痊愈。

材料来源：北京市顺义县牛栏山公社下坡屯大队。

神经性皮炎（附：顽癣）

主治：神经性皮炎。

方药：黄蚂蚁适量。

用法：取活黄蚂蚁去头，挤出内脏浆汁涂患部，6~8天一次。黄蚂蚁浆汁涂患处4~6小时后，患部皮肤有刺激性疼痛，随后出现红、热，形成片状丘疹性皮炎，再敷磺胺软膏，2~3天结痂，瘙痒消失，4~5天脱痂，皮肤光滑柔软而痊愈。

疗效：治疗11例，均有较好的疗效，随访6个月，未复发。

病例：王××，男，22岁。颈部两侧有6×7和6×8厘米的斑块，已两年余，斑块表面呈苔藓样，并有顽固性瘙痒，

诊断为神经性皮炎，曾多方治疗无效，经用上方治疗，7天痊愈。

材料来源：云南省。

注：黄蚂蚁为鞘翅目、隐翅目科多毛隐翅虫 *Paederus densipennis* Bernh.

主治：神经性皮炎。

方药：7054注射液：核桃树枝煎剂300毫升，0.5%盐酸普鲁卡因200毫升。

制法：取当年生核桃树枝50克，加蒸馏水1000毫升，煎至300毫升，滤除药渣，滤液分装10瓶，30分钟消毒即得。

用法：于病灶基底部采取封闭式皮下注射。剂量视病灶大小而定，每日一次。

疗效：治疗18例，痊愈8例，其余10例均明显好转。

病例：崔××，女，20岁。左侧颈部患神经性皮炎一年余，曾于病变部给予奎宁普鲁卡因封闭治疗，病变反见增大，皮肤更加粗厚，经用7054注射液一次，痒感消失，注射六次痊愈。

材料来源：新疆筑指医院。

注：7054注射液配制后，有时放置两天后出现轻微沉淀，如用前临时加0.5%普鲁卡因，则无沉淀现象。

主治：神经性皮炎。

方药：茗叶细辛适量。

用法：取鲜全草洗净，捣烂成糊状，涂敷患处，每日二次。