


彝医植物药

李耕冬 贺廷超 编著



四川民族出版社

责任编辑：康淑君
封面设计：何昌林
封面题字：陈希仲
技术设计：康永光

彝医植物药

四川民族出版社出版 (成都盐道街三号)
四川省新华书店经销 自贡新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张7.5 插页2 字数180千
1990年7月第一版 1990年7月第一次印刷
印数：1—2000 册

定价：2.90元

书号：ISBN7-5409-0230-2/Q·5

彝医植物药

李 耕 冬 编著
贺 廷 超

四川民族出版社

一九九〇年·成都

目 录

分类索引.....	1—7
正文.....	1—195
附：图谱.....	196—224
彝汉药名对照简表.....	225—228
后记.....	229—230

分类索引

科名	中名	拉丁名	页码	图
杉科	杉木	<i>Cunninghamia lanc-</i>		
		<i>colata</i>	1	1
三白草科	蕺菜	<i>Houttuynia cordata</i>	2	2
胡椒科	胡椒	<i>Piper nigrum</i>	4	3
胡桃科	野核桃	<i>Juglans cathayensis</i>	6	4
	胡桃	<i>Juglans regia</i>	8	5
桑科	蒙桑	<i>Morus mongolica</i>	10	6
马兜铃科	异叶马兜铃	<i>Aristolochia heteroph-</i>		
		<i>ylla</i>	15	8
	穆坪马兜铃	<i>Aristolochia moupinensis</i>		
			12	7
	细尖马兜铃	<i>Aristolochia transsecta</i>	14	
蓼科	虎杖	<i>Polygonum cuspidatum</i>	16	9
	天荞麦	<i>Polygonum hymnosum</i>	18	10
	甜荞麦	<i>Polygonum fagopyrum</i>	20	11
	草血竭	<i>Polygonum orientale</i>	22	12
	苦荞麦	<i>Polygonum tataricum</i>	24	13
	大黄	<i>Rheum officinale</i>	28	15
	尼泊尔酸模	<i>Rumex nepalensis</i>	26	14
苋科	牛膝	<i>Achyranthes bidentata</i>	30	16
毛茛科	弯喙乌头	<i>Aconitum campylorhyn-</i>		
		<i>chum</i>	33	
	乌头	<i>Aconitum carmichaeli</i>	36	
	紫乌头	<i>Aconitum episcopale</i>	32	17
	凉山乌头	<i>Aconitum liangshanicum</i>	34	18

	拟玉龙乌头	<i>Renitum pseudo-stapfi-</i> <i>anum</i>	44	
	黄草乌	<i>Rcnitum uilmorimianun</i>	44	
	打破碗花花	<i>Anemone hupehensis</i>	37	19
	野棉花	<i>A. vitifolia</i> Buch. Ham	38	
	高原唐松草	<i>Lhalictrum cultratum</i>	39	22
	多枝唐松草	<i>Lhalictrum ramosum</i>	40	21
	毛发唐松草	<i>Lhalictrum cultratum</i>	39	20
小檗科	獐猪刺	<i>Berberis julianae</i>	45	26
	金花小檗	<i>Berberis wilsonae</i>	45	27
樟科	猴樟	<i>Cinnamomum bedinieri</i>	41	
	樟	<i>Cinnamomum camphora</i>	41	
	油樟	<i>Cinnamomum longepani-</i> <i>culatum</i>	41	23
	清香木姜子	<i>Litsea euosma</i>	44	
	滇木姜子	<i>Litsea rubescens</i>	43	24
	钝叶木姜子	<i>Litsea veitchiana</i>	43	
罂粟科	赛北紫堇	<i>Corydalis impatiens</i>	45	25
	罂粟	<i>Papaver somniferum</i>	47	28
茅膏菜科	茅膏菜	<i>Drosera peltata</i> var. <i>lu-</i> <i>nta</i>	49	29
虎耳草科	红毛虎耳草	<i>Saxifraga rufescens</i>	51	30
蔷薇科	龙芽草	<i>Aglimonia pilosa</i>	53	31
	枳椇	<i>Dorynia delarayi</i>	55	32
	桃	<i>Prunus persica</i>	57	33
	地榆	<i>Sanguisorba officinalis</i>	59	34
牻牛儿苗科	老鹳草	<i>Geranium nepalense</i>	61	35
	紫地榆	<i>Geranium strictipes</i>	61	36
芸香科	桔	<i>Citrus reticulata</i>	63	37
	花椒	<i>Zanthoxylum bungea-</i> <i>num</i>	64	38

	竹叶椒	<i>Zanthoxylum planisp-</i>		
		<i>inum</i>	67	39
大戟科	余甘子	<i>Phyllanthus emblica</i>	69	40
卫矛科	昆明山海棠	<i>Tripterygium hypogl-</i>		
		<i>aucum</i>	71	41
	雷公藤	<i>Tripterygium wilfordii</i>	72	
葡萄科	狭叶崖爬藤	<i>Tetrastigma hypogla-</i>		
		<i>ucum</i>	73	42
	崖爬藤	<i>Tetrastigma obtectum</i>	76	43
	无毛崖爬藤	<i>Tetrastigma obtectum</i>		
		<i>var. glabium</i>	75	
锦葵科	冬葵	<i>Malva verticillata</i>	77	44
堇菜科	毛堇菜	<i>viola confusa</i>	78	45
五加科	五加	<i>Acanthopanax graci-</i>		
		<i>listylus</i>	80	
	雷五加	<i>Acanthopanax simo-</i>		
		<i>nii</i>	79	46
伞形科	竹叶柴胡	<i>Bupleurum margina-</i>		
		<i>tum</i>	81	47
蓝雪科	柴金标	<i>Ceratostigma willm-</i>		
		<i>ottianum</i>	82	48
萝藦科	青蛇藤	<i>Periploca calophylla</i>	84	49
	滇杠柳	<i>Periploca forrestii</i>	84	
紫草科	倒提壶	<i>Cynoglossum amabile</i>	86	50
	琉璃草	<i>Cynoglossum zeylani-</i>		
		<i>cum</i>	86	51
唇形科	寸金草	<i>Clinopodium megal-</i>		
		<i>anthum</i>	88	52
	坝子花	<i>Elsholtzia rugulosa</i>	89	53
	夏枯草	<i>Prunella vulgaris</i>	91	54

		线纹香茶菜	<i>Rabdosia loghanthoides</i>	92	
茄科		云南香茶菜	<i>Rabdosia yunnanensis</i>	92	
		辣椒	<i>Capsicum frutescens</i>	93	55
		曼陀罗	<i>Datura stramonium</i>	95	56
		黄花烟草	<i>Nicotiana rustica</i>	97	
		烟草	<i>Nicotiana glauca</i>	97	
		龙葵	<i>Solanum nigrum</i>	99	
		珊瑚豆	<i>Solanum pseudo-caps-</i>		
			<i>caudatum</i> var. <i>difflorum</i>	99	57
玄参科		扭盖马兜蒿	<i>Fedicularis davidii</i>	101	58
紫葳科		两头毛	<i>Intervillea arguta</i>	103	
车前草科		平车前	<i>Plantago depressa</i>	106	59
		大车前	<i>Plantago major</i>	106	60
茜草科		鸡矢藤	<i>Paederia scandens</i>	108	61
		茜草	<i>Rubia cordifolia</i>	110	64
		大叶茜草	<i>Rubia leiocaulis</i>	110	62
		大理茜草	<i>Rubia ustulata</i>	110	63
忍冬科		血滴草	<i>Sambucus adnata</i>	113	
		接骨木	<i>Sambucus williamsii</i>	113	65
川续断科		川续断	<i>Dipsacus asperoides</i>	115	66
			<i>Dipsacus japonicus</i>	116	
		双参	<i>Triplostegia glandulifera</i>	117	67
		大花双参	<i>Triplostegia grandiflora</i>	117	68
葫芦科		南瓜	<i>Cucurbita moschata</i>	119	69
		茅瓜	<i>Melothria heterophylla</i>	121	70
		苦瓜	<i>Momordica charantia</i>	123	71

001	川赤堇	<i>Thladiantha flavioides</i>	125	72
001	南赤堇	<i>Thladiantha nudiflora</i>	125	72
001	桔梗科	<i>Campanumoea javanica</i>	127	73
001	小花党参	<i>Codonopsis micrantha</i>	128	74
001	西南山梗菜	<i>Lobelia seguinii</i>	129	75
001	菊科	<i>Aster senecifolius</i>	131	76
001	鬼针草	<i>Bidens bipinnata</i>	133	77
001	三叶鬼针草	<i>Bidens pilosa</i>	133	77
001	狼把草	<i>Bidens tripartita</i>	133	78
001	天明精	<i>Carpesium abrotaneoides</i>	129	
001	总状菊	<i>Cirsium botryodes</i>	135	80
001	滇大菊	<i>Cirsium echlorolepis</i>	136	
001	烟管菊	<i>Cirsium pendulum</i>	136	81
001	异叶泽兰	<i>Eupatorium heterophyllum</i>	138	82
001	秋鼠曲草	<i>Gnaphalium hypoleucum</i>	140	83
001	三七草	<i>Gnaphalium segetum</i>	141	84
001	羊耳菊	<i>Inula cappa</i>	143	85
001	马兰	<i>Kalimeris indica</i>	145	86
001	华火絨草	<i>Leontopodium sinense</i>	147	87
001	孔雀草	<i>Tagetes patula</i>	149	88
001	苍耳	<i>Xanthium sibiricum</i>	151	89
001	禾本科	<i>Avena sativa</i>	153	
001	燕麦	<i>Avena sativa</i>	153	90
001	白茅	<i>Imperata cylindrica</i>	155	91
001	箭竹	<i>Sinarundinaria nitida</i>	157	92
120	棕榈科	<i>Trachycarpus fortunei</i>	158	93

121	天南星科	菖蒲	<i>Acorus calamus</i>	160	
122		金钱蒲	<i>Acorus gramineus</i>	160	94
123		一把伞南星	<i>Arisaema erubescens</i>	162	96
124		岩生南星	<i>Arisaema saxatile</i>	162	95
125		下延崖角藤	<i>Rhaphidophra deoursiva</i>		
126	灯心草科	灯心草	<i>Juncus effusus</i>	164	97
127		秧草	<i>Juncus setchuensis</i> var.		
			<i>effusoides</i>	164	
128	百合科	蒜	<i>Allium sativum</i>	166	98
129		狭叶重楼	<i>Paris polyphylla</i> var.		
			<i>stenophylla</i>	168	99
130		宽瓣重楼	<i>Paris polyphylla</i> var.		
			<i>yunnanensis</i>		
131		延龄草	<i>Trillium tschonoskii</i>	168	100
132	鸢尾科	射干	<i>Belamcanda chinensis</i>	171	101
133		蝴蝶花	<i>Iris japonica</i>	172	102
134		鸢尾	<i>Iris tectorum</i>	173	103
135	姜科	草果	<i>Amomum tsao-ko</i>	175	104
136		姜荷	<i>Zingiber macra</i>	177	105
137		姜	<i>Zingiber officinale</i>	178	106
138	兰科	白芨	<i>Bletilla striata</i>	180	
139		小白芨	<i>Bletilla yunnanensis</i>	180	107
140	木贼科	笔管草	<i>Equisetum hiemale</i>	182	108
141	紫萁科	紫萁	<i>Osmunda japonica</i>	184	109
142	中国蕨科	野鸡尾	<i>Onychium japonicum</i>	185	
143		狭叶金粉蕨	<i>Onychium tenuifrons</i>	185	110
144	鳞毛蕨科	刺齿贯众	<i>Cystodium caryotid-eum</i>	187	111
145		黑鳞耳蕨	<i>Polystichum makinoi</i>	188	112
	水龙骨科	云南娜蕨	<i>Drynaria delavayi</i>	189	

地茶科	瓦韦	<i>Lepisorus thunbergi-</i>		
		<i>anus</i>	190	113
	扇蕨	<i>Neocheiropteris</i>		
		<i>palmatopedata</i>	191	114
	密网蕨	<i>Phymatodes scolopen-</i>		
		<i>dria</i>	192	115
	石韦	<i>Pyrrosia lingua</i>	193	
	雪地茶	<i>Thamnia vermicula-</i>		
		<i>ris</i>	194	116

杉 木

彝族药名 苏波 紫生

原植物 杉科 杉木 *Cunninghamia lanceolata*
(Lamb.) HOOK.

常绿乔木。叶在侧枝上排成2列，条状披针形，坚硬，边缘有细齿。雄球花簇生枝顶；雌球花单生或簇生枝顶，卵圆形，苞鳞与珠鳞结合而生，苞鳞大，珠鳞先端3裂。球果近球形。种鳞形小，生于苞鳞腹面下部。种子扁平，两侧有窄翅。

彝医用药经验

痔疮：用根皮，熬水，洗。或用鲜叶，春烂，敷。

烧伤烫伤：用根皮，烧灰为末，调清油，搽。

漆疮：用鲜叶或根皮，熬水，洗。

以上流传深山地区。

按

漆疮，为接触漆树或生漆（土漆）后皮肤过敏而致之疮，痒不可耐。

彝医以根皮或嫩叶入药，主治痔疮、漆疮、烧烫伤，具敛疮拔脓、止痒消肿、燥湿解毒之功，多外用。

汉医《纲目》等有记述。性温、味辛。可治淋病、疝气、腹痛、转筋、关节炎、跌打伤，而治痔疮、漆疮、烧烫伤均为汉医未载，是为彝医独特的用药经验。

临床用杉木叶治疗慢性气管炎有效。

戴 菜

彝族药名 字乌 ꞑꞑ

原植物 三白草科 戴菜

Houttuynia cordata Thunb.

又名鱼腥草、侧耳根。

多年生草本植物，有腥臭味。茎下部伏地，生根，上部直立。叶互生，心形，下面常紫色；托叶膜质，条形，下部常与叶柄合生成鞘状。穗状花序生于茎上端，与叶对生，基部有4片白色花瓣状苞片；花小而密。

彝医用药经验

大疮：采挖新鲜根茎，春烂、捣绒后，敷贴患处，并煮食之。

胃痛：用鲜根切碎，生拌食之，或熬水吃。

咳：鲜草或风干后的根茎，熬水吃。

食积：鲜根熬水服。

饮食不化、腹胀：鲜根同猪脚，或鲜猪肉炖吃。

以上流传凉山地区。

风疹、痒疙瘩：全草兑酒服。

以上出《双柏彝医书》。

按

字乌，意为“咳药”，言其止咳之功效。云南彝语又称“翔翁土”。彝医主要以根茎入药，主治疮毒、咳嗽、食积、腹胀、胃痛、风疹等。《双柏彝医书》载之。

汉医记述此药较多。《本草纲目》、《滇南本草》、《贵州民间方药集》、《遵义府志》等均有记载。主肺咳、痔疮、湿热、

痢疾、疮毒等。但未见有治食积、腹胀、胃痛、风疹之说。是为彝医独有之特点。

本品主含挥发油，油中的鱼腥草素为抗菌活性成分。经药理实验本品具抗菌、抗病毒、利尿以及镇痛、止血、止咳、促进组织再生、抑制浆液分泌等作用；毒性较低。临床治疗肺炎、肺结核、慢性气管炎、百日咳、化脓性关节炎、慢性宫颈炎、皮肤科疾患（疱疹）以及预防钩端螺旋体病有效。鱼腥草素已能人工合成，目前已有注射剂、片剂等应用。

胡 椒

彝族药名 则 罗 菲¹⁰

原植物 胡椒科 胡椒

Piper nigrum L.

又名沙泽（《双柏彝医书》）。

木质藤本，茎长，节膨大，常生根。叶互生，近革质，卵状椭圆形，托叶短于叶柄。单性花，雌雄异株，无花被；穗状花序稍短于叶。浆果球形，熟时红色，干后黑色而有皱纹。

原产东南亚，我国广东、广西、云南等省有引种栽培。

彝医用药经验

伤风：胡椒果为末内服。

以上出《献药经》。

体弱身黄：本品加草果、猪肚子煮吃。

无头疮：本品加小鱼春烂，兑酒服。

乳疮、化脓未出头：本品加小鱼春烂，兑酒服。

酒醉病：本品加草果，与黄鳝、泥鳅共置土锅（用泥烧制成的锅）内煮，内服。

久病体衰：本品煨沙参服。

肠疮、体虚耳鸣：本品加金刚钻树根，煨吃。

以上出《双柏彝医书》。

按

彝医以果实入药，主治无头疮、乳疮、肠疮、伤风、酒醉、耳鸣、身黄诸症，具敛疮解毒、解酒祛风、补益身体之功。《双柏彝医书》及《献药经》均载之。

本品所主疾病中，伤风指感冒；体弱身黄、久病体虚均指各种慢性消耗性疾病如肝炎，肺结核等所致之体虚身弱；肠疮指慢性肠胃炎一类肠道疾病；酒醉病指饮酒过度，危及肠胃，积滞不化，以致不思饮食，身衰体弱。

汉医多有记述，为辛、热之品，主温中、下气、消痰、解毒，治寒痰食积、脘腹冷痛、反胃呕吐、泄泻冷痢，并解食物毒。但治伤风、乳疮、无头疮、酒醉等汉医无记载，是为彝医独特用法。可见汉医多用于胃部疾患，而彝医多用于疮疡溃肿，二者大相径庭。

本品含胡椒碱、胡椒脂碱、胡椒新碱等生物碱，以及多种成分组成的挥发油等。药理实验能升高人的血压及脉搏；内服可作驱风、健胃剂；外用可作刺激剂、发赤剂；胡椒碱曾作解热和驱风剂，有微弱抗疟作用。临床治疗小儿消化不良性腹泻、肾炎、慢性气管炎和喘息、神经衰弱，以及神经性皮炎、牛皮癣、湿疹、座疮、神经搔痒症，过敏性皮炎等皮肤病均有效。

野 核 桃

彝族药名 罗斯米 ꞑꞑ米

原植物 胡桃科 野核桃

Juglans cathayensis Dode.

又名山核桃。

高大落叶乔木。顶芽裸露，有黄褐色毛。单数羽状复叶，小叶无柄，卵状长椭圆形，有明显细密锯齿，有星状毛。雄花序下垂，雌花序穗状，直立，密生腺毛。果序长，下垂，果实卵形，有腺毛；果核球形，有纵棱，各棱间有不规则皱折。

彝医用药经验

骨折：本品同瓦布友（紫葳科植物两头毛）、斯赤列（血满草）、爬地草，以及活小鸡，共舂烂、捣绒，包敷伤处。

身弱体虚：本品果仁舂烂，蒸蜂糖吃。

以上流传凉山地区。

按

本品所主治疾病中，身弱体虚指久病（慢性消耗性疾病）后以及老年人之体虚。

彝医以其果及根和茎皮入药，主骨折、体虚，具接骨生肌、滋补强壮之功。

本品汉医古本草未载。现代仅《浙江天目山药植志》收录此药。为性温平、味甘之品，种仁炒熟捣烂冲酒服治腰痛。可补养气血，润燥化痰、温肺润肠，又可治虚寒咳嗽、下肢酸痛；油为缓下剂，可驱绦虫，外用治皮肤疥癣、冻疮、腋臭。治骨折为汉医不载，是彝医特有的用药经验。且汉医仅用果实及油，而彝医