

本草綱目

卷三十七

木之四 寓木類一十二種

茯苓本經 琥珀別錄 豎嘉祐 豬苓本經 雷丸本經 桑上寄生本經 松蘿本經 楓柳

唐本 桃寄生綱目 柳寄生綱目 占斯別錄 石刺木拾遺

右附方舊十五新四十

木之五 苞木類四種

竹本經 竹黃開寶 仙人杖嘉祐 鬼齒拾遺

右附方舊十七新二十

木之六 雜木類七種 附錄一十九種

淮木本經 城東腐木別錄 東家雞栖木拾遺 古崩木拾遺 古椶板拾遺 震燒木拾遺

河邊木拾遺

右附方新一

本草綱目 二十一 卷三十七 木部

附錄 別錄八種海藥二種拾遺九種
新維木 木核 合新木 榑蒲木 乾陀木 遂陽木 學木核 榭核

美樹 白馬骨 慈母 屑 那著悉 帝休 大木皮

木之四寓木類一十二種

茯苓本經上品

【釋名】茯苓。綱目。伏兔。經。松腴。不死麴。記事。抱根者名伏神。別錄。宗奭曰。多年樵斫之松根之氣

于外結為茯苓。故不抱根離其本體。有零之義也。津氣不盛。止能附結木根。英未淪其精氣。盛者發泄。珍曰。茯苓。史記。龜策傳。作茯苓。蓋松之神靈之氣。伏結而成。故謂之茯苓。神也。仙經言。茯苓。大如

拳者。佩之。令百鬼消滅。則神靈之氣。亦可散矣。俗作著者。傳寫之訛。爾下有茯苓。上有兔絲。故又名茯苓。或云其形如兔。故名。亦通。

【集解】三四升器。外皮黑而細。內堅白。形如鳥獸。龜鼈者。良。虛赤者。不佳。性無朽。蛀。埋地中。三十年

猶色。理無異也。一保界曰。今泰山亦有茯苓。實而理小。不復生。枯采用。第一出華山。形極粗。大雅州南山亦

有。不。如。華。山。一。范。子。計。然。言。茯苓。出。嵩。山。及。三。輔。淮。南。子。言。千。年。之。松。下。有。茯苓。或。云。即。茯苓。貫。着。松。根。者。生

入地。千歲。為茯苓。望松。赤者。有之。廣志。言。茯苓。乃。松。汁。所。作。勝。於。茯苓。或。云。久。為。人。斬。伐。其。枯。折。槎。者。生

朱提。漢。陽。縣。一。頌。曰。今。太。華。嵩。山。皆。有。之。出。大。松。下。附。根。而。生。無。苗。葉。花。實。作。塊。如。李。在。土。底。大。者。積

至。數。斤。有。赤。白。二。種。或。云。松。脂。變。成。或。云。假。松。氣。而。生。今。東。人。見。山。中。古。松。久。為。人。斬。伐。其。枯。折。槎。者。生

之。其。撥。大。者。茯苓。亦。大。皆。自。作。塊。不。附。着。根。而。生。今。東。人。見。山。中。古。松。久。為。人。斬。伐。其。枯。折。槎。者。生

云。茯苓。在。兔。絲。之。下。狀。如。飛。鳥。之。形。新。雨。已。霽。天。靜。無。風。以。火。夜。燒。兔。絲。去。之。即。篝。燭。此。地。單。之。火。滅

一。時。珍。曰。下。有。茯苓。則。上。有。靈。氣。如。斗。者。有。堅。如。石。者。絕。勝。其。輕。虛。者。不。佳。蓋。年。淺。未。堅。故。劉。宋。王

絲。子。及。女。蘿。為。說。誤。矣。茯苓。有。大。如。斗。者。有。堅。如。石。者。絕。勝。其。輕。虛。者。不。佳。蓋。年。淺。未。堅。故。劉。宋。王

一。時。珍。曰。下。有。茯苓。則。上。有。靈。氣。如。斗。者。有。堅。如。石。者。絕。勝。其。輕。虛。者。不。佳。蓋。年。淺。未。堅。故。劉。宋。王

微茯苓贊云：皓蒼下居，形絲上菁，中狀雞處，其容龜紫，神俸少司，保延幼艾終志不移，柔紅可佩，觀此形絲，即兔絲之證矣。寇氏未解此義。

【脩治】令人瞳子并黑睛點小筆盲目。弘景曰：「作丸散者，先煮二三沸，乃切暴乾用。」

【氣味】甘平無毒。草防風芍藥紫芝茯苓冬共療五臟惡白蠱畏牡蒙地榆雄黃秦朮龜甲忌米醋及酸物。弘景曰：「藥無馬問，或是馬莖也。」恭曰：「李氏本草，馬刀為茯苓使問字，草書似刀字，傳說爾。」志曰：「二注恐皆非，當是馬蘭字。」

【主治】胸脅逆氣，憂志驚邪，恐悸，心下結痛，寒熱煩滿，欬逆，口焦舌乾，利小便，久服安魂養神，不飢延年。本

止嘔逆，善安心神，主肺痿痰壅，心腹脹滿，小兒驚癇，女人熱淋。甄補五勞七傷，開心益智，止健忘，煖腰

膝，安胎。大止渴，利小便，除溼益燥，和中益氣，利腰臍，開血。元逐水，緩脾，生津，導氣，平火，止泄，除虛熱，開

腠理。李瀉膀胱，益脾胃，治腎積，奔豚。好

赤茯苓【主治】破結氣。甄瀉心，小腸膀胱溼熱，利竅行水。珍

茯苓皮【主治】水腫膚脹，開水道，開腠理。珍

【發明】弘景曰：「茯苓白色者補，赤色者利，俗用甚多，仙方服食亦為至要云。其通神而致靈，和魂

行水之功多，益心脾不可缺也。」元素曰：「茯苓亦瀉白補，上古無此說，氣味俱薄，性浮而升，其用有五利小便也，開腠理也，生津液也，除遺熱也，止瀉也，如小便利或數者，多服則損人目汗，多人服之亦

損元氣，天人為其淡而滲也，又云淡為天之陽，陽當上行，何以利水而瀉下？氣薄者陽中之陰，所以茯苓利水，瀉下不離陽之體，故入手太陽。」杲曰：「白者入壬癸，赤者入丙丁，味甘而淡，降也，陽中陰也。」

本草綱目 二十一 卷三十七 木部 三

其用有六。利發而除溼益氣。而和中治驚悸生津液。小便多者能止。小便結者能通。又云。溼淫所勝。小便不利。淡以利尿。甘以助陽。溫平能益脾。逐水乃除溼之聖藥也。一好古曰。一白者入手。太陰足太陽經氣分。赤者入足太陰。少陰太陽氣分。伐腎邪。小便多能止之。小便澹能利之。與車前子相似。雖利小便而不走氣。酒浸與光明朱砂同用。能秘真元。味甘而平。如陰虛者。恐未為宜。此物曰。一茯苓得松之餘氣。而成。屬金。仲景利小便多用之。此暴新病之要藥。中久陳積垢為搬運之功。爾。一時珍曰。一茯苓本。草。又言。利小便。伐腎邪。至李東垣王海藏。乃言。小便多者。能止。瀉者。能通。開胃。砂能秘真元。而朱丹溪。又言。陰虛者。不宜用。義似相反。何哉。茯苓氣味淡而滲。其性上行。生津液。開胃。砂能秘真元。而降。利小便。故張潔古謂。其屬陽。浮而升。言其性也。東垣謂。其為陽中之陰。降而下。言其功也。一素問云。一飲。食入胃。遊溢精氣。上輸于肺。通調水道。下輸膀胱。觀此。則知淡滲之藥。俱皆上行而後下。降非直下。行也。小便多。其源亦異。一素問云。一肺氣盛則便數而欠。虛則欠。欬小便遺數。心虛則少氣遺溺。下焦虛則遺溺。胞移熱于膀胱。則遺溺。膀胱不利為癰。不約為遺。厥陰病則遺溺。閉癰。所謂肺氣盛者。實熱也。其人必氣壯。脈強。宜用茯苓。甘淡以滲。其熱故曰。小便多者。能止也。若夫肺虛。心虛。熱厥。陰病者。皆虛熱也。其人必上熱下寒。脈虛而弱。法當用升陽之藥。以升水降火。膀胱不約。下焦虛者。乃火投于水。水泉不藏。脫陽之證。其入必肢冷。脈遲。法當用溫熱之藥。以升水降火。膀胱不約。下焦虛者。乃火投非茯苓。輩淡滲之藥。所可治。故曰。陰虛者。不宜用也。仙家雖有服峻補其下。交濟坎離。二證皆茯苓神。氣味甘平無毒。

【主治】辟不祥。療風眩風虛。五勞口乾。止驚悸。多恚怒。善忘。開心益智。安魂魄。養精神。別錄。補勞乏。主心下急痛。堅滿。人虛而小腸不利者。加而用之。甄

神木 即伏神。心內木也。又名黃松節。

【主治】偏風口面喎斜。毒風筋攣不語。心神驚掣。虛而健忘。甄。治腳氣痺痛。諸筋牽縮。時

【發明】一弘景曰。一仙方止云。茯苓而無茯神。為瘰。既同。用應無嫌。一時珍曰。一神農本草。止言茯苓。名醫別錄。始添茯神。而主治皆同。後人治心病。必用茯神。故潔古張氏。于風眩心虛。非茯神不

能除然疾者亦未嘗不治心病也陶弘景始言茯苓亦瀉白補李杲復分赤入丙丁白入壬癸此其發
前人之秘者時珍則謂茯苓神祇只當云赤入血分白入氣分各從其類如牡丹芍藥之義不當以丙
丁壬癸分也若以丙丁壬癸分則白茯苓不能治心病赤茯苓不能入膀胱矣張元素不分赤白之說
于理不通聖濟錄松節散用茯苓神心中木一兩乳香一錢瓦器炒研爲末每服二錢木瓜酒下治風寒
冷溼痺子筋骨縮筋攣痛並主之

【附方】舊五新服茯苓法一頌曰一集仙方多單餌茯苓其法取白茯苓五斤去黑皮搗篩以熟絹囊
銅器中殺火煮如膏收之每食以竹刀割隨性飽食辟穀不飢也如欲食穀以湯煮去苦汁飲之不
酥甜乃暴乾篩末用酒三石蜜三升相和置大甕中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之終日不食名
汁當浮出酒上掠取其味極甘美作掌大塊空甕中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之終日不食名
酥自浮出酒上掠取其味極甘美作掌大塊空甕中陰乾色赤如棗飢時食一枚酒送之終日不食名

神仙度世之法又服食法以茯苓合白菊花或合桂心或合鹿角爲散丸白任皆可常服神益殊勝
儒門事親方用茯苓四兩白麵二兩水調作餅以黃蠟三兩煎然飽食一頓便絕食服神益殊勝
難受以後氣力漸生也○經驗後方服法用華山挺子茯苓削如棗大塊安瓶內好酒浸之紙封
一重百日乃開其色當如餠糖可日食一塊至百日肌體潤澤一年可夜視物久久通靈○又法白茯苓
老皮酒浸十五日高記用茯苓松脂各二斤淨酒浸之相以白蜜日三服之久久通靈○又法白茯苓
去皮酒浸十五日高記用茯苓松脂各二斤淨酒浸之相以白蜜日三服之久久通靈○又法白茯苓
日晝夜不眠二年役使鬼神四年後玉女來侍○葛洪抱朴子云王子季服茯苓十八年中無影交感丸
從之能隱能彰不食穀矣癡滅面體玉澤又黃初起服茯苓五萬日能坐立亡日中無影交感丸
方見根下吳仙丹方見根下吳胸脅氣逆三錢水煎服一人參牛兩每服錄心養心安神定恍惚健忘心不
火不下降水不上升時復振跳常服消陰養火全氣服神二兩去皮沉血虛心汗有汗思慮多則心孔
香半兩爲末煉蜜丸小豆大每服三十丸食後入參湯下百一選方虛滑遺精仁茯苓二兩縮砂
亦多宜養心血以艾湯調茯苓心虛夢洩或白濁白茯苓末二錢米湯調下虛滑遺精仁茯苓二兩縮砂
二錢精羊肉批片證治要訣心虛夢洩或白濁白茯苓末二錢米湯調下虛滑遺精仁茯苓二兩縮砂
食以酒送下普濟方天漏精白濁薯蕷下遺帶下濁餘瀝常流夢寐驚顛顛遺洩婦人白淫

亦有黃蠟雞子及青魚魷作者並非真惟以手摩熱捨芥為真今桃膠後外國來而出茯苓處並無知出琥珀處復有茯苓否也一珣曰一琥珀是海心摩熱捨芥為真今桃膠後外國來而出茯苓處並無上來者一保昇曰一楓脂入地千年變為琥珀在其間一宗爽曰一今西戎亦有其色差淡而明敵南方有脂而多經年歲爾蜂巢既燒安有蚌形尚在其間一宗爽曰一今西戎亦有其色差淡而明敵南方者色深而重濁彼土人多碾為物形所謂千年茯苓所化則草木入土蜂蟻宛然具在極大也地理志云海南林邑多出琥珀松脂地所化不宜故有能化不化燒折或研伐而根癯不朽津液下流而結削去皮乃成此說為勝但土松脂所化但茯苓尚為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土茯苓琥珀雖有小異同皆云松脂所化但茯苓尚為炎日所灼流脂出樹身外日漸厚大因墮土中津潤歲久為土所滲泄而光瑩之體獨存今可拾芥尚為黏性故其蟲蟻之類未入土時所黏者二物皆自松出而所製各異茯苓生于陰而成于陽琥珀生于陽而成于陰故皆治營安心而利水也一數曰一凡用須分紅松脂石珀水珀花珀象珀璧珀琥珀其紅松脂如琥珀只是濁大肥文橫水珀多無紅色如淺黃多緻文石珀如石重色黃不堪用花珀似新馬尾松心文一路赤一路黃物象琥珀其內自有物命入用神妙璧珀是象珀之長琥珀如血色以布拭熱吸得芥子者真也一論珍曰一松楓諸木潛入土化珀同也雷氏言拾芥子誤矣唐書載西域康于河松木入水一二年化為石正格古論云琥珀出西番南番乃楓木津液多年所化色黃而明瑩者名蠟珀色若松香紅而且黃者名明珀有香者名香珀出高麗倭國者色深紅有蜂蟻松枝者尤好

【脩治】琥珀子內黃之從已至申當有異光搗粉篩用

【氣味】甘平無毒

【主治】安五臟定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋別壯心明目磨翳止痛癩邪療蠱毒破結瘕治產後血枕痛大止血生肌合金瘡藏清肺利小腸元

【發明】者反致其燥急之苦弘景曰以燥脾土有功脾能運化肺氣下降故小便可通若血少不利

白一和大黃紫甲作散酒下方寸匕下惡血婦人腹內血

【附方】新五琥珀散 紫甲一兩京三稜一兩延胡索半兩沒藥半兩大黃六銖熬搗為散空心酒服三

錢七日再服神驗莫及產小兒胎驚 琥珀一錢朱砂半錢為末 小兒胎痢 琥珀一錢朱砂半錢

後即減大黃神驗莫及產小兒胎驚 琥珀一錢朱砂半錢為末 小兒胎痢 琥珀一錢朱砂半錢

冬湯調一字 小便轉胞 入琥末二錢溫服沙水諸淋三服皆效 聖惠方 小便淋瀝 琥珀一錢朱砂半錢

服之或葶草煎湯服老人虛人善濟方 小便尿血 琥珀為末 每服二錢從高墜下 有瘀血在內寸匕

下亦可蜜丸以赤茯苓湯下 善濟方 小便尿血 琥珀為末 每服二錢從高墜下 有瘀血在內寸匕

或入蒲黃三二匕日服 金瘡悶絕 調一錢入琥珀研粉 童子小便 魚骨哽咽 推入咽所牽引之即出 外串

鑿音夥 ○ 宋嘉祐

【釋名】鑿珀 一敦曰一鑿是衆珀之長故號鑿珀

【集解】玄玉而輕出西戎相傳松脂千年為琥珀又千年為鑿二物燒之皆黑潤而輕燒之似

腥臭高昌人名為木鑿謂玄玉為石鑿共州土石開得者燒作松氣功同琥珀見風拆破不堪為器恐

此二種及琥珀或非松脂所為也 慎微曰 梁公作松氣功同琥珀見風拆破不堪為器恐

染或是一種木瀝結成未必是石琥珀復化也 玉策經言松脂千年作琥珀茯苓色年作琥珀

千石作石鑿石鑿千石作威喜大抵皆是神異

【氣味】甘平無毒

豬苓本經中品

【主治】補心安神。破血生肌。治婦人癥瘕。唐小兒帶之辟惡。磨滴目翳赤障。

【釋名】猥豬屎。本家囊。莊地烏桃。圖經一名茗。其根似豬矢是也。一時珍曰。一馬屎曰通。豬屎曰藪。即苓字。

其塊零落而下故也。

【集解】色肉白而實者佳。削去皮用。一頌曰。今蜀州習州亦有之。生土底不必楓根下始有也。一時

珍曰。豬苓亦是木之餘氣。所結如松之餘氣。結茯苓之義。他木皆有。楓木為多耳。

【脩治】升麻藥對。蒸一日去麩曬乾用。一時珍曰。以東流水浸一夜。至明漉出。細切。以

【氣味】甘平無毒。而微降。與茯苓同。一杲曰。淡甘平降也。陽中陰也。一好古曰。甘重子苦。陽也。入

足太陽。足少陰經。

【主治】痲瘡。解毒。蠱疰不祥。利水道。久服輕身耐老。本經解傷寒溫疫大熱發汗。主腫脹滿腹急痛。甄治

渴除溼。去心中懊懣。元瀉膀胱。好開腠理。治淋腫脚氣。白濁帶下。妊娠子淋胎腫。小便不利。珍時

【發明】冬時寒嗽如癆狀者。亦與豬苓。此即五苓散也。豬苓湯發其汗。病欲飲水而復吐。名為水逆。

水服方寸匕。日三四。飲煖水。汗出即愈。利水道。諸湯劑無若此。驗今人皆用之。一杲曰。苦以泄滯。甘

以助陽。淡以利竅。故能除溼。利小便。一宗液曰。豬苓行水之功。多入服必損腎氣。昏人目。久服者宜

【附方】舊五傷寒口渴。邪在臟也。豬苓湯主之。豬苓、茯苓、澤瀉、滑石、阿膠各一兩，以水四錢，調服立通。外臺祕要：通身腫滿，服方寸匕，日三服。楊氏產乳：妊娠腫渴，微渴引飲，方同上法。

錢調服立通。外臺祕要：通身腫滿，服方寸匕，日三服。楊氏產乳：妊娠腫渴，微渴引飲，方同上法。

秘錄：子母妊娠子淋，以通為度。小品方：壯年遺溺，方見草部。消渴白濁，方見。

雷丸本經下品

【釋名】雷實。別錄：雷矢。上竹荅。時珍曰：雷斧雷楔，皆霹靂擊物精氣所化。此物生土中，無苗葉而殺用。

【集解】別錄曰：雷丸生石城山谷及漢中土中，八月采，暴乾。弘景曰：今出建平宜都間。象而圓皮黑，肉白，甚堅實。

【脩治】再浸一宿，蒸之，從已至未，日乾。酒拌，再蒸，日乾。用大明曰：入藥炮用。

【氣味】苦寒，有小毒。甘，有毒。扁鵲曰：甘無毒。李當之曰：大寒。樞曰：苦有小毒。時珍曰：甘微苦平。之才曰：荔實厚朴。

【主治】殺三蟲，逐毒氣，胃中熱，利丈夫，不利女子。本經作摩膏，除小兒百病，逐邪氣，惡風汗出，除皮中熱。

結積蠱毒，白蟲寸白，自出，不止，久服，令人陰痿。別錄：逐風，主癩癩狂走。甄

【發明】弘景曰：本經云，利丈夫，不利女子。別錄曰：久服，陰痿，子事相反。時珍曰：經言利丈夫，不利女子。

子，乃疎利男子元氣，不疎利女子臟氣。故曰：久服，陰痿，子事相反。時珍曰：按陳正敏避齋閑

覽云楊動中年得異疾每發語腹中有小聲應之久漸聲大有道士見之曰此應聲蟲也但讀本草取不應者治之讀至雷丸兩粉半斤下寸白蟲許以稀粥飲服一錢七須上牛月服食肉少

【附方】新二小兒出汗有熱雷丸四兩粉半斤下寸白蟲許以稀粥飲服一錢七須上牛月服食肉少

驗方筋肉化蟲方見下部

桑上寄生上品

【釋名】寄屑。經。寓木。經。宛童。本。寫。寓木。葛。二音。呼為珍曰。此物寄寓他木而生如鳥立于地故曰寄生

【集解】上。楓。上。皆。有。形。類。一。般。但。根。津。所。因。處。為。異。則。各。隨。其。樹。名。之。生。樹。枝。間。根。在。枝。節。之。內。葉。圓。青。赤。厚。澤。易。折。旁。自。生。枝。節。冬。夏。生。四。月。花。白。五。月。實。赤。大。如。小。豆。處。處。皆。有。以。出。彭。城。者。為。勝。俗。呼。為。續。斷。用。之。而。本。經。續。斷。別。在。上。品。主。療。不。同。市。人。混。雜。無。識。者。恭。曰。此。多。生。楓。柳。柳。水。楊。呼。

樹上葉無陰陽如細柳葉而厚肥如小豆蓋未見也江南人相承用其莖為續斷殊不相關一保昇曰九月始熱黃陰陶言五月實亦大如小豆蓋未見也江南人相承用其莖為續斷殊不相關一保昇曰

肥。諸。樹。多。有。寄。生。莖。葉。並。相。似。云。是。鳥。食。以。別。可。斷。莖。落。樹。上。深。感。氣。而。生。葉。如。橘。而。厚。軟。莖。如。槐。而。肥。脆。處。雖。有。須。桑。上。者。佳。然。非。自。采。節。難。以。別。可。斷。莖。落。樹。上。深。感。氣。而。生。葉。如。橘。而。厚。軟。莖。如。槐。而。肥。

關。莖。短。似。雞。脚。樹。上。者。為。桑。寄。生。桑。上。極。少。縱。有。形。與。櫻。上。者。亦。不。同。次。即。楓。樹。上。者。力。與。櫻。樹。上。者。相。同。黃。色。七。月。六。月。采。一。宗。兩。曰。一。桑。寄。生。皆。言。處。處。有。之。從。官。南。北。處。處。難。得。豈。當。生。穀。不。當。生。此。一。物。能。自。生。耶。抑。宜。同。耶。若。以。為。鳥。食。一。桑。寄。生。落。枝。節。間。感。氣。而。生。則。麥。當。生。穀。不。當。生。此。一。物。有。求。此。于。吳。中。諸。邑。者。予。遍。搜。不。可。得。遂。以。實。告。之。鄰。邑。以。他。木。寄。生。途。上。服。之。逾。月。而。死。可。不。慎。哉。

也。自是感造化之氣別是一物。不可得遂以實告之鄰邑。以他木寄生。途上服之。逾月而死。可不慎哉。

有求此于吳中諸邑者。予遍搜不可得。遂以實告之鄰邑。以他木寄生。途上服之。逾月而死。可不慎哉。

之。苦氣厚意濃。自然生出也。何嘗節間可容他的惜哉。近海州邑及海外之境。其三三尺。其葉圓而微尖。採持

俗而柔。面光澤。以雜樹上者。充之氣性不同。恐反有害也。按鄭樵通志云。寄生有兩種。自采或連桑。采者乃石榴葉。一

積小者葉如麻黃葉其子皆相似大者曰葛小者曰女蘿今觀蜀本韓氏所說亦是兩種與鄭說同

【脩治】一斲曰一采得鋼刀和根枝莖葉細剉陰乾用勿見火

【氣味】苦平無毒【別錄曰】甘無毒

【主治】腰痛小兒背強癰腫充肌膚堅髮齒長鬚眉安胎本經去女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁

主金瘡去癩別錄助筋骨益血脈大明主懷妊漏血不止令胎牢固甄權

實【氣味】甘平無毒

【主治】明目輕身通神本經

【附方】新四膈氣生桑寄生搗汁一胎動腹痛桑寄生一兩半阿膠炒半兩艾葉半兩水一徵小並無寒熱宜以桑寄生二兩防風大芎二錢半炙甘草三下血後虛下血止後但覺少力桑寄生為末每服一錢非時白湯楊子建護命方

點服楊子建護命方

松蘿本經中品

松蘿

【釋名】女蘿別錄松上寄生時珍曰

【集解】上者為真詩云葛與女蘿施于松上為是寄生以桑上者為真不用松上者互有異同爾一時

珍曰按毛萇詩注云女蘿菟絲也吳晉本草菟絲一名松蘿陶弘景謂為是桑上寄生松蘿是松上寄生陸佃埤雅言葛是松柏上寄生女蘿是松上浮蔓又言在木為女蘿在草為菟絲鄭樵通志言寄

生有二種。大曰鳥小曰女蘿。陸機詩疏言兔絲蔓生草上。黃赤如金。非松蘿也。松蘿蔓延松上。生枝正青。與兔絲殊異。羅願爾雅翼云。女蘿色青而細長。無雜蔓。故離騷云。被薜荔兮帶女蘿。謂青長如帶也。兔絲黃赤。不相類。然二者附物而生。有時相結。故古樂府云。南山崔嵬。兔絲花比。陵青女蘿樹。由來花葉同一心。今日枝條分兩處。唐樂府云。兔絲故無情。隨風任顛倒。誰使女蘿枝。而來強繫抱。兩草纏蔓。當以二陸羅氏之說爲的。其曰兔絲者。誤矣。

【氣味】苦甘平無毒。

【主治】噴怒邪氣。止虛汗頭風。女子陰寒腫痛。本經療痰熱溫瘧。可爲吐湯。利水道。別錄治寒熱。胸中客熱。

痰涎去頭瘡頂上瘤癭令人得眠。

【發明】胸中有痰頭痛不欲食氣壯者用松蘿杜衡三兩瓜蒂三十枚酒一升二合漬再宿旦飲一合。取吐不吐晚再服一合。孫思邈千金方治胸膈痰癖積熱斷腸湯用松蘿甘草各一兩。恆山三兩瓜蒂二十一枚水酒各一升半。煮取一升分三服取吐。

楓柳唐本草

【集解】恭曰。楓柳出原州。葉似槐。莖赤根黃。子六月熟。綠色而細。剝取莖皮用。時珍曰。蘇恭言楓柳有毒。出原州。陳藏器駁之。以爲楓柳皮。即今楓樹皮。性濇能止水痢。按斗門方言。即今楓樹上寄生其葉亦可制粉霜。此說是也。若是楓樹則處甚多。何必專出原州耶。陳說誤矣。楓皮見前。楓香脂下。

皮【氣味】辛大熱有毒。

【主治】風齩齒痛。唐積年痛風不可忍。久治無效者。細剝焙。不限多少。入腦麝浸酒常服。以醉爲度。斗方。

桃寄生綱目

【氣味】苦辛無毒。

【主治】小兒中蠱毒。腹內堅痛。面目青黃。淋露骨立。取二兩爲末。如茶點服。日四五服。時珍○

柳寄生綱目

【集解】時珍曰此卽寄生之生柳上者。

【氣味】苦平無毒。

【主治】膈氣刺痛。搗汁服一盃。時珍

古斯別錄下品

【釋名】炭皮。別錄良無極。綱目。時珍曰古斯。范注方謂之良無極。劉涓子。鬼遺。

【集解】肉今人皆以胡桃皮爲之。非是真也。按桐君采藥錄云。生上洛。是木皮。狀如厚朴。色似桂白。其

理一縱一橫。今市人皆削乃似厚朴。而無正縱橫理。不知此復是何物。莫測真假也。

【氣味】苦溫無毒。權曰辛平無毒。葉黃爲之使。

【主治】邪氣濕痺。寒熱疽瘡。除水堅積血癥。月閉無子。小兒蹙不能行。諸惡瘡癰腫。止腹痛。令女人有

子錄。主脾熱。洗手足水爛傷。甄權。解狼毒毒器。

【附方】新木占斯散。治發背腸癰疽痔婦人乳腫諸瘰癧無有不瘳服之腫去痛止膿消已潰者便酒服方寸匕晝七夜四以多為善此藥入咽當覺流入瘡中令化為水也癰疽疔灸不發敗壞者尤可服之內臈在上者當吐膿血在下者當下膿血其瘡未壞及長服者去敗醫一方加桂心劉涓子鬼遺方。

石刺木拾

【集解】江西北人呼為石刺木乃木上寄生也生南方林篁間其樹根皮【氣味】苦平無毒。

【主治】破血產後餘血結瘕煮汁服神驗不可言器。

木之五苞木類四種

竹本經中品

【釋名】竹時珍曰竹字象形許慎說文云竹冬生草也故字從倒草戴凱之【集解】竹並以箭為佳子藥無用箭頭曰竹次用處有之其類甚多而入藥惟用箠竹淡竹苦竹種人多不能盡別按竹譜箠竹堅而促節圓而實勁皮白如霜大者宜刺細者可為笛苦竹有紫甘竹似篋而茂即淡竹也然今之刺船者多用桂竹作笛自有一種亦不苦味俗呼甜竹亦有今南江西閩中本極粗大竹一味肉薄節間有粉者一竹惟闊河之南甚多故曰九河鮮有五嶺實繁天坻皆土中苞箭各以時而出旬日落籜而成竹也莖有節死節有節油節有葉必兩之根下之枝一為雄二為雌雌者生箭其根鞭喜行東南而宜死節長阜刺油麻以五月十三

三日為辟日。六十年一花。花結實。其竹則枯。竹枯曰筍。竹實曰籩。小曰箨。大曰箨。其中皆虛。而有實心。竹出漢廣。其外皆圓。而有一花。竹出川蜀。其節或暴或無。或促或疎。暴節曰筍。節出蜀中。高節曰筍。節出南廣。其幹或長或短。或巨或細。交廣由吾。竹長三四丈。其肉薄。可作屋柱。管竹大至數圍。其肉厚。可為梁棟。亦昌。漢竹可為桶斛。籩竹可為舟船。嚴州越王竹。高止尺餘。長州龍絲竹。細如繩。或滑或澹。澹者其葉或細。或大。鳳尾竹。葉細三分。龍公竹。葉若芭蕉。百葉竹。有戈刀箭矢。謂之矛竹。箭竹。筋竹。石麻。柔者可為繩索。謂之篋竹。弓竹。苦竹。把髮。其色有青有黃。有白有赤。有烏有紫。有斑斑者。駁文。點染。紫者。色黝然。烏者。黑而害母。赤者。厚而直。白者。薄而曲。黃者。如金。青者。如玉。其別種有棘竹。一名勞竹。芒棘森然。大者圍二尺。可禦盜賊。樓竹。一名實竹。其葉似樓。可為拄杖。慈竹。一名義竹。叢生不散。人栽為玩。廣人以筍竹絲為竹布。甚肥。

箎竹葉【氣味】苦平無毒。【別錄曰】大寒。

【主治】欬逆上氣。溢筋急惡瘍。殺小蟲。本經除煩熱風瘧。喉痺嘔吐。別錄煎湯熨霍亂轉筋。珍。

淡竹葉【氣味】辛平大寒無毒。【權曰】甘寒。

【主治】胸中痰熱。欬逆上氣。別錄吐血熱毒風。止消渴。壓丹石毒。甄權消痰治熱狂煩悶。中風失音不語。壯

熱頭痛頭風。止驚悸。溫疫迷悶。妊婦頭旋倒地。小兒驚搐。天吊。大明喉痺。鬼疰惡氣煩熱。殺小蟲。孟詵涼心

經。益元氣。除熱緩脾。元煎濃汁。漱齒中出血。洗脫肛不收。珍。

苦竹葉【氣味】苦冷無毒。

【主治】口瘡目痛。明目利九竅。別錄治不睡。止消渴。解酒毒。除煩熱發汗。療中風瘡癰。明殺蟲。燒末和豬

膽塗小兒頭瘡耳瘡疥癬和雞子白塗一切惡瘡頻用取效時珍

【發明】竹次之（弘景曰）甘竹葉最勝（詵曰）竹葉蘊苦淡甘之外餘皆不堪入藥不宜人淡竹爲上甘竹葉苦平陰中微陽（杲曰）諸竹筍性皆寒故知其葉一致也張仲景竹葉湯惟用淡竹（元素曰）除也其用有二除新久風邪之煩熱止喘促氣勝之上衝中

【附方】新上氣發熱三兩水一斗煮五升細服三日一劑肘後方時行發黃竹葉五升切小麥七升取七升細服盡劑愈肘後方

【附方】新上氣發熱三兩水一斗煮五升細服三日一劑肘後方時行發黃竹葉五升切小麥七升取七升細服盡劑愈肘後方