

广西中药志

第二辑

广西僮族自治区卫生厅编著





数据加载失败，请稍后重试！

样 本 库

广西中草药

第 二 辑

广西僮族自治区卫生厅编著



广西僮族自治区人民出版社

一九六三年·南宁

54689

广西中药誌

第二辑

广西僮族自治区卫生厅編著

*

广西僮族自治区人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西僮族自治区書刊出版业營業許可証第一号

广西僮族自治区新华書店发行

广西僮族自治区民族印刷厂印刷

*

开本787×1092毫米 $\frac{1}{16}$ • 印张27 $\frac{3}{4}$ • 342千字 • 插图185幅 • 插頁5

1963年3月第一版

1963年3月第一次印刷

印数: 1—2,000册

前 言

本輯共收載我区出产的野生和栽培的藥材一百八十六种（按品种計算則为一百九十六种），其中植物藥一百六十五种，动物藥十种，矿物藥十一种。收入本輯的藥物标本，絕大部分收藏在区藥物研究所的标本室或栽培在标本园内。

本輯各种藥材內容的介紹，比第一輯增加了規格、包裝貯藏、炮制、归經、附方等項。同一藥名有两个以上原植物者，則分別介紹，并附檢索表，以便鑑別。全輯附墨綫图一百七十五幅，彩色图八幅，矿物照片图十幅。其他关于藥物名称、度量名詞等，仍与第一輯相同。

本輯收載的植物藥的学名承广西植物研究所陈立卿先生和华南植物研究所陈少卿先生分別鑑定；部分蕨类植物承秦仁昌先生鑑定；部分夹竹桃科与蘿藦科植物承蔣英先生鑑定。植物藥与动物藥初稿承陈立卿先生与广西师范学院生物系分別审查。此外，区内各地有关单位为本輯的編写工作提供了不少宝贵的資料，并抽調了有經驗的中草藥医师和中藥老师傅参加編写工作。我們仅在此向对本輯編写工作热情支持的单位和同志致以深切的謝意。

由于我們的水平有限，經驗不足，錯誤遺漏之处，希望讀者多加指正。

广西僮族自治区卫生厅

1961年3月

本 輯 編 寫 人 員

陳世文	方鼎	黃永增	周子靜
何汝勳	鄭啟明	程志立	鄭學忠
鍾驥才	溫業棠	曾媛基	黎漢明

本 輯 繪 圖 人 員

黃增任 盧啟鵬 林振群

目 录

一、根 类

天 冬	Asparagus lucidus Lindl.	(11)
小 薊	Cirsium chinense Gardn. et Champ.	(14)
草 烏	Aconitum chinensis Paxt.	(17)
防 风	Ledebouriella seseloides (Hoffm.) Wolff	(20)
坚 龙 胆	Gentiana rigescens Fr.	(23)
苧 麻 根	Boehmeria nivea (L.) Gaud.	(26)
威 灵 仙	Clematis chinensis Osbeck	(28)
穿 破 石	Cudrania tricuspidata (Carr.) Bur.	(30)
黄 藤	Fibraurea tinctoria Lour.	(32)
榕 树 须	Ficus retusa L.	(34)
萱 草 根	Hemerocallis fulva L.	(36)
商 陆	Phytolacca acinosa Roxb.	(38)
虎 杖	Polygonum cuspidatum S. et Z.	(40)
地 榆	Sanguisorba officinalis L.	(42)
玄 参	Scrophularia ningpoensis Hemsl.	(44)
黑 藜 芦	Veratrum nigrum L. var. japonicum Baker	(46)
續 断	Dipsacus asper Wall. Dipsacus japonicus Miq.	(48)
磨 盘 根	Abutilon indicum (L.) G. Don	(52)
紅 辣 树	Alstonia yunnanensis Diels	(54)
小 郎 伞	Ardisia crenata Sims	(56)
硃 砂 蓮	Aristolochia kaempferi Willd.	(58)
假 大 薯	Aristolochia tagala Champ.	(60)
花 叶 細 辛	Asarum geophilum Hemsl.	(62)
状 元 紅	Clerodendron kaempferi (Jacq.) Sieb.	(64)

深山黃堇	<i>Corydalis pallida</i> Pers.	(66)
紅背酸藤	<i>Ecdysanthera rosea</i> Hook. et Arn.	(68)
三叶珍珠草	<i>Lysimachia insignis</i> Hemsl.	(70)
虾須豆	<i>Fordia cauliflora</i> Hemsl.	(72)
小牛力	<i>Millettia pulchra</i> Kurz var. <i>typica</i> f. <i>laxior</i> Dunn	(74)
紫茉莉	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	(76)
千斤拔	<i>Moghania prostrata</i> (Roxb.) Wang et Tang	(78)
馬甲子	<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	(80)
箭頭風	<i>Patrinia heterophylla</i> Bunge	(82)
毛排錢草	<i>Phyllodium elegans</i> Desv.	(84)
血絲羅傘	<i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir.	(86)
猫爪草	<i>Ranunculus ternatus</i> Thunb.	(88)
古羊藤	<i>Streptocaulon griffithii</i> Hook. f.	(90)
通骨消	<i>Thunbergia grandiflora</i> (Rottl. et Willd.) Roxb.	(92)
三十六蕩	<i>Tylophora ovata</i> (Lindl.) Hook.	(94)
猫尾射	<i>Uraria crinita</i> Desv.	(96)
走馬胎	<i>Ardisia gigantifolia</i> Stapf	(98)

二、根 莖 類

白 朮	<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.	(103)
黃 藥 子	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	(106)
大 叶 仙 茅	<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) O. Ktze.	(108)
山 菅 兰	<i>Dianella ensifolia</i> (L.) DC.	(110)
馬 蹄 香	<i>Valeriana jatamansi</i> Jones	(112)
八 角 蓮	<i>Dysosma pleiantha</i> Woods.	(114)
泽 泻	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L. var. <i>parviflorum</i> Torr.	(116)

三、皮 類

鴨 脚 木 皮	<i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms	(120)
木 槿 皮	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	(122)
肉 桂	<i>Cinnamomum cassia</i> (Nees) Nees & Eberm. ex Bl.	(124)

四、莖木类

山 川 柳	<i>Tamarix chinensis</i> Lour.	(132)
席氏十大功劳	<i>Mahonia shenii</i> Chun.....	(134)
十 大 功 劳	<i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde	(136)
四 方 藤	<i>Cissus pteroclada</i> Hayata	(138)
沉 香	<i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg.	(140)
苏 木	<i>Caesalpinia sappan</i> L.	(144)

五、叶 类

古 柯 叶	<i>Erythroxylon coca</i> Lam.	(150)
枇 杷 叶	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	(152)
日 本 烏 蕨	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	(154)
烏 韭 蕨	<i>Stenoloma chusana</i> (L.) Ching.....	(156)
芙 蓉 叶	<i>Hibiscus mutabilis</i> L.	(158)
布 渣 叶	<i>Microcos paniculata</i> L.	(160)
龙 脷 叶	<i>Sauropus rostratus</i> Miq.	(162)
罗 裙 带	<i>Crinum asiaticum</i> L. var. <i>sinicum</i> Baker	(164)
大 駁 骨	<i>Adhatoda vasica</i> Nees	(166)
榧 花 叶	<i>Loropetalum chinense</i> Oliv.	(168)
小 蜡 树	<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	(170)
黄 花 母	<i>Sida rhombifolia</i> L.	(172)
亨氏地黄连	<i>Munronia henryi</i> Harms	(174)
算 盘 子 叶	<i>Glochidion puberum</i> (L.) Hutch.	(176)

六、花 类

旋 复 花	<i>Inula britannica</i> L.	
	<i>Anisopappus chinensis</i> (L.) Hook. et Arn.	(180)
鸡 蛋 花	<i>Plumeria rubra</i> L. var. <i>acutifolia</i> (Poir.) Bailey	(184)
蒙 花 珠	<i>Edgeworthia chrysantha</i> Lindl.	(186)

鸡冠花	<i>Celosia cristata</i> L.	(188)
千日紅	<i>Gomphrena globosa</i> L.	(190)

七、果 实 类

罗汉果	<i>Momordica grosvenori</i> Swingle	(195)
橘	<i>Citrus grandis</i> Osbeck var. <i>tomentosa</i> Hort. <i>Citrus grandis</i> Osbeck	(200)
佛手	<i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylus</i> Swingle	(207)
石蓮子	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.	(210)
胡椒	<i>Piper nigrum</i> L.	(216)
沙梨干	<i>Pyrus pyrifolia</i> Nakai var. <i>culta</i> Nakai	(218)
大枣	<i>Zizyphus jujuba</i> Mill.	(220)
絲瓜	<i>Luffa acutangula</i> Roxb. <i>Luffa cylindrica</i> Roem.	(222)
青果	<i>Canarium album</i> Raeusch.	(226)
金瓜	<i>Cucurbita pepo</i> L. var. <i>kintoga</i> Makino	(228)
苦瓜干	<i>Momordica charantia</i> L.	(230)
豆稔干	<i>Rhodomyrtus tomentosa</i> (Ait.) Hassk.	(232)
楮实	<i>Broussonetia papyrifera</i> Vent.	(234)
路路通	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	(236)

八、种 子 类

牵牛子	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	(241)
青葙子	<i>Celosia argentea</i> L.	(244)
白果	<i>Ginkgo biloba</i> L.	(246)
韭菜子	<i>Allium tuberosum</i> Rottler	(248)
葱子	<i>Allium fistulosum</i> L.	(250)
梧桐子	<i>Firmiana simplex</i> (L.) Wight	(252)
黑芝麻	<i>Sesamum orientale</i> L.	(254)
白扁豆	<i>Dolichos lablab</i> L.	(256)
赤小豆	<i>Phaseolus calcaratus</i> Roxb.	(258)

刀 豆	<i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.	(260)
相思子	<i>Abrus precatorius</i> L.	(262)
春 砂 仁	<i>Amomum villosum</i> Lour.	(264)
胡 桃 仁	<i>Juglans regia</i> L.	(267)
木 鼈 子	<i>Momordica cochinchinensis</i> Spreng.	(270)

九、全 草 类

白花蛇舌草	<i>Oldenlandia diffusa</i> (Willd.) Roxb. <i>Oldenlandia corymbosa</i> L. <i>Oldenlandia tenelliflora</i> (Bl.) O. Ktze.	(275)
松 叶 耳 草	<i>Oldenlandia pinifolia</i> (Wall.) K. Schum.	(280)
香 薷	<i>Mosla fordii</i> Maxim.	(282)
藿 香	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Mey.) O. Ktze.	(284)
石 薺	<i>Orthodon lanceolatum</i> (Benth.) Kudo	(286)
篇 蓄	<i>Polygonum aviculare</i> L.	(288)
馬 鞭 草	<i>Verbena officinalis</i> L.	(290)
独 脚 疳	<i>Striga asiatica</i> (L.) O. Ktze.	(292)
罗 勒	<i>Ocimum bacilicum</i> L.	(294)
馬 齿 莧	<i>Portulaca oleracea</i> L.	(296)
六 耳 稜	<i>Laggera alata</i> Sch.-Bip.	(298)
狗 肝 菜	<i>Dicliptera chinensis</i> (Vahl) Nees	(300)
剪 刀 股	<i>Lactuca debilis</i> Maxim.	(302)
九 节 风	<i>Chloranthus glaber</i> (Thunb.) Makino	(304)
凤 尾 草	<i>Pteris multifida</i> Poir.	(306)
田 基 黄	<i>Hypericum japonicum</i> Thunb.	(308)
小 金 香 爐	<i>Osbeckia chinensis</i> L.	(310)
小叶蛇总管	<i>Plectranthus amethystoides</i> Benth.	(312)
蛇 头 王	<i>Solidago virgo-aurea</i> L.	(314)
神仙眼鏡草	<i>Gnaphalium japonicum</i> Thunb.	(316)
茅 莓	<i>Rubus parvifolius</i> L.	(318)
牡 蒿	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	(320)
佛 甲 草	<i>Sedum lineare</i> Thunb.	(322)

石 油 菜	<i>Pilea cavaleriei</i> Levl.	(324)
铁 扫 帚	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.-Cours.) G. Don	(326)
下 草	<i>Ajuga genevensis</i> L.	(328)
白 花 丹	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	(330)
芸 香	<i>Ruta graveolens</i> L.	(332)
葫 芦 茶	<i>Desmodium triquetrum</i> (L.) DC.	(334)
花 边 灯 蓼	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	(336)
落 葵	<i>Basella rubra</i> L.	(338)
九 里 香	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack	(340)
金 挖 耳	<i>Dichondra repens</i> Forst.	(342)
巴 岩 香	<i>Pothos chinensis</i> (Raf.) Merr.	(344)
火 炭 母	<i>Polygonum chinense</i> L.	(346)
人 字 草	<i>Polygonum virginianum</i> L.	(348)
石 莽 草	<i>Polygonum capitatum</i> D. Don	(350)
竹 节 蓼	<i>Homalocladium platycladum</i> (F. Muell.) Bailey	(352)
飞 揚 草	<i>Euphorbia hirta</i> L. var. <i>typica</i> L. C. Wheeler	(354)
五 色 梅	<i>Lantana camara</i> L.	(356)
双 飞 蝴蝶	<i>Lourea vespertilionis</i> (L.) Desv.	(358)
烏 蘇 莓	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	(360)
紫 鴨 跖 草	<i>Tradescantia virginiana</i> L.	(362)
含 羞 草	<i>Mimosa pudica</i> L.	(364)
上 树 咳	<i>Lepidogrammitis subrostrata</i> (C. Chr.) Ching	(366)
吊 灯 籠	<i>Pittosporum kobuskianum</i> Gowda	(368)
細 穗 爵 床	<i>Justicia leptostachya</i> Hemsl.	(370)
石 仙 桃	<i>Pholidota chinensis</i> Ldl.	(372)
三 叉 苦	<i>Evodia lepta</i> (Spreng.) Merr.	(374)
大 飞 揚	<i>Bauhinia faberi</i> Oliver	(376)
铁 海 棠	<i>Euphorbia milii</i> Ch. des Moulins	(378)
走 馬 风	<i>Sambucus javanica</i> Reinw.	(380)
山 墨 菜	<i>Lactuca indica</i> L.	(382)
珍 珠 草	<i>Phyllanthus simplex</i> Retz.	(384)
水 仙 桃	<i>Jussiaea suffruticosa</i> L.	
	<i>Jussiaea linifolia</i> Vahl	(386)

薄	荷	<i>Mentha arvensis</i> L.	(389)
馬	利	<i>Asclepias curassavica</i> L.	(392)
山	芝	<i>Helicteres angustifolia</i> L.	(394)
浮	萍	<i>Lemna polyrrhiza</i> L.	
		<i>Lemna minor</i> L....	(397)
		<i>Pistia stratiotes</i> L.....	(398)
鷄	骨	<i>Abrus cantoniensis</i> Hance	(401)

十、花 粉 类

蒲	黃	<i>Typha angustifolia</i> L.	(406)
---	---	-----------------------------------	---------

十一、动 物 类

白	花	蛇	<i>Elaphe moellendorffi</i> (Boettger)	(411)
吹	風	蛇	<i>Naja naja atra</i> (Cantor)	(413)
黃	梢	蛇	<i>Ptyas korros</i> (Schlegel)	(415)
金	環	蛇	<i>Bungarus fasciatus</i> (Schneider)	(416)
水		蛭	<i>Whitmania pigra</i> (Whitman)	(417)
馬	鬚	蛇	<i>Japarula polygonata</i> (Hallowell)	(418)
虻		虫	<i>Tabanus mandarinus</i> (Schiner)	
			<i>Tabanus sapporoensis</i> (Shnaki)	(420)
小	毛	鷄	<i>Centropus bengalensis lignator</i> Swinhoe	(422)
竹		蜂	<i>Xylocopa dissimilis</i> (Lep.)	(424)
紅	娘	子	<i>Huechys sanguines</i> (De Geer)	(426)

十二、矿 物 类

自	然	銅	<i>Pyritum</i>	(430)
硃		砂	<i>Cinnabaris</i>	(431)
石		膏	<i>Gypsum Fibrosum</i>	(432)
寒	水	石	<i>Calcitum</i>	(433)
滑		石	<i>Talcum</i>	(434)

赤	石	脂	Bolus Rubra		(435)
硫		磺	Sulfur		(436)
密	陀	僧	Lithargyrum		(437)
云	母	石	Muscovitum		(438)
雄		黄	Realgar		(439)
雌		黄	Auripigmentum		(440)
中文名索引					(443)
学 名 索 引					(449)

根 类

天 冬

别名：明天冬、十姐妹、多仔婆。

来源：本品系百合科(Liliaceae)植物天门冬 *Asparagus lucidus* Lindl. 除去皮部的干燥块根。

产地：全区各地，以隆林、田林、德保、百色、田阳、靖西、巴马、武鸣、宁明、崇左等县为主要产地。

植物形态：多年生蔓草，有肉质块根，通常十余个簇生于短的根茎上，呈纺锤形，两端细长。茎披散或攀援，长1—2米，多分枝，下部常木质化，小枝具纵棱。叶退化而细小，互生，呈鳞片状；叶状枝三枚，簇生于叶腋，长1—2.5厘米，中央的一枚较两侧的为长，略弯曲，近镰刀状，线形，具三稜，深绿色，有光泽。花一至三朵生于叶状枝腋，花柄长约6毫米，有关节，具数条纵棱，稜上具短细毛；花被六枚，二轮排列，淡绿色，长椭圆形，内凹，边缘膜质，外轮花被于开放时张开；雄蕊六枚，着生于花被基部，花丝压扁，花药黄色；雌蕊一枚，子房上位，三室，柱头三裂。浆果球形，成熟时红色。花期三至四月。果期五至六月。

本植物生于溪边、山坡、林下、灌木丛中。

采制：多于立秋前后采挖。加工得宜与否，对品质优劣有着决定作用。加工方法如下：

一、熟晒：将挖回的鲜天冬除去须根，洗净泥土，分开大小，放进锅内加水（水量以浸过天冬为度）煮熟，大条的煮约三小时，小条的煮二小时，然后用硬薄竹片逐条把外部的皮剥下，随取随剥，乘热进行，冷则皮复紧困难剥。剥后投入冷水中，洗去胶质，泡浸片刻，至表面浮现白衣（里皮），便即进行第二次剥皮，否则干后进行返工，要影响品质。将剥去皮的天冬洗净，摊在蓆片上，晒去表面水分，用硫磺熏足一昼夜（遇天雨继续再熏），翌日取出晒干，晒时注意逐条翻匀，晒至数条握聚粘结成团，放手散开便成。这样加工方法，是本区过去一般所习用，不但成品颜色鲜艳，质量也很好。

二、生晒：把挖回的鲜天冬除去须根，洗净，分别大小，加清水浸至外皮分开，用硬薄竹片将外皮里皮一次剥下，再用硫磺熏到通体软熟透心，摊晒阳光下，晒到半干时再熏，如是反复熏晒到柔熟，握聚成团，放手散开即成。这样加工较简单方便，成品质量也好，颜色透明嫩白，但未普遍推行。

规格：以肥壮、大条、心小、油润、半透明、质坚脆、黄白色者为佳。条小、心大、淡黄色、黄色或深黄色、棕红色者为次。含水量一般不超过6—8%。