

广西药材

广西僮族自治区商业厅医药处編
广西僮族自治区人民出版社

前言

广西是全国中药材主要产地之一，历来就以“川广云贵”地道药材著称。产品种类十分丰富，据初步调查统计，包括民间用药在内，约有一千五百余种；在中医处方四百多个常用品种中，广西出产的就占半数以上。广西药材不但在品种数量上是多种多样，并且具有许多名贵特产，其中尤以六陈玉桂，龙州蛤蚧，西江左力（茶辣），靖西田七，大瑶山天花粉、苍香草，桂林罗汉果、勾藤，百色砂仁，玉林草薹，以及分布各地的小环草、青天葵、山姜子，巴戟……等等，均为广西特有的名贵产品。解放后，新登中药舞台的广西良花、麝香、琥珀、山药、沉香等，在产量上已跃居全国首要地位。

由于广西气候温和，四季皆春，以及地理环境等天然优越条件，药材蕴藏量十分丰富，历年运销国内外的药材，约在四十万担左右。近来还发现了大量可以提制“寿比南”，用作治疗高血压的贵重药品原料——鱼胆木。还有不少北药，如生地、红花、牛子等，在广西不但可以种植，并且生长更好。这说明广西药材的潜力很大，在发展外地药材上，同样具有极优越的条件。可惜过去在认真挖掘药材潜力，引种试种，提高规格，以及加工整理方面，注意不够，很多深山中的药源没有挖掘，收购上收错收假，时有发现，以及加工上的疏忽和不注意规格质量等，使广西药材减色不少。

解放以来，在党的正确领导下，广西药材在品种数量上，都有了很大的发展。但在收购以及药材的加工保管和质量规格等技术指导工作上，却远远落在形势发展的后面。我们在1957—1958年，曾针对这一情况，举办了四期药材训练班，借以培养一批与业务发展相适应的药材收购干部。但由于缺乏资料和经验，我们仅根据过去的一些零星资料和某些同志们的切身体会编写了“广西药材讲义”一书，作为当时训练班的教学参考。现在经过四期学员的研究讨

論，結合他們的工作經驗，並進一步參考了其他有關資料，重新加以整理，編寫成了這本“廣西藥材”。本書插圖，除部分自行描繪外，其餘系採自“中國植物圖鑑”及“廣西藥用植物栽培法”的圖樣，特此說明。

由於藥材品種繁多，技術性大，特別是在性能方面，各種藥材有着反正的作用，而我們的經驗又少，理論水平不高，因而在內容方面，不可能完全滿足讀者的要求。希望大家多多提供意見，以便今後逐步加以補充修改。

廣西僑族自治區商業廳醫藥處

1959年12月15日

目 录

植 物 类

茶 辣	(1)
罗汉果	(2)
田 七	(5)
山 药	(7)
鸡爪黄连	(10)
黄柏皮	(14)
佛 手	(15)
香橼片	(16)
沉 香	(17)
砂 仁(附:春砂仁)	(19)
草 蔻	(21)
草 果	(22)
桂白蔻	(23)
山姜子	(24)
木 瓜	(25)
麦門冬	(26)
枳实与枳壳	(27)
牛蒡子	(28)
红条紫草	(29)
小环草	(30)
水 兰	(32)
铁皮兰	(33)
鸡爪兰	(36)
铜皮兰	(37)

黄 草	(38)
馬鞭草	(39)
有瓜石斛	(40)
扁釵石斛	(41)
桂 皮	(42)
企边桂	(44)
桂 籽	(45)
桂 板	(46)
桂 通	(47)
桂 枝(附:桂碎)	(48)
金銀花	(49)
山梔子(附:水梔子)	(50)
使君子	(51)
艾 粉	(52)
馬板椰	(53)
勾 藤	(54)
馬 勃	(56)
通 草	(57)
粉葛根(附:葛花)	(59)
天花粉(附:蔓仁、蔓壳)	(60)
魚胆木	(62)
烏 梅	(63)
鴉胆子	(64)
青天葵(附:紫背天葵)	(66)
陈 皮(附:桔絡、柑核)	(68)
巴 戟	(69)

黑 草.....	(70)	淡竹叶.....	(109)
山刁竹.....	(71)	紫花地丁.....	(110)
千层纸.....	(73)	蔓陀罗花.....	(111)
山 奈.....	(74)	走馬胎.....	(112)
雷 丸.....	(75)	茜 根.....	(113)
黄 精.....	(76)	正茯苓.....	(114)
天門冬.....	(78)	苍香草.....	(116)
玉 竹.....	(80)	杜 仲.....	(117)
干 姜.....	(81)	厚 朴.....	(118)
相思豆.....	(82)	苦瓜子.....	(120)
土茵陈.....	(83)	枇杷叶.....	(121)
白茅根.....	(84)	狗脊片.....	(122)
甘菊花.....	(85)	薤 白.....	(123)
前 胡.....	(86)	葶 苈 (附: 芦根).....	(124)
巴 豆.....	(87)	車前草 (附: 車前子).....	(125)
菝 葜.....	(88)	小蓟姜 (附: 大蓟姜).....	(126)
桂玉金.....	(89)	石榴皮.....	(127)
山豆根.....	(90)	威灵仙.....	(128)
白芥子.....	(91)	枝花头.....	(129)
皂 角 (附: 皂刺片、皂角子).....	(92)	草决明.....	(130)
柯 子.....	(94)	柿 蒂.....	(131)
防 杞.....	(94)	絲瓜絡.....	(132)
旋复花.....	(96)	川楝子.....	(133)
薄 荷.....	(97)	桑寄生.....	(134)
木别子.....	(93)	桃 仁.....	(135)
桔 紅.....	(100)	蛇床子.....	(136)
谷精珠.....	(101)	半 夏.....	(137)
桔 梗.....	(102)	女贞子.....	(138)
柴 胡 (附: 草胡).....	(103)	天竹黄.....	(139)
龙胆草.....	(105)	白 前.....	(140)
淫羊藿.....	(106)	独 活.....	(141)
槐 花 (附: 槐角).....	(107)	韭菜子.....	(142)
夏枯球.....	(108)	竹 茹.....	(143)

蓮藕(附:蓮子,蓮谷, 藕節,蓮芯須,荷 葉,蓮梗,蓮葉蒂, 蓮房,生藕).....	(143)
蔓荊子.....	(145)
小茴香.....	(146)
首烏.....	(147)
紫蘇葉(附:紫蘇梗、紫 蘇子).....	(149)
三稜.....	(150)
天南星.....	(151)
蒙花.....	(153)
蕪本.....	(154)
石蓮子.....	(155)
烏藥.....	(156)
香薷.....	(157)
金古攪.....	(158)
姜黃.....	(159)
荔枝核.....	(160)
澤蘭.....	(161)
草烏.....	(162)
地楓皮.....	(163)
骨碎補.....	(164)
千年見.....	(165)
篇蓄(附:射干).....	(165)
白及.....	(167)
益母草(附:茺蔚子).....	(168)
香附.....	(169)
苦參.....	(170)
石薺.....	(171)
地榆.....	(172)
木棉花朵.....	(173)
百部.....	(174)

獨腳柑.....	(175)
五加皮.....	(176)
紅水葵.....	(177)
紅花.....	(178)
生地.....	(179)
石耳.....	(180)
銀耳.....	(181)
馬尾伸筋草.....	(182)

动物类

蛤蚧干.....	(183)
白花蛇干(附:盤蛇).....	(185)
麝香.....	(183)
穿山甲(附:山甲張).....	(190)
虎骨(附:豹骨).....	(192)
牛黃.....	(194)
熊胆.....	(196)
蜂糖(附:蜂蜡).....	(197)
水獺肝.....	(199)
紅娘子.....	(200)
狗鞭.....	(201)
斑毛虫.....	(202)
露蜂房.....	(203)
地龍干.....	(204)
桑螵蛸.....	(205)
鷄內金.....	(203)
牛黃.....	(207)
蟬蛻.....	(208)
龍衣.....	(209)
水蛭.....	(210)
龜板(附:龜板膠).....	(211)
鱉甲.....	(212)
紅毛鷄.....	(213)

竹 蜂..... (214)

矿物类

琥 珀..... (215)

伊 甘 石..... (217)

硃 砂..... (218)

龙 牙 (附: 龙骨)..... (219)

滴乳石 (附: 鍾乳石)..... (220)

茶 辣

类 别 及 形 态

茶辣属芸香科，为落叶亚乔木，高六、七尺至丈余。树干直立坚实，枝展开作十字形，树皮色暗褐。叶对生，奇数羽状复叶，小叶作椭圆形，前端尖，末端圆，全缘、叶网状脉；叶柄嫩枝，俱密生软毛。五、六月间，叶腋开黄绿色小花，呈短圆锥状花序。果实为小蒴果，青黄色，干则变黑绿色，外皮厚似革，作五稜，内分五房，每房藏种子一粒，味辛烈，香气较浓。茶辣树的果实（又叫左力、吴茱萸、吴萸、米辣）可供药用。



性 能 及 产 销 情 况

性质辛温，有小毒。效能温肝、降逆、开怯、化滞、收敛，用于产后血病，腹部胀满，感冒，或作发汗，驱风，镇痛杀虫药，对治毒蛇咬伤，尤有特效。茶辣通称吴茱萸，江苏、浙江、湖南、四川等省皆有出产，但多生于吴地，故又名“吴萸”。从品质上来看，以广西左江出产的为最好，故有“左力”之称，但广西右江出产的也很好（日本出产的茶辣，因气味太薄，不能入药）。广西主要产地为田林、凌云、都安、马山等县，全区各县也有少量出产。历年产量为六百担，数年来各地农民已进行大量繁殖，截至一九五七年底止，估计种植面积达一万亩以上，再过四、五年后，产量将增加四至六千担。每年九月为产期，本品药用很广，并可作香料的原料，国内外畅销，应积极扩大生产，以

供应国内外需要。

鑑 別 方 法

茶辣分大小花两种，大的多銷售广州、香港；小的行銷国内各地。品質的优劣与是否及时采摘有关，如长得过熟，其果实开裂，壳硬有子，会降低药用效能。其余带紫紅色的，也是留得过熟；品質較差。与茶辣类似的品种，名叫“鬼門椒”，其果实为五稜或六稜，色青黃，很象生茶辣，但一經日晒，果实即行开裂，中有黑子且苦悶无香辣味，收購时，須特別注意。

品 质 規 格

一級：大顆，干爽，墨綠色，成熟，无枝梗，无焦黑，无霉白。

二級：小顆，干爽，墨綠色，成熟，无枝梗，无焦黑，无霉白。

加 工 保 管

將成熟的茶辣采集，連枝梗置阳光下晒至足干，再用手搓去枝梗，便成干净茶辣，放干燥地方，以免发霉。付运时，需用麻包庄載，以減少損耗。

罗 汉 果

类 别 及 形 态

葫蘆科，为多年蔓生草本。雌雄異株，冬季地上部枯死，以地下块茎过冬，次年由块茎抽芽再生，每株寿命可达三十至六十年，块茎重达三十至五十斤。单叶互生，叶片心形，柄长约一分五，叶紙質，长约三至五寸，寬約三至四寸，先端稍尖更急尖，茎部心脏形，叶两面披毛，茎脉三出，背脉突起、显明。五月开花，黃色，十月果熟，嫩果为黃白色，成熟时为青色和淡黑色，果皮有毛，內

部种子四十二至七十五粒，全果烘干供药用。

性能及产销情况

罗汉果含有丰富的葡萄糖，有止咳润肺的功效，并可生津止渴。广西临桂、永福等县为主要产区，每年产季为九、十月，历年产量约二百万个。罗汉果是广西特产之一，国内外畅销。



鉴别方法

罗汉果的品种，约可分为七种：

1. 属铃子：又叫“毛罗汉”，果圆形，小个，果毛少，结果多，每串四、五个。
2. 冬瓜汉：果长圆，两头较平。
3. 红毛果：果圆形，果毛较多，结果每串多为一个。
4. 长单果：果长圆形，两头较尖，似鸭蛋，味最清甜，为最优良的品种。
5. 拉江子：形似冬瓜汉，但两头较平，果皮有斑白凌纹，结果较少，一般每株产果二十多个。
6. 地藕子：近圆形，上大下小，较大个，表面有八条纵白，稜纹不明显，人工种植的较少。
7. 茶山子：栽培在幼龄茶油树地，不用搭棚架，也不需人工授粉，叶子平滑，全缘，苗青绿色，茎微黑，果实圆而小，每一果轴上生五至六个果。

以上品种，一般仅分长果和圆果两种，长果最合外销，不论长果或圆果，均以大个无破烂为佳。如摇动时发响声，便是果皮和果

瓢脫离，俗叫“响果”，木各出口规格，这类汉果在内銷习惯上以两个作一个計价。

品 质 規 格

干爽，黄褐色，无响果，无破烂，分长、圆果两种，围径可分成四級：

特級：20公分以上。

一級：18—19.9公分。

二級：16.5—17.9公分。

三級：15—16.49公分。

加 工 保 管

罗汉果一般九、十月成熟，先熟先收，收时用剪刀将果柄剪下，輕放籃內，不要碰伤。收回后，按大小分級，削平果柄，然后一个一个排在楼板上，使其后熟，約八至十天果皮顏色轉黃即可，或先放入烘箱，然后再置阳光下晒三至四天，也能达到后熟作用，此时，可以开始烘炕。

加工主要是烘干，即在地上挖一个炕，形如烧火的灶，上面用木板制成如蒸飯的长方蒸籠（即烘箱），长约四尺（分高箱和矮箱两种），将罗汉果排在箱內，如蒸面包一样，一箱装一层，分大小装籠，以便同时烘干。每灶可堆起四、五层，每层一箱，下面用木柴烧火，开始一两天用文火，以后火力慢慢增大，头两天不能在烘箱內翻果，仅上箱换下箱，将每箱果子稍轉动一下即可，过两天果皮烘成稍坚硬时，即可放在高箱內。除换箱外，还将箱內果实上下互翻，这样，五六天后，用食指輕輕弹敲果皮，有响声时即可，此时进行刷毛，紙包，分級装箱，存放干燥地处，防止受潮。

田 七

类 别 及 形 态

田七又名“三七”，属五加科，为多年生的宿根草本。掌状复叶，輪生，头年生叶一柄，柄上着生小叶五片，次年生叶两柄，三、四年后，有叶三至四柄，小叶的片数，也随着年龄增加，三年以上的，每柄常有小叶七片。小叶长椭圆形，边缘有锯齿，叶面及背有稀疏的刚毛，花为繖形花序，頂生，淡綠色，或粉紅色，农历十月至十一月，果实成熟，呈紅色，通称紅子，可作种子用。根下結有小薯，三年生的薯块挖出加工后，供藥用。



性 能 及 产 銷 情 况

田七是一种經濟价值很高的名贵藥材。性質甘，微苦，溫无毒。效能行瘀、止血、止痛消肿，用作血症藥。云南文山、广南等地的产量很大。广西睦边、靖西等县皆有出产，目前全区各县正在大力培植。

鑑 别 方 法

将田七末段投入猪血块中，能使猪血立即化成血水的为真貨，否則为假貨。田七以坚实身重，味甘苦凉，才是正貨；身分太輕，

顏色晦暗，便是死七。如田七內部藏有鉛片，并显得特別身重時，收購時應注意檢查。

品 質 規 格

品質以大个，頭大尾尖，身堅實，外皮灰黑色，光滑無須，肉色微黃而白，國藥叫做鐵皮銅心。田七規格等級以每斤個數為標準，分為二十頭（即七王）、四十頭、六十頭（以上每級不超過五頭作本級計價）、八十頭、一百二十頭、一百六十頭、二百頭四級，每級不超過十頭的仍作本級計算（即四十五頭可作四十頭，九十頭可作八十頭，九十一頭作一百二十頭計算），二百五十頭以內作大二外，三百頭以內作小二外計算，五百頭以內為無數頭。其餘尚有京條、剪口、七須、田七花等都以每斤計價。

加 工 管 理

將田七的根部掘起後，去泥及細小的須根與莖基部，曝曬至半干，用人工搓揉，再反復曝曬、搓揉，如此約三至五次，曬干後，依大小分成不同等級的毛貨，然後摻摻于麻袋內往復振盪，使成棕黑色的光亮成品。剪下的細小根及選出的殘次品，經干燥後稱剪口七、筋條（即京條）、七須等。田七經過曬干後，容易保管，若遇潮濕，容易變壞，且易受虫蛀，宜放入硫磺櫃內，用磺蒸熏，包裝應用三層包庄法，再加白布袋裝載，入鐵罐封好，另加裝木箱，這樣，才適合出口規格。

山 藥

类 别 及 形 态

山藥，又名山薯、淮山，屬薯蕷科，一年生蔓性草本。雌雄異株，野生和家种两种。地下有长大块根，莖細有卷絡，纏繞他物。叶对生，有长柄，心脏形，尖头銳，夏日叶腋生白色小花，呈穗状花序。果实为三个翅的蒴果。采集地下根供藥用，并作食用。每条长一尺数寸或二、三尺不等，味淡白无臭。



性 能 及 产 銷 情 况

山藥是一种滋养强壮藥，肉質幼白有蛋白質，味微甘平，无毒。微有收斂性。治虛弱、消化不良、慢性腸炎、遺精、夜尿、盜汗、糖尿等病有功效。产于我国华中、华北及河南、浙江、江苏等省，历史上以河南淮庆为最，故有淮山之称。广西各地均有野生，近年来陆川、博白、貴县已大量开展人工栽培，一九五八年产量約二万担。山藥不但对人民身体健康和滿足国内外需要起很大作用，同时，也是增加农民收入的一种高产經濟作物。山藥銷路极广，行銷全国，并能出口，远销南洋、澳洲等地。

鑑 別 方 法

皮黃褐色有根須眼，質白幼滑，无筋絡，如用口咬有痕痒，蛋

白質很丰富，生在山野，并且生产時間較久（老茨），皮赤黃色、較粗，色帶赤褐，肉粗白，有筋絡，无蛋白質，味帶苦涩的，即假貨。同时，又有一种名叫“黎洞茨”，外皮黑褐色，須眼較多，色亦雪白，但肉質稍粗，容易混淆，收購干貨時，应特別加注意。

品 质 規 格

光山一級：干爽，結实，色雪白，光滑，长四市寸以上，直径大五市分以上，两头均匀，并与中間同大，无脫粉，无虫蛀，无克黄斑点，无破裂痕。

光山二級：干爽，結实色雪白，光滑，长四市寸以上，直径大四市分以上，两头均匀，并与中間同大，无脫粉，无虫蛀，无克黄斑点，无破裂痕。

光山三級：干爽，結实，色雪白，光滑，长三市寸以上，直径大四市分以下，两头与中間大小不超过30%，无脫粉，无虫蛀、无克黄斑点、无破裂痕。

寸山：干爽，結实，色雪白，光滑，长一市寸以上，两头平，无破裂痕，无脫粉，无虫蛀。

毛山一級：干爽，白色，去淨黄皮，长五市寸以上，中围三寸五以上，头尾平，結实，无破烂，无虫蛀，无霉。

毛山二級：干爽，白色，去淨黄皮，长四市寸以上，中围大二寸五以上，头尾平，結实，无破烂，无虫蛀，无霉。

毛山三級：干爽，白色，去淨黄皮，长三市寸以上，中围大一寸五以上，头尾平，結实，无破烂，无虫蛀，无霉。

山粒：干爽、白色，一市寸以下，无霉坏，无外皮。

山段：干爽。白色，无霉坏。

加 工 保 管

挖得山茨（未經加工的山藥，陆川称山茨）后，先分开圓形、扁形、或弯曲的，圓形的可加工成光山，扁形及弯曲的 加工成毛山，凡圓条中围径二寸五，长度够五寸长的均可加工光山。现将加

工过程分述如下:

1. **刨皮**: 将大細条及扁形弯曲的山茛用瓜刨刨去外皮, 一次过刨, 到白肉为止, 不留黄皮(因留有黄皮的, 熏磺时, 很难透心)。刨皮后, 即将大小条分开, 并用笠装好, 使熏磺时容易处理(因熏磺时间长短不同)。

2. **熏磺**: 将已刨皮的山茛, 放入磺柜熏磺, 大条熏三天, 小条熏二天, 每天烧磺三次, 上、中、下午各一次。每次烧磺, 以熏至身軟和熟透心为度, 但須检查切开看过, 心无黄色的为透心, 如发现还有黄色的“○”形时, 仍須繼續熏磺(这段时间約三天)。

3. **第一次用阳光晒**: 将熏透磺的山茛, 摆在竹笪上晒(竹笪要用竹架承住, 不能鋪在地面), 下午收回, 即用清水洗过, 但不能久浸, 洗后, 放入磺柜連續熏磺三次, 即晚上、早上、中午各一次。晒阳光的次序是: 隔两日晒一次, 如連日晒, 会加厚山茛外皮, 增加“吊水”时的困难。

4. **吊水**: 将熏过磺的山茛轉装在竹笠里, 并用白布盖住上面, 以火砖四块垫住竹笠, 放在不通风的地方, 使水分滲漏出来, 这叫做“吊水”。“吊水”是加工方法的要点, 能吊清水(身軟熟, 心內沒有水分的即清水), 使成光山, 不致內里发生霉坏。(吊水时间約二天)。

5. **再晒, 再熏磺, 再吊水**: 将吊过第一次水的山茛再晒一天, 晚上再放入磺柜熏磺一次, 第二天早上仍照前换过竹笠, 用白布盖面, 用火砖垫笠, 放在不通风的地方(約二天)。

6. **三晒, 三熏、三吊水**: 就是进行第三次晒, 晒后晚上熏磺一次, 第二天早上再照前次换过竹笠, 进行第三次吊水(約二天)。

7. **晒过入缸**: 将吊清水的山茛拣出光山、毛山两种, 毛山应晒至干爽; 光山晒干至不軟不硬的程度时, 即收回放在缸里, 用白布盖面(冬天在缸上加盖麻包), 放一至二天, 使山茛回潤后, 再进行第一次搓工, 但焯的时间不一定, 要看山茛是否回潤, 身稍軟的可入缸一天, 身硬的要两天。

8. **搓工**: 将放在缸里的山茛取出, 每条經過修整, 如紅皮未刮

淨的要用小刀削淨，并用木板搓揉，搓到圓直为止（注意：第一次搓不圓直，第二次再搓就很难圓直了）。搓后，晒一小时或晾二小时，再放回缸內，以白布盖面（約一天）。

9.再搓：将大小不勻的山茛切去头尾，按照长短的度数及規格用刀切断，并以搓板打击两端，搓到結实后，用竹筴装，第二日即进行暴晒，直晒至干爽为度。晒时，如果阳光猛烈，須即時收回，以免爆裂（約二天）。

10修刮刷滑：以清水一盆，将一条条的山茛放在水里，要即放即拿起，用洋錫皮或玻璃条刮之。浸一条刮一条，晾干，再用罗斗紗的銅紗布刷滑，并以白布抹淨，摆在竹筴上晒至干爽为止，（約一天）。

搓山茛的搓板，一般用梨木做成，每块长度一尺二寸，横闊四尺五寸，板厚一寸五，中嵌圓棍（长度四寸左右）揸手。

保管方法：把晒干的山茛用木箱装载，每箱約一百二十斤左右，装箱时，先用旧报纸将四周围垫好，然后进行装箱，装后，即釘箱盖，不可漏风，以免虫蛀及发霉。

鸡 爪 黄 連

类别及形状

黃連系毛茛科植物，野生的叫“野黃連”，人工栽培的叫“家黃連”，均为多年生草本。野黃連多生长在山地的阴蔽处，叶丛生于根，茎亦由此出，有叶柄，叶多为三或五出羽状复叶，呈錐尾状，在其中的一小叶較长，呈披針形，先端漸尖；邊緣有重銳鋸齿，質薄，深綠色。早春抽花，长一寸多，花小，白色，雌雄異株。蓇葖果三至七枚，有細长柄，呈輪状排列。“家黃連”为栽培种，通常用老枝发生的苗秧种植，或用种子播植法。根据一般情况，黃連多在种植五、六年后的秋季掘取其根茎，方够質量。