

# 漢 醫 產 科 學

## 病 證 類 目

雜 臨 紀

產

證 產 論

---

雜

治

證

廣德十年四月三日印刷  
廣德十年五月十日發行

一九四三年

# 不 准 翻 印

## 漢 醫 產 科 學

(全 一 冊)

定價九角整

編 輯 人

宋

慎

新 京 北 大 街 三 十 號

發 行 人

宋

逸

民

新 京 北 大 街 益 智 書 店

印 刷 人

劉

守

業

新 京 西 三 道 街 財 神 廟 院 內 二 四 號

印 刷 所

益 智 書 店 印 刷 部

新 京 西 三 道 街 財 神 廟 院 內 二 四 號

發 行 所

益

智

書

店

新 京 北 大 街 三 十 號

總 批 發 處

滿 洲 書 籍 配 給 株 式 會 社

# 漢醫產科學 目次

總

論

處置小兒須知

一

求孕須知

三

受孕須知

四

胎數須知

五

擇醫須知

七

生理要訣

八

衛生要訣

一九

測驗要訣

二三

色脈要訣

二六

臨

產

三〇

目

次

難產證

骨盤狹小類

四二

部位不正類

四五

破水過早類

五〇

陣痛微弱類

五二

四肢脫出類

五五

臍帶脫出類

五七

臍帶結紮類

五八

臍帶斷裂類

六〇

各方淺解

六一

小產證

各方淺解

六九

異產證

七一

葡萄狀鬼胎類

七三

雙胎類

七五

各方淺解

七八

雜治證

盤腸生類

八三

胎衣不下類

八四

死胎不下類

八六

兒生下即死類

八七

各方淺解

九〇

## 總 論

### 處置小兒須知

當小兒於母體中娩出後。第一應將口腔及鼻孔揩拭。以防有羊水等入內。次之則切斷臍帶。次之則拭乾其全身。將血液胎脂等拭去。而後以小棉被。即所謂襁褓者包裹之。然後處置產婦。俟產婦安臥後。則以溫水爲之沐浴。水之溫度。約須攝氏寒暑表三十七度。沐浴時。應爲全身檢查。其最要者。爲臍帶之結紮。是否堅固。肛門與尿道是否有閉鎖之畸形。而後要注意週迴。有無冷風侵入。浴法。載嬰兒於兩手。入水中時。應將頭部露出。不可使水入於小兒之耳中。枕其頭於左臂。以左手支持之。而以右手爲之洗滌。先洗顏面。次及頭部。次及軀幹。最後爲四肢。皮膚上附着之胎脂。於沐浴前雖曾揩拭一次。然於此沐浴時。更宜細細洗滌。塗肥皂於海綿。或軟布片拭去之。其不能者。更塗以卵黃。眼周及口內。宜用清潔消毒之布片。裹以清潔之溫水洗滌之。俟全身

洗畢。則以乾毛布拭乾之。如肛門或尿道有閉鎖者。應立時請專門醫生施用手術。而臍帶之結紮。未堅固者。即重行結紮。更以五十倍之硼酸水洗滌之。再撒以硼酸末。然後用紗布包裹之。

種種處置後。即行將小兒穿衣。並以襁褓將小兒包裹。宜稍寬弛。不可過緊。否則易妨礙其發育。諸事妥洽。則以五十倍之硼酸銀水。滴入小兒眼中。左右眼各一滴。蓋小兒於通過產道時。眼中往往有血液、羊水、及子宮分泌液等侵入。致發生眼疾。故應爲之預防。而於頸、腋窩、肘關節、膝關節間。凡皮膚多摺皺之處。更應撒布滑石粉。

至小兒之飲食。當然爲乳汁。但不必生產後。即爲哺乳。可於十二小時後行之。蓋在此十二小時內。在小兒固無急急飲食之必要。而在母體。則於生產後。身體亦尚未復原。故哺乳不妨稍稍從緩。

又我國古法。凡小兒娩出後。於授乳之先。必飲以三黃湯。所謂三黃湯者。大黃、西黃、黃連三味。煮成湯是也。清解胎毒。早泄胎便。有無限之功效。

## 求孕須知

求孕之要訣。蓄精與調經而已。蓄精以寡慾爲貴。即古所云寡慾多男是也。以男子寡慾。則精液充足。精蟲健全。此時與女性交。必可得孕。所謂調經者。即婦女經期不準者。調之使準之謂也。經期準則卵子成熟。於每月經淨後七月內。得強壯之男子性交。與精子相會。定可受孕。

世間每見富人少子女。窮人則子女成羣。此何故耶。非天給人以不平等。富自爲之而自取之也。以富人倚其財勢。無所作爲。日求淫慾之滿足。於是妻妾成羣。左擁右抱。且且伐之。精蟲不能成熟。交而不能孕。孕而多不育也。至於貧人則日夜孜孜。惟憂衣食之不給。毫無他念。以求淫慾。故慾念淡而精蟲熟。精液厚。擁一黃臉婆已心滿意足。蓄精厚而廣精專。宜其交而孕。孕而育矣。故求子無他道。亦無秘訣。惟蓄精與調經而已。雖然。此以普通人而言也。苟生理有變。子宮失常。是則須賴醫師之手術。爲之矯正。非蓄精調經所可奏功矣。

## 受 孕 須 知

婦女懷孕。爲增殖人口之基礎。注意懷孕期間之攝生。實爲婦女康甯之樞紐。此特爲孕婦安全。亦有直接的密切關係。即與民族健全人口繁殖。均有絕大影響。婦女在於懷孕期間。偶一不當心。違反攝生。因此而侵入疾病。終身受害。大則因此而喪失生命。亦數見不鮮。

孕婦精神。須有相當靜養。亦不可快樂過度。而至妨礙精神上平衡。大凡遊戲場愉快情事。多足以影響孕婦精神平衡。或關於胎兒腦的發育。也要受到影響。故此鬧熱地。勿去爲是。過度興奮生活。和劇烈感情衝動都要禁止。至於最使人驚悸之事物。尤須避去。但以十月懷胎之久。安能盡行躲避。擇所可能避去之。如險惡場所。豺獍之神像。以及畸形怪狀小兒等等勿使其親臨或目視最爲相宜。

食物：人生賴主要五種營養素。蛋白質。脂肪。含碳水化合物。糖類以及水份。日常食物中魚肉菜蔬。含有豐富營養素。孕婦食物。應擇其易消化而富有營養素者爲宜。鰻。魚。

鯊。鹹魚。豬肉。糯米食等富於脂肪。不易消化。梅。櫻。柑。柚。酸味過強。胡椒。番茄。濃酒等刺激性太重。皆在忌食之例。

運動：孕婦亦當如健康人。當從事於戶外運動及諸種動作。但以醫師所許可之運動爲限。多呼吸新鮮空氣。不獨母體有益。即於胎兒亦相宜。如登山涉水。乘車騎馬。屈曲身體。提攜重物。高攀舉重。均當禁忌。否則易引起子宮充血。易於流產。富家婦女。平常已慣安閑。妊娠時。矯養異常。其結果反不免於病。

清潔：宜常沐浴。既可使身體清潔。復可促進新陳代謝之機能。如每月有冷水浴習慣者。可持續勿斷。普通日用三十五度（攝氏表）之浴水。夏日可用較冷的水。在陰部要格外注意。以防不潔之物侵入陰道。分泌物較平時爲多。應用硼酸水清拭。免生粒疹等疾。

## 孕教須知

婦人有病。當遵胎教。不特無難產之虞。且生子鮮胎毒腸天之患。凡經後四十餘日不

行。即宜謹房屋。慎起居。薄滋味。養性情。刻刻存心。與持寶玉無異。舉步必珍。行立必仰。坐不實其前陰。臥下久偏一側。不得耽坐嗜臥。使氣血凝滯。雖不可負重作勞。然須時時小役肢體。則經絡流動。胎息易於轉運。及至腰腹漸粗。則飲食不宜過飽。茶湯更須節省。不獨犬羊鱉蟹等一切有毒之物。不宜食。即椒薑常用之品。亦宜少嘗。其豕肉醇酒濕麪之類。亦不可恣噉。致歸精於胎。過於蕃長。而有難產之患。且令子在胞中。稟質肥脆。襁褓必多羸困。至一切宰殺凶惡之事。以及修造動工。奇形怪狀。皆不宜見。市交三月。即當滿裏其腹。若胎氣漸長。僅可微鬆其束。不可因其氣急滿悶而頓放之。

夏日澡浴。須避熱湯。冬時寒寒。勿迫爐炭。其最要緊者。尤在節制交合。蓋交合不節。淫火盡歸其子。必釀痘疹疥癩之毒。然須姪婦稟性安靜。不假強爲。若強制以違其性。鬱火內熾。則所害亦同。是又在曲體母情。適其自然之性。至如懷子受驚。則子多胎驚。懷子抱鬱。則子多結核流注。懷子恐懼。則子多癩癧。懷子常起貧妄之念。則子多鄙吝。懷子常懷忿怒之心。則子多暴戾。懷子常作綺語詭行。則子多詐譎。故子母之

氣。息息相通。必當檢束身心。循遵禁戒。宗禱靈務。不可輕視也。

### 擇醫須知

異常分娩。究居少數。而正規分娩。占全數百分之九九。故不必在家庭中生產。更不妨即延請產婆。然產婆未必盡良。或學識淺薄。或經驗不廣。應事前即注意及之。擇當有學識而經驗較多者。如地方較近者。更為便利。且也。凡孕婦在孕妊第二十星期。即應先赴產科醫師檢查身體及胎位。在母體有無心臟病腎臟病。及其他不利於分娩之疾病。而在胎兒則檢查其體位及體向。苟可療治者。速為療治。苟可矯正者。速為矯正。迨至妊孕末期。又當延請產科醫師診斷一次。以測定其骨盤之何若。胎位之何若。以及母體之健否。如無異狀者。則屆時自可自然分娩。無招請產科醫師之必要。招一產婆足矣。惟產婆須人格高尚。而又學識經驗俱富者方可。蓋產婆之良否。實關係於母子二人之生命與健康也。應先調查其經歷。如何處學校畢業。有何開業執照。何年開始執業。有無致人死亡或傷害等情事。調查周詳。然後再調查其人格。產婆出入團體。極易轉

知一家之祕密。品性惡劣者。即易發生其他之不幸也。更有貪欲無厭。妄肆敲詐。易產做爲難產。濫打催生針之輩。尤宜拒絕之。如有異狀者。則以入醫院爲宜。在家固多不便。而僅僅產婆。亦無能爲力。蓋產婆只可助產。決不能施用手術。苟發生難產情事。仍非延產科醫師不可也。故妊娠末期之診斷。實爲預備上不可或缺者。

凡此皆擇醫之所須知者也。

## 生理要訣

【妊娠原理】妊娠者。男子之精子與女子之卵子。兩相結合。而成胎之謂也。

●精子 精子乃男子之蕃殖細胞。其形態極爲細小。目力不可辨。若將其置之顯微鏡下。可見其形如細線。全長約○・○○五糎。分頭尾兩部。頭部較大。扁圓而尖。尾部較小。既細且長。運動時即藉此以爲推進。其運動甚速。據專家考查謂。每一分鐘能推進二・五糎。精子之出生處爲男子之睪丸。故睪丸通常亦稱精巢。睪丸內分二百餘小葉。每一小葉均有二三個長而作纏繞狀之曲細精管。直通小葉尖端。而合成一個直細精

管。曲細精管上皮細胞。曰脫原。精原有分裂作用。一個精原分裂而爲二個精母。二個又分爲四個。……如此不斷分裂。至於無窮。是即精子。精子於交合時由曲細精管至直細精管。經副睪丸、輸精管、射精管、入尿道而射出。數約二萬萬。此二萬萬精子。各有其獨立活動之能力。但有強弱之不同。精子之頭部中藏有男性前核。染色體即包含於其中。此男性前核。與女性前核相合。即爲妊娠。

● 卵子 卵子是女性之繁殖細胞。生於女子卵巢中之韋拉夫氏腺胞內。其狀爲圓球

形。直徑約長○・○○二瓩。約大於精子四倍。不必用顯微鏡。肉眼即可見其爲細小之白點。其數在十萬以上。但多中途死滅。至月經初通時。已不過三萬。此三萬之卵子。每月必有一個。或二個成熟。由韋拉夫氏腺胞中破裂而出。外被透明之卵黃膜。中含卵黃。其外更有放射狀之細胞層。此卵子之中。更有細核。中含核仁。染色體包含於其中。此核仁名曰女性前核。與男性前核相會合。即可受孕。至韋拉夫氏胞。係一種皮質。中含質髓。有多數小血管。每一胞中。藏有卵子一個。更有細胞胞液。以保護卵子。胞液愈多。則卵子愈增大。至一定之程度。則爲成熟。遂破裂韋拉夫氏胞而排出。

先入腹腔。再轉入輸卵管。以待精子之侵入。結合而成胎兒。故受孕之虞。十之九在輸卵管中。

●喇叭管 喇叭管即輸卵管。外廣內狹。形似喇叭。故名。卵珠從卵巢排出。即由喇叭管輸送到子宮腔。管之地位。在子宮底之兩個廣韌帶上緣之間。左右橫於腹腔。有移動性。管之內層甚細小。末端之開口部。有剪絲。和卵巢相接者。稱為「卵巢剪絲」。喇叭管之下。扁韌帶之內。有「拿雷夫氏胞」。中藏卵子。卵子成熟後。即由卵巢中流出。被剪絲所吸收。先入喇叭管。再入子宮。

●精卵結合 精子與卵子相結合。而後成孕。是妊娠之必要條件。即為精卵結合。當精子射出之時。由睪丸而經各器官。如副睪丸、輸精管、精囊、攝護腺。高俾爾氏腺、里脫蘭氏腺。以至於射精管。每過一器官。各分泌一種液質。以保護之。使之易於推進。故性交一次。其射出之精液量。約為八〇克。（注意每一克適合吾國標準重量一公分。合市用斤三分二釐。凡純水二立方公分。在攝氏寒暑表回度時。適為一千克。合吾國標準重量一公斤）及至女性生殖器官內。女性各生殖器官。亦各分泌液質。以助長其維

進。但此種液質。多含酸性。故過多反促精子死滅。而斯時如適在妊娠時期。則卵子正潛於輸卵管中。一經刺激。則卵黃黃膜之中部突然凸出。以吸引精子前進。此凸出之部。名曰迎精丘。而同時子宮腔。及子宮壁。亦營其吸收作用。使雙方接近一經接近。則第一當先之精子。即由迎精丘中直入。而卵黃膜亦起變化。將精子侵入之孔閉塞。迎脫士亦突然凹下。不特不許第二精子侵入。即已侵入之精子。其尾部亦被截留於外。只頭部。得與卵子相結合。

⑤構成胎兒 精子之頭部。中含男性前核。染色體即包於其中。一入卵黃膜中。即與女性前核相結合。而成一新核。名曰胚卵。此即構成胎兒者也。任卵成後。即開始活動。藉輸卵管內之上皮細胞運動。及輸卵管壁之蠕動。遂降入於子宮之中。其時間約三日至一星期。入宮後。即緊緊附着於子宮黏膜上之一角。為棲止之所。位置既定。即開始分裂。由一而二。由二而四。而八。而一六。而三二。而六四。以至於無數。分內外中三層。內層則構成胃、腸、腎、肺、肝、脾、及膀胱等。中層則構成骨、筋、肉、末梢神經、血管、結締組織及泌尿器、生殖器等。外層則構成腦、脊髓、神經、表皮、爪甲

毛髮、以及汗腺、皮脂腺、唾液腺等。

【區別男女】區別男女。全在構成妊卵之男性前核中。原素男子每一精子。中含有染色體四十七。女子則為四十八。此染色體。專司遺傳之用。然其中不全司遺傳者。尚有性之關係。當精子分裂而成男性前核。及卵子分裂而成女性前核時。各各分裂為二。半則在前核中。半則萎化。然此分裂。並非每顆染色體分裂。係將染色體總數平均分配。故卵子本有染色體四十八。分後則其前核中只有二十四。精子本有染色體四十七。分後則其前核中或為二十三。或為二十四。蓋四十七為單數。不能平均分配。故或為二十三或為二十四。其與女性前核相會合之男性前核。使中含染色體二十三者。則兩兩相合。計為四十七。是為男胎。使中含染色體二十四者。則兩兩相合計為四十八。是為女胎。此即男女胎之所由區別。且純繫於自然。不能以人工左右也。

【胎兒之發育】一個月胎兒不過是一個胎芽。大小如鴿卵。表面平滑如絨毛。形狀則如海綿。及至月終長約〇・九一厘米。重約一・九八克。體部彎曲。臍胞以莖連接。此時妊婦若不節制勞動。任意操作。勢必阻礙其發育。故在妊娠確斷以後。最須保持安靜。