

新编常用 中药手册

XINBIAN CHANGYONG ZHONGYAO SHOUC

金盾出版社

新编常用中药手册

主 编

王锦鸿

编 委

(以姓氏笔画为序)

史欣德 李 纓 陈守鹏 虞 舜

编 者

(以姓氏笔画为序)

王桂芳 王锦鸿 史欣德 华海清
李 纓 陈守鹏 赵 熔 赵京生
唐德才 虞 舜

金 盾 出 版 社

(京)新登字 129 号

内 容 提 要

本书是为适应中医临床用药发展需要而编写的。全书共收录了常用中药 18 类 539 味,其中主药 418 味,附药 121 味,并介绍了古今用药的经验、某些中药研究成果和多种新的中药剂型。对每味药都具体地叙述了来源、成分、药理、药性、功能、临床应用、用法用量和注意事项等,还列有一章有毒药物的中毒与解救。全书简明、实用、新颖,是中西医临床医师、药师、护士、医学院校师生较好的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

新编常用中药手册/王锦鸿主编;王桂芳等编著。—北京:金盾出版社,1994.8

ISBN 7-80022-784-7

I. 新… II. ①王… ②王… III. 中药学-手册 IV. R28-62

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:8214039 8218137

传真:8214032 电挂:0234

国防大学第一印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:15 字数:470 千字

1994 年 8 月第 1 版 1995 年 2 月第 2 次印刷

印数:11001-32000 册 定价:16.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前 言

《新编常用中药手册》的编写,目的是为中医临床用药提供一本实用的参考书。本书以中药的临床功用为纲领,较多地介绍了古今用药的经验,并举以方例为佐证,便于临床工作者拓宽思路。为了进一步阐明中药的药理作用,本书还介绍了某些中药的现代临床应用和实验研究成果,多是有价值的参考资料。随着中医药科学技术的进步和对中药研究的深入,中药的剂型改革也有较大的发展,临床应用也日益广泛,并已收到较好的效果。本书注意收集了这方面的一些内容,并简要地作了介绍,这在同类书籍中是不多见的,目的在于为临床应用单味药或中药提出物等的新剂型提供参考。

由于各位中医家的临床经验、学说、诊疗范围和用药习惯的不同,且受地域、药源等限制,对常用中药的理解会有一定差异。虽然如此,但本书所选的常用中药,还是中医界公认的。本书按中药的功用分为18类,计539味。最后一章还介绍了40多味有毒中药的中毒与解救。关于本书收载中药的品种和名称,凡法定药均以《中华人民共和国药典》(1990年版,一部)为基本依据;某些非法定中药,则参照有关资料择其较通用者。中药用量亦采用国家法定计量单位。

希望通过本书,对读者临床用药有所裨益,提高疗效。由于编者学识所限,经验不足,书中错漏在所难免,敬希同道不吝指正。

编者谨识

1994年3月于南京中医学院

凡 例

一、《新编常用中药手册》的内容包括凡例、正文、引用方剂索引和药名索引。正文收载中药 539 味,其中主药 418 味,附药 121 味,并按其功用分为 18 类,每类 1 章,共列 18 章。第十九章为有毒中药的中毒与解救,介绍了有毒中药 38 味,另有 6 味含毒成分与 38 味中有相同者则合并阐述,如川乌与草乌、附子是一起介绍的。

二、每味主药设有药名、来源、成分药理、药性、功能、临床应用、用法用量、注意事项、制剂、备考 10 项内容。

1. 药名只写正名,不列异名;正名是指药物的原名或现代常用名。并列有拉丁文药名。

2. 来源:①指原植(动)物的科名、植(动)物名、拉丁文学名和药用部位。②矿物药则注明类、族、矿石名或岩石名以及主要成分。

3. 成分药理:①叙述药物的主要有效成分或主要成分。②叙述主要药理或与功用主治密切相关的药理作用。③只有成分或只有药理内容者,则其项目名称亦相应写作成分或药理。

4. 药性:包括性味、毒性和归经三项内容。

5. 功能:①扼要归纳药物的主要功能。②药物的传统功能用中医术语表述,现代医学发现的功能则用西医术语表述。

6. 临床应用:①以功能为纲,分条叙述各功能范围内的主要适应证,及同一病证的不同证型。②简要介绍药物在不同病证或不同证型中的具体应用和不同配伍。③介绍配伍时多数举出方例供参考,为了方便进一步查证,不少方剂还指明了出处。

7. 用法用量:①有不同炮制品的尽量写明不同炮制品的性能、效用和用药适应证。②用法是指内服、外用等不同方法及其剂型。③用量,煎服用量指成人日常用量,粉剂用量指成人一次的服用量。④对烈性药和有毒药,需要时亦注明最高限量。⑤作丸、散服用的复方不注明单味药的用量。⑥外用无特殊要求的只写适量。

8. 注意事项:①禁忌,包括病证禁忌、妊娠禁忌、配伍禁忌和食忌。②指明可能出现的毒副反应及用量的限制等。

9. 制剂:①有的中药介绍现代新剂型。②制剂必须是单味药或其提取物,或以该药为主,辅以 1~2 味佐使药者,复方不在此例。

10. 备考:①附药,主药的其它药用部位也可入药者,其内容均较简单,或与主药基本一致不需要分条专门叙述者,也列入附药。②效用近似药物的比较。③选介药物效用的临床例证,而在[功能]与[临床应用]中又未能包括的新用途、新功能。

三、有毒药物的中毒与解救,是进一步说明一些常用有毒药物的中毒情况与一旦发现急性中毒的处理方法。每一药物除药名以外,设有[中毒量]、[含毒成分]、[中毒原理]、[中毒症状]、[解救]等项内容。

1. 有毒药物绝大多数是前面的主药,个别药物是本书中未收录的常用药,但民间常有误用以致中毒者,录此以备参考。

2. 中毒量:是指成人口服引起中毒的最低量或范围,有的还写明最小致死量。但是一些还不能确切表明其中毒量的则不写,或写入半数致死量(LD₅₀)。

3. 含毒成分:是指药物的有毒成分,或某些可能与致毒有关的成分。

4. 中毒原理:说明在有毒成分的毒理作用下使人体某些组织器官产生的病理改变及功能变化。

5. 中毒症状:只写主要症状,并尽量按照器官系统症状罗列。

6. 解救:中毒的解救与处理分西药和中药两种方法,以西药为主中药为辅,因为中药目前还只有通用解毒的意义。即使西药的救治也只是一些常规的应急措施。中毒严重者,应请有经验的医师诊治并送医院抢救。

四、附录:①方剂索引是指正文临床应用中提及的方剂但未能包括所有组成内容者,凡已包括所有组成药物的方剂不列入索引。索引内有方名、来源、组成,以便借此查阅原著。②药名索引,以药名的笔画数与笔形顺序排列。

五、本书所用简体字为规范化简体字,但少数字体简化后可能在应用意义上容易混淆,故仍用繁体字。如癍痕的“癍”不用“症”,覆盆子的“覆”不用“复”等。另外,橘皮的“橘”不用“桔”字。

目 录

第一章 解表药

一、辛温解表药	(1)
麻黄(附麻黄根)	(1)
桂枝	(1)
紫苏叶(附紫苏梗)	(2)
荆芥	(2)
防风	(3)
羌活	(4)
白芷	(4)
细辛	(5)
藁本	(5)
香薷	(6)
辛夷	(6)
苍耳子(附苍耳草)	(6)
生姜(附生姜皮、煨姜)	(7)
葱白(附葱叶、葱汁)	(7)
灯盏细辛	(8)
鹅不食草	(8)
二、辛凉解表药	(8)
薄荷	(8)
牛蒡子	(9)
蝉蜕	(9)
桑叶	(10)
菊花	(10)
淡豆豉(附大豆黄卷)	(11)
蔓荆子	(11)
葛根	(11)
升麻	(12)
柴胡	(12)
浮萍	(13)
木贼	(13)
桉叶	(14)
蕤仁	(14)
山芝麻	(14)

第二章 清热药

一、清热泻火药	(15)
---------	------

石膏	(15)
知母	(15)
芦根(附芦茎)	(16)
天花粉	(16)
淡竹叶(附竹叶卷心、苦竹叶)	(16)
鸭跖草	(17)
栀子	(17)
夏枯草	(18)
龙胆草	(18)
青箱子	(18)
密蒙花	(19)
谷精草	(19)
熊胆	(19)
二、清热燥湿药	(20)
黄连	(20)
黄芩	(20)
黄柏	(21)
苦参	(21)
秦皮	(22)
白鲜皮	(22)
三、清热解毒药	(22)
金银花(附忍冬藤)	(22)
连翘	(23)
蒲公英	(23)
紫花地丁	(24)
板蓝根	(24)
大青叶	(25)
青黛	(25)
野菊花(附野菊)	(26)
穿心莲	(26)
一枝黄花	(27)
重楼	(27)
拳参	(27)
半边莲	(28)
半枝莲	(28)
垂盆草	(28)
土茯苓	(29)
金荞麦	(29)
鱼腥草	(29)

茵陈蒿	(62)
田基黄	(63)
白英	(63)
泽漆	(64)
蟋蟀	(64)

第五章 祛寒药

附子	(64)
川乌	(65)
草乌	(65)
肉桂	(66)
干姜	(67)
高良姜	(67)
吴茱萸	(68)
丁香(附母丁香、丁香油)	(68)
花椒(附椒目)	(69)
胡椒	(69)
荜茇	(70)
荜澄茄	(70)
小茴香(附八角茴香)	(70)

第六章 理气药

陈皮(附化橘红、橘白、橘络、橘核、橘叶)	(71)
青皮	(72)
枳实(附枳壳)	(72)
佛手(附佛手花)	(73)
木香(附青木香)	(73)
香附	(73)
川楝子(附苦楝子)	(74)
薤白	(74)
乌药	(75)
沉香	(75)
檀香	(76)
柿蒂(附柿霜)	(76)
荔枝核	(76)
娑罗子	(77)
八月札	(77)
绿梅花	(77)
九香虫	(78)

第七章 理血药

一、活血祛瘀药	(78)
川芎	(78)
丹参	(79)

桃仁	(81)
红花(附藏红花)	(81)
三棱	(82)
莪术	(83)
郁金	(83)
姜黄	(84)
乳香	(84)
没药	(84)
血竭	(85)
鸡血藤	(85)
牛膝(附川牛膝、土牛膝)	(86)
延胡索	(87)
五灵脂	(87)
穿山甲	(88)
地鳖虫	(88)
蜣螂	(88)
泽兰	(89)
益母草(附茺蔚子)	(89)
急性子(附凤仙花)	(90)
凌霄花	(90)
苏木	(90)
降香	(91)
王不留行	(91)
刘寄奴	(92)
马鞭草	(92)
毛冬青	(92)
虎杖	(93)
鬼箭羽	(94)
二、止血药	(94)
大蓟	(94)
小蓟	(95)
地榆	(95)
苎麻根	(96)
白茅根	(96)
槐花(附槐角)	(96)
侧柏叶	(97)
羊蹄	(97)
白及	(98)
棕榈炭	(98)
血余炭	(98)
藕节	(99)
三七(附菊叶三七、景天三七)	(99)
茜草	(100)
蒲黄	(100)

艾叶	(101)
卷柏	(101)
断血流	(102)

第八章 补益药

一、补气药	(102)
人参(附人参叶)	(102)
党参(附明党参)	(103)
太子参	(104)
黄芪	(104)
山药	(105)
白术	(105)
甘草	(106)
白扁豆(附扁豆衣、扁豆花)	(106)
西洋参	(107)
大枣	(107)
刺五加	(107)
二、补血药	(108)
当归	(108)
熟地黄	(108)
白芍	(109)
何首乌(附首乌藤、白首乌)	(109)
阿胶	(110)
龙眼肉	(110)
绿矾	(111)
三、补阴药	(111)
南沙参	(111)
北沙参	(111)
麦门冬	(112)
天门冬	(112)
石斛	(113)
玉竹	(113)
黄精	(114)
枸杞子	(114)
女贞子(附女贞叶)	(114)
墨旱莲(附红旱莲)	(115)
龟甲(附龟甲胶)	(115)
鳖甲(附鳖血、鳖甲胶)	(116)
四、助阳药	(116)
鹿茸	(116)
鹿角(附鹿角胶、鹿角霜)	(117)
巴戟天	(117)
肉苁蓉	(118)
淫羊藿	(118)

杜仲	(119)
续断	(119)
狗脊	(119)
骨碎补	(120)
补骨脂	(120)
山茱萸	(121)
菟丝子(附菟丝饼)	(121)
冬虫夏草(附人工虫草)	(121)
核桃仁	(122)

第九章 止咳平喘化痰药

一、止咳平喘药	(122)
桔梗	(122)
前胡	(123)
白前	(123)
紫菀	(124)
百部	(124)
苦杏仁(附巴旦杏仁)	(125)
马兜铃	(125)
款冬花	(125)
白果	(126)
枇杷叶	(126)
桑白皮	(127)
葶苈子	(127)
紫苏子	(128)
鼠曲草	(128)
牡荆子(附牡荆叶)	(128)
天仙子	(129)
二、化痰药	(129)
半夏	(129)
天南星(附胆南星)	(130)
白附子	(130)
芥子	(131)
皂荚(附皂荚刺)	(131)
瓜蒌	(131)
川贝母	(132)
浙贝母	(132)
竹茹	(133)
竹沥	(133)
天竺黄	(134)
乌蛇胆	(134)
胖大海	(134)
藏青果	(134)
挂金灯	(135)

钟乳石	(135)
罗汉果	(135)
木蝴蝶	(135)
旋覆花	(136)
礞石	(136)
蛤壳(附蚌粉)	(136)
海藻	(137)
昆布	(137)
瓦楞子	(137)

第十章 安神药

朱砂	(138)
磁石	(138)
龙骨(附龙齿)	(139)
琥珀	(140)
珍珠(附珍珠层)	(140)
远志	(141)
酸枣仁	(142)
柏子仁	(142)
合欢皮(附合欢花)	(142)
紫石英	(143)

第十一章 平肝息风药

天麻(附蜜环菌)	(143)
钩藤(附钩藤根)	(144)
羚羊角(附山羊角)	(145)
牡蛎	(145)
石决明	(146)
珍珠母	(146)
全蝎	(147)
蜈蚣	(147)
僵蚕(附僵蛹)	(148)
地龙	(149)
赭石	(150)
蒺藜	(150)
决明子	(151)
蛇蜕	(151)
罗布麻叶(附罗布麻根)	(152)
牛黄(附人工牛黄)	(152)

第十二章 固涩药

五味子	(153)
乌梅	(154)
五倍子	(154)

碧桃干(附桃叶)	(155)
赤石脂	(155)
禹余粮	(156)
石榴皮	(156)
肉豆蔻	(156)
椿皮(附凤眼草、香椿皮)	(157)
诃子	(157)
芡实	(158)
金樱子	(158)
益智仁	(158)
南烛子	(159)
莲子(附莲须、莲房、莲心、石莲子)	(159)
海螵蛸(附墨囊粉)	(159)
桑螵蛸	(160)
覆盆子	(160)

第十三章 开窍药

麝香(附灵猫香、人工麝香)	(161)
苏合香	(161)
安息香	(162)
石菖蒲(附白菖蒲、九节菖蒲)	(162)
冰片	(163)

第十四章 消食药

山楂	(163)
神曲	(164)
麦芽	(164)
谷芽(附米皮糠)	(165)
鸡内金	(165)
莱菔子(附莱菔、莱菔叶、地骷髅)	(165)

第十五章 驱虫药

使君子	(166)
苦楝皮	(166)
槟榔(附大腹皮)	(167)
南瓜子	(167)
鹤草芽	(168)
雷丸	(168)
鹤虱(附天名精)	(168)
榧子	(169)
芜荑	(169)

第十六章 泻下药

大黄	(169)
----------	-------

芒硝	(171)
番泻叶	(172)
芦荟	(172)
巴豆(附巴豆霜)	(172)
火麻仁	(173)
郁李仁	(173)
甘遂	(174)
大戟	(174)
芫花	(175)
牵牛子	(175)
商陆	(175)
千金子	(176)
狼毒	(176)
蓖麻子	(177)

第十七章 涌吐药

瓜蒂	(177)
胆矾	(178)
藜芦	(178)
常山(附蜀漆)	(178)

第十八章 外用药

硫黄	(179)
雄黄	(179)
砒石	(180)
轻粉	(180)
红粉	(180)
炉甘石	(181)
硼砂	(181)
明矾	(181)
硃砂	(182)
斑蝥	(182)
蟾酥(附蟾皮、蟾蜍)	(183)
鱼胆	(183)
蜂房	(184)
儿茶	(184)
樟脑	(185)
马钱子	(185)
大风子仁	(186)
木槿皮(附土槿皮)	(186)
木芙蓉叶(附木芙蓉花)	(186)
藤黄	(186)

第十九章 有毒药物的中毒与急救

大戟	(187)
大风子	(187)
千金子	(187)
马钱子	(187)
天南星	(188)
巴豆	(188)
甘遂	(188)
石菖蒲	(188)
北鹤虱	(188)
白果	(189)
白附子	(189)
瓜蒂	(189)
半夏	(189)
地龙	(189)
全蝎	(189)
芫花	(190)
皂荚	(190)
附子 川乌 草乌	(190)
苦杏仁 桃仁	(190)
苦楝皮 苦楝子	(190)
鱼胆	(191)
细辛	(191)
砒霜	(191)
牵牛子	(191)
轻粉 升药 朱砂	(192)
鸦胆子	(192)
洋金花	(192)
狼毒	(192)
常山	(193)
商陆	(193)
斑蝥	(193)
雷公藤	(193)
蜈蚣	(194)
赭石	(194)
樟脑	(194)
藜芦	(194)
藤黄	(194)
蟾酥	(194)
中药名称索引	(196)
引用方剂索引	

第一章 解表药

一、辛温解表药

麻 黄

Herba Ephedrae

【来源】为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf、中麻黄 *E. intermedia* Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 *E. equisetina* Bge. 的干燥草质茎。

【成分药理】

成分：茎中含有多种有机胺类生物碱，其中主要有效成分为左旋麻黄碱，其次为右旋伪麻黄碱、麻黄定碱等，还含挥发油。

药理：①麻黄碱有拟肾上腺素样作用，故能松弛支气管平滑肌，兴奋心脏，升高血压；大剂量可引起精神兴奋、失眠、不安和震颤。②麻黄挥发油及其主要成分松油醇，则有解热作用。③伪麻黄碱有显著的利尿作用。

【药性】味辛、微苦，性温。归肺、膀胱经。

【功能】发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

【临床应用】

1. 发汗解表：用于①风寒感冒表实证，证见发热恶寒、无汗身痛，常与桂枝配伍，如麻黄汤；若阳虚之人，风寒直中少阴，证见发热无汗，脉沉不浮者，可配细辛、附子以助阳解表，如麻黄附子细辛汤。②风寒湿痹，寒热无汗，周身烦痛，常配白术、桂枝等，如麻黄加术汤。

2. 宣肺平喘：用于肺寒咳喘，常配杏仁以加强平喘作用，如三拗汤；兼有寒饮者，配白芍药、干姜、细辛等，以温肺化饮、止咳平喘，如小青龙汤；邪热郁肺之喘咳，则配石膏等，如麻杏石甘汤。

3. 利水消肿：用于风水一身悉肿，偏热者，配石膏同用，如越婢汤；若属寒、脉沉者，配附子同用，如麻黄附子甘草汤。

此外，麻黄与连翘、赤小豆等配伍，可治疗湿热黄疸；与熟地、肉桂、鹿角胶、白芥子等配伍，可治疗外科阴证，如阴疽、流注、鹤膝风、贴骨疽等，如阳和汤。

现代常用于治疗流感、风湿性关节炎、急性和慢性支气管炎、肺炎、支气管哮喘、肺气肿、急性肾炎等疾患。

【用法用量】解表、利水宜生用，止咳平喘蜜炙用。内服：煎汤，1.5~9g。

【注意事项】凡表虚自汗，阴虚盗汗，高血压，心功能不全者均禁服。

【备考】麻黄根(Radix Ephedrae)为麻黄的根。味甘，性平，归心、肺经。具有止汗的功效适用于自汗、盗汗。治阴虚盗汗，常配五味子、麦冬、牡蛎等药；治气虚自汗，常配黄芪、白术等药；也可单用或配牡蛎研细末外扑。煎服，3~10g。本品有收敛止汗作用，故有表邪者忌用。

桂 枝

Ramulus Cinnamomi

【来源】为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥嫩枝。

【成分药理】

成分：含挥发油约1.5%，油中85%为桂皮醛。还含有硬脂酸、桂皮酯等。

药理：①桂皮醛具有解热作用，能使皮肤血管扩张，调整血液循环，使血液流向体表，有利于散热发汗。②健胃作用，可刺激嗅觉器官，引起胃功能反射性亢进，也能直接刺激消化道粘膜，使分泌增加，蠕动亢进；大剂量使子宫充血，表现有通经作用，对孕妇可引起流产。③对家兔心脏有抑制作用，并使血压下降。④体外试验对流感病毒、金黄色葡萄球菌、伤寒杆菌等有显著的抑制作用。

【药性】味辛、甘，性温。归肺、心、膀胱经。

【功能】发汗解表，散寒止痛，通阳化气。

【临床应用】

1. 发汗解表：外感风寒表证，发热、恶寒、无汗、头痛之表实证者，与麻黄同用，以加强发汗解表之功，如麻黄汤；若表虚有汗者，与白芍等同用，能调和营卫，解肌祛邪，如桂枝汤。

2. 散寒止痛：用于①风湿痹痛，尤以上肢肩臂关节疼痛为佳，常配羌活、防风、姜黄、当归、川芎等；寒湿盛者，可配附子、白术、甘草等，如桂枝附子汤、甘草附子汤等；若热痹关节红肿疼痛者，也可与白芍药、石膏、知母等清热药配伍，如桂枝芍药知母汤；若气血不足，营卫不和，又感风邪之血痹，证见肌肤麻木或疼痛者，可与黄芪、芍药配伍，如黄芪桂枝五物汤。②脘腹疼痛，阴寒内盛，腹痛肢冷，也可配附子、乌头；若中阳不振，虚寒腹痛者，配芍药、甘草、干姜、饴糖同用，以温中补虚、缓急止痛，如小建中汤；中虚甚者，再配黄

芪以增强益气之功,如黄芪建中汤;兼血虚者,加配当归,补养营血,如当归建中汤。③妇科病,如虚寒凝滞之月经不调、经闭、痛经及宫冷不孕,可配吴茱萸、川芎、生姜等,如温经汤;腹有癥瘕,可配当归、芍药、桃仁、丹皮之类,如桂枝茯苓丸。

3. 通阳化气:用于①胸痹胸痛,胸阳不振,痰气痹阻,胸痛窒闷者,常配薤白、枳实等,如枳实薤白桂枝汤。②心动悸、脉结代,心阴心阳两虚者,当与炙甘草、人参、生地、阿胶等配用,如炙甘草汤。③痰饮证,如痰饮阻遏阳气,咳喘短气,目眩心悸,胸脘痞满者,常配茯苓、白术、甘草等,以温运脾阳、化湿蠲饮,如茯苓桂枝白术甘草汤;若小便不利,水肿者,乃膀胱气化不行,常配茯苓、猪苓、泽泻等利水渗湿药,如五苓散等。

现代常用于流感、风湿性关节炎、神经痛、慢性支气管炎、哮喘、慢性胃炎、冠心病、心肌炎等症。

【用法用量】 发散风寒,宜生用;温经通阳,炒用;温中补虚,蜜炙用。内服:煎汤,3~9g;治风湿痹痛可用较大剂量,15~20g。

【注意事项】 本品辛温助热,易伤阴动血,温热病、阴虚阳盛、血热妄行之证禁服。孕妇慎服。

紫 苏 叶

Folium Perillae

【来源】 为唇形科植物野生紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var. *acuta* (Thunb.) Kudo 或皱紫苏 *P. frutescens* (L.) Britt. var. *crispa* (Thunb.) Decne. 等的叶。

【成分药理】

成分:野紫苏全草含挥发油,内有左旋紫苏醛、右旋柠檬烯、左旋芳樟醇、薄荷酮、丁香油酚、香蒿酮等。皱紫苏全草含挥发油,内有紫苏醛、左旋柠檬烯及少量 α -蒎烯;还含精氨酸等。

药理:紫苏叶煎剂或浸剂口服,对家兔有微弱的解热作用,能促进消化液分泌及胃肠运动;紫苏油及紫苏醛能引起饥饿家兔之血糖上升。

【药性】 味辛,性微温。归肺、脾、胃经。

【功能】 发表散寒,行气和中。

【临床应用】

1. 发表散寒:用于风寒表证,恶寒发热,头痛无汗,常与其它辛温表散药羌活、防风、生姜等同用,如苏羌达表汤;若兼肺气不宣,发热而咳嗽者,常与杏仁、前胡、桔梗等同用,以宣肺化痰止咳,如杏苏散;本品兼行气之功,故外感风寒,兼胸脘痞闷等气滞之象者,可与香附、陈皮配伍,如香苏散;若外感风寒,内有湿滞,寒热而吐泻腹痛者,多与藿香、厚朴等芳香化浊之品同用,如藿香正气散;若气虚复感风寒,可与人

参、白术、山药等补气药同用,如参苏饮。

2. 行气和中:用于①脾胃气滞,挟有胃热,胸脘痞闷或痛、恶心呕吐者,常配黄连、吴茱萸、白薏仁等同用,以辛开苦降。②妊娠胎气上逆,呕恶胸闷,胎动不安者,常配砂仁、白术、陈皮同用,以行气安胎。③梅核气,咽中如有物阻,常配厚朴、半夏、茯苓等同用,以行气消痰解郁,如半夏厚朴汤。

此外,①单味紫苏叶煎服,或配生姜同用,可解鱼蟹中毒。②煎汤熏洗,可治阴囊湿疹;鲜品单用或与桑叶捣敷创伤,有止血敛疮之效;捣敷并煎服亦治乳痈。

现代临床有用本品配少量干姜治疗慢性支气管炎的报道,具有止咳、平喘、化痰作用。

【用法用量】 生用。内服:煎汤,6~9g,解鱼蟹毒,30~60g;或捣汁冲服。外用:煎洗,30g;捣敷,适量。

【注意事项】 阴虚发热者慎服。

【备考】

1. 紫苏梗(*Caulis Perillae*) 为紫苏的老茎,味辛,性温,能行气和中,宽胸利膈,顺气安胎。用于胸脘痞闷,腹胀腹痛,妊娠呕恶,胎动不安等证。用量5~10g,水煎服。

2. 紫苏发散风寒,而力逊于麻黄、桂枝,故适用于外感风寒之轻证。

3. 苏叶与苏梗皆辛温之品,前者散寒解表、理气和中,而后者仅能行气和中安胎。

4. 治疗宫颈出血:紫苏水提取液,1ml含生药2g,分装成5ml安瓿,密封消毒备用。并以此制成止血纸和止血棉球(或纱布)。止血纸,以1g擦镜头纸浸润5ml紫苏注射液,烘干。止血棉球(纱布),以无菌棉球(纱布)充分浸润紫苏注射液即可。使用时将本止血剂贴敷出血处,一般不需纱布填塞。共治108例,出血原因多为活检出血(86例),另有宫颈癌出血、囊肿穿刺出血、冰冻治疗后出血及外伤出血等。结果:显效58例,占53.7%,止血时间 ≤ 15 分钟;良效22例,占20.37%;有效6例,占5.5%;无效22例,占20.37%。总有效率为79.63%(中医杂志1988;8:49)。

荆 芥

Herba Schizonepetae

【来源】 为唇形科植物荆芥 *Schizonepeta tenuifolia* (Benth.) Briq. 带花穗的地上部分。

【成分药理】

成分:荆芥全草含挥发油1.8%,其中主要成分为右旋薄荷酮、消旋薄荷酮和少量右旋柠檬烯等。

药理:荆芥挥发油中的某些成分具有镇痛、抗炎、轻度健胃、驱风、解痉作用;煎剂在体外对金黄色葡萄

球菌和白喉杆菌有较强的抗菌作用,对炭疽杆菌、乙型链球菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、绿脓杆菌和人型结核菌也有一定的抑制作用;炒炭能缩短出血和凝血时间。

【药性】 味辛,性温。归肺、肝经。

【功能】 祛风散表、止咳、止痉、止痛、止痒、透疹、止血。

【临床应用】

1. 祛风解表:用于外感表证,风寒表证,常配防风、羌活等同用,如荆防败毒散;风热表证,常与银花、连翘等同用,如银翘散。

2. 祛风止咳:风寒咳嗽,久而不已,咯痰不爽,与桔梗、白前、百部等配用,如止嗽散;风热咳嗽,咽喉肿痛,则配桔梗、甘草。

3. 祛风止痉:治产后失血血晕、口噤、四肢抽搐,用芥穗炭单味研末冲服,或随证配其它药煎服。

4. 祛风止痛止痒:用于①头风头痛,常配川芎、羌活、白芷等同用,如川芎茶调散;②皮肤瘙痒症、荨麻疹、风疹,常配薄荷、蝉蜕、白蒺藜等同用,或合苦参煎汤外洗患处。

5. 透疹:用于麻疹初起,疹出不畅,可与葛根、牛蒡子、蝉衣、薄荷等同用。

6. 收敛止血:用于诸出血证,与参三七、炮姜、伏龙肝配用,温中散寒,和血止血,用治胃痛吐血或大便色黑稀薄;如与藕节、黑山栀、白茅根同用,能清肺凉肝止血,可治鼻衄;合地榆、槐花炭等可治肠风便血;合当归、艾叶、陈棕炭、川断炭、益母草等固经止血,可治妇女月经过多及崩漏。

此外,荆芥还具有消疮毒、破结气的作用,用于疮疡初起见有表证者,可配银花、土茯苓同用;用荆芥一味煎汤,可熏洗治疗痔疮肿痛;合牛蒡子、夏枯草、玄参、牡蛎等同用,可治疗瘰疬结核;治口舌生疮、扁桃体炎等,与薄荷、元明粉、青黛等研末点,或蜜、水调点,如绿袍散。

【用法用量】 内服:煎汤,5~10g。炒炭用,8~15g;治失血、血晕可用至30g。

【注意事项】 本品性主升散,凡表虚自汗、阴虚头痛忌服。

【制剂】 荆芥注射液:每支2ml,含原生药6g。肌注1次2~4ml,1日1~2次。祛风解表。用于感冒发热。

【备考】 本品入药用地地上部分,茎穗同用,称荆芥,适用于散全身的风邪;只用其穗,称芥穗,其升散之性较强,适用于散头部风邪;炒炭用时,称荆芥炭、芥穗炭,适用于止血,尤宜于产后血晕。

防 风

Radix Saposhnikoviae

【来源】 为伞形科植物防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 的根。

【成分药理】

成分:含挥发油、甘露醇等。

药理:煎剂和乙醇浸剂有一定程度的解热、镇痛作用,对实验性关节炎有抑制作用,有某些抗癫痫作用。体外试验,防风鲜汁对绿脓杆菌及金黄色葡萄球菌有一定的抗菌作用。

【药性】 味辛、甘,性温。归膀胱、肺、脾经。

【功能】 祛风解表、止痛、解痉、止痒。

【临床应用】

1. 祛风解表:用于风寒表证,以恶寒、发热、头疼、身痛、无汗为主症,常与荆芥、紫苏叶、羌活等同用,如荆防败毒散;如风寒夹湿,寒热无汗,鼻塞声重,身体疼痛,苔白,可与苍术、葱白、生姜等配用,如海藏神术散;若配薄荷、连翘、牛蒡子等辛凉药同用,也可用于风热表证。

2. 祛风止痛:用于风寒湿痹,肌肉关节疼痛,以风邪偏胜者,可配羌活、秦艽、桂枝、苍术等以除痹止痛,如蠲痹汤;痛剧,游走不定,手足屈伸不利者,可配川乌、草乌或附子等以加强散寒止痛之功;热痹,关节红肿疼痛者,可配地龙、漏芦同用,以祛风清热通络;治偏正头痛,与白芷、川芎等配伍,如川芎茶调散。

3. 祛风解痉:用于破伤风,牙关紧闭,角弓反张,多配天南星、白附子等同用,如玉真散;小儿高热惊风,可配龙胆草、钩藤、牛黄等同用,如凉惊丸。

4. 祛风止痒:用于风疮湿疹,疥癣,皮肤瘙痒症,常配白鲜皮、荆芥、白蒺藜同用。

此外,防风配白术、白芍、陈皮能祛风胜湿、疏肝和脾,可用于肝脾不和的肠鸣腹痛泄泻,如痛泻要方。防风配羌活、白附子、秦艽、胆星、白僵蚕等,可用于祛风化痰、舒经活络,如治口眼喎斜的正容汤。本品炒炭,可用于肠风便血与崩漏之证,便血可配荆芥炭、槐花、地榆;崩漏常配蒲黄等。本品用于痈疽肿毒,不论阴症阳症,均可用为佐使药以宣发散结,入外治药、围敷药、洗渍药、膏药中。如与艾叶、大戟煎洗可治蛙疔,冲洗还治霉菌性阴道炎。

现代常用于感冒、风湿性关节炎、血管神经性头痛、荨麻疹、皮肤瘙痒症、胃肠功能紊乱症等。

【用法用量】 一般多生用,治泄泻可煨用,治出血宜炒炭用。内服:煎汤,3~10g。

【注意事项】 血虚发痉及阴虚火旺者禁服。

【备考】 防风为祛风之要药,但兼有甘味,故辛

温而不燥,药性缓和。本品常与荆芥相须同用,荆芥发汗之力较著,且能透疹、止血,而防风胜湿止痛作用较优,风湿诸痛症用之尤宜。

羌 活

Rhizoma seu Radix Notopterygii

【来源】 为伞形科植物羌活 *Notopterygium incisum* Ting ex H. T. Chang 或宽叶羌活 *N. forbesii* Boiss. 的根茎及根。

【成分药理】

成分:含挥发油,其中有 α -蒎烯、 β -蒎烯、柠檬烯、牻牛儿苗醇-4、乙酸龙脑酯等。

药理:能对抗垂体后叶素引起的大鼠急性心肌缺血所致的心电图改变,增加心肌营养性血流,减慢心率。

【药性】 味辛、苦,性温。归膀胱、肾经。

【功能】 解表散寒,祛湿止痛。

【临床应用】

1. 解表散寒:用于①风寒感冒,恶寒发热无汗,头痛身痛,可配防风、苍术、白芷、细辛等品,如羌活汤或九味羌活汤。②客寒犯脑,脑痛连齿,口臭气冷,配附子、麻黄、甘草同用,如羌活附子汤。

2. 祛湿止痛:①若风湿头痛如裹,昏沉胀重,脊痛项强,肩背痛,腰痛,可与独活、川芎、蔓荆子、藁本等配伍,如羌活胜湿汤。②用于风湿痹痛,肢节疼痛,或屈伸不利,常与防风、姜黄等配伍,如蠲痹汤;若湿邪偏盛者,加苍术;寒邪偏盛者,加附子。

【用法用量】 生用。内服:煎汤,3~10g;或入丸、散。

【注意事项】 本品温燥,故阴虚血虚之头痛、痹痛者慎服。

【备考】 羌活、独活都能祛风湿,而羌活偏于散浅表之风湿,善治脊、项、头、背的上半身疼痛;独活则偏于祛深在之风湿,善治腰、腿、足、胫下半身疼痛,两者常相须为用,增强治疗风寒湿痹止痛之效,但两者的剂量不宜过多,以免引起恶心等不适。

白 芷

Radix Angelicae Dahuricae

【来源】 为伞形科植物白芷 *Angelica dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 *A. dahurica* (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. *formosana* (Boiss.) Shan et Yuan 的根。

【成分药理】

成分:①白芷根含多种呋喃香豆素:白当归素、白当归脑、氧化前胡素、珊瑚菜素等。另含花椒毒素、东

莨菪素等。②杭白芷根含欧前胡内酯、异欧前胡内酯、香柑内酯、谷甾醇、硬脂酸等。

药理:①体外试验川白芷水煎剂对大肠杆菌、宋氏痢疾杆菌等有一定抑制作用;水浸剂对奥杜盎氏小芽胞癣菌等致病皮肤真菌,也有一定抑制作用。②白当归素有扩张冠状血管作用。

【药性】 味辛,性温。归胃、脾、肺经。

【功能】 祛风止痛,通鼻窍,消痈肿,润肤止痒。

【临床应用】

1. 祛风止痛:用于①头痛,外感风寒或风湿之头痛,可配羌活、防风、川芎等同用,如川芎茶调散;与菊花、葛根、石膏、黄芩等同用,亦治风热头痛;阳明经头痛、前额部或眉棱骨疼痛者,可单用为末,炼蜜为丸,清茶或荆芥汤送下,如都梁丸。②牙痛,属风寒者,配细辛同用,或与吴茱萸等各等分浸水漱口;如属风火者,可配石膏同用。

2. 通鼻窍:用于鼻渊,流浊涕,头额胀痛,可配辛夷、苍耳、薄荷为末服。

3. 消痈肿:用于痈疽肿疡,可散气分之结、和血分之瘀,多与赤芍同用,但多作辅助药用;用于疮疡肿毒初起未溃的热证,常与金银花、天花粉、姜黄、连翘等配伍;对于阴疽发背、阴冷流注等寒证,多与草乌头、南星、赤芍等同用。

4. 润肤止痒:用于风团、脱屑、湿烂渗液等皮肤损害。①治急、慢性湿疹,接触性皮炎,热痒等皮肤痒症,用本品与川柏、石膏、冰片等配用。②治面部粉刺、雀斑、酒皰鼻、黄褐斑等,与密陀僧、白附子、绿豆粉等配用。

此外,用于:①妇女赤白带下,有燥湿止带作用,属寒湿者,常与白术、海螵蛸、茯苓等配伍;属湿热者,常与黄柏、椿根皮同用。②治脾虚湿盛的久泻,可与肉豆蔻、诃子、茯苓、芡实等同用。

【用法用量】 生用。内服:煎汤,3~10g,或入丸、散。外用:可配制成多种剂型,研为散作掺敷药,水煎为洗渍药,酒浸或酒、醋煎膏作敷涂药,或作油脂膏等。治头痛、鼻渊等,也可研末搐鼻。

【注意事项】 本品性燥,阴虚火旺及痈肿溃后则禁服用。

【备考】 白芷与细辛均治牙痛,但白芷治齿龈连面颊疼痛较好,而细辛治齿髓痛,夜间痛为优。白芷与羌活均治头痛,但羌活归膀胱经,故头痛连及项背者多用之;白芷入足阳明胃经,治头额痛、眉棱骨痛、鼻渊头痛、牙痛等多种疼痛。

细 辛 Herba Asari

【来源】 为马兜铃科植物东北细辛 *Asarum heterotropoides* Fr. Schmidt var. *mandshuricum* (Maxim.) Kitag. 或华细辛 *A. sieboldii* Miq. 的全草。

【成分药理】

成分: 北细辛和华细辛均含有挥发油, 其组成基本相同。主要成分有甲基丁香油酚、黄樟油醚等。两种细辛的根中均含有木脂素类化合物左旋细辛素。

药理: ①细辛挥发油具有解热、镇静、镇痛、抗炎作用。②细辛醇浸剂、煎剂及挥发油有局部麻醉作用。③甲基丁香油酚具有松弛气管平滑肌作用。④细辛水或乙醇提取物有抗变态反应及抗组胺作用。本品具有一定毒性, 浸出液毒性大于煎剂。挥发油对小鼠、兔先兴奋, 后抑制, 最后因呼吸麻痹而死。

【药性】 味辛, 性温。有小毒。归肺、肾经。

【功能】 祛风解表, 散寒止痛, 温肺化饮, 宣通鼻窍。

【临床应用】

1. 祛风解表: 用于①风寒表证, 鼻塞, 头身疼痛明显者, 常配羌活、防风等辛温解表药, 如九味羌活汤; 若素体阳虚, 感冒风寒, 恶寒发热, 身倦欲卧, 舌苔水滑, 脉沉者, 可与麻黄、附子同用, 以助阳温经发汗, 如麻黄附子细辛汤。

2. 散寒止痛: 用于①风冷头痛, 可与川芎、防风、白芷等同用, 如川芎茶调散。②牙痛, 属风寒者, 可用单味细辛煎汤含漱, 或配川乌、乳香、白芷等研末擦患处; 属胃火牙痛者, 配石膏以泻火止痛。③风寒湿痹, 关节疼痛, 常配独活、防风、秦艽等, 如独活寄生汤。

3. 温肺化饮: 用于寒饮咳嗽, 痰多清稀者, 常配麻黄、干姜、五味子, 如小青龙汤、苓甘五味姜辛汤。

4. 宣通鼻窍: 用于①鼻渊, 鼻塞不通, 时流清涕, 常配辛夷、白芷等同用。②中风卒倒, 不省人事, 用细辛末吹鼻取嚏, 以醒神开窍。③气闭性耳聋, 将细辛为末, 溶黄蜡为丸, 如鼠矢大, 绵裹一丸塞之。

此外, 本品常用于治疗口舌生疮, 配黄连末搽患处, 或以细辛末水调敷于脐部, 每日一换, 连用3日。配川乌、急性子, 共研细末, 涂于牙龈上, 作拔牙时麻醉止痛剂用。

现代常用于感冒、风湿性关节炎、慢性气管炎、支气管哮喘、慢性鼻炎、副鼻窦炎、口腔炎、牙痛、牙龈炎、血管神经性头痛等疾病。

【用法用量】 治痰饮喘咳, 蜜炙用, 余皆生用。内服: 煎汤, 生用1.5~3g; 蜜炙, 2~6g; 研末服0.5~2g。外用: 适量, 研末吹鼻或外敷。

【注意事项】 本品性味辛烈, 辛散太甚, 能耗散正气, 因此用量宜少不宜多。凡气虚多汗, 阴虚火旺, 血虚头痛及阴虚咳逆等证, 均禁服。反藜芦。

【制剂】 细辛注射液: 每2ml相当于细辛2g。肌注1次2~4ml, 1日2次。功能清热解毒。用于急性咽喉炎、支气管炎等呼吸道感染。

【备考】 传统有“辛不过钱”之诫, 目前有人主张不必受此所限, 临床应用较大剂量者不乏其例。对此, 现代实验表明, 细辛用粉末与入汤剂, 其药力有明显差别, 故其用量不可等同对待, 在相同剂量下, 细辛根末中的含量近乎细辛全草煎煮10分钟后的3倍; 又在相同剂量下, 根末所含挥发油中有毒成分黄樟醚的含量, 是全草煎煮10、20、30分钟后的4、12、50倍(上海中医药杂志1987; 9: 2)。可见应用散剂必须慎重, 不可任意加大, 入汤剂可酌情增加, 但也不要妄用大剂量。

藁 本

Rhizoma Ligustici

【来源】 为伞形科植物藁本 *Ligusticum sinense* Oliv. 或辽藁本 *L. jeholense* Nakai et Kitag. 的根茎及根。

【成分药理】

成分: 藁本含3-丁基酞内酯、蛇床内酯、甲基丁香酚及挥发油0.3%。辽藁本含挥发油1.5%。

药理: ①挥发油对中枢神经有镇静、镇痛作用; 有抑制流感病毒作用。②煎剂在体外对许蓝氏毛癣菌等皮肤真菌有抑制作用。

【药性】 味辛, 性温。归膀胱经。

【功能】 祛风胜湿, 散寒止痛。

【临床应用】 用于①外感风寒头痛, 或巅顶脑后俱痛, 或痛连齿颊; 风湿头痛, 头风, 偏头痛, 以及鼻炎、鼻窦炎引起的头痛, 临床常与细辛、川芎、白芷、苍耳子等同用。②痹症初起, 腰背及关节冷痛, 可配羌活、防风等同用。③治脘腹痛, 藁本能温散寒湿; 伴泄泻者, 可配苍术或加香附等, 如藁本汤; 寒凝气滞之疝瘕腹痛, 则多配吴茱萸、小茴香等。

此外, 本品外用能祛皮肤中风湿; 单味煎汤洗浴, 可治小儿疥癣; 配白芷为末作面脂, 可治粉刺、酒皰鼻; 亦可去头屑, 研末掺发内。

【用法用量】 生用。内服: 煎汤, 3~10g。外用: 适量, 煎水洗, 或研末涂敷。

【注意事项】 本品辛温性燥, 阴虚、血虚、温病头痛者禁服。

香 薷 Herba Elsholtziae

【来源】为唇形科植物海州香薷 *Elsholtzia splendens* Nakai ex. F. Maekawa 的地上部分。

【成分药理】

成分:含挥发油。

药理:①挥发油有抗菌、发汗解热作用,并可刺激消化腺分泌及胃肠蠕动。②能使肾小球充血,滤过压增大而有利尿作用。

【药性】味辛,性微温。归肺、脾、胃经。

【功能】发汗解表,祛暑化湿,利水消肿。

【临床应用】

1. 发汗解表、祛暑化湿:用于①夏季外感风寒或暑湿之恶寒、发热、无汗,头疼身痛,胸闷腹痛,呕吐泄泻者,常与厚朴、扁豆同用,如香薷散;若热重寒轻,烦渴汗不出者,与金银花、连翘、扁豆、厚朴同用,如新加香薷饮。②霍乱,如腹痛,吐泻不止,恶寒不渴,手足厥逆之阴霍乱者,可配肉桂、姜汁、木香等温中祛寒之品;治吐泻而大热烦渴的热霍乱,可与川连、滑石等清热化湿药同用。

2. 利水消肿:用于水肿小便不利,对风水尤为适宜。可单用,如一味香薷煎;也可与茯苓、车前子等利水渗湿药同用;或以香薷浓煮取汁,和白术为丸服,如薷术丸(《深师集方》)。

此外,本品配橘核、小茴香、槟榔、木瓜等行气化湿药同用,可治疗寒湿疝气;水煎含漱,还能除口臭;鲜品外用捣敷,治脓性指头炎等。

【用法用量】生用。内服:煎汤,3~9g。解表不宜久煎,用于水肿宜久煎浓缩服。

【注意事项】①本药宜凉饮,热饮则易致呕吐。②体弱易出虚汗者,及烈日曝晒之中暑高热,有烦渴、大汗之阳暑证禁服。

辛 夷 Flos Magnoliae

【来源】为木兰科植物望春玉兰 *Magnolia biondii* Pamp.、玉兰 *M. denudata* Desr. 或武当玉兰 *M. sprengeri* Pamp. 等的花蕾。

【成分药理】

成分:望春玉兰花蕾含松树脂醇二甲醚、望春花素、发氏玉兰素等木脂体成分。玉兰花蕾含挥发油,内有柠檬醛、丁香油酚、茴香醚等。

药理:①挥发油有收缩鼻粘膜血管作用及抗组织胺作用。②花苞干燥粉末的水、醇提取物对多种动物均有降低血压效果。③辛夷煎剂和流浸膏对子宫有明

显的兴奋作用。④在试管中辛夷煎剂对多种致病皮肤真菌有较强抑制作用。

【药性】味辛,性温。归肺、胃经。

【功能】散风寒,通鼻窍。

【临床应用】用于:①外感表证,头痛,鼻塞,常配防风、羌活、白芷等同用。②鼻渊,鼻流清涕,喷嚏不止,属风寒者,每与细辛、白芷、防风、川芎等同用,如辛夷散;若鼻流浊涕,色黄腥臭,属风热者,可与苍耳子、薄荷、白芷、石膏、黄芩等同用;若病程较久,浊涕如脓,腥臭难闻,鼻塞不闻香臭,属胆热上犯者,可与柴胡、山梔、贝母、玄参等清泄肝胆药配伍,如取渊汤。治鼻渊本品亦多外用,如与鹅不食草煎水滴鼻,或配鹅不食草、苍耳子、白芷、冰片等研末滴鼻。

现代常用于过敏性鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉等。

【用法用量】生用。内服:煎汤,3~10g,或入丸、散。本品因有细毛,入汤剂宜包煎。外用:适量,研末滴鼻,或水浸、蒸馏滴鼻。

【注意事项】本品辛温,易耗伤气阴,故鼻病见有气虚或阴虚火旺者慎服用。

【备考】

1. 辛夷、苍耳子均治鼻病,但苍耳子偏于散头部风湿,兼治头风头痛;辛夷偏于散上焦风寒,开宣肺窍,但两者常相须为用。

2. 治过敏性鼻炎:用蒸馏法将辛夷的挥发成分制成30%注射液,以1%狄卡因麻黄素棉片麻醉鼻腔双侧下鼻甲前端3~5分钟,于双侧下鼻甲前端粘膜下各注入本剂1ml,用棉球压迫半小时后取出,隔日1次,10次为一疗程,共治疗202例,暂时治愈148例,好转50例,无效4例,临床有效率98%,一般注射1~3次起效,仅少数需进行第二疗程(中西医结合杂志1984;12:728)。

苍 耳 子 Fructus Xanthii

【来源】为菊科植物苍耳 *Xanthium sibiricum* Patr. 带总苞的果实。

【成分药理】

成分:果实含苍耳子甙、树脂、脂肪油、生物碱、维生素C、β-谷甾醇、豆甾醇等。

药理:①苍耳子甙有明显的降血糖作用。②苍耳子煎剂在体外对金黄色葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌等有抑制作用,其醇提取物对红色毛癣菌有抑制作用。③种仁有毒,其水溶性成分给动物后可见活动减少、反应迟钝,死前呼吸极度困难,伴阵发性惊厥,主要病理改变为肝损害和肾变性,肺和脑充血、水肿。异丙嗪对中毒有解救作用。