



第二集

福建中医研究所中药研究室編

福建人民出版社

目 录

一、菊科.....	(1)
(一)艾 (二)鬼針草 (三)大薊 (四)蒺藜 (五)一点紅 (六)鼠麴草 (七)澤蘭 (八)向日葵 (九)獨脚蓮 (十)黃花絲 簽草	
二、桔梗科.....	(9)
羊乳	
三、葫蘆科.....	(10)
土瓜	
四、忍冬科.....	(11)
接骨木	
五、茜草科.....	(13)
茜草	
六、車前科.....	(14)
車前草	
七、茄科.....	(15)
枸杞	
八、唇形科.....	(16)
夏枯草	
九、馬鞭草科.....	(17)
(一)牡荆 (二)臭牡丹	
十、蘿藦科.....	(19)

(一) 徐長卿 (二) 球蘭

- 十一、报春花科 (21)
星宿菜
- 十二、桃金娘科 (22)
桃金娘
- 十三、胡頹子科 (23)
胡頹子
- 十四、金絲桃科 (25)
地耳草
- 十五、錦葵科 (26)
木芙蓉
- 十六、大戟科 (27)
烏柏
- 十七、芸香科 (28)
芸香
- 十八、豆科 (30)
紫云英
- 十九、薔薇科 (31)
(一) 金櫻子 (二) 蛇葡萄 (三) 塞藤
- 二十、虎耳草科 (34)
虎耳草
- 二十一、樟科 (35)
山胡椒
- 二十二、木兰科 (36)
南五味子

二十三、防己科	(37)
千金藤	
二十四、小蘖科	(38)
細叶十大功劳	
二十五、毛茛科	(39)
毛茛	
二十六、馬齒莧科	(40)
馬齒莧	
二十七、莧科	(41)
曲節草	
二十八、蓼科	(42)
赤地利	
二十九、馬兜鈴科	(43)
杜衡	
三十、桑科	(44)
葎草	
三十一、石蒜科	(46)
石蒜	
三十二、百合科	(47)
(一)蘆薈 (二)菝葜 (三)沿階草	
三十三、百部科	(50)
百部	
三十四、灯心草科	(51)
灯心草	
三十五、鴨跖草科	(52)

(一)竹叶菜	(二)吊竹梅
三十六、谷精草科	(54)
白珠谷精草	
三十七、天南星科	(55)
蚤休	
三十八、禾本科	(56)
(一)狗尾草	(二)蟋蟀草
三十九、松柏科	(58)
側柏	
四十、卷柏科	(59)
兗州卷柏	
四十一、蕨科	(61)
(一)亨氏綫蕨	(二)鵝掌金星草
四十二、水龙骨科	(63)
石葦	

一、菊科

(一) 艾

俗名叫艾草，是多年生草本植物，自生于山野、荒地。莖高可达三尺許。叶羽狀分裂，背面密生白毛，互生，有香气。夏秋間，莖梢着生淡褐色頭狀花，穗狀排列（图1）。

性味和功能：苦微溫无毒。能溫氣血，逐寒湿、調經安胎，止血解熱。凡陰虛血熱者忌用。

民間效用：

1. 治風寒、身熱、頭痛——取干的艾葉三至五錢，酌加水煎成半小碗，溫服。蓋被令微汗出。

2. 治久痢不愈——取艾葉三錢，陳皮三錢，酌加水煎成半

42
—
14—
—
公分



图1

碗，饭前服，日两次。

3. 艾叶晒干揉搓成绒，可作灸剂。

4. 治风湿顽痹——取全草一握，煎汤薰洗。

(二) 鬼針草

俗名叫山东老鵝草、鬼黃花，为湿草类之野生草本，自生于原野、池畔、湿地。莖高可达二、三尺。叶三出，二回羽狀裂叶，对生。秋末，枝梢着生黄色头狀花，有少数舌狀花冠。开花后結果，頂尖有刺毛四、五条，会粘人的衣服(图2)。

性味和功能：苦平无毒。能散瘀活血，消痛解毒。

民間效用：

1. 治蛇伤、虫咬—取鮮的全草二两，酌加水煎成半碗溫服。渣搗烂涂貼伤口，日如法两次。

2. 治气性坏疽(俗称“崩台”病)—取鮮的全草，用冷开水洗净，和水煎湯薰洗。

3. 治跌打损伤—取鮮的全草一至二两(干的减半)，和水煎，另加黃酒一两，溫服。日服一次，一般連服三次。



图2

—24

—8

公分

(三) 大薊

俗名叫猪姆刺、六月霜、鸡姆刺、蟻姆刺、利叶刺，为多年生

宿根草本，自生于山野間。根呈長紡錘狀。莖有稜角形，有刺，高达二、三尺。葉羽狀分裂，邊緣多刺。葉與莖都有茸毛。入秋，梢上分枝着生紫紅色或白色的頭狀花，花梗較短，花冠筒狀高出總苞（圖3）。

性味和功能：甘寒
无毒。能涼血止
血，消炎退肿。凡
属寒冷体质或挾有
外感者禁忌內服。

民間效用：

1. 治湯火燙傷
——取新鮮的根，
以冷開水洗淨后搗
烂，包麻布炖熱絞
汁涂抹，日二、三
次。

2. 治肺熱咳血
——取鮮的根一
两，洗淨后杵碎，
酌加冰糖半两，和
水煎成半碗，溫服，日服两次。

3. 治漆疮（即俗称漆咬，因遇漆过敏而遍身发生疹痒）——
取鮮的根一握洗淨，加些桐油搗烂，用麻布包炖熱絞汁涂抹，日
三、四次。

4. 治疗癩疮瘍灼热赤肿者——取鮮的根和冬蜜搗匀貼患处，




图3

日換兩次。

5. 治熱結血淋——取鮮的根一至三兩，洗淨搗碎，酌沖開水泡一小時，飯前服，日服三次。

(四) 茼 菜

俗名叫蚯疽草，為一年生草本，自生于原野荒地。莖高尺余，上部分枝。葉橢圓形，通常羽狀分裂，互生。夏秋之交，頂開白色小頭狀花，略成小穗狀（圖4）。

性味和功能：苦辛平。能消肿解毒，清热利尿。

民間效用：

1. 治小兒生殖器生蚯疽，
濕肿，小便不利（是蚯蚓毒的
誘因）——取鮮的葉和冬蜜搗
烂敷貼，但用布包裹時，不得
包太緊。

2. 治疗毒肿痛——取鮮的
葉和米稀飯，加食鹽少許，搗
烂敷貼，日換二次。




图4

(五) 一 点 紅

俗名叫叶下紅、喇叭紅草，為一年生草本，自生于原野路

旁。莖高尺余。葉互生，下部的葉略呈圓形，有葉柄；上部的葉常呈羽狀分裂，無柄，抱莖而生，葉背面帶些赤紅色。夏秋間，枝端分枝開淡紅色頭狀花（圖5）。

性味和功能：辛溫无毒。能活血消肿，利尿逐水。



图5

民間效用：

1. 治水腫——取鮮的全草和燈心草各二兩，酌加水煎成半碗，飯前服，日兩次。
2. 治婦人乳痛初起——取鮮的葉、莖一握，加些紅糖，共搗爛加熱敷貼。
3. 治無名肿毒、對口瘡——取鮮的葉一握，加些紅糖，共搗爛敷貼，日換兩次。

（六）鼠 麝 草

俗名叫佛耳草、蕷婆草，為二年生草本，自生于原野荒地。莖從基部分枝直立，高达七、八寸。葉倒披針形，密生柔軟的白毛。互生。春夏間，枝端簇生黃色頭狀花（圖6）。

性味和功能：甘平无毒。能和中益氣，止洩除痰，并治風寒痰咳。

民間效用：

1. 治感冒咳嗽——取全草五至八錢，酌冲开水，炖一小时，温服。
2. 用叶、花洗净和米粉作糕食，能健胃益气。

(七) 泽蘭

俗名叫孩儿菊、白垢草、普息草，为多年生草本，自生于

河畔、路旁低湿地。莖带紫色，被有粗涩的毛。叶广披针形，边缘有锯齿，通常不分裂，对生。秋日，莖梢分枝开白色或带些紫色的繖房头状的花。全草含有芳香的气味（图7）。

性味和功能：苦辛微温无毒。能和血逐水，行瘀通经。

民間效用：

1. 妇人月經不調——用鮮的全草五至八錢（干的三至五錢），酌加水煎，另加黃酒二两，取一茶杯許，饭前服，日两次。

2. 治跌打损伤、风湿顽痹——取

全草一握，煎湯薰洗。

3. 治妇人产后水肿——取澤蘭叶和防己等量为末，每次二



图6

— 18 —

— 9 —

公分




图7

公分

適，用黃酒送下，飯前服，日两次。

(八)向 日 葵

俗名叫向阳花，为一年生草本，多栽培于庭園中。莖高达五、六尺，被有茸毛。叶呈广心脏形，有长柄。八、九月間，莖頂和枝梢着生黃色盤形头狀花，周圍有环黃色的舌狀花冠，内部生多数筒狀花。开花后結多数瘦果(图8)。

36—



图 8

性味和功能：甘溫无毒。能利小便，清湿热，通窍逐风，滑胎催产。

民間效用：

1. 治风热挟湿头痛——取干的花盘八錢至一两(或加鵝蛋一个)，和水煎成半碗，饭后服，日两次。
2. 治血痢——取子一两，冲开水炖一小时，加些冰糖服。

(九)独 脚 蓼

俗名叫蓮蓬草，为多年生草本，自生于山野阴湿地。地下根块形状似羌有白，附生多数须根。叶从根生，呈圓腎脏形，質厚，有光澤；叶面呈深綠色，叶背被有茸毛，边缘有粗鋸齒；叶柄长，質脆。夏日，从根抽莖分枝着生黄色头狀花(图9)。

性味和功能：辛溫无毒。能消痈散結，除痰化鬱。

民間效用：



图9

- 36 根二至三两或加夏枯草（图17）一两，酌加黃酒和水各半，煎取半碗，飯后服，日两次。或取叶炒鸡蛋服。
- 9 —
2. 治妇人乳痛 初起（俗称內吹、外吹的乳結肿）——取鮮草全株洗淨加紅糖，共搗烂加热敷公分貼。

3. 治疗疮潰瘍——取鮮的全叶，用銀針密刺細孔，以米湯或开水泡軟，敷貼疮口，日換二至三次。

(十) 黃花豨莶草

俗名叫黃花草、豬母菜、粘糊菜，为一年生草本，自生于原野間。莖高一至二尺。叶呈卵圓形，先端尖，邊緣有鋸齒，互生。莖叶都生有茸毛。秋日，莖梢着生黃色小头狀的花；花下有狭长的总苞片，生有粘毛，容易粘人衣服（图10）。

性味和功能：苦寒有小毒。能搜风除湿，解毒療瘧。

民間效用：



图10

— 60
— 12
—
公分

1. 治湿疹、疥疮瘙痒——

取全草二至三两（干者一两），酌加水煎成半碗，温服，日两次。另外取全草一握，煎汤浴洗。

2. 治风湿顽痹，腰膝痠楚——

取根二至三两同猪脚（七寸）一只，黄酒四两，酌加水煎，分二至三次服。

3. 治高血压——以鲜的全

草二两和臭梧桐二两，酌加水煎成半碗，日服两次。

二、桔梗科

羊 乳

俗名叫土乳参、奶树，为多年生蔓性草本，自生于山野间。根呈块状。茎蔓延缠绕他物而生。叶阔披针形，全缘，对生，枝端往往四叶相接。夏秋间，开广形针状花，钟缘五裂，裂片尖而反卷；外面绿白色，内面有暗紫色斑点（图11）。

12—

公分



性味和功能：甘微澀平。能活血催乳，民間用作滋養強壯藥。

民間效用：

1. 治過力疲倦——取根块一至二两和猪脚（七寸）或猪赤肉六两，酌加黃酒和水各半煎服。

2. 治妇人乳汁不通——取根块一至二两和猪赤肉八两，酌加黃酒或酒水各半，炖一小时，饭后服。日服一次，連服三至五次。

三、葫蘆科

土 瓜

俗名叫杜瓜、鵝蛋瓜，为多年生蔓草，生于原野、路旁或石縫間。根呈块狀。莖瘦長有卷須。叶淺三裂或五裂，下部的叶分裂較

深，粗澀而生茸毛，有叶柄，互生。夏日，叶腋开白色絲狀的花。开花后結淡綠色椭圓的果，熟呈紅色（图12）。

性味和功能：苦寒无毒。能泻热利水，行血化瘀，用作利尿和通經藥。

民間效用：

1. 治痈疽初起，
藤瓜蕷——取根块二
至四两，酌加水煎成半碗，日服两次。渣和紅糖搗烂加热敷貼。
2. 治妇人乳汁不通——取根块晒干研末，每用二錢，用热黃酒送下，日服两次。

9
—
—
—
—
—
—
—
—
分公



图12

四、忍冬科

接骨木

俗名七叶金、透骨草，为落叶小灌木，自生于原野間。莖高六、七尺，髓部很发达。叶为羽状复叶，对生。早春抽新芽，

簇生多數白色小花。开花后結赤色小漿果（图13）。

性味和功能：酸平无毒。能活血行瘀，續接骨伤。



图13

民間效用：

1. 治风湿性关节炎痛——取根三至四两，鮮豆腐四至五两，酌加开水或紅酒炖服。
2. 治跌伤骨折——取鮮的叶一握，黃枝子五錢，和老酒或紅糟捣烂敷貼。