



MINGGUI HUAHUI

JIANSHANG YU YANGHU

名贵花卉鉴赏与养护

王意成 刘树珍 王 翔 编著



江苏科学技术出版社

MINGGUI HUAHUI
JIANSHANG YU YANGHU

名贵花卉鉴赏与养护

王意成 刘树珍 王 翔 编著



江苏科学技术出版社

前言

千姿百态、万紫千红的花卉正在为越来越多的人所青睐。随着我国经济的快速发展、国际交往的日益频繁,花卉业也正在大踏步地走向世界。由此,花卉所涉及的面也愈来愈宽,花卉的种类年年出新,时尚花卉更是层出不穷。我国早期曾掀起了“君子兰热”、“郁金香热”,继而是“观赏凤梨热”、“观叶植物热”,至今又出现了“洋兰热”、“金琥热”,等等。在一浪又一浪的花卉热中,花卉经营者给花卉起了不少吉祥、赞美的名字;在报刊上,由于花卉名称的接近也出现了不少误认,把紫荆当洋紫荆,洋桔梗用桔梗的描述,非洲紫罗兰认作紫罗兰等;再有,同属植物的花卉,外形上比较相似,也出现许多张冠李戴的现象。由于花卉种类的混淆,给花卉爱好者在繁殖和养护上带来一定困难。

编写本书的目的,就是为花卉爱好者在养花、赏花过程中能正确识别花卉,有针对性地采取措施,养护好自己喜爱的花卉,为花所乐。根据目前家庭养花最常见的种类,本书精选出约 200 个条目,分为草本花卉、木本花卉、观叶植物和多浆花卉四大类,介绍它们的主要识别点、简要的养护方法,并配有精美彩图,以供花卉爱好者参考。条目按花卉属名的字母顺序排列。

由于我们的水平有限,错误与不妥之处,敬请读者批评指正。

编者
2002 年 9 月





目 录

草本花卉

- 百子莲与孤挺花 2
- 藿香与藿香蓟 3
- 红姜与姜黄 4
- 蜀葵与锦葵 5
- 欧洲银莲花与花毛茛 6
- 金鱼草与随意草 7
- 四季秋海棠与球根秋海棠 8
- 风铃草与桔梗 10
- 大花美人蕉与食用美人蕉 ... 11
- 长春花与长春蔓 12
- 卡特兰与蝴蝶兰、大花蕙兰 ... 13
- 青葙与鸡冠花 15
- 大花君子兰与垂笑君子兰 ... 16
- 波斯菊与大花金鸡菊 18
- 春兰与蕙兰 19
- 墨兰与建兰 20
- 飞燕草与耧斗菜 21
- 菊花与小菊 22
- 石竹与香石竹 24
- 洋桔梗与桔梗 25
- 勋章花与天人菊 26
- 艳红蝎尾蕉与垂花蝎尾蕉 ... 27
- 黄花菜与萱草 28
- 朱顶红与中肋朱顶红 29
- 风信子与葡萄风信子 31
- 苏丹凤仙与新几内亚凤仙 ... 32
- 牵牛与矮牵牛 33
- 德国鸢尾与球根鸢尾 34
- 花菖蒲与黄菖蒲 36
- 百合与卷丹 37
- 红花石蒜与红蓝石蒜 38
- 夏水仙与换锦花 39
- 忽地笑与长筒石蒜 40
- 紫罗兰与非洲紫罗兰 41
- 薄荷与马薄荷 43
- 芭蕉与红花蕉 44



- 水仙与黄水仙 45
- 明星水仙与红口水仙 46
- 莲花与美国黄连 47
- 纳里花与石蒜 48
- 睡莲与红睡莲 50
- 硬叶兜兰与杏黄兜兰 51
- 芍药与牡丹 52
- 天竺葵与大花天竺葵、蔓性天竺葵
..... 54
- 五星花与龙船花 55
- 福禄考与宿根福禄考 56
- 半支莲与大花马齿苋 58
- 鄂报春与藏报春、欧报春 59
- 金光菊与黑心菊 60
- 一串红与一串蓝 61
- 瓶子草与捕蝇草、猪笼草 63
- 鹤望兰与白花鹤望兰 65
- 万寿菊与孔雀草 66
- 三色堇与夏堇 67

- 万带兰与石斛兰 68
- 葱兰与红花葱兰 70

木本花卉

- 三角槭与鸡爪槭 72
- 红枫与红叶羽毛枫 73
- 水杨梅与杨梅 74
- 米兰与大叶米兰 76
- 紫荆与洋紫荆 77
- 虾夷花与金苞花 78
- 鸳鸯茉莉与茉莉 79
- 黄杨与大叶黄杨 80
- 紫珠与华紫珠 82
- 夏蜡梅与美国蜡梅 83
- 山茶与茶梅 84
- 巨紫荆与黄山紫荆 85
- 香樟与天竺桂 87
- 佛手与香橼 88
- 铁线莲与西番莲 89



- 臭牡丹与龙吐珠 91
- 瑞香与结香 92
- 老鸦柿与君迁子 93
- 狗牙花与梔子花 94
- 象牙红与刺桐 95
- 金橘与金弹 96
- 气球花与钉头果 97
- 木芙蓉与木槿 99
- 扶桑与吊灯花 100
- 金丝桃与金丝梅 101
- 冬青与枸骨 102
- 紫薇与银薇、翠薇 104
- 贯叶忍冬与金银花 105
- 檵木与红花檵木 106
- 白玉兰与紫玉兰、广玉兰 ... 107
- 夜合花与木莲 109
- 含笑与乐昌含笑 110
- 金桂与银桂、丹桂 111
- 石楠与桤木石楠 113

- 日本五针松与白皮松 114
- 跳枝梅与垂枝梅 115
- 火棘与黄果火棘 116
- 毛鹃与西鹃、云锦杜鹃 117
- 木香与重瓣黄木香 119
- 月季与蔷薇、玫瑰 120
- 金樱子与刺梨 122
- 麻叶绣线菊与日本绣线菊 ... 123
- 黄花夹竹桃与夹竹桃 124
- 荚蒾与琼花 125
- 海仙花与锦带花 127

观叶植物

- 金边红桑与皱叶红桑 130
- 海芋与象耳芋 131
- 美叶观音莲与龟甲观音莲 ... 133
- 楼氏海芋与克拉琳花烛 134
- 雁来红与老枪谷 135
- 南洋杉与锥叶南洋杉、广叶南洋杉



- 136
- 桃叶珊瑚与洒金东瀛珊瑚 ... 138
- 眉毛秋海棠与虎斑秋海棠 ... 139
- 铁十字秋海棠与彩纹秋海棠
..... 141
- 水塔花与狭叶水塔花 142
- 花叶芋与银斑芋 143
- 天鹅绒竹芋与彩虹竹芋 144
- 白纹草与金边吊兰 145
- 变叶木与彩叶木 147
- 绒叶小凤梨与虎斑小凤梨 ... 148
- 苏铁与阔叶苏铁 149
- 中斑香龙血树与白纹龙血树 .. 151
- 红边竹蕉与红边朱蕉 152
- 猩猩草与银边翠 153
- 花叶垂榕与金叶榕 154
- 常春藤与加那利常春藤 155
- 蒲葵与圆叶轴榈 156
- 十大功劳与阔叶十大功劳 ... 157

- 龟背竹与多孔龟背竹 159
- 发财树与木棉 160
- 爬山虎与五叶地锦 161
- 西瓜皮椒草与皱叶椒草 163
- 斑叶豆瓣绿与斑叶垂椒草 ... 164
- 冷水花与皱叶冷水花 165
- 棕竹与观音竹 166
- 金叶木与金脉单药花 167
- 密脉鹅掌柴与斑叶鹅掌藤 ... 169
- 合果芋与长耳合果芋 170
- 铁兰与黄苞铁兰 171
- 老人须与章鱼凤梨 172
- 水竹草与吊竹梅 173


多茎花卉

- 雷神与鬼脚掌 176
- 翡翠殿与索马里芦荟 177
- 星球与鸾凤玉 178
- 珊瑚树与将军 179



- 照波与宝绿 180
- 白雪光与黄雪光 181
- 紫龙角与玉牛掌 182
- 翁柱与白云锦 183
- 山吹与红山吹 185
- 熊童子与绒毛掌、褐斑伽蓝 ... 186
- 金星与琴丝 188
- 金琥与狂刺金琥 189
- 金龙与白元虾 190
- 五刺玉与剑恋玉 191
- 幻乐与老乐 192
- 春峰与春峰之辉 194
- 白桦麒麟与姬麒麟、火麒麟 ... 195
- 布纹球与法利达 197
- 彩云阁与红彩云阁 198
- 虎须与狮子坡 199
- 江守玉与巨鹭玉 200
- 沙鱼掌与孔雀扇 201
- 瑞云牡丹与绯牡丹 202
- 龙王球与大碇 203
- 玉章与寿宝殿 204
- 条纹十二卷与点纹十二卷 ... 205
- 蛇皮掌与琉璃殿 206
- 宽叶落地生根与棒叶落地生根
..... 207
- 花叶川莲与白姬舞 208
- 长刺白龙与白玉兔 209
- 朝霞与猩猩球 210
- 彩云与蓝云 212
- 金晃与红小町 213
- 黄毛掌与白毛掌、红毛掌 214
- 惠比须笑与白马城 215
- 棒捶树与亚阿相界 216
- 蟹爪兰与仙人指 217
- 翡翠景天与耳坠草 219
- 厚叶景天与金景天 220
- 念珠掌与大弦月城 221
- 叠叶草与茜之塔 223

草本花卉



百子莲与孤挺花

百子莲又名非洲百合、紫君子兰，石蒜科百子莲属植物。花色蓝紫，花形秀丽，有“爱之花”之称。至今，在欧美和南非栽培普遍，是极佳的室内和庭园装饰花卉。

孤挺花又名百子莲、柱顶红，石蒜科孤挺花属植物。花枝亭亭玉立，4朵喇叭形花朵着生顶端，朝阳开放，艳丽悦目，在欧美常作“罐装花卉”。

它们虽同属石蒜科，但在花形、花色上有较明显的区别。名称上，都有“百子莲”的叫法。



识别

百子莲 (*Agapanthus africanus*)，多年生草本。根状茎肉质。株高80厘米。叶带状，浓绿色。花葶直立，伞形花序，着生小花20~40朵，钟状漏斗形，蓝紫色。

孤挺花 (*Hippeastrum vittatum*)，多年生草本。鳞茎肥大，近球形。叶带状。花茎中空，顶生漏斗状花朵。



养护

百子莲原产非洲南部，喜温暖湿润和半阴环境。孤挺花原产巴西、秘鲁。喜温暖湿润和阳光充足环境。孤挺花较百子莲稍耐寒，鳞茎在0℃不受冻，百子莲冬季温度不低于4℃，土壤以富含有机质的沙质壤土为宜。常用分株繁殖，一般2~3年分株1次，也可用播种繁殖，发芽适温为18~22℃。播种苗均需3~4年才能开花。



百子莲



孤挺花

藿香与藿香蓟

藿

藿香又名排香草、土藿香，唇形科藿香属植物。在我国栽培历史悠久，是芳香化湿的重要中药。当密集的淡紫红色花盛开时，优美雅致，适用于花境、池畔和庭园成片栽植。

藿香蓟又名胜利蓟、熊耳草，菊科藿香蓟属植物。株丛矮小繁茂，蓝色花朵密集，素雅醒目，常用于花坛边缘、栽植槽栽植或作插花观赏。

两者不同科，花的结构上差别大。不过它们都有“藿香”两字，花色、叶形也较接近，容易混淆。



识别

藿香 (*Agastache rugosa*)，多年生草本。株高 70~100 厘米，茎直立多分枝，四棱形。叶对生，卵圆形，具薄荷味。轮伞花

序，集成穗状，顶生，花唇形，淡紫红色。

藿香蓟 (*Ageratum houstonianum*)，多年生草本。植株丛生而紧密，上部多分枝。叶卵圆形，表面皱缩。头状花序，聚伞状着生枝顶，花小，具蓬松毛，淡紫红色。



养护

藿香原产我国，而藿香蓟原产墨西哥和秘鲁。均喜温暖、湿润和阳光充足环境。藿香地上部不耐寒；藿香蓟不耐寒，幼苗越冬温度为 10℃。怕高温。宜肥沃、疏松和排水良好的沙质壤土。藿香以播种和分株繁殖；藿香蓟常用播种和扦插繁殖，发芽适温 16~18℃。藿香越冬宿根 5~6 月出苗后可移植或盆栽；藿香蓟要摘心，促使多分枝，以利矮化多花。一般盆栽 12~14 周可开花。



藿香



藿香菊

红姜与姜黄

红姜又名红山姜，姜科山姜属植物。姿态优美，深绿叶片，夏日抽出鲜红圆锥花序，似火炬，异常醒目。

姜黄又名姜花、黄丝郁金，姜科姜黄属植物。花形新奇别致，花色娇艳，清雅秀丽，是目前国际上十分流行的切花和庭园配植材料。其干燥的根茎是咖喱粉的主要原料，印度菜肴和辣泡菜都用姜黄根来调味、着色。嫩枝及花序在泰国当蔬菜食用。

两者同科不同属，圆柱状花序极其相像。不过姜黄须根末端膨大成指头大小的块根，中药上叫“郁金”；而红姜没有。



识别

红姜 (*Alpinia purpurata*)，多年生草本。根茎匍匐状，具节。株高2~3米，茎丛生。叶2列，披针形。总状花序顶生，直立，苞片船形，红色，花小，白色。

姜黄 (*Curcuma domestica*)，多年生草本。根状茎粗壮，深黄色，极香。株高45~50厘米。叶莲座状，矩圆形。从叶鞘中抽出花葶，穗状花序圆柱状，苞片淡紫红色，花米黄色。



养护

红姜和姜黄都原产亚洲热带地区。喜高温多湿和半阴环境。不耐寒，怕干旱和强光曝晒。冬季温度不低于10℃。要求土层深厚、肥沃、含腐殖质丰富和保水性好的土壤。主要用分株繁殖，根茎上必须带顶芽，否则不易成苗。一般每隔2年分株1次。原产地也用播种繁殖，发芽适温为20℃。花期适当遮阴，可延长开花期，花后剪除茎枝，有利于萌发新株。



姜黄



红 姜

蜀葵与锦葵

蜀

葵又名熟季花、端午锦，锦葵科蜀葵属植物。植株健壮，栽培容易。花色丰富，花期又长，是庭园、花境的理想花卉。其根含软化黏质物，也是最早的软糖材料。

锦葵又名小熟季、钱葵，锦葵科锦葵属植物。植株较蜀葵矮小，花朵紫红色，十分可爱，是花境和绿化背景材料。其叶和嫩茎含有丰富的维生素，可当蔬菜食用；花可拌沙拉，根用于制作止咳糖浆。

蜀葵和锦葵同科不同属，有大小“熟季花”之称。蜀葵植株高大，花朵大，单生于叶腋，多见重瓣花；锦葵花小，3~5朵簇生于叶腋。



识别

蜀葵 (*Althaea rosea*)，多年生草本。高达 2.5 米。茎直立，不分枝。叶近圆形，常 5~7 浅裂。花大，直径 6~8 厘米，小苞片基部合生，花萼钟形。

锦葵 (*Malva sinensis*)，多年生草本。高 40~90 厘米。茎直立，多分枝。叶心状圆形，常 5~7 浅裂。花淡紫红色，径 2.5~4 厘米，小苞片卵形，花瓣倒心脏形，顶端微凹。




养护

蜀葵和锦葵均原产我国。喜温暖、湿润和阳光充足环境。适应性强，较耐寒，又耐干旱和半阴。宜土层深厚、肥沃和排水良好的壤土。它们主要用播种繁殖，发芽适温为 13~18℃，春播需第 2 年才能开花，种子有自播繁衍能力。也可用分株或扦插繁殖。分株在花后至春季抽梢前都能进行。扦插需 20~25 天生根。花后及时剪除枯萎花茎，以便再发新枝。生长多年的老株要挖出重新分株更新。



蜀 葵



欧洲银莲花和花毛茛

欧洲银莲花又名罂粟秋牡丹、法国白头翁，毛茛科银莲花属植物。茎叶优美。花大色艳，花形如同罂粟花，看似被风所吹开，曾有“风花”美称，是欧洲著名的春季花卉，适用切花和盆栽观赏。以色列把它选为国花。

花毛茛又名陆莲花，芹菜花，毛茛科毛茛属植物。株形秀丽。花形精巧，既像莲花，又似罂粟花，花色鲜艳诱人，是城市花坛、花境和花槽的新颖装饰材料。

欧洲银莲花和花毛茛同科不同属，花形和叶片极其相似，比较容易

混淆。但两者花的形态和地下部还是有较明显差别的。



识别

欧洲银莲花 (*Anemone coronaria*)，多年生草本。地下具褐色圆柱形根状茎。株高 25~40 厘米。根出叶 3 回羽裂。花单生，直立，无花瓣，花萼花瓣状，花色有白、红、紫、蓝等。

花毛茛 (*Ranunculus asiaticus*)，多年生草本。块根纺锤形。株高 30~40 厘米。根出叶 2~3 回羽状深裂，叶缘齿状。春季抽出花葶，萼片绿色，花以黄色为主。至今，也有红粉、白和双色品种。



养护

欧洲银莲花原产地地中海沿岸地区。花毛茛原产欧洲东南部和亚洲西北部。都宜凉爽、湿润和阳光充足环境。较耐寒，耐半阴，怕高温多湿和干旱。需肥沃、疏松和排水良好的沙质壤土。它们常用分株和播种繁殖，分株在 9~10 月，栽植前将根部先放在湿沙或水中浸泡，使之充分吸水，栽植后发芽整齐。欧洲银莲花发芽适温为 15~20℃。花毛茛发芽适温为 10~18℃。播种苗，欧洲银莲花需 2~3 年才能开花；花毛茛翌年春季开花。根部贮藏宜干不宜湿。





花毛茛

金鱼草与随意草

金鱼草又名龙头花、龙口花，玄参科金鱼草属植物。花茎挺拔，花形奇特，花色浓艳，花期又长，是园林中最常见的草本花卉。近年来又选育出超矮品种和杜鹃花型、蝴蝶型等新品种，观赏性更强，成为制作花篮、组景和室内装饰的主要花材。

随意草又名假龙头花、芝麻花，唇形科假龙头花属植物。株态挺拔，叶色翠绿，花朵排列有序，花色素

雅，是新颖的草本切花和盆栽材料。

两者不同科不同属，但它们整齐有序的花朵排列在挺拔的花茎上，看上去十分相像，故有龙头花和假龙头花之称。



识别

金鱼草(*Antirrhinum majus*)，多年生草本。株高20~100厘米。叶披针形。总状花序顶生，花冠筒状唇形，外有绒毛，基部膨大成囊状，花色有白、黄、红、紫和复色，喉凸顶部有明显黄斑。

随意草(*Physostegia virginiana*)，多年生草本。地下具匍匐状根茎。株高60~100

厘米。茎直立丛生。叶披针形。穗状花序顶生，每轮有花2朵，花唇形，筒长，唇瓣短，花色有白、淡紫、粉红和红色。



养护

金鱼草原产地中海地区。随意草原产北美。均喜温暖、湿润和阳光充足环境。较耐寒，不耐热和怕干旱。金鱼草主要用播种繁殖，发芽适温为21℃。幼苗的越冬温度为4~7℃。播种后60~70天可开花，盆栽需摘心或用0.05%~0.1%B-9液喷洒矮化处理。随意草可用播种和分株繁殖。发芽适温为18~24℃。早春萌芽前或花后进行分株，萌芽力强，残根留土中易萌发繁衍。每2~3年分栽1次。



金鱼草



随意草

四季秋海棠与球根秋海棠

四

季秋海棠又名四季海棠、洋海棠，秋海棠科秋海棠属植物。姿态优美，叶色娇嫩光亮，花朵成簇，四季开放，适用盆栽观赏，布置花坛、花槽，装点居室、橱窗和公共场所。

球根秋海棠又名茶花海棠、球根海棠，秋海棠科秋海棠属植物。花大色艳，兼具茶花、牡丹、月季、香石竹等名花的色、姿、香特点，是世界

著名的盆栽花卉,可用它装饰客厅、橱窗、阳台。

两者同科同属,四季秋海棠属须根类秋海棠,以花期长而著称,而球根秋海棠属球根类秋海棠,以花大色艳而闻名。



识别

四季秋海棠(*Begonia semperflorens*), 多年生草本。有发达的须根。茎直立,多分枝。叶互生,卵形,有绿、紫红或棕褐等变化。雌雄同株异花,聚伞花序腋生,花色有红、粉白等,单瓣或重瓣。

球根秋海棠(*Begonia tuberhybrida*), 多年生草本。块茎肉质,扁圆形。茎肉质,

直立。叶大,互生,倒心脏形。花大,有单瓣、半重瓣和重瓣之分,花色有红、白、黄、粉、橙等。



养护

四季秋海棠原产巴西。球根秋海棠为园艺杂种。四季秋海棠喜温暖、湿润和阳光充足环境。球根秋海棠需温暖、湿润和半阴环境,不宜超过 32℃。宜堆肥土、腐叶土和粗沙组成的混合土壤。四季秋海棠和球根秋海棠主要用播种繁殖,种子特别细小,播后不需覆土。发芽适温为 18~22℃。四季秋海棠也可用扦插繁殖。打顶摘心,控制株形是养好四季秋海棠的关键措施;块茎贮藏越冬和温度控制是球根秋海棠栽培是否成功的关键。



四季秋海棠