

# 精选 补遗总索引 新品种146种

JINGGUAN ZHIWU SHIYONG  
TUJIAN

编著 薛聪贤

简体字版审定 陈锡沐

景观植物实用图鉴

第13辑



百图集团

北京科学技术出版社

著作权合同登记号

图字：01-2002-0674 号

图书在版编目 (CIP) 数据

补遗·总索引新品种 146 种 / 薛聪贤编著. —北京: 北京科学技术出版社, 2002.5

(景观植物实用图鉴. 第 13 辑)

ISBN 7-5304-2645-1

I. 补... II. 薛... III. ①园林植物—图集②园林植物—索引 IV. S68-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 011309 号

百 通 集 团

|            |           |
|------------|-----------|
| 广东科技出版社    | 北京出版社     |
| 吉林科学技术出版社  | 中国建筑工业出版社 |
| 辽宁科学技术出版社  | 电子工业出版社   |
| 天津科学技术出版社  | 浙江科学技术出版社 |
| 河南科学技术出版社  | 云南科技出版社   |
| 安徽科学技术出版社  | 上海科学技术出版社 |
| 黑龙江科学技术出版社 | 江苏科学技术出版社 |
| 江西科学技术出版社  | 广西科学技术出版社 |
| 贵州科技出版社    | 北京科学技术出版社 |
| 四川科学技术出版社  |           |

---

出版发行：百通集团

北京科学技术出版社

原书制作：台湾普绿有限公司出版部

编 著 者：薛聪贤

原出版者：台湾普绿有限公司

责任编辑：崔燕京 张远文

特约编辑：谭 莉

印 刷：利丰雅高印刷（深圳）有限公司

经 销：各地新华书店

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：4.25

版 次：2002年5月第1版第1次印刷

定 价：48.00元

---



景观植物实用图鉴（第13辑）

# 补遗·总索引新品种146种

编著 薛聪贤 简体字版审定 陈锡沐



# 目录

## 一年生草花

- 苏木科 Caesalpinaceae  
望江南 ..... 6
- 蝶形花科 Fabaceae  
黄野百合 ..... 6
- 茄科 Solanaceae  
假酸浆 ..... 7

## 宿根草花

- 爵床科 Acanthaceae  
紫美花 ..... 7  
紫莉花 ..... 8  
早田爵床 ..... 8
- 苋科 Amaranthaceae  
橙花千日红 ..... 9
- 天南星科 Araceae  
香鹤芋 ..... 9
- 萝藦科 Asclepiadaceae  
彩冠花 ..... 10
- 花蔺科 Butomaceae  
水罨粟 ..... 10
- 旋花科 Convolvulaceae  
土丁桂 ..... 11
- 蝶形花科 Fabaceae  
白车轴草 ..... 11  
猫尾草 ..... 12  
穗序木蓝 ..... 12
- 鸢尾科 Iridaceae  
庭菖蒲 ..... 13
- 千屈菜科 Lythraceae  
卡尔他萼距花 ..... 13
- 野牡丹科 Melastomataceae  
围巾花 ..... 14

- 芭蕉科 Musaceae  
紫芭蕉 ..... 14
- 柳叶菜科 Onagraceae  
粉花月见草 ..... 15
- 兰科 Orchidaceae  
紫花苞舌兰 ..... 15
- 商陆科 Phytolaccaceae  
美洲商陆 ..... 16
- 花荵科 Polemoniaceae  
针叶福禄考 ..... 16
- 蓼科 Polygonaceae  
头花蓼 ..... 17  
虎杖·红虎杖 ..... 17
- 蔷薇科 Rosaceae  
红花草莓 ..... 18
- 旅人蕉科 Strelitziaceae  
赫蕉类 ..... 19

## 球根花卉

- 石蒜科 Amaryllidaceae  
香殊兰 ..... 20  
假玉簪 ..... 20
- 美人蕉科 Cannaceae  
美人蕉类 ..... 21
- 百合科 Liliaceae  
绣球葱 ..... 22
- 睡莲科 Nymphaeaceae  
黄萍蓬草 ..... 22
- 酢浆草科 Oxalidaceae  
芙蓉酢浆草 ..... 23
- 姜科 Zingiberaceae  
姜荷花 ..... 23  
鳞甲姜 ..... 24

## 多肉植物

- 番杏科 Aizoaceae  
海马齿 ..... 24  
松叶菊 ..... 25



|                           |    |
|---------------------------|----|
| • 萝藦科 Asclepiadaceae      |    |
| 翠玉藤·····                  | 25 |
| <b>观叶植物</b>               |    |
| • 龙舌兰科 Agavaceae          |    |
| 龙舌兰类·····                 | 26 |
| 剑麻·····                   | 27 |
| 银道王兰·····                 | 27 |
| 长柄竹蕉·····                 | 28 |
| • 五加科 Araliaceae          |    |
| 福祿桐类·····                 | 29 |
| 五爪木·····                  | 30 |
| • 天南星科 Araceae            |    |
| 蔓绿绒类·春雪芋类·····            | 31 |
| 水菖蒲·····                  | 32 |
| 花叶芋类·····                 | 32 |
| 粗肋草类·····                 | 33 |
| 黛粉叶类·····                 | 34 |
| • 紫草科 Boraginaceae        |    |
| 聚合草·····                  | 35 |
| • 鸭跖草科 Commelinaceae      |    |
| 白纹香锦竹草·····               | 35 |
| • 巴拿马草科 Cyclanthaceae     |    |
| 巴拿马草·····                 | 36 |
| • 大戟科 Euphorbiaceae       |    |
| 雪花木·····                  | 36 |
| 变叶木类·····                 | 37 |
| • 牻牛儿苗科 Geraniaceae       |    |
| 香叶天竺葵·····                | 37 |
| • 禾本科 Gramineae (Poaceae) |    |
| 蕙苳·····                   | 38 |
| 香茅·····                   | 38 |
| 紫叶甘蔗·····                 | 39 |
| • 唇形科 Labiatae            |    |
| 薄荷·····                   | 39 |
| • 百合科 Liliaceae           |    |
| 油点百合·····                 | 40 |
| • 竹芋科 Marantaceae         |    |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 竹芋类·····              | 41 |
| • 露兜树科 Pandanaceae    |    |
| 香露兜·····              | 42 |
| • 旅人蕉科 Strelitziaceae |    |
| 红斑蕉蕨·····             | 42 |
| • 姜科 Zingiberaceae    |    |
| 观叶姜类·····             | 43 |
| • 铁角蕨科 Aspleniaceae   |    |
| 卷叶巢蕨·····             | 44 |
| • 石松科 Lycopodiaceae   |    |
| 杉叶石松·····             | 44 |
| • 木贼科 Equisetaceae    |    |
| 木贼·····               | 45 |
| • 水龙骨科 Polypodiaceae  |    |
| 密网蕨·····              | 45 |
| <b>蔓性植物</b>           |    |
| • 夹竹桃科 Apocynaceae    |    |
| 小叶软枝黄蝉·银叶软枝黄蝉·····    | 46 |
| 长节珠·····              | 47 |
| • 萝藦科 Asclepiadaceae  |    |
| 大夜香花·····             | 47 |
| • 紫葳科 Bignoniaceae    |    |
| 斑叶粉花凌霄·····           | 48 |
| • 苏木科 Caesalpiniaceae |    |
| 素心花藤·····             | 48 |
| 龙须藤·····              | 49 |
| • 使君子科 Combretaceae   |    |
| 大花风车子·····            | 49 |
| • 旋花科 Convolvulaceae  |    |
| 绒毛白鹤藤·····            | 50 |
| • 蝶形花科 Fabaceae       |    |
| 毛鱼藤·····              | 50 |
| • 毛茛科 Ranunculaceae   |    |
| 小木通·····              | 51 |
| • 马鞭草科 Verbenaceae    |    |

|                |    |
|----------------|----|
| 冬红             | 51 |
| • 葡萄科 Vitaceae |    |
| 小叶葡萄           | 52 |

## 木本花卉

|                        |    |
|------------------------|----|
| • 夹竹桃科 Apocynaceae     |    |
| 无刺大花假虎刺                | 52 |
| 白黄夹竹桃                  | 53 |
| • 紫葳科 Bignoniaceae     |    |
| 洋红风铃木                  | 53 |
| • 苏木科 Caesalpiniaceae  |    |
| 四叶黄槐                   | 54 |
| 丝苏木                    | 54 |
| • 千屈菜科 Lythraceae      |    |
| 白细雪茄花·金叶雪茄花            | 55 |
| • 紫金牛科 Myrsinaceae     |    |
| 紫背朱砂根·黑星紫金牛            | 56 |
| • 蓝雪花科 Plumbaginaceae  |    |
| 蓝雪花                    | 57 |
| • 芸香科 Rutaceae         |    |
| 香吉果                    | 57 |
| • 玄参科 Scrophulariaceae |    |
| 红花玉芙蓉                  | 58 |
| • 马鞭草科 Verbenaceae     |    |
| 单瓣山茉莉                  | 58 |

## 观赏树木

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| • 漆树科 Anacardiaceae                   |    |
| 黄檗榔青                                  | 59 |
| • 冬青科 Aquifoliaceae                   |    |
| 钝头冬青                                  | 59 |
| • 紫葳科 Bignoniaceae                    |    |
| 蒲瓜树                                   | 60 |
| • 紫草科 Boraginaceae (厚壳树科 Ehretiaceae) |    |
| 台湾厚壳树                                 | 60 |
| 大果破布木                                 | 61 |
| • 藤黄科 Clusiaceae                      |    |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 兰屿红厚壳                 | 61  |
| 粉红香果树                 | 62  |
| • 大戟科 Euphorbiaceae   |     |
| 圆叶澳杨                  | 62  |
| 台湾五月茶                 | 63  |
| • 蝶形花科 Fabaceae       |     |
| 栗豆树                   | 63  |
| • 金缕梅科 Hamamelidaceae |     |
| 蚊母树                   | 64  |
| • 茶茱萸科 Icacinaceae    |     |
| 青脆枝                   | 64  |
| • 樟科 Lauraceae        |     |
| 木姜子类                  | 65  |
| 台琼楠·台楠                | 66  |
| • 木兰科 Magnoliaceae    |     |
| 北美鹅掌楸                 | 67  |
| • 桃金娘科 Myrtaceae      |     |
| 肖蒲桃                   | 67  |
| • 桑科 Moraceae         |     |
| 榕树类                   | 68  |
| • 使君子科 Combretaceae   |     |
| 钮子树·绿钮树               | 69  |
| • 山柚子科 Opiliaceae     |     |
| 台湾山柚                  | 69  |
| • 蔷薇科 Rosaceae        |     |
| 小石积                   | 70  |
| 红芽石楠                  | 70  |
| • 芸香科 Rutaceae        |     |
| 兰屿花椒·椿叶花椒             | 71  |
| 胡椒木                   | 72  |
| • 花历·索引               | 73  |
| • 1~13 辑中文名总索引        | 81  |
| • 1~13 辑科名中文名总索引      | 122 |
| • 1~13 辑科名学名总索引       | 127 |

# 前言

近十余年来，笔者常与业者同赴国外引种并致力于开发台湾省原生植物的工作，同时从事试种、观察、记录、育苗、推广工作，默默为园艺事业耕耘奋斗，其引种至开发、推广的过程备尝艰辛，鲜为人知，惟一冀望本书能提供最新园艺资讯，对园艺事业的蓬勃发展及景观植物领域的进一步开拓起到积极作用，以推动环保绿化工作的加速落实。

本套丛书，花木的中文名称以一花一名为原则，但有些花木的商品名称或俗名，具有强烈代表性，因而也一并列入。照片均是实物拍摄，采用电子扫描分色，原版印制，其花姿花容跃然纸上，绝不同于坊间翻印本；繁殖方法及栽培要点，大部分依照华南地区的风土气候、植物的生长习性、实际栽培管理等作论述；学名均是根据中、外国艺界的学者、专家所公认的名称，再敦聘植物分类专家陈德顺先生审订，参考文献达数十种，力求尽善尽美，倘有疏谬之处，期盼先进不吝指正。

本书能顺利出版，得感谢北斗花卉中心郑满珠主任、前光华花卉李睿明老师、彰化县园艺花卉公会理事长刘福森先生、九和造园有限公司胡明山先生、成和季农园李胜魁和李胜伍先生、绿田造园胡清田先生、广裕园胡高荣先生、改良园胡高为先生、鸿林园艺中心胡高笔先生、中兴农园胡清钦先生、清高植物有限公司罗坤龙先生、翡翠园艺有限公司胡清扬先生、和平种苗园罗胜辉先生、花都综合苗园罗荣守老师、玫瑰花推广中心张维斌先生、源兴种苗园张济棠先生、再居北投花圃王宗雄先生、马来西亚美景花园郑庆森先生、华陶窑陈文辉先生；台湾大学森林系廖日京教授、省立博物馆郑元春先生、东海大学景观系章锦瑜教授、嘉义农专黄达雄教授、农经博士蔡建雄先生、张莉莉老师、省立员农园艺科宋芬玫老师、李锦文先生、古训铭先生等协助，在此致万分谢意！

薛聪贤

2002年3月





▲望江南·野扁豆(原产我国华东至西南、亚洲热带及美洲热带)*Cassia occidentalis*



▲黄野百合·猪屎豆(原产热带、亚热带地区)*Crotalaria pallida*

## 绿肥药用·望江南

苏木科亚灌木状一年生草本

望江南在我国分布于华东、华南及西南地区,生于平野至山坡地。株高约1~1.5m,羽状复叶,小叶卵状披针形或椭圆形,先端渐尖,全缘。夏至秋季开花,伞房状总状花序,花冠黄色。荚果条形,扁平,略弯,长约10cm。全株可作绿肥、药用,极适合荒地绿化美化。

●繁殖:用播种法,春季为播种适期,种子发芽适温约为20~26℃。

●栽培要点:可直接播种,栽培土质以壤土或砂质壤土为最佳,排水,光照需良好,生长期少量追肥1~2次即可。性喜高温高湿,生长适温约为22~32℃。

## 自生能力强·黄野百合

蝶形花科亚灌木状一年生草本

黄野百合分布我国中部至南部,株高约50~100cm,全株密生短柔毛。叶互生,三出复叶,小叶倒卵形,先端微凹。夏至秋季开花,总状花序,顶生或腋生,花冠黄色,极为鲜明亮丽。荚果长椭圆形,种子成熟时摇晃有声。全株可当牧草、绿肥,适合庭园、荒地绿化美化,生性强健,自生能力极强。

●繁殖:用播种法,春季为适期,发芽适温约为20~25℃。

●栽培要点:土质以壤土或砂质壤土为最佳。排水、光照需良好,成长至开花期追肥1~2次。性喜高温,生长适温为20~30℃。





▲假酸浆·鞭打绣球(原产秘鲁)  
*Nicandra physaloides*

## 观花赏萼·假酸浆

茄科一年生草本

假酸浆株高约 60~120cm, 茎带紫黑色。叶互生, 卵形, 边缘有粗锯齿。春季开花, 腋生, 花冠杯形, 淡紫色。花萼宿存, 心形, 5 棱合翼状, 形似小灯笼, 干燥后如同天然干燥花, 久藏不凋, 为高级花材。适合庭园美化或大型盆栽。

●繁殖: 用播种法, 春、秋季均适合播种, 但以春季为佳, 发芽适温约为 20~25℃。

●栽培要点: 栽培土质以砂质壤土为佳, 排水、光照需良好。苗高 15~20cm 摘心, 促使多分侧枝。成长期间每月施肥 1 次。性喜高温, 生长适温约为 22~28℃。

茄科 SOLANACEAE



▲紫美花(原产缅甸)  
*Pseuderanthemum acuminatissimum*

## 优雅可爱·紫美花

爵床科亚灌木状宿根草本

紫美花株高约 20~40cm, 叶对生, 长椭圆形或披针状长椭圆形, 全缘, 近革质。初夏至秋季均能开花, 花顶生, 花冠长筒状, 紫蓝色, 花期持久, 颇为优雅可爱, 适合庭园美化或盆栽。

●繁殖: 可用扦插法, 春至秋季均能育苗, 剪取成熟的顶芽作插穗较易发根。

●栽培要点: 栽培土质以砂质壤土或腐殖质壤土为佳, 排水需良好, 半日照或遮光 30%~50% 较理想。春至秋季每 1~2 个月追肥 1 次。花后剪除花梗, 老化的植株早春施以强剪。性喜高温, 生长适温为 23~32℃。

爵床科 ACANTHACEAE 7





▲紫莉花·硬枝水蓑衣(原产亚洲热带)  
*Hygrophila erecta*

## 夏日佳丽·紫莉花

爵床科宿根草本

紫莉花株高约 20~50cm,茎呈四方形,紫褐色。叶对生,卵形或椭圆形,边缘波状,先端钝突尖。夏至秋季开花,花腋生或顶生,花冠粉紫色,5裂,喉部浓紫色。花姿清丽优美,适于庭园美化或盆栽。生性强健,耐旱、耐热,冬季呈半休眠状态。

●繁殖:可用播种、扦插或分株法,春至秋季均能育苗,栽培地常见幼苗自生。

●栽培要点:栽培土质以砂质壤土为最佳,排水、光照需良好。春至夏季生长期追肥 1~2 次,开花期间水分要充足。性喜高温,生长适温约为 23~32℃。



▲早田爵床(原产我国台湾)*Rostellularia procumbens* var. *hayatai* (syn. *Justicia procumbens* var. *hayatai*)

## 茎叶细致·早田爵床

爵床科宿根草本

早田爵床在我国分布于台湾恒春半岛。茎伸长呈倾卧至匍匐状。叶厚而小,对生,卵形或近心形,长约 1~3cm,宽 1~1.2cm,叶面密生白色尘毛,全缘。夏、秋季开花,穗状花序,顶生,花冠淡紫红色。其茎叶细致,风格优雅,适合作地被、盆栽作吊盆或高地缘栽,茎叶悬垂甚美观。

●繁殖:播种、扦插法,春至夏季为适。

●栽培要点:栽培土质以肥沃的砂质壤土为最佳,排水、光照需良好。春、夏季生长期每月追肥 1 次。茎过长应做修剪或强剪。性喜高温高湿,生长适温为 23~32℃。



▲橙花千日红(原产美国、墨西哥)  
*Gomphrena haageana*



▲香鹤芋·香白掌(原产美洲热带)  
*Spathiphyllum patinii*

## 圆仔花·橙花千日红

苋科宿根草本

橙花千日红株高约 30~50cm, 茎叶密被细绵毛。叶对生, 披针形。春末至夏、秋季均能开花, 头状花序顶生, 由多数小花组成, 苞片橙红色, 纸质, 可制干燥花, 花姿花色鲜艳可爱, 可用于盆栽、作花坛、制干燥花。

●繁殖: 可用播种、扦插或分株法, 但以播种法为主, 春季为适期。

●栽培要点: 栽培土质以肥沃的砂质壤土为最佳, 光照需充足。生长至开花期每月追肥 1 次, 冬季需温暖避风越冬。春季施以强剪, 促其茎叶新生。性喜高温, 生长适温约为 22~30℃。

## 雪白殊香·香鹤芋

天南星科宿根草本

香鹤芋株高约 20~40cm, 成株丛生, 短茎。叶椭圆形或阔倒披针形, 全缘, 质厚。春至夏季开花, 佛焰苞片雪白色, 肉穗花序散发特殊香味。生性强健, 耐阴, 终年青翠, 为高级室内植物, 适合盆栽或中庭荫蔽地美化。

●繁殖: 可用分株法, 春至秋季为适。

●栽培要点: 栽培土质以腐殖质壤土为最佳, 排水需良好。遮光 30%~50%, 忌强光直射。春、夏季施肥 2~3 次, 宜用油粕、豆饼。性喜高温高湿, 生长适温约为 22~30℃, 冬季要温暖、避风越冬。





▲彩冠花·天蓝尖瓣木(原产巴西、阿根廷)  
*Oxypetalum caeruleum*


## 花色幽雅·彩冠花

萝藦科宿根草本

彩冠花株高约 30~80cm,全株密被白色茸毛。叶对生,披针状长心形,全缘或波状缘。春夏季开花,花顶生或腋生,5 瓣,淡蓝或淡红色,花色变化微妙,极为优雅脱俗。蓇葖果筒状圆柱形,先端渐尖。由于性喜温暖,不耐高温,华南地区平地常当作一年生草花栽培,适合用于盆栽、切花。

●繁殖:秋季播种或扦插育苗。

●栽培要点:栽培土质以壤土或砂质壤土为佳,排水、光照需良好。生长期间每月施肥 1 次。花后做修剪,植株老化则施以强剪。性喜温暖,生长适温约为 15~26℃。



▲水罨粟·水金英(原产巴西、委内瑞拉)  
*Hydrocleys nymphoides*

## 水生植物·水罨粟

花蔺科宿根草本

水罨粟是浮游性水生植物,根自水中茎节处发生。叶具长柄,圆形或椭圆状卵形,叶面油亮光滑。夏至秋季开花,单生,花冠杯形,3 瓣,金黄色。花姿亮丽优雅,适合在水池、大型水槽中栽培。

●繁殖:可用分株法,春夏季为佳。

●栽培要点:水池或水槽底部先置入有机质壤土,厚约 5~10cm,再注入清水深约 50cm,然后将水罨粟投入水中即能成活。栽培地光照需充足,池水减少需补充,池水若能缓缓流动更佳。性喜高温,生长适温约 23~32℃。冬季温暖越冬,避免寒害。





▲土丁桂(原产我国南方及世界其他热带、亚热带地区) *Evolvulus alsinoides*


## 海岸小美人·土丁桂

旋花科宿根草本

土丁桂分布于我国南方地区。茎具匍匐性，茎叶密被银灰色绢毛。叶卵圆形或长椭圆形，甚小，长约 0.5~2cm。夏至冬季均能开花，花腋生，花冠浅漏斗形，淡蓝至紫蓝色，花姿娇美。蒴果球形。耐旱、耐盐、抗贫瘠，适合干燥地作地被、防风固沙或盆栽。

●繁殖：用播种或扦插法，春、夏季为适期。

●栽培要点：栽培土质以碱性砂土为最佳，排水、光照需良好。成长期间每 1~2 个月少量追肥 1 次。植株老化应修剪或更新栽培。性喜高温，生长适温约为 22~32℃。



▲白车轴草·白三叶草(原产欧洲) *Trifolium repens*

## 耐寒好湿·白车轴草

蝶形花科宿根草本

白车轴草株高约 5~15cm，茎横卧于地面。叶翠绿互生，三出复叶，小叶倒卵形，边缘具细锯齿，叶面偶有倒“V”形白色斑纹。夏至秋季开花，头状花序，白色，小花多数密生，花冠蝶形，荚果线形可作草坪或地被植物，是优良绿肥或牧草。性喜冷凉，华南地区适合在冷地栽培，平地夏季高温生长不良。


●繁殖：播种或分株法，春、秋季为宜。

●栽培要点：栽培土质以保水力强的壤土或砂质壤土为最佳，光照需充足。生长期每 1~2 个月施肥 1 次。性喜冷凉至温暖，忌高温干燥，生长适温约为 12~25℃。





▲猫尾草·兔尾草·牛春花(原产我国南部及东南亚) *Uraria crinita*



▲穗序木蓝·爬靛蓝(原产中国及东南亚) *Indigofera spicata*

## 牛春花·猫尾草

蝶形花科亚灌木状宿根草本

猫尾草分布于我国南部,常生于海拔800m以下的平地、山野,株高约50~150cm,全株密被短茸毛。奇数羽状复叶,小叶卵形或长椭圆状披针形,全缘。夏、秋季开花,总状花序,花穗朝上,紫红色,形似猫尾巴。荚果节状,种子肾形。根、叶可入药,具消积、健脾胃、活血之效,目前已有专业栽培。性强健、耐旱,适合作庭植美化、大型盆栽。

●繁殖:用播种、分株法,春季为适期。

●栽培要点:不择土质,排水、光照需良好。春、夏季施肥2~3次。早春修剪整枝1次。性喜高温,生长适温约为22~30℃。

## 爬靛蓝·穗序木蓝

蝶形花科匍匐性宿根草本

穗序木蓝分布于我国南部的平地荒野或草地,茎匍匐,可延伸数米。奇数羽状复叶,小叶长椭圆状倒卵形。夏、秋、冬季均能开花,总状花序,顶生或腋生,蝶形花冠,粉红色。荚果线状,末端具逆刺。耐旱、耐贫瘠,茎叶青翠密集,适作地被植物、庭园美化、大型盆栽、绿肥等。

●繁殖:用播种、扦插法,春、秋季为适。

●栽培要点:不择土质,但以砂质壤土为最佳,排水、光照需良好。春至秋季施肥2~3次。每年春季修剪,茎枝老化用强剪或更新栽培。性喜高温,生长适温为20~30℃。





▲庭菖蒲·狭叶庭菖蒲(原产北美洲)  
*Sisyrinchium angustifolium*

## 纤柔雅致·庭菖蒲

鸢尾科宿根草本

庭菖蒲株高约 30~50cm, 外形似禾草。茎细直, 节明显。叶线状剑形, 平行脉。春至夏季开花, 顶生或腋生, 花冠紫蓝色, 6 瓣, 花叶纤柔雅致, 迎风摇曳, 适合作庭园缘栽、盆栽。性喜温暖, 不耐高温, 华南地区适合在冷地栽培, 平地高温越夏困难。

●繁殖: 可用播种或分株法, 分株成活率高, 春、秋季为适期。

●栽培要点: 栽培以富含有机质的砂质壤土为最佳, 排水、光照需良好。生长期间少量施肥, 植株老化则加以修剪, 盆栽拥挤应分株。忌高温高湿, 生长适温为 15~25℃。

鸢尾科 IRIDACEAE



▲卡尔他萼距花·克非亚草(原产美洲热带)  
*Cuphea cartagenensis*

## 易栽易植·卡尔他萼距花

千屈菜科宿根草本

卡尔他萼距花在我国南方一些地区已驯化, 生于中部低海拔山区。株高约 20~40cm, 茎细直, 密被赤色腺毛。叶对生, 长卵形或长椭圆形, 先端钝尖或急尖, 全缘有毛。春至夏季开花, 花小, 顶生或腋生, 花冠紫红色。生性强健, 耐修剪, 适合作庭园美化或盆栽。

●繁殖: 可用播种、扦插法, 春至秋季均能育苗, 种子落地可发芽。

●栽培要点: 栽培土质宜选砂质壤土, 光照需充足。春至秋季每月施肥 1 次。植株老化需修剪, 并补给肥料、水分, 即能花开不断。性喜高温, 生长适温为 20~30℃。

千屈菜科 LYTHRACEAE 13





▲围巾花·蔓性野牡丹(原产墨西哥)  
*Heterocentron elegans* (syn. *Schizocentron elegans*)

## 蔓性野牡丹·围巾花

野牡丹科宿根草本

围巾花茎具匍匐性,延伸可达 60cm 以上。叶对生,阔卵形,叶面、叶背脉上有长柔毛,边缘具细齿。夏、秋季开花,花顶生,花冠粉红色,5 瓣,雄蕊鲜黄色。耐阴,花、叶柔美,适合作吊盆、地被、庭园缘栽美化。

●繁殖:可用扦插法,春、夏季为适。

●栽培要点:栽培土质以腐殖质壤土或砂质壤土为最佳,排水需良好。半日照或遮光 30%~50% 生长最理想。春、夏季施肥 2~3 次,茎枝老化应修剪。性喜高温高湿,生长适温约为 22~30℃,冬季需温暖越冬。



▲紫芭蕉(原产孟加拉)  
*Musa ornata*

## 朝天芭蕉·紫芭蕉

芭蕉科宿根草本

紫芭蕉高 60~100cm,外形酷似迷你形香蕉。叶长椭圆形,先端圆钝,全缘。夏、秋季自茎顶抽生花茎,穗状花序,朝天直立,苞片紫红色,浆果圆柱形,成熟可食用。其花穗形态优雅,吸水性良好,为高级花材,也适用于庭园美化或大型盆栽。

●繁殖:用分株法,春至秋季均能育苗。成年植株基部容易长出吸芽,可分切另植。

●栽培要点:土质以肥沃的砂质壤土为最佳,排水、光照需良好。春、夏季施肥 2~3 次。果后除去老株,加以培土,促进新株成长。性喜高温,生长适温为 23~32℃。



▲粉花月见草·夕化妆(原产美国南部至南美洲) *Oenothera rosea*

## 婉约柔丽·粉花月见草

柳叶菜科宿根草本

粉花月见草株高约 20~40cm, 叶互生, 倒披针形或长椭圆形, 幼叶曲皱, 边缘呈不规则波状或齿状。春末至夏季开花, 腋生或顶生, 花冠杯形, 5 瓣, 呈覆瓦状排列, 粉红色, 中心粉黄, 花姿婉约柔美, 颇为高雅。适合作庭园美化或盆栽。

●繁殖: 用播种、分株法, 春、秋为适。

●栽培要点: 栽培土质以富含有机质的壤土或砂质壤土为佳, 排水、光照需良好。生长期间每月施肥 1 次。花后修剪整枝, 老化的植株施以强剪, 促使茎叶再生长。性喜温暖至高温, 生长适温为 15~27℃。

柳叶菜科 ONAGRACEAE



▲紫花苞舌兰·紫兰(原产我国台湾及亚洲热带、大洋洲) *Spathoglottis plicata*

## 土生土长·紫花苞舌兰

兰科宿根草本

紫花苞舌兰高约 40~80cm, 假球茎呈卵状圆锥形。叶剑形或狭椭圆形, 先端狭尖, 叶面皱纹状。春、夏、秋三季均能开花, 总状花序, 花茎直立, 花冠粉红或紫红色, 花姿美妍。生性粗放, 花期长, 适合作庭园美化、花坛或盆栽。

●繁殖: 用分株法, 春至秋季均可育苗。

●栽培要点: 栽培土质用腐殖质砂土或砂质壤土均佳。排水需良好, 全日照、半日照均可。秋季每 1~2 个月施肥 1 次。生长拥挤需剪除老株或分株另植。性喜高温高湿, 生长适温约为 20~30℃。

兰科 ORCHIDACEAE 15