

SPT 21世纪高等院校教材

工科类

工科数学分析

上册

丁晓庆 编

科学出版社

21 世纪高等院校教材(工科类)

工科数学分析

上 册

丁晓庆 编

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书讲述微积分学的基本理论,分上下两册,上册内容是:极限论、一元函数微分学、一元函数积分学;下册内容是:多元函数微分学、多元函数积分学、广义积分、级数理论、常微分方程。本书的主体部分接近理科数学专业对“数学分析”的要求,提出了新观点,得到了新结论;本书尽量从初学者和研究者的立场出发,用简洁朴素的语言,以螺旋式上升的方式,阐述数学理论的本质。

本书编写了较多典型例题,对一般理工科专业学习“高等数学”的学生,可作为进一步提高或做题方法方面的课外读物。本书偏重于理论,适合于对数学要求高的理工科专业,也可作为理科数学专业的教学参考书,供数学教师参考。

图书在版编目(CIP)数据

工科数学分析·上册/丁晓庆编. —北京:科学出版社, 2002. 9

(21世纪高等院校教材(工科类))

ISBN 7-03-010757-8

I . 工… II . 丁… III . 数学分析—高等学校—教材 IV . O17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 063236 号

责任编辑:胡华强 陈玉琢/责任校对:朱光光

责任印制:安春生 /封面设计:黄华斌 陈 岚

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新蕾印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2002年9月第一 版 开本:720×1000 1/16

2002年9月第一次印刷 印张:22 3/4

印数:1~3 000 字数:418 000

定价:62.00 元(上、下册)

(如有印装质量问题,我社负责调换(路通))

前　　言

数学的重要性是尽人皆知的.数学教育是整个科学教育的基本部分，在传播知识、启迪智慧方面有特殊的作用。

数学是自然科学和工程技术科学的基础。随着人类进入 21 世纪这个“知识经济时代”，数学的基础作用必将越来越明显。单纯从“投入-产出比”的角度来看，数学就具有特殊的经济价值。实际上，数学的研究和教学可以说“本钱”不多，通过一枝笔、几张纸、一副桌椅，或者通过一块黑板、几枝粉笔就可以实现，但是由此产生的社会和经济价值却是无法估计的。有一句古话用在这里恰到好处：运筹于帷幄之中，决胜于千里之外。

不过，任何价值都不可能无中生有。数学含有的价值，来自于学习、研究、应用数学时所付出心血的人的劳动。实际上，“数学所用的方法是逻辑推导，它有严格的定义和特定的符号，它的研究对象是抽象的数量关系和空间形式，没有相当的训练和基础知识是难以入门的”^①。正因为如此，学习研究数学就必须花大力气。可以这样说，对于人类的文明和社会的发展，数学的研究和教育是“一本万利”的事业。

这本书主要介绍微积分理论。时间和实践都已经证明：学习这些理论是大学一年级新生的“童子功”。从整个数学发展的历史来看，微积分学是现代数学的基础；从理工科大学的所有课程来看，微积分课程是基础课（没有微积分知识，就无法学其他许多课程）。实际上，一个人从进小学开始到大学毕业为止，不论哪个专业，学习数学的时间至少都有 12 年至 14 年之久。在这十几年里，微积分的学习是最关键的，这不仅表现在微积分学是现代数学乃至现代科学的基础，而且还表现在学习微积分时养成的“个人风格”对其他课程的学习都有一定的影响。

* * * * *

在这 21 世纪之初，应该说，我国数学的研究、教学和普及水平都是相当高的，当代学生对数学都有浓厚的学习兴趣和比较高的接受能力，时代呼唤有时代特色的教材。在这样的背景下，我国近一两年出版了多本“面向 21 世纪课程教材”。也正是在这样的背景下，本书的编者在西北工业大学教

^① 《数学百科全书》（出版说明），北京：科学出版社，1994

务处的大力支持和许多老教师的鼓励下，为“本硕博连读教改班”编写了这本试用教材。

在这本教材里，编者在以下几个方面做了努力：

1. 尽量从初学者和研究者的立场出发，提出问题、考察问题、探索问题、解决问题；力求运用简朴的语言描述问题；在论述时，尽量做一些注解（这些注解都是学生应注意的地方）。
2. 对一些概念、名词、定理给予形象的解释，以便于学生掌握和使用。
3. 对于数学领域中有重要作用的概念和问题，给予较多的关注，例如函数的凹凸性、开映射原理、隐函数整体存在定理、逆映射存在的充分条件、多元向量值函数微积分等。这样做是为了提高“本硕博连读学生”认识数学、应用数学的能力。
4. 突出知识的结构，一簇一簇地把结论叙述出来，以便于学生从整体上去把握。
5. 力求基本理论和做题技巧并重，给“做题难问题”以较多的关注。

本书分上下两册，分两学期、192学时使用。本书分8个部分，有23章。

第一部分是极限理论。与常见讲法有所不同的方面是：在实数理论里，采用了“分界点公理”；突出了“平均值不等式”的作用；比较系统地介绍了数列的极限理论，把函数的极限理论作为它的推广。

第二部分是一元函数微分学。与常见讲法有所不同的方面是：先讲微分概念，后讲导数概念（为的是先入为主，突出“微分”概念的应有地位）；用几何的观点引出、证明微分中值定理（共5个）。

第三部分是一元函数积分学。与常见讲法有所不同的方面是：把不定积分的第二类换元法看成“用参数方程表示原函数的一种方法”；对分部积分法着重强调“分部”的意义；通过“分割、采样、求和、求极限”这四个步骤，引出了定积分概念；在上册末尾编写了“一元向量值函数微积分”，以便于学生学习普通物理课程，也为下册系统介绍向量值函数理论做准备。

第四部分是多元函数微分学。与常见讲法有所不同的方面是：由浅入深、比较系统地介绍了点集拓扑的一些概念；给向量值函数及其相关概念以更多的关注；突出不动点原理在微积分学中的特殊地位；平等看待一元函数的微分中值定理和多元函数的微分中值定理；突出介绍了开映射定理；首次得到了“反函数存在的充分条件（对于凸开集上的多元向量值函数而言）”（参见定理13.4.1）；首次得到了“整体隐函数定理”（参见定理13.5.2）——假定在某个凸开集 D 上，二元函数 $F(x, y)$ 有连续的偏导函数，并且

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \neq 0, \forall (x, y) \in D.$$

如果数值 c 是函数 $F(x, y)$ 的值, 那么由二元方程 $F(x, y) = c$ 可以惟一确定隐函数, 这个函数可微, 并且定义域是若干个互不相交的开区间的并集.

第五部分是多元函数积分学. 与常见讲法有所不同的方面是: 通过“分割、采样、求和、求极限”这四个步骤, 先后引出了曲线积分、二重积分、曲面积分、三重积分等概念; 把第二型曲线或曲面积分作为第一型相应积分的特殊形式 (这样更贴近物理观点, 有利于体现整体思想, 有利于课堂教学); 从测度论的观点给予“积分变换问题”更多的关注; 探讨了“曲面面积问题”.

以上五部分是微积分学的精髓, 也是本书的主体; 在这些内容的处理上, 本书是从纯粹数学的立场出发的, 但力求叙述方式更贴近“日常生活”.

由于学时限制以及“工科限制”, 在广义积分、级数理论、常微分方程这三个部分, 本书是按“工科数学”观点处理的. 这里要说明的是: 按照正交级数理论, 对区间 $[0, 2\pi]$ 上定义的可积函数, 可以直接研究它的 Fourier 级数; (“周期性”不是本质, 这是因为在区间 $[0, 2\pi]$ 上定义的函数, 通过延拓, 就可以把它转变成周期函数.)

* * * * *

对许多老师和同行的支持、对西北工业大学应用数学系的大力支持、对西北工业大学教务处领导和同志们的全力支持、对西北工业大学教务处的资助, 编者表示衷心的感谢!

本书在编写过程中, 得到了我的老师余家荣教授、罗学波教授、聂铁军教授的鼓励和支持.

本书初稿完成后, 曾请十多位前辈和同行审阅. 他们是: 西北大学熊必璠教授, 西安电子科技大学王金金教授, 陕西师范大学曹怀信教授, 西安理工大学李全灿教授, 西北工业大学罗学波教授、田铮教授、肖亚兰教授、钮鹏程教授、封建湖副教授、李承家副教授、赵选民教授、王红教授.

* * * * *

西北工业大学 2000、2001 级教改班全体学生和编者一起投身改革、积极参与, 指出了初稿的多处疏忽. 对他们一并表示谢意.

在本书的编写过程中, 参阅了许多教材和专著, 恕不一一列出. 这里特别列出两本:

[1] 数学百科全书. 北京: 科学出版社, 1994~2000.

[2] Б. П. 吉米多维奇. 数学分析习题集 (李荣冰译). 北京: 人民教

育出版社，1978.

本人水平有限，本书的错误和缺陷在所难免。恳请前辈、同行、学生提出宝贵意见。

丁晓庆

2002年1月于西北工业大学

人 名 表

柯西 Cauchy

达布 Darboux

狄里克莱 Dirichlet

费马 Fermat

詹森 Jensen

拉格朗日 Lagrange

莱布尼兹 Leibniz

洛比达 L'Hospital

马克劳林 MacLaurin

牛顿 Newton

黎曼 Riemann

洛尔 Rolle

斯铎兹 Stoltz

泰勒 Taylor

目 录

第一部分 极 限 论

第一章 预备知识	1
§ 1.1 集合	1
§ 1.2 映射	2
§ 1.3 实数的性质 分界点公理	5
§ 1.4 最大数和最小数 上确界和下确界	7
§ 1.5 两个重要不等式	12
第二章 数列的极限	16
§ 2.1 数列的概念和类型	16
§ 2.2 极限的概念	19
§ 2.3 极限的定义	21
§ 2.4 极限的存在性与惟一性	26
§ 2.5 收敛数列的基本性质	33
§ 2.6 极限运算和常见运算的关系	35
§ 2.7 无穷小数列与无穷大数列	43
§ 2.8 数 e 及其相关极限	46
§ 2.9 斯铎兹法则 不定型极限及其求法	48
第三章 函数的极限	57
§ 3.1 函数及其相关概念	57
§ 3.2 函数的最大值、最小值与上确界、下确界	62
§ 3.3 函数在一点的极限	68
§ 3.4 函数在一点的左右极限	73
§ 3.5 函数在无穷远点的极限	76
§ 3.6 极限定义的总结	82
§ 3.7 极限的存在性与惟一性	83
§ 3.8 有极限时函数的基本性质	87
§ 3.9 极限运算和常见运算的关系	89
§ 3.10 无穷小量与无穷大量	94

§ 3.11 不定型极限 求极限的例子.....	102
第四章 函数的连续性.....	106
§ 4.1 函数在一点的连续性	106
§ 4.2 函数在一点的左、右连续性 间断点的分类.....	109
§ 4.3 连续函数的运算性质	113
§ 4.4 在闭区间上连续函数的性质	117
§ 4.5 函数的一致连续性	121

第二部分 一元函数微分学

第五章 微分与导数.....	127
§ 5.1 微分的概念	127
§ 5.2 导数的概念	129
§ 5.3 左、右导数 导函数.....	133
§ 5.4 导数的几何与物理意义	138
§ 5.5 求导法则	141
§ 5.6 常用导数公式	149
§ 5.7 参变量求导法 对数求导法 绝对值求导法	153
§ 5.8 微分学基本定理	157
§ 5.9 高阶导数	165
§ 5.10 微分的运算法则 高阶微分	172
§ 5.11 洛比达法则.....	175
§ 5.12 高阶可微函数的性质 泰勒公式(I)	181
§ 5.13 泰勒公式(II)	185
第六章 导数的应用.....	195
§ 6.1 函数恒为常数的条件	195
§ 6.2 函数的单调性	197
§ 6.3 函数的凹凸性	203
§ 6.4 函数的最大值和最小值问题	211
§ 6.5 函数的极值问题	215
§ 6.6 函数的作图	220

第三部分 一元函数积分学

第七章 原函数与不定积分.....	224
§ 7.1 原函数的概念	224

§ 7.2 不定积分的概念	226
§ 7.3 积分运算的线性性质 逐项积分法	228
§ 7.4 第一类换元积分法——凑微分法	230
§ 7.5 第二类换元积分法——参变量积分法	234
§ 7.6 分部积分法	238
§ 7.7 有理函数的积分	242
§ 7.8 三角函数有理式的积分	248
§ 7.9 求无理函数积分的例子	250
§ 7.10 补充例子和说明	253
第八章 定积分	259
§ 8.1 定积分的概念	259
§ 8.2 积分的基本性质	265
§ 8.3 函数的可积性	269
§ 8.4 积分运算的性质 积分中值定理	278
§ 8.5 变上限积分及其性质 微积分基本定理	283
§ 8.6 分部积分法 换元积分法	290
§ 8.7 函数的特性与定积分的计算	295
§ 8.8 积分不等式	299
§ 8.9 一些例子	305
第九章 一元函数微积分的一些应用	309
§ 9.1 积分元素法	309
§ 9.2 平面图形面积的求法	312
§ 9.3 立体体积的求法	315
§ 9.4 曲线的长度 弧长微分	320
§ 9.5 平面曲线的曲率 曲率半径	327
§ 9.6 一元向量值函数的概念 极限 连续性	331
§ 9.7 一元向量值函数微分和导向量	338
§ 9.8 一元向量值函数的积分	346
汉英词汇对照表	350
人名表	353

第一部分 极限论

第一章 预备知识

§ 1.1 集合

§ 1.1.1 集合的概念

我们在千变万化的自然界中生存，在错综复杂的人类社会中生活，总要面对这样那样的问题。为了解决一个问题，就要把有关的事物作为一个整体来考虑，这些事物就组成一个集合，每个事物都叫元素。

在这门课程里，最常见的集合是实数集 \mathbf{R} 。（我们在中学已经对实数的概念和性质有一定的了解，这些知识是今后学习的基础。）

我们经常要使用下面的记号：（这些记号在中学都有介绍，现在只罗列如下。）

$a \in A$: a 是集合 A 的元素。

$a \notin A$: a 不是集合 A 的元素。

$A \subseteq B$: 集合 A 是 B 的子集。

$A \cup B$: 集合 A, B 的并集 —— $\{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ 。

$A \cap B$: 集合 A, B 的交集 —— $\{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ 。

$A - B$: 集合 A, B 的差集 —— $\{x : x \in A \text{ 但 } x \notin B\}$ 。

(a, b) : 以 a, b 为端点的开区间 —— $\{x : a < x < b\}$ 。

$[a, b]$: 以 a, b 为端点的闭区间 —— $\{x : a \leq x \leq b\}$ 。

$(a, b]$: 以 a, b 为端点的左开右闭区间 —— $\{x : a < x \leq b\}$ 。

$[a, b)$: 以 a, b 为端点左闭右开区间 —— $\{x : a \leq x < b\}$ 。

以上区间都叫有限区间，下面给出无限区间：

$(a, +\infty)$ —— $\{x : x > a\}$ 。

类似的无限区间还有 $[a, +\infty)$, $(-\infty, b)$, $(-\infty, b]$ 等。

§ 1.1.2 邻域的概念

我们经常要在一点的“邻近”讨论函数的某个性质，为此引进“邻域”概

念.

(1) 设 x_0 是数轴上的一点, 以 x_0 为中心的开区间叫点 x_0 的邻域, 记做 $U(x_0)$. 在这个邻域中, 把中心 x_0 去掉, 就得到去心邻域, 记做


$$\dot{U}(x_0) = \{x : x \in U(x_0) \text{ 但 } x \neq x_0\}.$$

(2) 对于某个正数 δ , 开区间 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 就是点 x_0 的一个邻域, 叫做“以 x_0 为中心、以 δ 为半径的邻域”, 记做


$$U(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta).$$

在这个邻域中, 把中心 x_0 去掉, 就得到去心邻域, 记做

$$\begin{aligned}\dot{U}(x_0, \delta) &= \{x : x \in U(x_0, \delta) \text{ 且 } x \neq x_0\} \\ &= (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta).\end{aligned}$$



点 x_0 的邻域 $U(x_0, \delta)$.



点 x_0 的去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$.

习题 1.1

1. 对集合 $A = [0, 2]$, $B = (1, 2]$, 求差集 $A - B$, $B - A$.

2. 用区间表示下面的邻域:

$$U(0, 1); U\left(1, \frac{1}{2}\right); \dot{U}(0, 1); \dot{U}\left(0, \frac{1}{2}\right).$$

3. 通过求区间的中心和半长, 用邻域的记号表示下面的区间:

$$\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right), (0.9, 1.1), (9.99, 10.01).$$

§ 1.2 映射

§ 1.2.1 映射的概念

假设 A, B 是非空集合. 如果按照某种对应法则 f , 对集合 A 的每个元素, 集合 B 都有唯一的元素和它对应, 这样的对应叫做从集合 A 到集合 B 的映射, 记做

$$f: A \rightarrow B.$$

如果映射 f 把集合 A 的元素 a 映射为集合 B 的元素 b , 那么元素 b 叫元

素 a 的像, 记做 $b = f(a)$.

另外, 从集合 A 到集合 B 的映射还有下面的记号:

$$f: A \rightarrow B.$$

在映射 f 下, 集合 A 的元素的像也组成一个集合, 叫**集合 A 的像**, 记做

$$f(A) = \{f(a); a \in A\}.$$

例 用 $[x]$ 表示“不超过实数 x 的最大整数”, 这样就形成从实数集 \mathbf{R} 到 \mathbf{R} 的映射:

$$[x] = \text{不超过 } x \text{ 的最大整数}; \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}.$$

例如

$$[-1.5] = -2, [1.5] = 1, [2] = 2.$$

在这个映射下, 实数集 \mathbf{R} 的像就是全体整数的集合.

§ 1.2.2 映射的常见类型

假设 f 是从集合 A 到集合 B 的映射:

$$f: A \rightarrow B.$$

- (1) 如果集合 A 的不同元素有不同的像, 那么称 f 是**一对一的映射**.
- (2) 如果集合 B 的每个元素都是集合 A 的元素的像, 也就是说, 集合 A 的像 $f(A) = B$, 那么称 f 是**满映射**.
- (3) 如果 f 既是一对一的映射, 又是满映射, 那么称 f 是**一一对应的映射**. 在这种情况下, 通过映射 f , 集合 A 的元素和集合 B 的元素是相互惟一决定的.

§ 1.2.3 映射的两个运算——映射的逆与映射的复合

1. 映射的逆

考虑映射 $f: A \rightarrow B$. 如果 f 是一一对应的映射, 那么通过映射 f , 集合 A 的元素和集合 B 的元素是相互惟一决定的. 因此, 对集合 B 的任意一个元素 b , 集合 A 都有惟一的元素 a 和它对应; 这两个元素的关系是:

$$b = f(a).$$

这时元素 a 叫**元素 b 的逆像**, 记做 $f^{-1}(b)$, 即

$$a = f^{-1}(b).$$

这样的对应关系, 确定了从集合 B 到集合 A 的映射, 叫**映射 f 的逆映射**, 记号是

$$f^{-1}: B \rightarrow A \quad \text{或} \quad f^{-1}(b): B \rightarrow A.$$

例 考虑映射

$$y = \sin x : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow [-1, 1].$$

这是一个一一对应的映射, 它的逆映射是

$$x = \arcsin y : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right].$$


2. 映射的复合

考虑两个映射,

$$f: A \rightarrow B, \quad g: B \rightarrow C.$$

在这种情况下, 对集合 A 的任意一个元素 a , 集合 B 都有唯一的元素 $f(a)$ 和它对应; 接下来, 既然 $f(a)$ 是集合 B 的元素, 那么通过映射 g , 集合 C 就有唯一的元素 c 和 $f(a)$ 对应; 元素 c 可以表示为:

$$c = g(f(a)).$$



根据这样的对应关系, 可以确定从集合 A 到集合 C 的映射, 叫做映射 f, g 的复合映射, 记号为

$$g \circ f: A \rightarrow C \quad \text{或} \quad g(f(a)): A \rightarrow C.$$

例 考虑两个映射

$$f(x) = \ln x: (0, +\infty) \rightarrow (-\infty, +\infty),$$

$$g(y) = \sin y: (-\infty, +\infty) \rightarrow [-1, 1].$$

它们的复合映射是

$$g(f(x)) = \sin \ln x: (0, +\infty) \rightarrow [-1, 1].$$

习题 1.2

1. 设映射 $f(x) = \ln x: [1, +\infty) \rightarrow \mathbf{R}$, 求集合 $[1, +\infty)$ 的像 $f([1, +\infty))$.

2. 设映射 $f(x) = \tan x: A = \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4} \right] \rightarrow \mathbf{R}$, 求集合 A 的像 $f(A)$.

3. 用 $[x]$ 表示“不超过 x 的最大整数”, 求下列数值:

$$[-2.1], [-0.5], [0], [1.1], [9.99].$$

4. (1) 对映射 $f(x) = \sin x : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 证明: 它不是一对一的映射.
 (2) 考虑映射 $f(x) = \sin x : \mathbf{R} \rightarrow [-1, 1]$. 证明: 这个映射是满映射.
 (3) 考虑映射 $f(x) = \sin x : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$. 证明: 这个映射不是满映射.
 5. 考虑映射 $y = \cos x : [0, \pi] \rightarrow [-1, 1]$. (这是——对应的映射.) 求它的逆映射.
 6. 考虑映射 $y = \tan x : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbf{R}$. (这是——对应的映射.) 求它的逆映射.
 7. 对两个映射

$$f(x) = \ln x : (0, +\infty) \rightarrow (-\infty, +\infty),$$

$$g(y) = \cos y : (-\infty, +\infty) \rightarrow [-1, 1].$$

求复合映射 $g \circ f : (0, +\infty) \rightarrow [-1, 1]$.

§ 1.3 实数的性质 分界点公理

关于实数, 我们在中学已经知道了它的概念和许多性质. 这一节的内容是: 在回顾这些性质的基础上, 介绍一个新的性质, 叫分界点公理.

§ 1.3.1 四则运算性质

(i) 对任意实数 x, y, z , 下面的运算规律成立:

交换律 $x + y = y + x, xy = yx$.

结合律 $x + (y + z) = (x + y) + z, x(yz) = (xy)z$.

分配律 $x(y + z) = xy + xz$.

(ii) 对任意的实数 x , 都有

$$x + 0 = x, \quad 1 \cdot x = x.$$

(iii) 任何实数 x 都有相反数 $-x$, 任何非零实数 x 都有倒数 x^{-1} , 并且

$$x + (-x) = 0, \quad xx^{-1} = 1 (x \neq 0).$$

§ 1.3.2 实数的基本性质

(i) 有序性 对每一对实数 x 和 y , 下列关系式有且只有一个成立:

$$x < y, \quad x = y, \quad x > y.$$

(ii) 传递性 如果 $x < y$, 并且 $y < z$, 那么 $x < z$.

(iii) 如果 $x < y$, 那么对任意实数 z , 总有 $x + z < y + z$.

(iv) 如果 $z > 0$, 并且 $x < y$, 那么 $xz < yz$.

§ 1.3.3 分界点公理

1. 从具体例子说起

考虑一对数集 $A = (0, 1]$ 和 $B = [1, 2)$, 可以看出:

- “数集 A 的任何数” \leqslant “数集 B 的任何数”;
- 数 1 把数集 A, B “左右隔开”, 这就是说,

“数集 A 的任何数” $\leqslant 1 \leqslant$ “数集 B 的任何数”.

由于这个原因, 就把点 1 直观地叫做“点集 $(0, 1]$ 和 $[1, 2)$ 的分界点”.


一般说来, 对于一对数集 A, B , 如果

“数集 A 的任何数” \leqslant “数集 B 的任何数”,

那么从数轴上来看, 应该存在着点 c , 把两个点集 A, B “左右隔开”, 这就是说,

“数集 A 的任何数” $\leqslant c \leqslant$ “数集 B 的任何数”.

这时, 点 c 叫点集 A, B 的分界点.



点 c 把点集 A, B “左右隔开”, 它是这两个点集的“分界点”.

根据这样的观察, 我们总结出实数的一个基本性质, 叫**分界点公理**.

2. 分界点公理

设 A, B 是一对非空数集(实数集 \mathbf{R} 的子集). 如果

“数集 A 的任何数” \leqslant “数集 B 的任何数”,

那么一定存在数 c , 使得

“数集 A 的任何数” $\leqslant c \leqslant$ “数集 B 的任何数”.

这样的点 c 叫**数集 A, B 的分界点**.

由于实数集 \mathbf{R} 有这样的性质, 我们就说实数集 \mathbf{R} 是完备的.

例 1 数集 $(0, 1]$ 和 $[1, 2)$ 的分界点是点 1.

例 2 对点集 $A = (0, 1)$, $B = (2, +\infty)$, 区间 $[1, 2]$ 上的每个点都是分界点.(从这个例子看出, 分界点可以不止一个.)

