

中國醫學大成第八集

外科類 丙
喉科叢刊之一

包氏

喉

證

家

寶

全

上海大東書局印行

包氏喉證家寶目錄

咽喉總論

一

條目

二

辨喉證

九

附方

一六

咽喉七十二證考

二七

氏也
喉證家寶

清 歸安 包三 鏞 編述

鄞縣 曹炳章 圈校

咽喉總論

咽喉。氣之呼吸。食之出入。乃人身之門戶也。其證雖繁。多歸於火。蓋少陰君火。少陽相火。二脈並絡於咽喉。君火勢緩。則熱結而爲疼。爲腫。相火勢急。則熱結而爲癰。爲痺。痺甚不通。而痰塞以死矣。經曰。一陰一陽結。謂之痺。所謂一陰者。肝與心胞也。所謂一陽者。膽與三焦也。四經皆有相火。火者痰之本。痰者火之標。故言火則痰在其中矣。言喉則牙舌亦在其中矣。火有虛實。實火因過食煎炒。蘊積熱毒。

煩渴。二便閉塞。風痰上壅。將發喉痺。必先三日。胸膈不利。脈弦數。當去風痰。解熱毒。至於虛火。因飲酒則動脾火。忿怒則動肝火。色慾則動腎火。火炎上攻。咽喉乾燥。二便如常。少陰脈數。宜養陰降火。此治咽喉病之大綱也。今特進言其目。

條目

凡一二日腫痛。三四日勢定。第三日必發寒熱。或頭痛不止。用本醫士秋字藥。病即已。凡喉證之變。皆疏忽於第三日故也。

喉痺。屬熱。屬痰。屬風。風多者。吹本醫士碧玉散。痰多者。吹秋字藥。不速治。則痺鬱而兼熱毒。致發乳蛾等證。治法去風痰。解熱毒。開鬱。

單乳蛾。多因酒色鬱結而發。生於喉旁。或左或右。一日痛。二日紅腫。三日有形如細白星。發寒熱者凶。四日勢定。大約四五日可愈。用青藥五分。黃藥一分。後青三

黃二同吹。痰出盡後。再服煎劑微利之。大便去後當愈。

如至三日。看喉內但紅腫無細白星。卽爲癰證。若三日後紅退。但腫兩旁左右。卽爲雙乳蛾。然左屬心右屬肝。煎劑內左宜加黃連五分。製皂角七分。右宜加赤芍八分。柴胡六分。雙蛾兼用。如大便不通。加枳殼一錢。元明粉七分。連珠蛾者。二白星上下相連。又云狀如纏袋。用藥照前。雙乳蛾較單乳蛾重。連珠則尤重也。

喉癰證。因過食辛辣炙博厚味醇酒。感熱而發。屬肺經痛。喉證中無形跡。但喉腫而痛。重者亦發寒熱頭痛。四五日可愈。用青藥加黃藥少許。內服煎劑。及膏子藥。喉菌證。屬憂鬱血熱氣滯而發。婦人多患此。狀如浮萍。略高而厚。紫色。生在喉旁。初起用青藥五分。黃藥一分。後用青三黃二和吹。內服煎藥。不可間斷。亦難速愈。輕則半月餘。重則經年。治之得法則愈。要守忌戒口。

頸癰證。胸前紅腫。形在外。亦要內攻。甚則喉腫閉結。要出膿。外用三黃散敷。內用

青藥吹并服煎劑。

面癰與頸癰相仿。大抵屬鬱。

托腮癰結熱而發。治法與頸癰同。

外敷三黃散方

生大黃一錢、生蒲黃五分、薑片五分、冰片五分、麝香二厘爲末。蜜調。加蔥汁二三匙。敷患處。或芭蕉汁。或扁柏汁。亦可。

搥舌證。舌下生如小舌者。若連喉腫痛。卽爲喉癰。不連喉痛。非癰也。肺熱性燥。感成熟毒所致。煎劑用犀角地黃湯加減。吹用黃藥。須至舌根兩旁。勤吹方速效。喉內用青十黃一頻吹。

喉閉傷寒後見者難治。爲其閉氣不通。無形無聲故也。纏喉風證。因心中燥結而發。先兩日必胸膈氣緊。出氣短促。忽然咽喉腫痛。手足厥冷。頸如紋。轉結於內。腫

繞於外。且麻且痺。喉中紅絲繞緊。手指甲白色。手心壯熱。喉腫而大。風痰壅盛。如拽鋸之聲。是其候也。最爲急證。速吹服藥可愈。若遲過一日夜。目直視。喉中如雷鳴者。不治。再用燈火近患人口。卽滅者。不治。如喘急頭汗。危在旦夕矣。儻下藥。須加牛黃一錢。以上二證。十無一生。不可輕醫。

一凡傷寒後患連珠蛾及喉閉證。多不治。以其喉項強。目睛上視。皆死候也。

一凡患喉證。一二日不發寒熱尙輕。若三日發寒熱。證必加重。亦必問其大小便通塞。如通證必卽減。不過浮游之火。攻於咽喉耳。宜內服清熱解毒消風之藥。若二便不通。證必加重。內有毒火。非用降火消毒之劑。及通利二便之藥。火從何泄。病從何解乎。故證有輕重。治有緩急。并要問頭痛不痛。證雖甚凶。若發於外。而不見死證者。無妨。

一凡喉證須吹藥四五管。可以出痰。痰亦必去三次。方可愈。至出痰一管。藥內必

用黃藥爲要。吹時必須直對喉中。重重吹入乃效。吹過急提出管。恐痰涎湧出耳。
一凡喉證先碎。須用涼藥吹之。後用青藥。若欲出痰。單用黃藥。方能提去頑痰。初起一二日。用青藥。漸漸多加黃藥。熱甚黃藥爲君。

一凡喉證。大便去後。方去病瘥。若猶閉結。不可輕許其愈。若無痰者。不治。

一凡患喉證。面發紅腫。白亮無神。脈沈微無力。是神氣外洩。無陽故也。證凶必死。
若面發紅腫。脈大有力。證雖重不死。是有元氣。而火氣盛耳。

一凡喉刺痛。因患勞瘁既久。虛火上升。榮竭血盡。患此者。其喉上顎有紅腫。密密如蚊蟲狀。危篤將死之候也。

一凡喉連胸紅腫。此係肺癰證。必用蜜調膏子藥。及百藥煎。凡患肺癰。疑似之間。豆腥者是。

一凡喉中無形。止紅腫者。宜多用燈草灰。乳蛾亦然。

一凡喉證初起。大便閉結。宜用生大黃。元明粉各一錢二分。微利之。則火自降而易愈。若至五六日。久不食。而大便閉結者。誤用立斃。蓋因病久。胃氣已虛。元氣亦弱。雖閉甚。宜蜜煎導而通之。

一凡喉證初起。內服解毒之劑。而兼發散之藥。則毒易愈。解毒必加牛蒡子。連翹之類。發散加紫蘇。葛根之類。及荆防。忌用桔梗。

一凡婦人喉證腫痛。有因經閉致火上升者。服通經藥三四劑。經通而證自愈。其證喉腫而色紅。

一凡喉證不可純用涼藥。取效目前。上熱未降。下寒復起。毒氣乘虛而入腹。胸前高腫。上喘下泄。手足指甲青黑。七日後全不進食。如魚口而死。

一治咽喉者。忌發汗。或針砭出血。卽汗之義也。其腎虛傷寒及帶中喉內之喉花腫。尤忌針。如內傷虛損。咽中生瘡。語言失音者。死不治。

一凡舌下起五峰如蓮。名曰舌下蓮。止可針兩邊四峰。不可針中峰。誤針者死。

一凡舌腫脹滿口。吐舌在外者。用製過僵蠶。製過皂角。二味。爲細末。和勻用少許。吹入鼻中。男左女右。吹之。牙關自開。痰涎自吐。然後用箸捲絲綿。蘸甘草湯。潤舌脣。後用黃藥多加冰片。頻吹。

一凡腮以內腫爛。用箸扎絲綿蘸水。輕攪患處。病者即愈。若不知痛。此係死肉。多難愈。

一凡舌腫大。用生蒲黃末加冰片敷之。欲止血。用炒蒲黃。

一凡搥舌喉癰二證。大便不通。煎劑內加生大黃。元明粉各一錢二分。此微利法。亦抽熱下行法。不可用承氣湯。變成攻下。流弊滋多。小便不通者。調六一散服之。效。

一凡喉舌等證。初起吹藥一次。即令患者低頭開口。漏出痰涎粘唾者。易愈。吹藥

無涎者不治。

辨喉證

喉證初起。一寒戰而生者。發後身涼。口不碎。又無重舌。或二便俱利。不要認作熱證。皆由陽虛寒冷而發也。其痰不可提盡。此痰卽身內之精神所化。與牙關緊乳蛾。搥舌之痰。毒種一氣。必流盡毒而愈者不同。若一流盡。則精神竭而必死。先以藥吹之。或以水漱之法。使一通便服藥。初劑發散和解。二劑卽用溫補滋養。設三四日後。再發寒戰。或心痛脇痛。骨痛等證。死不治。

發時牙關緊急。喉舌俱脹。口碎而臭。或有重舌。或舌上有黃屑屑者。發後。下午再發微寒熱。大小便閉結者。卽作熱證。用石膏敗毒散主之。證亦易愈。如漸起之證。三四日後而發寒熱者。雖凶不害。惟有證未減。而牙關反不緊急。脣不腫。而如好

人者不治。舌腫滿口者不治。色如蒲桃、茄子、如砂紙者不治。或連重舌。發寒熱。猶可治也。

重舌。捺之色雪白。捺舌一起。卽紫色。或紅色。此身內氣血已死。然口臭者。猶可望生。最忌口渴氣急。痰多而稠。如桃膠者。死期甚速。一頸全紅腫者。亦極危也。面紅帶紫。面青帶白。神氣少者。俱不治。不語者死。略能語者。尙有生機。面色少神氣。而好坐低處者。亦難治。喉內之喉花。爲帝中。性命所關。舌下紫筋。爲舌系。通於腎。白腫不治。傷之卽死。亦性命所關也。

舌癰證。舌紅腫大。屬心經火盛。地角亦紅腫。吹藥用青黃各半。吹至舌根。煎劑多用黃連、山梔、犀角。

木證。舌生舌根下。狀如白棗。有青紫筋者。不能速愈。半月方痊。如初起。不作痛。不發寒熱。漸漸腫大。起發愈遲。則愈難痊。皆因憂鬱而起。內服煎藥。外用青藥加黃

藥初時或青黃兼用。後單用黃藥者。又有一種。舌腫輒不能舉動者。亦名木舌。治法同。舌下又生舌。名曰重舌。或腫面腫腮。先在外見。但有膿處。即用利刀出血。次針舌下兩邊青筋出血。宜早治。遲則爛下舌根而死矣。

舌菌證。屬心經。多因氣鬱而生。生於舌上。如菌狀。或如木耳。紅紫色。

紫舌脹證。屬心火。內必煩躁悶亂。單用青藥吹。內服犀角地黃湯。可漸愈。懸癰。生於上顎。紫色泡。如豆大。用銀針脚挑破出血。涼藥吹之。

牙槽風證。初起先齒痛不已。後牙齦內浮腫。紫黑色。或出血。久則腐爛而臭。難速愈。

牙漏證。卽前證久不愈。齒縫中出白膿。是也。極難調治。如上左邊門牙落者。不治。此證屬胃火腎虛。

搜牙床。此證初起。牙床必腫痛。當用拔針出其血。後用青鹽擦之。若屢用拔針。日

久骨自露者難治。

牙癰證。一名牙蟬風。牙齦腫病。毒盛成瘡。初起有小塊。生於牙齦肉上。或上或下。或內或外。其狀高鞭。若生泡。針出膿血而愈。鞭厚成疹狀者。施麻藥。京墨如法割之。烙鐵盪過自愈。

牙齧證。生牙盡處。齦中。齒不能開。熱勢凶。至夜尤甚。然易愈。不害命。

牙挫證。屬胃火。如豆大。或內或外。無定處。

牙宣證。乃縫中出血。上屬脾。下屬胃。因陽明經實火上攻而出也。必有胃火虛動。腐爛牙齦。以致淡血常常滲漏也。

牙菌證。生牙齦。其狀紫花色。高起如菌狀。此乃血熱而兼氣滯也。

穿牙疔證。先二日牙痛。發寒熱。後痛不可忍。牙齦上發一塊紫色。是也。

穿牙毒。卽前證。初起未破者疔。已破者毒。色紅者可治。青者死。

崩砂疳口風證。自舌下牙齦上腫赤。口內作嫩。如渴熱。牙齦漸爛。亦能脫齒爲患。
連珠疳口風證。自舌下起小泡。初起一個又一個。甚者三五七八九連珠而生。
魚風證。係危病。如魚吸水。故名。死不治。

走馬牙疳證。大人患者。卽微瘡毒攻。小兒患者。或因胎毒。或因痘後餘毒。齒齦腐爛成疳。殺人最速。鼻梁發紅點如珠者。不治。其色如乾醬。一日爛一分。二日爛一寸。故名走馬。言其速也。有齒者落盡而死矣。用黃藥吹。宜服蘆薈消疳飲。
牙疳五不治。口臭涎穢者。不治。黑腐脫爛者。不治。牙落無血者。不治。穿

腮破脣者。不治。用藥不效者。不治。

鵝口疳證。一名雪口。初生小兒。滿口連舌上生白屑。如鵝口樣。故名。

馬牙證。初生小兒。先受胎毒熱氣。出胎後受風。風熱相搏卽生。但看牙齦上有白色脆骨者。卽是其初發也。出胎時卽打噴嚏。已冒外風。伏馬牙之根矣。若延至吮

乳時尙不知覺察。病深且危。故不急治者。卽死。切勿誤認作黃丹之類。出胎時卽當看。日日更換。至二三日病卽成。五六日堅硬難治矣。甚有發而再發者。大約百日外。方免此患。

凡口疳黑腐而臭者。不治。小兒胎疳黃色如乾橘瓢者。不治。

凡小兒走馬牙疳。及大人骨槽風。須防落牙。至上門牙偏左一牙。是牙中之王。此牙一落。餘牙必落。最重難治。此牙不落。餘牙尙可治。

凡治口疳。須用棉花。或絲棉。捲在箸上。輕攪患處。然後吹藥。凡脣上疳難吹藥者。或蜜調。或溫水潤。再敷。

凡面上放光而色白者。不治。或放光而色紅者。可治。屢試屢驗。所謂放光者。面上綳急而放光也。

乳蛾。生喉間。形如乳頭。