

西药手册



人民卫生出版社

西 药 手 册

中国医药公司 编

人民卫生出版社

一九六四年·北京

內 容 提 要

本书內容分为两部分。第一部分介紹一些药品的基本知識，如药的制剂、給药的方法、药品的一般保管方法等。第二部分具体介紹各种常用药品，药品的介紹采取了按疗效分类叙述的方法。对于每一个药，則叙述其拉丁名、别名、成分含量、性状、用途、用法及用量、注意事項、保管方法等。书末附有常用外文对照表、名詞解釋及索引。此次再版修訂，增删部分药物品种，并对全书編排体例作了适当調整，現共收載药品 356 种。本书可作为中初級医药卫生工作者学习与参考之用。

西 药 手 册

开本：787×1092/32 印張：8¹²/16 字数：182 千字

中国医药公司 編

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京书刊出版业营业許可証出字第〇四六号)

·北京崇文区談子胡同三十六号·

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

統一书号：14048·1938

1959 年 8 月第 1 版—第 1 次印刷

定 价：0.55 元

1964 年 8 月第 2 版—第 9 次印刷

印 数：307,001—373,000

前 言

在党的总路綫光輝照耀下,随着工农业生产大跃进,我国医药卫生保健事业,也在飞跃发展。为适应新形势发展的需要,和根据我們在河南省登封县試驗田帮助改进医药供应工作及培训保健員的经验,认为编写一本适合目前广大农村医药人員学习参考的药品书籍,借以提高其业务水平使之能更好的为人民保健事业服务,是很必要的。因此特根据中初級及人民公社医药人員的业务需要,编写了这一手册。

本书内容主要分为两部分。第一部分是介绍一些药品的的基本常識,如药的制剂,給药的方法,药品的一般保管方法等;第二部分具体介绍 318 个常用药品,这都是县級经营单位较为普遍经营的原药、制剂和成药。另外还附有名詞解釋及常用外文对照表。为便于农村医药卫生人員的应用,除在文字方面力求通俗外,对于药品的介绍,采取了按疗效分类叙述的方法。至于中药部分,将会同有关单位另行编写专册。

由于编写时间仓卒以及編者业务水平的限制,在内容选择与叙述上难免存在缺点和錯誤,我們要求讀者給予批評和指正,以便再版时加以糾正和补充。

中华人民共和国商业部医药局

1959 年 4 月

第 二 版 序

本书第一版是在1958年大跃进中诞生的。出版以来得到各方面的欢迎和支持，印数先后达二十余万册；吉林省延边人民出版社并将本书译成朝鲜文出版；有不少读者对本书内容提出了宝贵意见；有的还写了书评；这些都给予我们很大的鼓舞。近几年来由于在国民经济方面正确贯彻了党的调整、巩固、充实、提高的方针，医药工业生产和农村医疗卫生保健事业都有很大的发展；我们经营的西药品种也相应的有了增加，为了适应客观形势发展的需要，进一步贯彻党的“以农业为基础，以工业为主导”的发展国民经济的总方针，大力支援农业，提高农村医药工作人员的业务水平，更好的为农民的健康服务，特组织北京商学院药品医疗器械系和中国医药公司北京采购供应站的同志，对本书进行了修订。

这次修订在内容上根据读者的意见作了必要的改正和补充，增加了51个品种，删去了10个品种，在章节上增加解毒药一章，删併内分泌药一章，连前共有356个品种。由于修订时间匆促，在品种的选择和内容的叙述上，还会存在着缺点和错误，希望读者继续给予指正。

中国医药公司

(原中华人民共和国商业部医药局)

1963年4月

几 点 說 明

一、收集品种原則:

(1) 原药和制剂: 大致根据县級以下經營范围收集, 如某一种药品原药、制剂都經營, 那么均列入。只經營制剂的就仅列制剂。

(2) 成药: 行銷面比較广, 疗效較确实的成药也在收集之列, 各地均有处方的某些成药并疗效相近似的, 仅取一、二个做代表。

二、品种根据疗效分类, 如某一种药品有两种以上疗效, 則按主要作用归类。

三、本书中对常見的药性名詞和疾病名詞, 均作了解釋。解釋方式有两种:

(1) 大部分常見名詞均按笔划排列, 列入名詞解釋表中。

(2) 为了减少前后翻閱的麻煩, 不常見的名詞就在本品种用途或說明項下进行了解釋。

四、药品剂量未注明小儿用量的, 均为成人用量。

五、有些药品剂量如指按片服用时, 系指本书所介紹之品种含量規格而言。各地同一品种含量規格与本书不同者, 应按含量折算服用, 不得按本书所指数量服用。

六、用法和用量: 对于一般常用的药品用法和用量叙述的較詳細, 必須由医师决定使用的药品, 則叙述的比較簡單。

目 录

前言.....	(9)
第二版序.....	(10)
几点说明.....	(11)
第一部分 药物的基本常識.....	1
一、药物的制剂.....	1
二、給药的方法.....	4
三、剂量.....	6
四、药物的衡量制.....	8
五、用药的注意事项.....	11
六、药品的一般保管方法.....	14
第二部分 原药、制剂和成药.....	21
一、退热止痛药.....	21
阿司匹林(22) 阿司匹林片(22) 复方阿司匹林片(23) 非那 西汀(24) 非那西汀片(24) 安替比林(25) 氨基比林(25) 复方氨基比林片(26) 复方氨基比林注射液(26) 复方奎宁注 射液(27) 百尔定注射液(27) 平热散(28) 天字头痛粉(28) 止痛退热散(28) 头痛粉(29) 小儿退热片(29) 安痛定片 (30) 优散痛片(30) 撒烈痛片(30) 索密痛片(31) 脑宁片 (31) 复方安乃近片(32) 安痛定注射液(32)	
二、抗風湿药.....	33
水楊醇鈉(34) 水楊酸鈉片(34) 水楊酸鈉注射液(35) 水楊 酸鈉碘化鈉注射液(35) 水楊酸鈉辛可芬注射液(36) 辛可芬 片(37) 水楊酰胺片(37) 安乃近片(38) 安乃近注射液(38) 汉防己甲素片(38) 醋酸可的松片(39) 醋酸可的松注射液 (39)	

三、鎮靜藥.....	40
溴化鉀(40) 溴化鈉(41) 溴化銨(42) 三溴片(42) 溴化鈣 注射液(42) 腦力須(43) 眠爾通片(43) 苯妥英鈉片(44)	
四、催眠藥.....	44
水合氯醛(45) 巴比妥片(46) 苯巴比妥片(46) 異戊巴比妥 片(47)	
五、止咳祛痰藥.....	47
甘草流浸膏(48) 復方甘草片(含氯化銨)(48) 復方甘草片 (含阿片)(49) 復方甘草合劑(49) 復方樟腦酊(50) 杏仁水 (50) 亞硝酸乙酯酊(50) 氯化銨(51) 氯化銨片(51) 碘化 鉀(52) 遠志酊(52) 遠志糖漿(53) 白松糖漿(53) 止咳祛 痰片(54) 唐拾義咳丸(54) 小兒止咳糖漿(55) 信寧咳(55) 科發咳嗽糖漿(56) 几怪康福多(56)	
六、止喘藥.....	57
鹽酸麻黃鹼(58) 鹽酸麻黃鹼片(58) 鹽酸麻黃鹼注射液(59) 唐拾義哮喘丸(59) 息喘靈片(60) 喘息定片(60)	
七、抗過敏病藥.....	61
鹽酸苯海拉明片(61) 抗胺羣片(62)	
八、強心利尿藥.....	63
洋地黃片(63) 洋地黃酊(64) 洋地黃毒甙注射液(64) 氯茶 鹼片(65) 氯茶鹼注射液(65) 汞撒利茶鹼注射液(66) 水楊 酸鈉柯柯豆鹼(67)	
九、救急藥.....	67
樟腦(67) 樟腦磺酸鈉注射液(68) 尼可刹米注射液(68) 苯 甲酸鈉咖啡因注射液(69) 腎上腺素注射液(70) 混旋鹽酸洛 貝林注射液(70) 芳香氨酊(71)	
十、解毒藥.....	72
二巰基丙醇注射液(72) 依地酸鈣鈉注射液(73) 解磷定注射 液(73) 亞甲藍注射液(74)	
十一、抗高血壓藥.....	75

降壓靈片(75) 利血平片(76) 路丁片(76) 复方路丁片(77)	
十二、制胃酸与止胃痛药	77
碳酸氫鈉(78) 碳酸氫鈉片(79) 复方碳酸氫鈉片(79) 氧化	
鎂(80) 氫氧化鋁片(80) 复方氫氧化鋁片(81) 胃痛片(81)	
复方胃舒平片(82) 胃宝片(82) 颠茄酊(83) 颠茄浸膏片	
(84) 莨菪酊(84) 莨菪浸膏片(84) 硫酸阿托品注射液(85)	
溴本辛片(85) 維生素U片(86)	
十三、助消化药	86
含糖胃蛋白酶(86) 稀盐酸(87) 淀粉酶(87) 胰酶(88) 乳	
酶生(89) 干酵母片(89) 食母生片(90)	
十四、健胃药	90
龙胆酊(90) 复方龙胆酊(91) 复方大黃酊(91) 健胃散(92)	
健胃片(92) 大黃碳酸氫鈉片(93) 小儿消食片(93)	
十五、泻药	93
硫酸鎂(94) 硫酸鈉(95) 人工盐(95) 蓖麻油(96) 液状石	
蜡(96) 双醋酊汀片(97) 酊散片(97) 果子露潤腸片(98)	
潤腸果子糖(98) 甘油栓(98)	
十六、止泻药	99
药用炭片(99) 矽炭銀片(100) 鞣酸蛋白(100) 鹼式硝酸鉍	
(100) 鹼式碳酸鉍(101) 止泻片(101)	
十七、驅虫药	102
四氯乙炔胶丸(102) 灭虫宁片(103) 己基間苯二酚片(104)	
枸橼醛呱嗪片(104) 山道年片(106) 愛尔康六一宝塔糖	
(107) 宝塔糖(107) 驅蛔虫片(108) 蛔虫丹(109) 唐拾义	
疳积片(109)	
十八、維生素	110
魚肝油(110) 魚肝油乳(111) 魚肝油麦芽浸膏(112) 維生	
素甲、丁滴剂(113) 維生素甲、丁胶丸(113) 盐酸硫胺片	
(114) 盐酸硫胺注射液(115) 核黄素片(115) 烟酸片(115)	
烟酰胺片(116) 盐酸吡多辛片(116) 盐酸吡多辛注射液	

- (117) 抗坏血酸片(117) 抗坏血酸注射液(118)
- 十九、鈣剂118
- 氯化鈣注射液(119) 氯化鈣葡萄糖注射液(119) 葡萄糖酸鈣注射液(120) 碘化鈣注射液(120) 葡萄糖酸鈣片(121) 乳酸鈣片(121) 鈣素母片(122) 多种鈣糖片(122) 維它鈣片(122) 維丁鈣糖片(123) 小儿健身片(123)
- 二十、补血药124
- 硫酸亚铁片(124) 砷铁丸(125) 碳酸亚铁丸(126) 复方碳酸亚铁丸(126) 五洲人造补血药(127) 肝浸膏片(127) 肝注射液(128) 維生素 B₁₂ 注射液(128) 叶酸片(129) 內服葡萄糖(129) 葡萄糖注射液(130)
- 二十一、止血药131
- 亚硫酸氢鈉甲萘醌片(132) 亚硫酸氢鈉甲萘醌注射液(132) 凝血质注射液(132) 仙鶴草色素片(133) 仙鶴草色素注射液(133) 安特諾新片(134) 安特諾新注射液(134)
- 二十二、体液补充药135
- 氯化鈉(135) 氯化鈉注射液(136) 复方氯化鈉注射液(136) 葡萄糖氯化鈉注射液(137) 右旋糖酐注射液(137)
- 二十三、磺胺类药物138
- 磺胺噻唑片(140) 磺胺噻唑鈉注射液(140) 磺胺嘧啶片(141) 磺胺嘧啶鈉注射液(141) 磺胺二甲基嘧啶片(142) 磺胺甲氧嘧啶片(143) 小儿消炎散(143) 嬰兒胺(144) 慈母欣片(145)
- 二十四、抗菌素145
- 注射用青霉素 G 鈣(鈉)(147) 注射用复方青霉素(149) 油制普魯卡因青霉素 G 注射液(149) 青霉素片(150) 长效西林片(151) 盐酸金霉素胶囊(152) 盐酸土霉素胶囊(153) 盐酸四圈素胶囊(153) 合霉素胶囊(154) 无味合霉素(155) 无味合霉素糖浆(155)
- 二十五、抗結核药156
- 注射用硫酸鏈霉素(156) 异烟肼片(157) 对氨基水楊酸鈉片

(158) 对氨基水杨酸钙片(159) 异烟肼对氨基水杨酸钙片
(159)

二十六、抗痢疾药160

磺胺脒片(160) 酞磺胺噻唑片(161) 琥珀酰磺胺噻唑片
(162) 克泻痢宁片(162) 盐酸黄连素硷片(163) 喹碘方片
(163) 盐酸依米丁注射液(164)

二十七、抗梅毒药164

新肿凡纳明(164)

二十八、抗疟药166

硫酸奎宁片(166) 二盐酸奎宁注射液(167) 优奎宁(168)
阿的平片(168) 磷酸氯喹片(169) 磷酸伯氨喹林片(170)
盐酸氯胍片(170) 盐酸圆氯胍片(171) 乙氨嘧啶片(172)
小儿瘧疾片(173) 唐拾义瘧疾丸(173)

二十九、妇产科药174

麦角流浸膏(174) 麦角酊(175) 顺丁烯二酸麦角新碱注射液
(175) 益母草流浸膏(176) 脑垂体后叶注射液(176) 乙烯
雌酚片(177) 己烯雌酚注射液(177) 黄体酮注射液(178)
当归流浸膏(178) 当归浸膏片(179) 生乳药(179) 媽媽多
片(180)

三十、避孕药180

避孕栓(180) 避孕药片(181) 避孕药膏(182) 健乐蜜避孕
霜(183)

三十一、全身和局部麻醉药183

麻醉乙醚(184) 麻醉氯仿(185) 氯乙烷(185) 盐酸普鲁卡
因注射液(186)

三十二、外用药186

(一)防腐消毒药187

硼酸(187) 硼酸软膏(187) 氧化锌(188) 氧化锌软膏(188)
硫桐脂(188) 硫桐脂软膏(189) 汞溴红(189) 汞溴红溶液
(189) 汞溴红软膏(190) 甲紫(190) 甲紫溶液(191) 碘

(191) 碘酊(192) 氯化氨基汞軟膏(192) 高猛酸鉀(193)	
过氧化氢溶液(193) 醇(194) 甲醛溶液(195) 酚(195) 煤	
酚皂溶液(196) 臭药水(197) 含氯石灰(197)	
(二)青霉素和磺胺类外用藥	198
青霉素軟膏(198) 磺胺軟膏(199) 灭菌磺胺結晶粉(199)	
磺胺嘧啶軟膏(200) 消治龙药膏(200) 火燙药膏(200)	
(三)癬藥	201
水楊酸(201) 癬藥水(202) 鵝根(202) 甘露(203) 黑白癬	
藥水(203) 明兴癬藥水(204) 秃疮膏(204) 杀烈癬膏(205)	
杀烈癬霜(205)	
(四)疥疮藥	206
升华硫(206) 硫軟膏(206) 含硫鉀(207)	
(五)其他	207
冻疮膏(207) 痔疮膏(207) 松节油(208) 余氏止痛消炎膏	
(208) 軟肥皂(209) 痱子粉(209) 氨溶液(209)	
三十三、五官用藥	210
硝酸銀(210) 强蛋白銀(211) 弱蛋白銀(211) 硼砂(212)	
硫酸鋅(212) 青霉素眼膏(212) 金霉素眼膏(213) 四圓素	
眼膏(214) 消炎眼药膏(214) 眼药膏(214) 沃古林眼藥水	
(215) 可的松眼藥水(215) 青霉素喉片(216) 含碘喉症片	
(216) 薄荷喉症片(217) 滴耳油(217) 牙痛水(218) 鼻通	
(218) 鼻眼淨(219)	
三十四、矯味藥	219
糖漿(219) 糖精鈉(220) 橙皮酊(220) 薄荷油(220)	
三十五、賦形藥	221
凡士林(221) 羊毛脂(221) 甘油(222) 注射用水(222) 滑	
石粉(223)	
三十六、解暑藥	223
含盐清凉片(224) 十滴水(224) 人丹(225) 一片丹(225)	
清凉油(226)	

三十七、杀虫药及杀鼠药	227
六六六(227) 六六六粉剂(228) 可湿性六六六粉剂(229)	
六六六烟雾剂(229) 氯苯乙烷(230) 氯苯乙烷粉剂(231)	
可湿性滴滴涕粉(231) 氯苯乙烷乳剂(232) 氯苯乙烷喷射	
剂(233) 敌百虫(233) 安妥(234) 磷化锌(235)	
附录	236
一、常用外文参考表	236
二、名词解释	238
索引	253

第一部分 药物的基本常識

一、药物的制剂

把原料药根据医疗上的需要制成各种便于服用的药品,就叫“制剂”。制剂的类型共有几十种,目前医药供应部門經常供应的共有十余种,现将这些制剂扼要地解釋如下:

(一)液体制剂

1. 注射剂(液)(*Injectio*): 也叫安瓿剂(*Ampulla*), 就是一般叫的針药。这类制剂經過严密消毒,专供注射用。一般可以分为下列三种形式:

(1) 一种是药物溶于水、油类或其他适当的溶剂中密封在瓶里或熔封在安瓿里而成。药物溶于水的注射剂,如葡萄糖、氯化鈉、氯化鈣等注射剂。药物溶于油的注射剂,如樟脑注射液、黄体酮注射液等。

(2) 一种是药物的粉末密封在安瓿或小瓶里,用时以蒸溜水或其他溶剂溶解后再用,如注射用新肺炎納明(九一四)、青霉素、鏈霉素等。

(3) 一种是药物的粉末悬浮在油类中密封在安瓿或小瓶里而成,如油制青霉素普魯卡因注射液(大油或小油)等。

2. 芳香水剂(水剂)(*Aquae aromaticae*): 是揮发油或其他揮发性药物的水溶液,多供內服用。例如:薄荷水、杏仁水等。

3. 溶液(*Liquor*): 是不揮发性药物的水溶液,供內服或外用。內服的如复方維生素B溶液。外用的如汞溴

紅溶液(紅药水)、甲紫溶液(紫药水)。(这两种制剂应当叫它們溶液,因为汞溴紅和甲紫都是沒有揮发性的药物,但是市面上一一般都叫它們为紅药水、紫药水。这是因为它們是用水作溶剂制成的,所以有这样的俗称。)

4. 糖浆剂(Syrupus): 是單純的稠厚糖溶液,或含有药物的稠厚糖溶液。如: 单糖浆、远志糖浆等。

5. 酊剂(Spiritus): 是揮发性药物的酒精溶液,例如亚硝酸乙酯酊。但揮发性的碘的酒精溶液,习惯上仍称为“碘酊”(俗称“碘酒”),是一个例外。

6. 酊剂(Tinctura): 多指植物性生药的酒精浸出液,如复方大黃酊、远志酊等。

7. 流浸膏(Extractum liquidum): 将生药的酒精或水浸出液濃縮制成。通常每毫升流浸膏相当于原生药1克,也就是說将1,000克原生药可制出1,000毫升流浸膏,如甘草流浸膏、当归流浸膏等。

8. 浸膏(Extractum): 就是把生药的浸出液比流浸膏更加濃縮,即濃縮到固体或半固体状态为止。通常每1克浸膏約相当于原生药2~5克,如甘草、当归等生药也可以制成浸膏。

9. 合剂(Mistura): 普通指含有不溶性药粉的水溶液。溶液里面通常加入甘油、树胶等物质增加粘度,以防止不溶性药粉沉淀,但应用时必须振蕩,使药物均匀。例如复方甘草合剂等。

10. 乳剂(Emulsio): 是借乳化剂(如阿拉伯树胶等)的作用使油脂或树脂质混悬在液体中,如魚肝油乳剂等。

(二)固体制剂

1. 散剂(粉末剂)(Pulvis): 一种或几种固体药品研

和而得的粉末，內服或外用，內服的如健胃散、頭痛粉等。外用的如痲子粉、脚气粉等。

2. 片剂(Tabellae): 从前也称“錠剂”。

(1) 一般片剂: 是用药粉压制成的小圆片, 多供口服, 如阿司匹林片、磺胺噻唑片等。也有专供外用的片剂, 如升汞毒片、避孕药片等。

(2) “含片”或“喉片”: 这种药片里面加入了蔗糖, 服用时含在口内让它慢慢溶化, 使在口腔及咽喉部发挥药的作用, 如青霉素喉片、含碘喉症片等。

(3) 糖衣片: 是在压好的片子外面包一层糖衣, 可以遮盖不快的药味, 如糖衣硫酸奎宁片、糖衣对氨基水杨酸钠片等。

(4) 肠衣片: 是在压好的片子外面, 包一层肠衣(原料为萨罗等), 使药片能抵抗胃酸的作用, 通过胃中不起变化, 到肠内才被溶解发生作用, 例如噻碘方片(安痢生片)等。

3. 丸剂(Pilulae): 是球形或长圆形的固体制剂, 外面通常包有丸衣(有糖衣、有肠衣), 可以掩盖不快的药味, 如复方碳酸亚铁丸(红色补丸)等。

4. 胶囊剂(Capsulae): 把药粉或药液装在胶囊内而成, 便于内服。如合霉素胶囊、四氯乙烯胶丸等。

5. 栓剂(Suppositorium): 又名“坐药”或“塞药”是以定量药粉和柯柯豆脂或甘油明胶等基质熔铸而成的栓状固体制剂, 形状是按施用在人体的腔道不同而有不同, 用时插入肛门、阴道、尿道等处遇体温即熔化, 发生药效, 例如: 甘油栓、避孕栓等。

6. 软膏剂(Unguentum): 以定量药品和油脂或凡士林等调和制成的油膏, 多供外用, 如磺胺噻唑软膏、氧化锌

軟膏。专供眼用的軟膏就叫“眼膏”(Oculentum),制造时通常經過灭菌消毒,如黃氧化汞眼膏、青霉素眼膏等。

二、給药的方法

(一)口服 为最常用的給药方法,它的优点是既簡便又安全。药物口服后,可經過胃腸吸收而作用于全身或留在胃腸中对胃腸局部发生药效(如治胃痛药、泻药等)。如病人昏迷不醒或不能咽下,或口服不能达到药物作用时,应考虑其他用法。现将口服制剂时应注意之事項,分別說明如下:

1. 丸剂和片剂:一般讲来,苦味或难吃的药物,常在片、丸剂外面包有糖衣(如糖衣硫酸奎宁片),对口腔和胃粘膜有刺激性的药品,常在片丸剂外面包有腸衣(如腸衣对氨基水楊酸鈉片),这些药品都应当吞服,服用时不可把它咬破。含片或喉片(如青霉素喉片、薄荷喉症片)是要药物在口腔及咽喉局部发挥作用,因此应当含在口里让它慢慢溶化。而不要一气吞下去。

2. 胶囊剂和胶丸剂:苦味及难吃的药物(如合霉素、魚肝油),或对口腔和胃壁粘膜的刺激太大的药物(如四氯乙烯胶丸),通常都装入胶囊內或制成胶丸,因此服用时,切不可将胶囊咬破或压碎。

3. 液体制剂中的水剂、溶液、糖浆、合剂等服法簡便,因此不加說明。仅把其中較特殊的情况重点說明如下:合剂中含有不溶性药物,服前应振蕩均匀,有些糖浆制剂如咳嗽糖浆服前也应搖匀。消化药中的稀盐酸和含鉄补药,服用时必须冲淡,最好用麦杆吸入。服药后要漱口,因为酸类能损坏牙齿,鉄剂会使牙齿变色。