


上海大学面向 21 世纪教学改革教材

数 学 分 析

(下册)



上海大学出版社

· 上 海 ·

内 容 提 要

本书是上海大学朱正佑和秦成林同志合编的《数学分析》的下册。内容包括瑕积分、级数理论、多元函数微分学和积分学、隐函数和多元函数极值理论及多元函数的积分理论。本书采用 Banach 空间的观点讲述了函数一致收敛和平均收敛的概念；采用 Hilbert 空间的观点讲述了三角级数收敛的概念；在曲线积分和曲面积分的阐述中，强调了有关的物理、力学背景和一些重要公式的物理意义。

本书可作为理工科大学和师范院校数学系、力学系本科生的教材，也可作为理工科其他专业本科学生学习高等数学的教学参考书，同时还可供从事数学分析、高等数学教学的教师以及数学系、力学系的研究生参考。

图书在版编目 (C I P) 数据

数学分析. 下册/朱正佑编. — 上海: 上海大学出版社, 2001. 7

ISBN 7-81058-315-8

I. 数… II. 朱… III. 数学分析 - 高等学校 - 教材 IV. O17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 032948 号

上海大学出版社出版发行

(上海市延长路 149 号 邮政编码: 200072)

常熟市印刷八厂印刷 各地新华书店经销

开本 880×1230 1/32 印张 15.25 字数 434 000

2001 年 7 月第 1 版 2001 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 1 050

定价: 26.50 元

目 录

第八章 广义积分	1
§ 1 无穷区间上的定积分	1
§ 2 无界函数的广义积分	16
第九章 数项级数	31
§ 1 基本概念	34
§ 2 正项级数	40
§ 3 一般级数的判别法	50
§ 4 级数重排	57
第十章 函数项级数和幂级数	67
§ 1 函数项序列及其基本性质	67
§ 2 函数项级数及其基本性质	82
§ 3 幂级数的基本性质	87
§ 4 函数的 Taylor 展开	96
§ 5 连续函数的多项式逼近	99
第十一章 傅立叶级数	107
§ 1 三角级数的一致收敛性	109
§ 2 傅立叶级数收敛性的进一步讨论	131
§ 3 一般区间上函数的三角级数展开	139
第十二章 多元函数的微分学	151
§ 1 平面上的点集	153
§ 2 二元函数的极限和连续性	169
§ 3 多元函数的一阶微分和一阶偏导数	184
§ 4 高阶偏导数、高阶微分和泰勒公式	209
第十三章 隐函数定理和极值	222
§ 1 隐函数定理	222

§ 2 变数变换和同胚	236
§ 3 雅可比行列式的几何意义	244
§ 4 多元函数的极值	249
第十四章 含参变量的积分	273
§ 1 含参变量的积分	273
§ 2 含参变量的广义积分	283
§ 3 一些例子	296
第十五章 二元函数的重积分	306
§ 1 平面图形的测度	306
§ 2 二元函数的重积分	313
§ 3 化重积分为累次积分	324
§ 4 变数变换	339
§ 5 一些简单的应用	357
第十六章 曲线积分	367
§ 1 曲线的定向	368
§ 2 第一型曲线积分	372
§ 3 第二型曲线积分	380
§ 4 格林(Green)公式	392
§ 5 积分与路径无关的条件	405
第十七章 曲面积分	420
§ 1 曲面的侧	420
§ 2 空间曲面的面积	428
§ 3 第一类曲面积分	436
§ 4 第二类曲面积分	443
§ 5 高斯公式	454
§ 6 斯托克斯公式	464
参考书目	477
编后语	480
注: 若课时不够, 书中加“*”处可以不讲	

第八章 广义积分

在上一章定积分的讨论中,我们总假定积分区间的长度是有限的,而且被积函数是有界的。然而在实际应用和进一步的理论研究中都需要放宽这两个限制,即对无穷区间或无界函数进行定积分运算。本章讨论定积分在这两个方面的拓广。在 §1 中我们先讨论无穷区间上的定积分,然后在 §2 中讨论无界函数的定积分。

§1 无穷区间上的定积分

1.1 无穷区间上的定积分的定义

考察 $[1, +\infty)$ 区间上的函数 $y = \frac{1}{x^2}$ 。这个函数在 $[1, +\infty)$ 是恒正的连续函数。由定积分理论知,在 $[1, b]$ 区间上 ($b \geq 1$), 由这个函数界定的曲边梯形的面积为

$$\int_1^b \frac{dx}{x^2} = 1 - \frac{1}{b} \quad (1.1)$$

如果我们让 b 增大,这时曲边梯形的图形向右延伸,如图 8.1 所示。当 $b \rightarrow +\infty$ 时,由 (1.1) 知这个向右不断延伸的曲边梯形的面积以 1 为极限。因此,很自然地把 Oxy 平面上位于 $x = 1$ 右侧, x 轴上方和 $y = \frac{1}{x^2}$ 下方的图形的面积定义为这个极限 1。不过应注意并非




图 8.1

对任意在 $[a, +\infty)$ 上的恒正、连续函数 $f(x)$, 即使满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 都会使极限

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

存在。例如, 在 $[1, +\infty)$ 上的函数 $y = \frac{1}{x}$ 就是这样。实际上由

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_1^b \frac{1}{x} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \ln b = +\infty$$

因而平面 Oxy 上位于 $x = 1$ 右侧, x 轴上方和 $y = \frac{1}{x}$ 下方的图形没有(有限的)面积。

现在抛开具体的“面积”的含义, 假定 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义且对任意 $b \geq a$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。如果极限

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx \quad (1.2)$$

存在, 我们称它为函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上的广义积分, 记为

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad (1.3)$$

同时称广义积分是收敛的或 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上是可积的。反之, 若极限(1.2)不存在, 则说广义积分(1.3)是发散的或 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上是不可积的。发散的广义积分(1.3)不表示任何数。

在上面讨论中, 积分下限总是不变的。现在反过来, 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上有定义, 且对任意 $a \leq b$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。如果极限

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx \quad (1.4)$$

存在, 则我们把这一极限称为 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上的广义积分, 记为

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx \quad (1.5)$$

并称广义积分(1.5)是收敛的或 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上可积;反之,则称广义积分(1.5)是发散的或 $f(x)$ 在 $(-\infty, b]$ 上是不可积。

最后,假设 $f(x)$ 在整个数轴上都有定义,且对任意 $a \leq b$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。如果 a 和 b 彼此独立无关地分别趋于 $-\infty$ 和 $+\infty$ 时, $\int_a^b f(x)dx$ 趋向于 I ,确切地说,对任给 $\epsilon > 0$ 总存在 $A > 0$,使得当 $a < -A, b > A$ 时永远有

$$\left| \int_a^b f(x)dx - I \right| < \epsilon \quad (1.6)$$

则称 I 是 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的广义积分,记为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \quad (1.7)$$

同时称广义积分(1.7)是收敛的或 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可积。反之,则称广义积分(1.7)是发散的或 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不可积。

利用极限的符号,把 a 和 b 彼此独立地分别趋向于 $-\infty$ 和 $+\infty$ 时 $\int_a^b f(x)dx$ 的极限 I 记为

$$I = \lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow +\infty}} \int_a^b f(x)dx$$

于是,我们有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow +\infty}} \int_a^b f(x)dx \quad (1.8)$$

显然,广义积分(1.7)收敛的充要条件是两个广义积分

$$\int_{-\infty}^0 f(x)dx \quad \text{和} \quad \int_0^{+\infty} f(x)dx$$

都收敛,且这时有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx \quad (1.9)$$

例 1 计算广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ 。

解 因为 $\int_a^b \frac{dx}{1+x^2} = \arctan b - \arctan a$

所以

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan b = \frac{\pi}{2} \\ \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} -\arctan a = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

于是,我们有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$$

例 2 计算广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^x dx$ 。

解 因为 $\int_a^b e^x dx = e^b - e^a$

所以

$$\int_{-\infty}^0 e^x dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} (1 - e^a) = 1$$

又因为当 $b \rightarrow +\infty$ 时 $e^b \rightarrow +\infty$, 所以积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^x dx$ 是发散的, 从而 $f(x)$

在 $(-\infty, +\infty)$ 上不可积。

例 3 考察广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \cos x dx$ 。

解 因为 $\int_a^b \cos x dx = \sin b - \sin a$

且当 $x \rightarrow \infty$ 时, $\sin x$ 不存在极限, 所以 $\cos x$ 在 $(-\infty, 0), (0, +\infty)$ 和 $(-\infty, +\infty)$ 上都是不可积的。

例 4 考察广义积分 $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} (a > 0)$ 。

解 因为当 $p \neq 1$ 时, 对任意 $0 < a \leq b$ 有

$$\int_a^b \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p} (b^{1-p} - a^{1-p})$$

所以当 $p > 1$ 时, x^{-p} 在 $[a, +\infty)$ 上可积, 且

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1} a^{1-p} \quad (p > 1, a > 0)$$

而当 $p < 1$ 时, x^{-p} 在 $[a, +\infty)$ 上不可积。

对 $p = 1$ 时, 由

$$\int_a^b \frac{dx}{x} = \ln b - \ln a \rightarrow +\infty \quad (b \rightarrow +\infty)$$

所以 $\frac{1}{x}$ 在 $[a, +\infty)$ 上也不可积。

1.2 基本运算法则

下面只对 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 型的广义积分进行讨论, 所有结论都能容易

地搬到 $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ 型和 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 型的广义积分中去。

设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, 且对任意 $b \geq a$, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上

可积。本节中总认为这个假定是成立的。考虑变动上限的定积分

$$F(x) = \int_a^x f(x) dx \quad (x \geq a) \quad (1.10)$$

由定积分理论知, $F(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的连续函数。利用(1.10)给出的函数 $F(x)$, 广义积分(1.3)的定义可复述为: 如果当 $x \rightarrow +\infty$ 时函数 $F(x)$ 有极限, 则广义积分(1.3)收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$$

反之, 如果当 $x \rightarrow +\infty$ 时函数 $F(x)$ 的极限不存在, 则称广义积分(1.3)是发散的。从这个意义上说, 广义积分(1.3)就是由(1.10)给出的函数 $F(x)$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限。因为函数的极限已有许多运算法则, 所以对广义积分(1.3)理应也有相应的运算法则。

(1) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积, 则 $f(x) \pm g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上也可积, 且

$$\int_a^{+\infty} (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^{+\infty} f(x) dx \pm \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积, 则对任意常数 k , $kf(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上也可积, 且

$$\int_a^{+\infty} (kf(x)) dx = k \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

这两条运算法则的证明相当简单, 请读者自己完成证明。

然而广义积分(1.3)作为由变动上限的定积分(1.10)给出的一种特殊的函数 $F(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限, 因为 $F(x)$ 还具有一些定积分的运算法则, 所以理应使广义积分(1.3)也会有相应的运算法则。对定积分来讲, 分部积分法和变数变换是两个重要的运算法则, 对广义积分(1.3)自然也会有相应的运算法则。

(3) 分部积分公式 设 $u'(x), v'(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上存在, 且对任

意 $b \geq a$, $u'(x)$ 和 $v'(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\int_a^{+\infty} uv' dx = uv|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} vu' dx \quad (1.11)$$

注 1 (1.11) 中的 $uv|_a^{+\infty}$ 表示如下极限

$$uv|_a^{+\infty} = \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x)v(x) - u(a)v(a) \quad (1.12)$$

(1.11) 的含义是 (1.11) 的三项中若有两项是收敛的, 例如 (1.12) 收敛和 $\int_a^{+\infty} vu' dx$ 收敛, 则另一项, 如 $\int_a^{+\infty} uv' dx$, 也必收敛, 且有 (1.11) 成立。

证明 对任意 $b \geq a$, 因为

$$\int_a^b uv' dx = uv|_a^b - \int_a^b u'v dx$$

在上式中令 $b \rightarrow +\infty$, 利用极限的性质立即得 (1.11), 证毕。

(4) 变数变换公式 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $x = \varphi(t)$ 是区间 $[a, +\infty)$ 到 $[a, +\infty)$ 上的一个变数变换, $\varphi(a) = a, \varphi(+\infty) = +\infty$, 且 $\varphi'(t)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 则两个广义积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad \text{和} \quad \int_a^{+\infty} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

有相同的收敛性。当它们收敛时, 有

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^{+\infty} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \quad (1.13)$$

证明 记 $x = \varphi(t)$ 的反函数为 $t = \psi(x)$ 。于是对任意 $b \geq a$, 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\psi(a)}^{\psi(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt = \int_a^{\psi(b)} f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$$

注意到 $b \rightarrow +\infty$ 时 $\psi(b) \rightarrow +\infty$, 所以在上式中令 $b \rightarrow +\infty$ 就得到 (1.13)。证毕。

这里我们只叙述了 $[a, +\infty)$ 到 $[a, +\infty)$ 上的变数变换 $x = \varphi(t)$

的积分变换公式 (1.13)。类似的推导方法也适用于 $(\alpha, \beta]$ 到 $[a, +\infty)$ 的变数变换, 例如 $x = \frac{1}{t}$ 是 $(0, 1]$ 到 $[1, +\infty)$ 上的一个变数变换, 请读者自行写出这时相应于 (1.13) 的计算公式, 并说明这个公式的含义。

1.3 广义积分收敛的条件

前面已经指出广义积分 (1.3) 的收敛性依赖于当 $x \rightarrow +\infty$ 时由 (1.10) 给出的 $F(x)$ 的极限的存在性。实用中, 当 $f(x)$ 比较复杂时, 由 (1.10) 确定的 $F(x)$ 很难给出显式的解析表达式。从而使得我们很难判断当 $x \rightarrow +\infty$ 时按这一定义的 $F(x)$ 是否有极限。本节希望给出一些方法, 能够直接从 $f(x)$ 的性质 (不需求出 $F(x)$) 判定广义积分 (1.3) 的收敛性。我们回顾到当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 判断函数 $F(x)$ 极限存在, 有两个重要的判断方法: 柯西 (Cauchy) 判别法和单调有界判别法。柯西判别准则指出了当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $F(x)$ 有极限的准则是: 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $A > 0$, 使得当 $x', x'' > A$ 时有 $|F(x') - F(x'')| < \varepsilon$ 。对广义积分收敛性的判断来讲, 因为 $F(x)$ 是由 (1.10) 给出的, 所以有

$$|F(x') - F(x'')| = \left| \int_a^{x'} f(x) dx - \int_a^{x''} f(x) dx \right| = \left| \int_{x'}^{x''} f(x) dx \right|$$

这样我们得到广义积分收敛的如下判断准则。

定理 1.1 (Cauchy 判别准则) 广义积分 (1.3) 收敛的充要条件是对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $A > 0$, 使得当 $x', x'' > A$ 时总有

$$\left| \int_{x'}^{x''} f(x) dx \right| < \varepsilon \quad (1.14)$$

因为对任意有限区间 $[x', x'']$ (或 $[x'', x']$), 我们总有

$$\left| \int_{x'}^{x''} f(x) dx \right| \leq \int_{x'}^{x''} |f(x)| dx$$

所以由 Cauchy 判别准则立刻得到

推论 1.1 如果广义积分

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx \quad (1.15)$$

收敛,则广义积分(1.3)收敛。

根据这一推论,当(1.15)收敛时,我们称广义积分是绝对收敛的。当然由(1.3)的收敛不一定能断言(1.15)收敛,这一点将在以后再举例说明。我们把本身收敛,而(1.15)发散的广义积分(1.3)称为条件收敛的。

现在我们来分析一下函数 $F(x)$ 极限存在的单调有界收敛原理。这个原理说若存在 A , 使在 $[A, +\infty)$ 上 $F(x)$ 是单调上升的(为了确定起见,这里把单调改成单调上升) 且是有上界的, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $F(x)$ 有极限。注意到由(1.10)给出的 $F(x)$, 当 $x' > x''$ 时, 有 $F(x') - F(x'') = \int_{x''}^{x'} f(x) dx$ 。所以只要被积函数 $f(x)$ 在 $[A, +\infty)$ 上非负, 则 $F(x)$ 在 $[A, +\infty)$ 上是单调上升的。这样我们得到广义积分收敛的另一判断准则:

定理 1.2 设存在 $A \geq a$, 使得被积函数 $f(x)$ 在 $[A, +\infty)$ 非负, 则广义积分(1.3)收敛的充要条件是存在常数 K , 使得

$$\int_a^x f(x) dx \leq K \quad (x \in [a, +\infty)) \quad (1.16)$$

成立。

这个定理的详细证明请读者自行完成。

利用定理 1.2, 立刻可得到如下控制收敛原理。

定理 1.3(控制收敛原理或比较判别法) 设存在 $A \geq a$ 使得

$$0 \leq f(x) \leq g(x), \quad \text{当 } x \geq A \text{ 时} \quad (1.17)$$

若 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 是可积的, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上也可积, 或者说, 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上不可积, 则 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上必不可积。

证明 设 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积, 由定理 1.2 知, 存在 $k_1 > 0$ 使得

$$\int_a^x g(x)dx \leq k_1 \quad (x \in [a, +\infty))$$

现在,取 $M > 0$ 是 $[a, A]$ 上的连续函数 $\int_a^x f(x)dx$ 的一个上界,同时取常

数 K 满足 $K \geq M$ 和 $K \geq \int_a^A (f(x) - g(x))dx + k_1$, 于是对任意 $x \in [a,$

$A]$, 我们显然有 $\int_a^x f(x)dx \leq M \leq K$ 。而当 $x \geq A$ 时, 有

$$\begin{aligned} \int_a^x f(x)dx &= \int_a^x (f(x) - g(x))dx + \int_a^x g(x)dx \\ &= \int_a^A (f(x) - g(x))dx + \int_a^x g(x)dx + \int_A^x (f(x) - g(x))dx \end{aligned}$$

因为在 $[A, x]$ 上 $f(x) - g(x) \leq 0$, 所以由上式知

$$\int_a^x f(x)dx \leq \int_a^A (f(x) - g(x))dx + k_1 \leq K$$

这样我们已经证明了,对任意 $x \in [a, +\infty)$ 有 $\int_a^x f(x)dx \leq K$, 于是由定理 2 知, $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积。证毕。

在应用这个定理时,需检验条件(1.17)成立。通常这种检验工作是通过计算极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 来完成的。实际上,如果当 x 足够大时, $f(x)$ 和 $g(x)$ 非负且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l \quad (0 \leq l < \infty) \quad (1.18)$$

则对任给 $\epsilon > 0$, 存在 A , 当 $x \geq A$ 时, 有 $f(x) \leq (l + \epsilon)g(x)$ ($x \geq A$)。于是, 当 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积时, 因为 $(l + \epsilon)g(x)$ 也在 $[a, +\infty)$ 上可积, 从而由控制收敛法则知, $f(x)$ 也在 $[a, +\infty)$ 可积。这样, 我们

得到了定理 3 的如下推论。

推论 1.2 如果 $f(x)$ 和 $g(x)$ 当 x 足够大时非负。若 (1.18) 成立, 则由 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 可积可推出 $f(x)$ 也在 $[a, +\infty)$ 可积。若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l \quad (0 < l \leq +\infty) \quad (1.19)$$

则由 $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 不可积可断言: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上不可积。

推论中的第一部分结论, 我们已经作了证明。第二部分的证明和第一部分的证明类似, 请读者自行完成。

当我们知道了一些函数的可积性时, 就可以用它们作为标准, 取为定理 3 或其推论中的 $g(x)$, 去判断其他函数的可积性。作为这种标准的函数最常用的是 $\frac{1}{x^p}$ 。例 4 中已指出了: 当 $p > 1$ 时它在 $[a, +\infty)$ 上的积分是收敛的, 而 $p \leq 1$ 时是发散的, 其中 a 为任一正数。利用这一标准函数作为 $g(x)$, 我们得到如下的判别法。

定理 1.4 (柯西判别法) 如果存在 $A \geq a$, 使得当 $x \in [A, +\infty)$ 时有

$$0 \leq f(x) \leq \frac{c}{x^p} \quad (p > 1)$$

其中 c 为正常数, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积。

定理 1.4' (Cauchy 判别法的极限形式) 设 $f(x)$ 当 x 足够大时非负, 如果对某 $p > 1$ 极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = l \quad (l < +\infty)$$

存在, 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可积; 如果对某 $p \leq 1$ 极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p f(x) = l > 0$$

则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上不可积。

例 5 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x\sqrt{1+x}} dx$ 的收敛性。

解 因

$$\left| \frac{\sin x}{x\sqrt{1+x}} \right| \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x}} \quad (1.20)$$

而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{x\sqrt{1+x}} = 1$, 所以 $\frac{1}{x\sqrt{1+x}}$ 在 $[1, +\infty)$ 上可积, 再由

(1.20) 知, $\frac{|\sin x|}{x\sqrt{1+x}}$ 在 $[1, +\infty)$ 上可积, 从而 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x\sqrt{1+x}} dx$ 是绝对收敛的。

例 6 讨论下面积分的收敛性

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x} dx; \quad (2) \int_1^{+\infty} \left(e^{-\frac{a^2}{x^2}} - e^{-\frac{b^2}{x^2}} \right) dx.$$

解 (1) 被积函数当 $x \rightarrow +\infty$ 时为 $\frac{1}{x}$ 的一阶无穷小量, 所以积分发散。

(2) 被积函数当 $x \rightarrow +\infty$ 时为 $\frac{1}{x}$ 的二阶无穷小量, 所以积分绝对收敛。

例 7 讨论积分 $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln x}$ 的收敛性, 其中 p 是实常数。

解 当 $p > 1$ 时, 取 q 满足 $p > q - 1 > 0$. 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^q \cdot \frac{1}{x^p \ln x} = 0$$

所以由 Cauchy 判别法的极限形式知, 这个积分绝对收敛。

当 $p = 1$ 时, 由 $\int_2^b \frac{dx}{x \ln x} = \ln \ln x \Big|_2^b$, 故当 $b \rightarrow +\infty$ 时, $\int_2^b \frac{dx}{x \ln x} \rightarrow +\infty$, 所以积分发散。

当 $p < 1$ 时, 取 q 使得 $p < q < 1$, 由

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^q \cdot \frac{1}{x^p \ln x} = +\infty$$

所以, 由 Cauchy 判别法(极限形式)知积分发散。