

邹春梅、刘俊、黄爱群 编写

新英汉
医学缩略语词典

新英汉医学缩略语词典

邹春梅 刘 俊 编
黄爱耕 廖大渊
杨学志 张国忱 审

江西科学技术出版社

一九八七·年南昌

内 容 介 绍

本书以日本藤泽俊雄等著1981年版《ポケット医学略语辞典》和泽木修二著1981年版《医学略语小辞典》为蓝本，大量参阅了国内外医学缩略语辞典和医学期刊杂志，并以新近出现之医学缩略词为主，汇编成这本《新英汉医学缩略语词典》。内容涉及临床各科和医学各个学科。全书共收10,133词条，其中3454条并有释义，是阅读医学书刊和翻译医学文献之必备工具书。

新 英 汉 医 学 缩 略 语 词 典

邹春梅 刘俊 编
黄爱耕 廖大渊

江西科学技术出版社出版

(南昌市红魏路5号)

江西省新华书店发行 江西印刷公司印刷

开本：787×1092 1/32 印张：14.75 字数：48万

1987年8月第一版 1987年8月第一次印刷

印数：1—4,450

统一书号：9425.8 定价：4.80元

前 言

近年来,医学科技发展迅速,新的缩写词不断涌现,为适应阅读医学文献及翻译工作的需要,我们以日本藤泽俊雄著一九八一年版《ポケット医学略语辞典》和泽木修二著一九八一年版《医学略语小辞典》为蓝本,并大量参阅了国内外其他医学缩略语词典和医学期刊,广采博纳,力求做到以汇集新近出现的医学缩略词为主,汇编成这本《新英汉医学缩略语词典》。本书涉及临床各科,以及生理、解剖、生化、病理、药物、免疫、微生物等多方面内容,全书共收10133词条,其中3454条并有释义,以词条MCLS为例,除全称(acute febrile muco-cutaneous lymphonode syndrome)译名“急性发热性粘膜皮肤淋巴结综合征”之外,还对该病之主要症状作简要的描述,这也是本书特点之一。

本书承蒙著名妇产科专家杨学志教授、放射学专家张国忱教授在百忙中为之审稿,藉此谨致由衷的谢意。

本书在编写过程中,还得到丁永善副教授、刘肇清副教授、李子瑜副教授、张成武副教授对有关专业词条指导修缮,谨致谢意。

参加本书整理工作的还有张俊和倪勇文同志。

由于我们知识水平有限,缺点错误在所难免,诚恳希望读者批评,指正。

编 者

1989.6/7

体 例 说 明

- 一、本词典所收之缩略词按英语字母顺序编排
- 二、同形异义词条按全称字母顺序编排，重排，重复缩写形式
- 三、词条由略语、全称、译名、及释义组成，词条末尾有“＝”号者，表示近义词或相同，“→”表示参看有关词条
- 四、缩写词用黑体，语种用括号，缩写词源于英、美者，不标明语种，源于英、美以外者一律标明语种

目 录

体例说明	1
英汉缩略词典正文	1—1294

A

- A** absorbance 吸光度 (=E)
- A** adrinaline 肾上腺素
- A** allergy 变态反应, 超敏反应
机体受某一抗原或半抗原刺激后, 发生的一种表现为组织损伤或生理功能紊乱的特异性免疫反应
- A** ampere 安培 电流单位。源于法国人名 A. M. Ampère
- A** androsteron 雄性激素
- A** angiotensin 血管紧张素
- Å** (A, Au) angstrom 埃
光波波长单位。源于瑞典物理学家 Angstrom. 用于光学或结晶学, 表示波长。1 Å = 0.1 μm (毫微米) = 10⁻¹⁰m
- A₂** zweiter Aortenton (德)
主动脉第二音 (aortic second sound) 一般是在第二肋间的胸骨右缘附近听诊的主动脉心脏瓣膜音的第二音, 系指心脏舒张期初期心脏瓣膜闭锁时的音。通过此音的强弱及与第二肺动脉音 (P₂) 的比较而发现问题的较多。 (=P₂)
- A** arteria(e) (拉) 动脉 例如: 总颈动脉为 A carotis communis, 英语为 common carotid artery
- A** atrium 心房
- A** Auge (德) 眼科 检查项目
- AA** achievement age 成就年龄, 知能年龄
- AA** Alcoholics Anonymous
匿名酒精中毒者协会 对酒精中毒的治疗, 必须有地区、社会中集体方面的支持。1935年在美国成立了匿名酒精中毒者组织, 此组织现已扩大为国际性组织
- AA** (aa) alcoholics anony-mous 无水酒精
- AA** ¹³¹I- aggregated albumin
¹³¹I 凝集白蛋白 (→¹³¹I-AA)
- AA** aortic arch 主动脉弓
- AA** aplastic anemia 再生障碍性贫血 骨髓造血功能低下或衰竭所引起的一种贫血, 伴有白细胞及血小板显著减少
- AA** arrhythmia absoluta (拉)
绝对心律不齐
- AA** ascorbic acid 抗坏血酸 (=VC)
- AA** audiometric assistant 助听器
aa, aa anapartes aequales (拉) 等分量地处方用语
- AAA** abdominal aortic

aneurysm 腹主动脉瘤

AAA acquired aplastic anemia

获得性再生障碍性贫血

AAA acute anxiety attack

急性焦虑发作

AAA androgenic anabolic agent

雄性激素同化剂

aADco₂ arterial-alveolar

carbon dioxide tension

difference 动脉血、肺泡二
氧化碳气张力差

AaDo₂ alveolararterial oxygen
difference (deviation)

肺泡动脉血氧分压比(肺泡与
动脉血氧张力差) $AaDo_2 =$

$P_{AO_2} - P_{aO_2}$ 正常值在 20

mmHg 以下, 扩散能力减退时

则增大。AaDo₂ 打开时, 有

换气/血流分布异常, 则认为
有左右分流或扩散障碍

AAE active assistive exercise

自动协助锻炼(=MMT) 按

照理疗医生或器械的帮助来进

行的肌肉自动收缩锻炼, 肌力

在 2 (P) 时进行, 则有利于

增强肌力和协调运动

AAE autoallergic encephalo-

myetitis 自身(自体)交应性

脑脊髓炎(=MS)

AAF acetic alcohol-formalin

醋酸-酒精-甲醛液 一香固定

液

AAF ascorbic acid factor 抗

坏血酸因子 垂体前叶之一激

素, 系在促肾上腺皮质激素中
的一种促肾皮质激素

AAL anterior axillary line

腋前线

AAMC American Association

of Medical Colleges 美国

医学院联合会(美国医学院协

会)

AAP aminoantipyrine 匹拉米

酮(氨基替比林)有解热镇痛、

抗风湿等作用。用于高热、头

痛、伤风感冒、肌肉痛、牙痛、

关节痛、肩痛及风湿性关节炎

等。特异性体质者, 可发生

皮疹、过敏性紫癜、剥脱性皮

炎, 甚至出现过敏性休克, 长

期服药期间, 应经常检查血象

A&T adenoidectomy and

tonsillectomy 增殖腺切除

和扁桃腺切除术

AAR Antigen-Antikörper-

Reaktion (德) 抗原-抗体

反应

AAR Australia antigen

radioimmunoassay 澳洲抗

原放射免疫检验

AARIT antigen-antibody

reaction inhibition test

抗原-抗体反应抑制试验

AAS aortic arch syndrome

主动脉弓综合征 主动脉弓分

支的颈动脉、锁骨下动脉的炎

症性闭塞性疾病, 亦称弓部大

动脉炎、无脉症。患梅毒性或

非梅毒性主动脉炎时,因血栓形成或主动脉瘤的栓塞,引起桡动脉搏动消失,卧起时眩晕,意识障碍,全身症状,由于血管机能障碍而发生呼吸困难和类似心绞痛等症状

AAS atomic absorption spectroscopy 原子吸收分光镜检查

AAT acute abdominal tympany 急性腹部胀气

AAV adeno-associated virus 腺病毒相关病毒 与腺病毒同时增殖的小病毒

ab abortion 流产

Ab antibody 抗体 机体在抗原物质刺激下所形成的一类具有与抗原发生特异性结合反应的球蛋白(免疫球蛋白)

A/B acid/base ratio 酸/碱比率

AB asthmatic bronchitis 喘息性支气管炎

AB Augenbutter (德) 眼脂 包括泪液、皮脂、脱落上皮细胞、纤维素、尘埃、细菌、游走细胞。结膜有炎症时,则增加

ABA Abbott Bichromatic Analyzer 阿波特二核染色质分析器

ABA antibacterial activity 抗细菌活性

ABC absolute basophil count

嗜碱性白细胞绝对值计算

ABC alum, blood, charcoal process 明矾、血液、木炭方法 即所谓用明矾、血液、木炭净水法

ABC check for open airway. breathing and (blood) circulation 检查呼吸道、呼吸和循环 国际麻醉科学会推荐的复苏检查顺序:呼吸道、呼吸、循环、药物、心电图、心脏按摩、低体温、特别护理等

Abd abductio (拉) 外展(肌) 上臂或大腿从肩关节或股关节的前后轴线向外侧移动的运动。手、足的指,则是高中指的运动。例如:股关节的 Abd (=Add)

abd abdomen (拉) 腹部

abd Hyst abdominal hysterectomy 经腹子宫切除术

ABE acute bacterial endocarditis 急性细菌性心内膜炎 细菌直接感染心脏内膜的一种疾病,按病程可分急性和亚急性两种。急性者,可发生于正常心脏,致病菌以溶血性链球菌、金葡菌、肺炎球菌等为多见

ABF anti-bleeding factor 抗出血因子

AB gap air bone gap 空气传导骨传导听力差 为气传导听力和骨传导听力之差,空气传导

听力的降低产生与骨传导听力之间的差,可表示传音障碍

a. Bic. actual bicarbonate

实际碳酸氢盐 血液气体分析用语

ABL antigen-binding lymphocyte 结合抗原淋巴细胞

ABLB alternate binaural loudness balance test 双耳交替响度平衡测试 两耳听音大小平衡检查,在增加检查音量的同时,正常耳与病耳交替听音,亦称 Fowler 法

ABO-system ABO blood type (group) system ABO 血型分类系统 (ABO 血液型)

分为A型、B型、AB型、O型的血型。此外也有A₁、A₂、A₁B、A₂B、的划分方法,以及MN式、Rh式、P式等

ABPA allergic broncho-pulmonary aspergillosis 变应性支气管肺曲菌病

AB-Pc aminobenzyl penicillin 氨基苄基青霉素 (氨基苄青霉素) 广谱合成青霉素,适用范围较广,也称为 α -aminobenzyl-Pc, ampicillin. 血中浓度维持时间长,胆汁内会有高浓度,常用于细菌性痢疾、大肠伤寒菌性胆囊炎及脑膜炎、伤寒、副伤寒等

ABR-test abortus bang ring test 流产菌试验

ABr test agglutination test for brucellosis 布鲁氏杆菌病凝集试验

ABS acute brain syndrome 急性脑综合征

abs. feb. absente febre (拉) 不发热时

ABU asymptomatic bacteriuria 无症状细菌尿

AC abdominal circumscript 腹围 (=BU) 与德语 BU [Bauchumfang] 相同。对有腹水患者,定期在腹水穿刺排除前后测量。测量时,必须在与身体高度轴线成直角的肚脐面上用卷尺测量

Ac acetylcholine 乙酰胆碱 (=Ach)

AC air conduction 空气传导 听力 从气导耳机传出的声音,经外耳道、鼓膜、中耳腔到达内耳的听力,可由于外耳道、中耳炎疾患而降低。 (=LL)

AC ambulatory care 门诊监护

AC angle campimetry 视角中心视野测定 视野检查法

AC aortic close 主动脉关闭

AC anterior chamber 眼前房 在角膜与虹膜及晶状体间,内盛水样液

AC anterior commissure 前连合 解剖学用语,在脑和喉处有此连合

AC antiphlogistic corticoid
抗炎皮质类固醇

ac acidum (拉) 酸 (处方用语)

ac ad concham (拉) 耳语
听力检查, 对在正常距离内听力衰减的患者, 检查听力时, 缩短距离, 在患者耳旁说话, 使之听到

a. c. ante cibum (拉) 饭前
处方用语 (=a.p., v.d.E.)

ac (a) anterior communicating artery 前传导动脉 系连结两侧前大脑动脉, 易发生动脉瘤的部位

ACA active cutaneous anaphylaxis 敏感的皮肤过敏反应

ACA anterior cerebral artery 前大脑动脉

ACA anticomplementary activity 抗补体活性

ACA automatic clinical analyzer 临床自动分析器

Acasci acute anterior spinal cord injury 急性前部脊索损伤

A-C block alveolar-capillary block syndrome 肺泡-毛细血管梗塞综合征 在肺泡壁或者毛细血管增厚的肺部疾患中, 引起氧气扩散障碍, 形成呼吸困难

A-C Bypass aorto-coronary bypass 主动脉-冠状动脉分

流术 在冠状动脉严重狭窄、很可能发生心肌梗塞时, 作此手术, 用血管 (大多切下隐静脉) 连接大动脉和狭窄部的末端, 以确保血流, 改善左心室的功能, 预防心肌梗塞

ACC accommodation 调节 眼科用语 指睫状肌的收缩以调节晶状体, 使增加眼球的屈折力

ACC alveolar cell carcinoma 肺泡细胞癌

ACC anodal closing contraction, Anodenschließungszuckung (英, 德) 阳极闭锁收缩 测定使肌肉产生牵缩的阳极闭锁时的最小电流值

ACD absolute cardiac dullness 绝对心浊音区 (心脏绝对浊音) 心脏与胸壁直接接触部分的大小

ACD (blood) acid-citrate-dextrose (blood) 酸性枸橼酸葡萄糖液 血液抗凝固剂, 用以保存血液, 取血后加入柠檬酸、枸橼酸钠、葡萄糖液, 即成非凝固性可保存的血液

ACD actinomycin D 放线菌素 D (更生霉素) 抗肿瘤抗生素 (=ActD)

ACD allergic contact dermatitis 过敏性接触性皮炎

ACD angiocardiology 心脏血管造影术 由静脉直接将造影剂注入心脏进行连续的X线

摄影法

ACE mixture alcohol-chloroform ether mixture 酒精、氯仿、乙醚混合剂 一种全身麻醉剂

ACE angiotensin converting enzyme 血管紧张素转化酶

ACEP adriamycin, cyclophosphamide, predonine 阿霉素, 环磷酰胺, 泼尼松 抗癌化疗合剂

ACF accessory clinical finding 其他临床所见

ACG apex cardiography 心尖搏动图 描记每一心动周期各部分中, 心尖搏动位置的动态变化。用于诊断冠心病, 能间接反映心室舒张期动态的一种主要方法。系与心音、心电图同时记录心尖搏动的检查法

Ach acetylcholin 乙酰胆碱(乙酰胆碱) 胆碱能神经递质, 可将副交感神经、运动神经的刺激传至内脏。作用于M胆碱受体, 可致心率减慢, 血管扩张, 血压下降, 支气管和肠道平滑肌兴奋, 瞳孔缩小, 消化道与支气管的腺体以及汗腺分泌增加。也广泛分布于脑中, 是网状激活系统的递质

ACH arm, chest, height 上臂围, 胸围, 身长

AchE acetylcholin esterase 乙酰胆碱酯酶 乙酰胆碱水解

酶, 其作用为阻碍毒扁豆碱, 系在突触间隙灭活乙酰胆碱的酶

ACH index arm girth, chest depth, hip width index (of nutrition) 臂围-胸厚-臀宽指数 (关于营养)

ACI acute coronary insufficiency 急性冠状动脉功能不全 指冠心病突然发生的心绞痛或心肌梗塞所造成的心肌缺血综合征

ACI anticonvulsant index 抗阵挛指数

ACL albumin, casein, lecithin 白蛋白, 酪蛋白, 卵磷脂 胃切除后有综合征时所用处方

ACLS advanced cardiac life support 最新心脏生命维持法

AcM achromycin 阿克鲁霉素 四环素系的一种抗菌素

ACMS American Chinese Medical Society 美国中医学会

ACN acute conditional necrosis 急性条件性坏死

ACNU 1-(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)-methyl-3-(2-chlorethyl)-3-nitrosourea 4-氨基-2-甲基-5-嘧啶-甲基-3-(2-氯)-3-亚硝基脲 抗肿瘤药

ACP acetyl carrier protein

乙酰基载体蛋白

AcP acid phosphatase 酸性磷酸酶 正常值与碱性磷酸酶相同,按测定法而异。Bodansky氏法: 0.1—1.0u/ml, King-Armstrong 氏法: 0—4单位, Bessey-Lowry 氏法: 0.13—0.68单位。前列腺癌时,则此值明显增高;慢性粒细胞性白血病、骨髓组织变形、真性红细胞增多症、原发性血小板减少症、急、慢性淋巴细胞性白血病等轻度增高

ACPC aminocyclohexylpenicillin 氨基环己基青霉素 一种广谱合成的青霉素,对葡萄球菌、链球菌、肺炎球菌有效

ACPP adrenocorticepolypeptide 肾上腺皮质多肽

ACR anti-constipation regimen 抗便秘措施 (抗便秘生活制度)

ACS acute confusional status 急性昏迷状态 突然无意志和行为,对外界刺激无反应的一种昏迷状态

ACS antireticular cytotoxic serum 抗网状细胞毒血清

AC shock alternating current (counter) shock 交流电冲击 用交流电冲击的除纤颤器或除纤颤,现由于其效果及安全方面的关系已不大使用,而认为使用直流电的DC型较好

(=DC shock) (=DF)

ACT activating coagulation time 活化凝血时间 正常值: 50—90秒,由于此法省时,快速,故在应用抗凝治疗时,可在床边进行测定,便于临床随时调节肝素剂量

ACT alternating cover test 交替遮闭试验

ACT anticoagulant therapy 抗凝剂治疗

ACT atropine coma therapy 阿托品昏睡疗法

A-C test ascorbate-cyanide test 抗坏血酸-氰化物试验

ActD actinomycin D 放线菌素D 抗肿瘤抗菌物质(=ALD) 亦称为 dactinomycin

ACTH adrenocorticotrop(h)ic hormone 促肾上腺皮质激素 可促使肾上腺皮质分泌皮质激素类固醇激素。用于严重的急性感染、中毒性休克、血小板减少性紫癜、过敏性疾病、席汉氏综合征(垂体前叶机能减退)、急性粒细胞性白血病等,使用本品时可以滞钠排钾,故应给低钠高钾饮食。少数病人可有过敏反应。此激素除用作治疗药物外,也可用于检查垂体肾上腺皮质的机能

ACTP adrenocorticotrophic polypeptide 促肾上腺皮质多肽

ACVD acute cardiovascular disease 急性心血管疾病

ACW anti-clockwise 逆时针方向 与时针走向相反(-CW)

AD adenoidal degeneration 增殖腺退变 (腺样变性) 一种组织病理改变

AD Alentian Disease 阿留申氏病 一种慢性病毒感染, 病毒为DNA型, 大小约50nm以下

AD Alzheimer's disease 阿尔兹海莫病 由Alois Alzheimer (德国神经学家1864—1915) 所发现。此病系一种早老性痴呆, 脑小血管有玻璃样退化。除痴呆外, 也有其他变化, 最初症状为记忆障碍, 反应迟钝, 理解困难, 定向障碍, 病人逐渐不能处理日常生活, 进而发展为精神衰退而呈痴呆

AD drug addict 药瘾

AD Anfangsdruck (德) 初压 作腰椎穿刺检查髓液时, 一般需先测定脊髓液压力 (用mm H₂O记录)。称之为脊髓液检查前的压力。(=ID)

AD atopic dermatitis 特异反应性皮炎

AD atrium dexter (拉) 右心房

A.D. Anno Domini (拉) 公元 记述涉及公元前后的事。例如: Augustus (63 B.C.—A.D. 14). 正式的写法A.D.写

在年数前, B.C.写在年数的后面

Ad adrenaline (英) 肾上腺素 (=Adr) 系肾上腺分泌之激素, 亦称epinephrine, suprarenin, 肾上腺髓质激素。刺激交感神经末端, 能使小血管收缩, 心跳加快, 瞳孔扩大, 支气管扩张, 平滑肌松弛, 可用于局部, 为一种止血剂, 亦可皮下注射, 以止气喘发作及过敏性与血清病等反应

Ad assay date 鉴定日时 放射性医药品的鉴定日时。一般用于放射性药品的R I短半衰期的较多。鉴定药品的容量、放射能量、放射浓度, 以鉴定日时为准, 使用时以此为基点, 计算剂量

ad auris dextra (拉) 右耳

ADA adenosine deaminase 腺武脱氨(基)酶 分布于肌肉、肝、脾、肾、胰肠粘膜中

ADA anterior descending artery 前降枝动脉

AD conversion (converter) analog-digital conversion (converter) 模拟数字变换器 将曲线的连续量变为数字的量的器械 (=DA conversion)

ad-ca adenocarcinoma 腺癌

ADCC antibodydependent cell-medium cytotoxicity 抗体

依赖性细胞介导细胞毒素

Add. adductio (拉) 内收 (肌)

上臂或大腿由外侧向肩关节或股关节的前后轴线靠近的运动, 或从轴线向内侧远离的运动。在手、足的指、趾, 则是靠近中指 (趾) 的运动。例如, 股关节的 Add. (=Abd)

add. adde (拉) 加量 处方用语

ad deliq ad deliquium (拉)

昏厥状态 (昏迷状态)

Ade-Lec adeno-tonsillectomy

腺扁桃体切除术

ADEM acute disseminated

encephalomyelitis 急性播散性脑脊髓炎 常继发于流行性腮腺炎、麻疹、水痘、风疹、流感, 或在接种狂犬疫苗、天花疫苗, 或在注射外来血清后, 也有原发性的, 症状与一般流脑相似但轻些, 血中白细胞正常或减少, 脑脊髓中可见到细胞轻度增加, 糖和蛋白均正常, 可随原发病的恢复而痊愈

Adeno-virus adenoidal-pharyn-

geal-conjunctival virus 腺

病毒 (腺样、咽、结膜病毒)

进入上呼吸道, 能引起呼吸系统的炎症

ad.feb. adstante febre (拉)

发热时

ADH antidiuretic hormone

抗利尿激素 (加压素) 由垂体后叶分泌的激素之一, 亦称

Vasopressin, 系丘脑下部视上核神经细胞合成的一种激素, 贮存在神经垂体。主要能增加远曲小管和集合管对水的通透性, 从而增加对水的重吸收, 使尿量减少, 此外, 在药理剂量下, 它还能使小动脉和毛细血管普遍收缩, 使血压升高, 故又名加压素。缺乏此激素所引起的尿崩症, 大多由原因不明的垂体后叶萎缩而发生的, 但也有的由于炎症、肿瘤、外伤等而发生

ADI acceptable daily intake

一日允许摄取量 各种毒性农药的规定允许摄取量

ADKM aminodeoxykanamycin

氨基去氧卡那霉素 (卡那霉素 B)

ADL activities of daily living

(or life) 日常 (生活的) 活动

对身体机能障碍者恢复日常生活的指导及评定, 从身体恢复的情况分成各阶段, 客观地测定从起居、饮食、更衣、大小便到步行各种基本动作可能程度的情况

ad lib; ad libt ad libitum (拉)

随意量 (处方用语)

ADLT activities of daily li-

ving test 日常活动试验 (日

常生活活动试验) 对患者日常生活活动能力的评定试验

Adm admission, admit 入院

ADP adenosine diphosphate

二磷酸腺苷 腺苷磷酸酯的一种,具有一个高能磷酸键,在体内的各种营养素由AMP通过ADP以ATP的形式存储,当能源释放时,则过程相反

ADM adriamycin 阿霉素 抗癌剂,取自阿得利亚海沿岸土中而得名(=ADR)

ADPL adenopathies dysimmunities et pseudo-lymphomateuses (法)免疫异常和假淋巴瘤淋巴腺病

ADPL average daily patient load 平均每日病人负荷

ad-pro adrenaline-protalgol 肾上腺素-普洛泰戈 5,000倍肾上腺素与2%普洛泰戈的混合液,涂于鼻、咽喉炎患者的患处

ADQ abductor digiti quinti muscle 小指外展肌 从豌豆骨开始至小指第一节指骨底内侧缘为止的小指球肌,由尺骨神经(C₈, T₁)支配,外展小指

Adr. adrenalin (e) 肾上腺素 由肾上腺髓质分泌的激素,系交感神经末梢刺激剂的代表性药物,亦称肾上腺素(epinephrine),也有缩写成Ad的(=Ad)

ADR adverse drug reaction 药物有害反应

ADRS acute respiratory distress syndrome 急性呼吸窘迫综合征 成人于创伤或休克后并发急性呼吸功能衰竭的一组综合病征。又称成人呼吸困难综合征(adult respiratory distress syndrome)。病因与严重创伤、感染、休克、大面积烧伤、大手术后、大量输血、中毒、急性内脏穿孔或破裂等因素有关,临床表现有气急、浮肿、咳嗽、少尿,甚至发生尿毒症

ADS antibody deficiency syndrome 抗体缺乏综合征

ADS antidiuretic substance 抗利尿物质 包含抗利尿激素的物质,垂体后叶分泌的抗利尿激素(ADH)在血液中的微量浓度较难测定,以此作为生物学的测定,也包括ADH以外的物质(=ADH)

ADT adenosine triphosphate 三磷酸腺苷

ADT agar-gel diffusion test 琼脂扩散试验

ADT arm deviation test 臂偏位试验 闭上眼睛,使两上肢、手掌向上水平举起,麻痹侧,上肢落下或内转

ADT automated dithionate test 自动的二硫基盐试验

ADTe tetanic contraction 强直性收缩

- ad us ad usum (拉) 按习惯
处方用语
- ad us ext ad usum externum
(拉) 外用 处方用语
- ad us int ad usum internum
(拉) 内服 处方用语
- A/DV arterio/deep venous 动
脉/深静脉
- A₅ D₅W alcohol 5%, dextrose
5% in water 5% 酒精-5%
葡萄糖水溶液
- ADX adrenal-ectomized 切除
肾上腺的
- AE; A/E above-elbow 肘上
AE 截肢即上手臂截肢, AE
假肢即上手臂假肢
- AE active exercise 自动运动
患者自行进行的肌肉运动, 在
肌力为 3 (F) 时为宜, 用于增
强肌力和改善功能 (=MMT)
- AE angioneurotic edema 血管
神经性水肿
- AE antitoxin einheit (德)
抗毒素单位
- AECG abdominal electrocardio-
graph 腹部心电图
- AED acceptable emergency
dose 急救允许剂量
- AEAA aminoethylethanolamine
氨基乙基乙醇胺
- AE fold ary-epiglottic fold
杓状会厌襞 起自喉头盖至杓
状会厌软骨部的粘膜部分, 包围
着喉头腔的上部
- AEG air encephalogram 气脑
造影
- AEP auditory evoked potential
听觉诱发电位 听音时所引起
的电反应
- AER aldosterone excretion
rate 醛甾酮排泄率
- AER auditory evoked response
听觉诱发反应 受到音刺激时,
听觉所产生的种种反应, 脑干
反应, 蜗牛电反应等
- aera aeration 通气, 曝气
- AES atrial extra systole 心房
性期外收缩
- AES Auger electron spectro-
scopy 奥格电子分光镜检查
- AET absorbtion-equivalent
thickness 吸收当量浓度
- AET aminoethyl-isothiuro-
nium 氨基异硫脲 对 X 线
有防护作用
- AF anterior fontanel 前囟
出生时, 前头骨与头顶骨包围
着的菱形部分, 出生后 15—18
个月闭合
- AF atrial(or auricular) fibril-
lation 心房纤颤 心房失去
整体收缩能力, 各部分发生极
快而细微的乱颤, 每分钟达 400
—600 次, 出现于二尖瓣膜症
中, 心室只能应答一部分由心
房传下的冲动, 心室率在 120
—160 次之间, 搏动快而不规
则, 脉搏强弱不等亦不规则,