

室内装饰植物

设计与范例

车生泉等 编著

浓浓的花红，淡淡的叶绿
掬一捧大自然的芬芳到你的居所
使你的爱家，处处生机盎然
年年充满诗情，岁岁洋溢温馨

中国农业出版社



室内装饰植物 设计与范例

车生泉等 编著

中国 农业 出版 社



图书在版编目(CIP)数据

室内装饰植物设计与范例/车生泉等编著. —北京:
中国农业出版社, 2002. 1

ISBN 7-109-07386-6

I. 室... II. 车... III. 植物—室内装饰
IV. J525.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第094138号

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区农展馆北路2号)
(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥
责任编辑 舒 薇 黄 宇

北京恒智彩印有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
2002年8月第1版 2002年8月北京第1次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/24 印张: 8 $\frac{1}{3}$

字数: 120千字 印数: 1~8 000册

定价: 38.00元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)

主 编 车生泉

编写人员 (以姓氏笔画为序)

车生泉

尹豪俊


江玉芳

吴建敏

洪静波

顾远英

唐海玉



前言

随着人类社会的发展，人类的生活环境发生了质的飞跃，使得人们得以将一大部分日常生活环节从室外转移至室内——一个有维护的、可回避自然带来的不利条件的环境中进行。人们的生活也越来越依赖于室内这一舒适、安全、便于调节与控制的优越环境。但是，对室内环境的过分依赖，也对人产生了一定的负面效应：在室内人们被限定在一定的领域内，生活在某一功能性、私密性的空间中，尽管藉此排除了大部分来自自然或人为的干扰，但也在一个有限、封闭、单调、凝固的空间中，失去了与自然的亲近和环境的融合，失去了本性所向往的开敞感、生命力和创造性。同时高速度、高效率的紧张工作使人在精神上缺少宁静与和谐，从内心深处产生了对大自然的追求与向往。

自20世纪六七十年代以来，室内绿化已逐渐从不自觉状态进入自觉状态。室内绿化是把大自然的景观加工浓缩引入室内，给居室增加生机和活力。这是室内装饰重要的手段，对长期脱离大自然的居民来说尤为重要，可以使他们在一定程度上满足回归自然的心理需要。

室内装饰植物的设计是提高室内植物观赏性的重要手段，它是一门将植物学和美学融合于一体的综合性艺术。本书力求用通俗的语言和图解照片将这一主题生动化、形象化，易学易懂，为广大读者朋友室内环境的美化提供参考。

限于编者的水平和时间仓促，书中不当和错误之处，敬请读者批评指正。



目 录

前 言

植 物 类 型 篇

一、观叶植物	2	五、果蔬植物	68
二、观花植物	28	六、芳香植物	75
三、观果植物	53	七、藤蔓植物	83
四、多肉植物	60	八、观赏水草类	92

设 计 制 作 篇

一、水栽式	102	六、碗碟景	118
二、悬垂式	107	七、瓶景	120
三、攀援式	110	八、组合盆栽	124
四、壁挂式 (镶嵌式)	113	九、盆艺	126
五、箱景	116	十、干花制作	130

装 饰 范 例 篇

一、阳台、窗台	136	五、书房	159
二、门厅	143	六、厨房	163
三、客厅	146	七、餐厅	167
四、卧室	154	八、盥洗室	172
附录 花语	176		
主要参考文献	194		





Zhiwu leixing pian 植物类型篇



室内绿化装饰植物在室内生长的环境条件与大自然中差别很大，是在一种缺乏充足的光照的室内环境条件下生长的，因此一般室内装饰植物应具有较强的耐阴性；同时，由于室内可供绿化布置的空间相对较小，故室内装饰植物还应该在形态或色彩上具有较强的装饰效果，并且体量不能太大。以中小型盆栽植物为主，若具有芳香气息或具有净化空气、保健功能的植物更为受欢迎。

室内装饰植物的种类很多，按照植物的观赏特征可分为以下八大类：观叶植物、观花植物、观果植物、多肉植物、果蔬植物、芳香植物、藤蔓植物和观赏水草类。



一、观叶植物

(一) 特点

室内观叶植物大多属于阴性植物，主要原产于美洲的低纬度地区、非洲南部以及东南亚的热带雨林地区，这些地区具有光照强度大、年平均温度高、一年四季温差小、空气湿度大等气候特点。

1. 光照 观叶植物在原产地大多生长在林下，由于热带雨林树高林密，林下只有一些散射光和透射光。因此，长期生长在林下的植物形成了对弱光的适应，50%~80%的遮光即可满足它们的生长需求，遇到阳光的强烈直射极易灼伤叶片，同时，对光照长度也要求不严格。但对一些色彩丰富的观叶植物来说，一定的光照有利于色彩的形成和使之变得更加鲜艳；过度的遮荫往往会导致叶片色彩的淡化甚至消失，因此对室内植物给予适当的光照还是非常必需的，室内光照强度大致分为三个等级：

- (1) 低光度 光照强度在 250~750 勒克斯。
- (2) 中光度 光照强度在 750~1 500 勒克斯。
- (3) 高光度 光照强度在 1 500~10 000 勒克斯。

大多数室内观叶植物可在低光度和中光度环境下生长。

2. 温度 温度是影响观叶植物生长发育的关键性因子之一，植物的生长发育需要一定的温度幅度，太高和太低都会制约植物的生长，甚至引起死亡(热害或冻害)，大部分观叶植物抗寒能力和耐高温能力都很差，尤其是对低温反应更敏感，一般生长所需要的温度在15℃以上，最佳生长温度为22~28℃，冬季也应当保持在6~10℃以上。

3. 湿度 室内观叶植物多喜欢高温高湿的环境，需要较高的空气湿度，尤其是附生类、气生类

和蕨类、苔藓类植物，需要保持较大的空气湿度，但同时又要保持根部土壤疏松、透气，以免烂根。在我国大部分地区，都有较为明显的旱季，空气干燥、湿度低，应经常进行叶片喷水以增加空气湿度。

(二) 主要观赏特征

观叶植物种类很多，叶色丰富，大部分种类都以叶子的形、色、斑纹作为观赏对象，其他观赏特征如：花、果等则次之。

1. 叶的大小 观叶植物叶形变化很大，大的可达1~3米(如海芋、芭蕉等)，小的不足1厘米(如文竹、天门冬等)。

2. 叶的形状 观叶植物的叶形有线形(如兰花、肾蕨等)、心形(如豆瓣绿、景天等)、戟形(如合果芋、喜林芋等)、椭圆形(如黄金葛、椒草等)、多角形(如常春藤、鹿角蕨等)和剑形(如丝兰、芦荟等)。

3. 叶的色彩 很多观叶植物叶片上具有斑纹、斑点或为深浅不等的绿色及其他纯色色彩(如红色、黄绿色等)，具有斑纹的植物如：变叶木、彩叶红桑、白金葛、丽花景天、洋常春藤等。

4. 叶的质地 观叶植物叶的质地有草质(如铁线蕨、冷水花等)、革质(如橡皮树、朱蕉等)、多汁多肉类(如仙人掌类、景天类等)。

(三) 主要类别和种类

室内观叶植物主要可分为草本观叶植物类和木本观叶植物类。

1. 草本观叶植物类 植物叶为草质，枝叶较柔软，一般为中小型植物。主要类别有：

(1) 蕨类植物 本类植物分布于全世界，具有

叶形优美、喜湿耐阴的特点，室内绿化较常见的有铁线蕨、肾蕨、凤尾蕨、鹿角蕨、巢蕨等。

(2) 天南星类植物 本类植物多产于热带、亚热带地区，多具有耐阴、叶形奇特优美的特点，室内绿化较常见的有广东万年青、花叶芋、龟背竹、绿萝、合果芋等。

(3) 竹芋类植物 多产于热带地区，喜高温，叶形优美，叶色多变，如：花叶竹芋、箭羽竹芋、银心竹芋等。

(4) 秋海棠类植物 多分布于亚热带地区，耐阴，具有叶形多变、质地柔和、色彩丰富等特点，常见的有竹节海棠、蝶叶秋海棠、银星海棠等。

(5) 凤梨类植物 多分布于热带、亚热带地区，叶常丛生或莲座状、叶片多肉质而带有各种色斑（纹），常见的有：姬凤梨、水塔花、斑粉菠萝、波叶斑马等。另外，还有文竹、吊兰、鸭趾草类等。

2. 木本观叶植物类 木质、枝叶较硬，体型较高大，属中大型室内观叶植物。主要有：

(1) 棕榈类植物 多分布于热带、亚热带地区，具有单茎性和叶片聚顶生的特点，如棕榈、散尾葵、棕竹、鱼尾葵、酒瓶椰子、袖珍椰子等。

(2) 龙血树类 此类植物多分布于热带，其叶形、叶色极富于观赏性，如银线龙血树、三色缘龙血树、金心香龙血树等。

(3) 榕树类 此类植物多产于热带地区，具有叶形多变、根部可观赏等特点，如垂榕、花叶榕、人参榕等。

其他室内木本植物还有变叶木类、橡皮树类等。

（四）常见室内观叶植物介绍

金皇后 (*Aglaonema commutatum* cv. *Pseudobracteatum*)


又名白柄亮丝草，株高50厘米左右，叶片为长卵圆形，叶柄长10~20厘米，叶长20~25厘米，宽6~10厘米，叶片绿色，上面散布许多黄绿色的斑点，叶柄和茎上有黄白斑纹。



原产于热带，喜湿耐阴，亦较耐旱，栽培中要给予足够的散射光，以促使其斑点更加艳丽多彩，合适的生长温度为20~30℃，冬天地温和气温都不得低于10℃，空气湿度40%左右。栽培基质要疏松，生长季节要充分浇水，保持盆土不干，叶面要经常喷雾，每10天施一次酸性肥。

【繁殖方法】一般采用茎段扦插繁殖。

【室内应用】金皇后叶色亮丽、色彩柔和，适于在客厅的沙发、茶几以及餐厅等处摆放。



金皇后

广东万年青 (*Aglaonema modestum*)



别名粗肋草，株高40厘米左右，叶片卵状披针形，长约10厘米，宽约8厘米，叶柄长约13厘米，叶片深绿色，叶柄基部阔鞘抱茎生。

原产于我国广东等地，喜温耐湿，极其耐阴，不耐盐碱和干旱，夏天生长需遮荫，生长的合适温度为20~28℃，冬天温度不得低于4℃，以12℃为宜，并且少浇水。高温季节每天需浇两次水，叶面常喷雾，培养基质要保水力强，生长季每月最好施一次钾肥。

【繁殖方法】常用其茎干，切成3~5厘米一段扦插。也可直接切取分株。作插枝扦插前切口最好蘸草木灰，晾干后插入沙床，一般15~20天就发根，繁殖容易。

【室内应用】广东万年青叶片素雅，植株大小适中，极耐阴的性格特别适合在中国传统建筑物的厅堂、书房等处摆设。

花叶芋 (*Caladium bicolor*)



又名彩叶芋，地下具黄色扁球形块茎，叶片从块茎的芽眼上抽生，叶片为盾形或心形，叶缘有皱，叶柄长于叶身，目前栽植的均为杂种，一般叶片由红色斑块、白色斑块等组合而成。



广东万年青

原产于南美洲，喜高温高湿，冬天最低土温大于 15°C ，合适的生长温度为 $20\sim 28^{\circ}\text{C}$ ，气温低于 18°C 后进入休眠，忌曝晒及风吹。生长期要多浇水，并施液肥，秋后叶色褪淡后逐步减少浇水，深秋温度低于 12°C 时，停止浇水，让其休眠。为防止茎腐烂，要求基质具有一定保水能力但不能积水。

【繁殖方法】 一般切分大球或用子球植于沙质苗床。

【室内应用】 花叶芋叶色绚丽多彩，可单盆装饰于客厅小屋，也可数盆群集于大厅内，构成一副色彩斑斓的图案。



花叶芋

龟背竹 (*Monstera deliciosa*)

别名蓬莱蕉，株高不定，野生的老株可达 $7\sim 8$ 米，叶片革质，厚实，上面具深的羽裂及长椭圆形的孔洞，叶柄粗壮而挺拔，长 $50\sim 80$ 厘米，一半左



右呈鞘状，叶长 $40\sim 100$ 厘米，叶片表面暗绿色，背面为淡绿色，雌雄同株，夏天开花结果。

原产中美洲，主要分布于墨西哥的热带雨林中，




龟背竹

喜凉爽湿润，不宜放在直射阳光下以免叶片变黄干枯，生长适温 22~26℃，冬天室温不得低于 10℃，要求高的土壤湿度和较高的空气湿度。栽培基质要深厚且保水力强，土壤 pH 应在 6.5~7.5 之间，生长季节要给予充足的水分，其气生根能直接吸收空气中的氮，为使茎干坚实、叶片挺拔，应多施磷、钾肥。

【繁殖方法】 一般切取茎段 1~2 节扦插，易发根。

【室内应用】 龟背竹叶形奇特，是点缀客厅、办公室或会议室的最佳装饰物。

春羽 (*Philodendron selloum*)



叶片宽心脏形，叶柄长约 30~100 厘米，叶片浓绿色，长 30~100 厘米，叶片从茎的顶部向四方扩展，羽状全裂。

原产于巴西、巴拉圭，耐旱耐阴，能耐 5℃ 温度，从秋季到春季需多些光照，而夏天应避免阳光直射。培养基质以混合腐叶土的沙质培养土为佳，生长季节叶面要经常喷水，适当施一些稀液肥。

【繁殖方法】 一般在 5~7 月进行繁殖。用小刀切离从植株基部长出的小株，种在配好新土的花盆里。

【室内应用】 春羽较耐阴，室内任何地方都可盆栽。

海芋 (*Alocasia macrorrhiza*)



又名广东毒，株高可达 3 米，茎粗壮，内多黏液，皮茶褐色，叶片为巨大盾形，叶长 30~90 厘米，叶柄长可达 1 米，体液有毒。

性喜温暖、潮湿和半阴的环境，冬季的室温最低不得低于 25℃，多喷水以增加空气湿度，春夏秋冬四季须适当遮荫，遮去 60% 左右的阳光。栽培基质要求疏松、肥沃。

【繁殖方法】 主要在 6 月份进行分株繁殖。从块茎抽出的小叶长至 20 厘米高则可分割，另行上盆培



海芋

养。此外，还可在春末夏初，挖出块茎分切若干块，分切后伤口要涂上草木灰，稍晾干后种植。

【室内应用】海芋由于植株体量较大，且由于体液有毒，一般用于公共场所的绿化，家庭中禁用。

斑粉菠萝 (*Aechmea fasciata*)

别名蜻蜓凤梨，10~20片叶片簇生为一棵植株，基部有一可贮藏水和肥的贮水筒，叶长50厘米左右，宽5~6厘米，黑色锯齿密生在叶缘上，叶片表面为深绿色，其背面具白色粉状的横条纹。

原产巴西，喜强光照，但夏天需适当遮荫，冬天室温不得低于6℃。贮水筒中可贮藏所需的水分和养分，所以可直接将稀肥水放入贮水筒中，栽培基质要求疏松。

【繁殖方法】可切取植株基部的小芽扦插繁殖。

【室内应用】斑粉菠萝奇特的花苞，挺立在叶座贮水筒中，好似出水的荷花，有强烈的美感，是装饰宾馆套房、迎宾室等豪华场所的珍品。



斑粉菠萝

豹纹竹芋 (*Calathea leopardina*)

别名豹纹肖竹芋，植株低矮，一般为匍匐生长，叶片倒卵形，叶长约7~10厘米，宽5厘米左右，叶色翠绿，主脉的两侧具有墨绿色条纹交错成对排列，幼叶面为白绿色。



喜温暖、湿润、阴凉的环境，冬季室温不得低于10℃，生长适温20℃左右。培养基质要求松软透气，适当控制浇水，以免烂根。

【繁殖方法】繁殖力强，温度适宜，四季均可进行分株繁殖。

【室内应用】豹纹竹芋植株矮小，适合摆放在橱窗花架或案头上，十分雅致。也可作吊盆悬挂。



豹纹竹芋

银心竹芋

(*Calathea picturata* cv. *Randen Heckei*)

又名花纹竹芋，株高15~25厘米，矮丛生状，叶形卵圆，叶长11厘米左右，宽7厘米左右，叶色为墨绿色，主脉及近边缘处有以叶基至叶端的三条银灰色带，似西瓜皮斑纹，叶片背面为微红色。

性喜温暖，要求半荫蔽、空气湿度大的环境，生长适温20~28℃，大于28℃或小于15℃，生长减缓，低于10℃发生寒害，栽培基质可用腐殖土和园土的混合土。

【繁殖方法】一般采用分株繁殖。

【室内应用】银心竹芋花纹美丽、青翠优雅。既可单独摆设于客厅，又可与同类的竹芋混合摆放，显示出它独特的风姿。

箭羽竹芋 (*Ctenanthe oppenheimiana*)

株高60厘米左右，叶形为长椭圆，长约27厘米，宽8~15厘米，主脉两侧有暗绿色带与白色带



交互成羽状排列，叶片背面为紫红色。

原产巴西、哥斯达黎加，适合温暖、湿润及半荫蔽的环境，对温度变化敏感，夜温低会使叶片卷成筒状，夏秋高温干燥应保持叶面周围湿度，越冬

极限温度10℃，对肥料要求不高，应当控制施肥，栽培基质要求疏松、排水良好。

【繁殖方法】一般采用分株繁殖。

【室内应用】箭羽竹芋植株高大，叶姿大方清爽，置于厅堂门口、走廊两侧或会议室角落，显得落落大方。



箭羽竹芋

虎尾兰 (*Sansevieria trifasciata*)

别名虎皮兰，地下具短粗的横生匍匐茎，叶片




由匍匐茎顶芽抽生，叶片肉厚革质，基部卷成筒状，呈长剑形，叶长30~50厘米，宽约5厘米，叶色深绿色至暗绿，正反两面均布有灰绿色横向波状条纹，表面覆厚蜡质层。

原产美洲热带如墨西哥地区，较耐寒，生长适温为20~28℃，冬季最好在5℃以上，耐阴忌曝晒，夏天避免阳光直射，入冬后控制浇水宁干勿湿，栽培基质要求不高，以疏松为宜。

【繁殖方法】在4~5月份进行分株，可结合换盆切割根茎，每株带3~4片叶，分后立即上盆。

【室内应用】虎尾兰叶色常年碧绿，斑纹奇特，叶片直立，气质刚强，摆设于案头或书架上，别具一格。

铁线蕨 (*Adiantum capillus-veneris*)



又名铁丝草，株高15~40厘米，叶片卵状三角形，细裂，裂片斜扇形，叶片深绿色，叶柄紫黑色，细且坚硬。

原产中国长江以南各地，多生于阴湿的沟边、溪旁及岩壁上，喜温暖、湿润和半阴，生长适温白天21~26℃，夜间10~15℃，冬天温度最好在5℃以上，夏天需遮荫，喜明亮散射光，生长季节需充足水分和较高的空气湿度，以及适当的液肥，约2周

施一次肥。栽培基质要求疏松肥沃。

【繁殖方法】常用分株繁殖，春夏之间分株最好。也可用孢子繁殖。

【室内应用】铁线蕨给人柔美舒适的感觉，可以沿楼梯摆放或与其他鲜切花组合点缀餐厅。



铁线蕨

肾蕨

(*Neprolepis exaltata* cv. Teddy Junior)

别名少年特地皱叶肾蕨，叶片羽状深裂，叶长



25厘米左右,叶片浓绿色,小叶的边缘为波状,植株密集而生。

该种为人工培育的园艺品种,喜湿润凉爽,冬天室温不得低于5℃,耐阴性强,对光照敏感,室外栽培应遮荫,要求空气湿度大。所以,需经常给叶面喷水,栽培基质要求疏松,生长季节需多浇水及每月喷施两次液肥。

【繁殖方法】常在5月份进行分株繁殖。

【室内应用】肾蕨叶色青翠,绿意盎然,可摆放在楼道口,也可吊挂在客厅、厨房或盥洗室等处。



肾蕨

凤尾蕨 (*Pteris ensiformis*)



狭长的孢子叶从植株基部伸出,形成水平的草姿,叶片色彩淡雅。

原种原产东亚、马来半岛、澳大利亚,此种则是一园艺品种,喜阴耐湿、耐寒力强,但对光照没有要求,只要微弱的光线便能正常生长。栽培基质要求不严,盆土需保持潮湿,施肥要适当。

【繁殖方法】除寒冬之外任何季节都可用孢子繁殖。用分株也可培植新的植株。


【室内应用】箭叶凤尾蕨色彩淡雅,草姿柔美,形态独秀,是装饰门厅的佳品。



凤尾蕨

蟆叶秋海棠 (*Bengonia rex*)

又名毛叶秋海棠,具匍匐伸长的横生根茎,叶片从生于根茎上,叶形硕大,叶长18~30厘米,宽17厘米左右,叶面皱褶,叶片深绿至暗绿色,中间



嵌有斑纹，叶背紫红色，有毛，叶面有明显凸皱。

原产于印度的阿萨姆地区，喜温暖多湿，怕阳光暴晒，合适的生长温度为22~26℃，冬天室温不得低于12℃，经常喷水以保持一个湿润的环境。栽培基质要求肥沃疏松和排水良好，不耐盐碱、干旱、瘠薄，应多浇水施肥。

【繁殖方法】剪取叶片，用小刀切成几片，插于沙床中，半个月可生根，待长芽后就可上盆。

【室内应用】蜈蚣秋海棠叶片茂密，色彩华丽，株形矮小，一般摆放在室内光线较亮的地方。



秋海棠

冷水花 (*Pilea calierei*)



又名白雪草，具横生的根状茎，多汁，株高30~60厘米，叶椭圆状卵形，叶对生，多肉质，叶长3~5厘米，宽2.5~4厘米，叶片绿色，上布许多银白色的斑块，基部有小托叶。

原产印度支那的热带国家，喜温暖湿润，怕阳光暴晒，在微弱光照下生长良好，温度大于10℃开始生长，冬天室温不得低于6℃，夏天高温要充分浇水，栽培基质要求不严，耐湿不耐旱，既耐肥又耐瘠。

【繁殖方法】一般在5~10月剪取枝条顶端扦插，容易繁殖。

【室内应用】冷水花叶片光泽明亮，在室内摆设给人清凉之感，适于水栽于桌台、花架，还可与其他观叶植物配植于花槽中。

富贵竹

(*Dracaena sanderiana* var. *viresdens*)

别名绿叶仙龙血树，为金边富贵竹的芽变品种，叶片长披针形，叶柄鞘状，长10厘米，叶长18~20厘米，宽4~5厘米，叶片浓绿色。

喜阴喜湿，盛夏时要适当遮荫，并勤浇水保持盆土不干，冬天室温不得低于2℃，栽培时给予足够



的散射光，忌阳光直射，栽培基质要求不高。

【繁殖方法】切取不带叶茎段，每个插穗剪成5厘米长，扦插于沙床中。

【室内应用】富贵竹茎叶疏挺高洁，悠然洒脱，青翠迎人，给人以富贵吉祥之感，适于摆放在客厅、书房。

龙血树 (*Dracaena fragrans*)



富贵竹



龙血树