



(增订本)

● 中医学多选题题库

山西科学技术出版社

伤寒论分册



黃帝內經素問序
不忘危存不忘亡者往聖之先務

之疾恤民之隱者上主之深仁也
生平之先務

中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 叶显纯 乔 模 朱大年 严世芸 杨百茀
沈全鱼 张伯讷 周夕琳 施汉章 徐生旺 高忻洙 梅国强 郭谦亨 程士德

编委 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 王小平 方伯英 尤荣辑 毛美蓉 冯学中 叶显纯 乔 模 朱大年
刘文龙 孙承禄 吕炳奎 李 义 严世芸 杨百茀 沈全鱼 李廷冠 肖庆慈
张伯讷 杨抗生 张克敏 宋秀琴 杨宗孟 邱幸凡 李学耕 李恩复 张效禹
陈照甫 肖德发 周 衡 周夕琳 郑玉清 郑蕴芝 施汉章 郝印卿 赵存娥
赵尚华 徐生旺 高忻洙 梅国强 钱信忠 钱承辉 顾家正 郭恩吉 郭谦亨
曹培林 程士德 董建华 窦昌贵 熊曼琪 樊德明

《题库》编写人员所属学院 (以笔划为序)

山东中医药大学 广西中医药大学 广州中医药大学 上海中医药大学 天津中医药大学
长春中医药大学 云南中医药大学 辽宁中医药大学 北京中医药大学 江西中医药大学
成都中医药大学 安徽中医药大学 河北中医药大学 陕西中医药大学 河南中医药大学
贵阳中医药大学 南京中医药大学 浙江中医药大学 湖北中医药大学 湖南中医药大学
黑龙江中医药大学 福建中医药大学 内蒙古医学院中医系 山西中医药大学筹备处

参加编写人员 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 马贵同 马桂文 马新超 马献图 于慕真 王 厉 王沛 王笈
王小平 王云凯 王允荣 王寿生 王骏彧 王跃廷 韦永兴 车庆云 方伯英
凤良元 尤荣辑 毛美蓉 牛敏国 尹淑香 白 锋 皮巨川 石汉基 叶显纯
乐秀珍 冯学中 冯锦伦 代桂满 田德录 朱 义 朱广仁 朱大年 朱伟常
朱松生 朱瑞群 朱锦善 许 能 许芝银 许耀芳 刘文龙 刘亦选 刘茂林
刘国普 刘淑清 刘联声 乔 模 孙文忠 孙龙川 孙兰英 孙伟正 孙承禄
吕乐远 江平安 汤希孟 伍炳彩 伍楚雄 刚葆玲 纪青山 李 义 李彪
李一清 李大钧 李友蕊 李元文 李日庆 李长英 李廷冠 李庆业 李佃贵
李秀敏 李妙珠 李学耕 李映林 李洪涛 李恩复 李惠民 李敬孝 李惠德
张 亮 张之文 张小萍 张志云 张有俊 张安莉 张伯讷 张启贤 张克敏
张继芳 张效禹 张道宗 张腊荣 张载义 张谨墉 张静玲 张燕生 杨 骏

杨文义 杨玉瑛 杨百茀 杨抗生 杨育周 杨宗孟 杨蓉修 邱云峰 邱明义
邱幸凡 邱健行 吴水清 吴润秋 吴高媛 严世芸 陈永珩 陈治恒 陈国信
陈奕庆 陈淑长 陈照甫 陈镜合 肖庆慈 肖应健 肖承悰 肖俊平 肖德发
沈全鱼 沈志芳 宋秀琴 宋章孟 消明荣 陆金根 苏树蓉 旷惠桃 何麒麟
林 云 林钟香 林莲梅 茅 晓 周 然 周 衡 周玉朱 周民权 周庚生
周晓爱 周崇仁 周德英 范夕林 范永升 范国樑 范积健 郑玉清 郑守曾
郑蕴芝 金秀玲 金起凤 易续岐 姚乃中 侯士良 俞尔科 郝印卿 赵永梅
赵存娥 赵尚久 赵尚华 赵树声 欧名宇 施汉章 贺兴东 骆宏石 洪秀清
祝君逵 段尚仙 段育华 贺雅平 欧阳瑜 皇甫夏 徐 萱 徐生旺 徐志华
徐宝圻 唐为勇 贾玉森 钱正贤 钱承辉 顾家政 袁宝权 袁金声 袁思芳
高学敏 倪承恺 倪恩荣 夏祖昌 莫矜耀 郭恩吉 郭淑珍 郭谦亨 郭锦章
康广盛 黄云亮 黄汉强 黄仰模 黄明舫 黄恺行 黄彩萍 梅国强 梁柳文
曹培林 常章富 阎惠卿 程士德 程家正 喻文球 谢文光 曾君望 储秀珍
韩明象 韩靖平 董国娴 董德蓉 廉玉林 路一平 简丁山 窦昌贵 熊曼琪
潘华信 黎烈荣 樊德明 魏玉琦 瞿 辛 戴锦成 戴德英

并有广西中医学院内科教研室、上海中医学院伤寒、温病及金匱教研室、江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。

中医学多选题题库

伤寒论分册

主 编 梅国强

副主编 熊曼琪 郝印卿

编写人员 (以单位笔划为序)

广州中医学院伤寒教研室 熊曼琪 梁柳文

上海中医学院伤寒教研室

天津中医学院伤寒教研室 杨育周 张有俊 朱广仁

成都中医学院伤寒教研室 陈治恒

贵阳中医学院伤寒教研室 袁金声

浙江中医学院伤寒教研室 周庚生

湖北中医学院伤寒教研室 邱明义 梅国强

湖北中医学院伤寒教研室 简丁山 伍楚雄

黑龙江中医学院伤寒教研室 王 历

山西中医学院筹备处 郝印卿

增订说明

中医学多选题题库和问答题题库从1985年出版发行以来已15年之久，九十年代之后，六版教材陆续出版，并为各中医院校普遍使用，各学科新教材的内容都有变动，有更新，有增加，因此本题库必须增补修订，以达到与教材内容一致，随着中医教育事业的发展，教学质量的提高，教学方法的改进，考试中新题型的出现与使用以及广大国内外读者对这套题库的欢迎和厚爱，我们决定增修再版。

题库共28个分册，每分册的主编是原书的主编担任，或由原书主编的推荐和意见确定新的主编，各分册的主编、副主编以及全体编写的专家、教授把自己的新观点、新体会、新理论在这次增订中写入了题库，使题库中的更多的问题和答案成为更准确、更精炼、更新颖、更实用，并有举一返三，一通百通，富有启发性的经典之作。在此，我们向所有作者表示崇高

的敬意和感谢。在这次增修工作中纠正了原书中存在的错误和不妥之处外，增加了新教材的新内容，保留了A、B、C、K型题增加D、X型题和方剂组合题，在多选题分册之后，都附有5~7套考试模拟试题，有的分册在大的章节后有模拟试题，对于难题和重点题，更有利于复习和应考。

尽管我们力求既要内容全面又要突出重点；既要紧扣教材，又要避免“课本搬家”；既要遵循系统性又要加强实用性，要达到上述要求确实比较困难，因此，本题库仍可能存在有不妥、不当、不精，甚至于错误之处，真诚的希望得到广大专家和读者的批评指正。

编委
2001年8月

出版说明

多选题（MCQ）是一种新兴的考试形式，它优于问答型考试，为此，已在我国各中医学院普遍采用；中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的，初稿共拟五万七千五百余题，经过筛选、审定，共采用二万二千余题。筛选的原则是：①以质量为重、水平为重，不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本，重点章节多选，一般章节少选。③根据教学大纲要求，须重点掌握的和需要熟悉的多选，需一般了解的少选。④对中医学的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量，在筛选过程中，我们规定了五不选：

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用，故要筛选有相应水平的多选题，不够以上水平者，不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型，即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是：

A型题：A型题又称最佳选择题，故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案，只有“最佳”与“非最佳”之分，而无“正确”与“错误”

之别。备选答案】之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同，A型题又衍化出A—2、A—3、A—4三种亚型。

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”，所以A、B、C、D四个备选答案】也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错的”，答案也不能错得过于明显，其余备选答案，也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况：①除外者与主题有关；②除外者与主题无关。不论有关、无关，正确答案也不能过于明显，亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用；其余备选答案，亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题：B型题又称配伍题。五个被选答案中，除正确答案外，其余备选答案也要有似是而非的干扰作用；并列的两道或两道以上的试题（题干）也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题：C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的关系上，也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题：K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案（即：A—只有①、②、③是对

的；B—只有①、③是对的；C—只有②、④是对的；D—只有④是对的；E—①、②、③、④全是对的。）不能任意改变；五种组合答案中只能有一种是正确的。

D型题：选择5个备选答案中的2个作为正确答案，2个答案间须有特殊联系。

X型题：在10个备选答案中选择2个以上正确答案。

A、B、C、K四题型，凡不符合以上要求者，不选。

三、在技术上有明显错误者，不选。

四、在文字上，有逻辑性错误者，不选；概念不清者，不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中医学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸等。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者检阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

目 录

A型题	(1)	太阴、少阴、厥阴篇	(132)
太阳篇	(1)	综合	(134)
阳明篇	(44)	K型题	(141)
少阳篇	(62)	太阳、阳明、少阳篇	(141)
太阴篇	(73)	太阴、少阴、厥阴篇	(155)
少阴篇	(79)	综合	(161)
厥阴篇	(92)	X型题	(167)
综合	(96)	太阳、阳明、少阳篇	(167)
B型题	(103)	太阴、少阴、厥阴篇	(180)
太阳、阳明、少阳篇	(103)	模拟试题(一)	(187)
太阴、少阴、厥阴篇	(112)	模拟试题(二)	(191)
综合	(114)	模拟试题(三)	(195)
C型题	(124)	模拟试题(四)	(199)
太阳、阳明、少阳篇	(124)	模拟试题(五)	(203)

A型题

太 阳 篇

- 【1】《伤寒杂病论》的成书年代大约是：
A. 春秋时代
B. 西汉末年
C. 战国时代
D. 晋代
E. 东汉末年
- 答案 E
- 【2】《伤寒杂病论》的作者是：
A. 王叔和
B. 成无己
C. 张机
D. 林亿
E. 华佗
- 答案 C
- 【3】首次全文注解《伤寒论》的是：
A. 王叔和
B. 孙思邈
C. 成无己
D. 林亿
E. 柯韵伯
- 答案 C
- 【4】目前在我国广泛流行的《伤寒论》版本有哪两种：
A. 《千金要方》和《千金翼方》
B. “宋版本”和明·赵开美的“复刻本”
C. 赵开美的“复刻本”和成无己的《注解伤寒论》
- D. “宋版本”和《伤寒论条辨》
E. “赵刻本”和《医宗金鉴·订正仲景全书》
- 答案 C
- 【5】关于《伤寒论》一书内容的论述下面哪项较为确当？
A. 全面地阐述了寒邪所致疾病
B. 全面地阐述了外感疾病和杂病
C. 全面地阐述了外感风寒，未论及外感温热和杂病
D. 较为全面地阐述了外感热病，兼述杂病
E. 全面地阐述了外感风寒，兼述外感温热，未论及杂病
- 答案 D
- 提示 《伤寒论》一书，绝大部分条文阐述的是外感风寒疾病的辩证论治。对外感温热和杂病亦有所论述，但杂病条文较少，内容简略，仅属兼述。
- 【6】《伤寒论》的六经病证是：
A. 十二经络病理变化的临床反映
B. 综合六经所系脏腑经络，气血阴阳等病理变化的临床反映
C. 脏腑经络结构为六经病理变化的临床反映
D. 外感疾病的六个不同证侯分类
E. 外感疾病的六个不同发展阶段
- 答案 C
- 【7】《伤寒论》六经辨证与八纲辨证

的关系是：

- A. 六经辨证中无八纲辨证内容
- B. 八纲辨证是后世医学的发展
- C. 八纲辨证可以概括六经辨证
- D. 六经辨证已涉及了八纲内容
- E. 六经辨证始终贯穿八纲辨证

答案 E

【8】六经病总的治则是：

- A. 和胃气
- B. 扶阳气，存阴液
- C. 扶正祛邪
- D. 汗吐下和温清补消
- E. 表里同治

答案 C

【9】《伤寒论》变证的概念是：

- A. 实证突然转为虚证
- B. 热证突然转为寒证
- C. 寒证突然变为危候
- D. 热汗出突变无汗
- E. 病情不循一般规律发展，而发

生性质变化

答案 E

提示 变证是在某些特殊条件下，病情不循一般规律发展，起着性质的转变。

【10】并病的涵义是：

- A. 两经病归并为一经
- B. 一经证候未罢，又出现另一经证候
- C. 两经或三经证候同时出现
- D. 阳经与阴经病证的证候并见
- E. 一经病证兼有其他证候

答案 B

【11】合病的涵义是：

- A. 太阳与少阴的病证同时出现
- B. 太阳与少阳的病证同时出现
- C. 两经或两经以上的证候同时出现
- D. 一经证候未罢，又见另一经证候

· 2 ·

E. 阳经与阴经的证候同时出现

答案 C

【12】温病与太阳中风、伤寒的鉴别点在于

- A. 发热、脉浮数
- B. 发热、恶寒
- C. 发热、汗出
- D. 发热、头痛
- E. 发热而渴、不恶寒

答案 E

【13】决定六经病证是否传变的主要因素是：

- A. 正气的强弱，感邪的轻重，医、护的当否
- B. 病情的轻重，护理的当否，误治与否
- C. 感邪的轻重，护理的当否，失治与否
- D. 正气的强弱，感邪的轻重，护理的当否
- E. 以上均不是

答案 A

【14】下列表里同病，何证应当先治里后治表：

- A. 大黄黄连泻心汤证，表未解者
- B. 抵当汤证，表证仍在者
- C. 白虎汤证，其表未解者
- D. 桃核承气汤证，其外不解者
- E. 太阴病，脉浮者

答案 B

【15】“伤寒，医下之，续得不利清谷不止，身疼痛者。”治宜：

- A. 解其表，表解里自和
- B. 温其里，里和表自解
- C. 先解表，后温其里
- D. 先温里，后解其表
- E. 解表温里，表里双解

答案 D

提示 本条即原文 93 条。伤寒误下，

伤及脾肾之阳，表证未解，里传少阴。病情是里急于表，故应采取先里后表的治法。

【16】病人身大热，反欲得近衣者，属下列何证？

- A. 真热假寒证
- B. 真寒假热证
- C. 表寒里热证
- D. 寒热错杂证
- E. 以上都不是

答案 B

【17】太阳病的主要病机是：

- A. 风寒外束，卫阳被遏，营阴郁滞
- B. 风邪外袭，卫不外固，营不内守
- C. 风寒袭表，营卫不和，正邪交争
- D. 寒邪侵袭，营卫不和，其病在表
- E. 风寒袭表，郁遏阳气，损伤营阴

答案 C

【18】太阳伤寒、中风的鉴别要点，下列解答哪项是正确的？

- A. 有无“或未发热”
- B. 恶寒与否
- C. 恶风与否
- D. 汗出与否
- E. 疼痛与否

答案 D

提示 太阳伤寒，寒性敛束，卫阳被遏，汗孔合而不开；太阳中风，风性疏泄，汗孔开而不合，因此以汗出与否为主要鉴别点。

【19】太阳病的头痛是：

- A. 头项强痛
- B. 头顶胀痛
- C. 两侧头痛

- D. 前额刺痛
- E. 以上均不是

答案 A

【20】《伤寒论》中的风温是指：

- A. 春月受风，其气已温的病证
- B. 太阳温病误用辛温发汗的变证
- C. 里热炽盛，津液受损伤
- D. 阴伤火炽，热动肝风证
- E. 以上都不是

答案 B

【21】以原文为据，下列脉证，哪项在太阳中风提纲中未予明叙？

- A. 汗出
- B. 发热
- C. 头痛
- D. 脉缓
- E. 恶风

答案 C

【22】太阳中风证的主要脉证是：

- A. 发热，恶寒，头痛，柴柴汗出，发作有时，脉紧
- B. 发热，恶寒，汗出，项背强，脉浮缓
- C. 发热，恶寒，头痛，汗出，脉浮缓
- D. 恶寒，头项强痛，脉浮
- E. 发热，恶寒，头痛，汗出，喘息，脉浮

答案 C

【23】太阳中风证的治法是：

- A. 调和营卫
- B. 解表发汗，固护卫阳
- C. 调和营卫，益气和营
- D. 解肌祛风，调和营卫
- E. 解表祛风，宣肺发汗

答案 D

【24】太阳中风证的病机，下述哪项是错误的？

- A. 营弱卫强

- B. 阳浮阴弱
C. 风寒外袭，卫阳不固，营不内守
D. 风寒束表，正气固外，营阴郁滞
E. 以上均不错

答案 D

【25】太阳中风发热的特点是：

- A. 或已发热，或未发热
B. 时发热
C. 寒多热少
D. 翩翩发热
E. 热多寒少

答案 D

【26】太阳中风证中汗出的机理是：

- A. 阳虚不能固摄于外
B. 风寒外袭，卫阳不固，营不内守
C. 卫虚失固，腠理疏松
D. 外邪化热，热迫津出
E. 卫气不共营气谐和

答案 B

【27】下列原文属“桂枝汤主之”的是：

- A. 太阳病，头痛，发热，汗出，恶风者
B. 太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者
C. 太阳病，外证未解，脉浮弱者
D. 太阳病，下之后，其气上冲者
E. 脏无他病，时发热自汗出而不愈者

答案 A

【28】下列原文证候，不宜用桂枝汤的是：

- A. 阳明病，脉迟，汗出多，微恶寒
B. 伤寒不大便六七日，头痛有热……其小便清

- C. 服桂枝汤，大汗出，脉洪大
D. 形作伤寒，其脉不弦紧而弱……弱者发热脉浮，解之当汗出愈
E. 伤寒发汗，已解，半日许复烦，脉浮数，可更发汗

答案 D

提示 “形作伤寒……”（原文 116 条）是温病初起，故不宜用桂枝汤。

【29】“太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者”根据病机变化，治宜：

- A. 小柴胡汤
B. 桀子豉汤
C. 大青龙汤
D. 桂枝汤
E. 先刺风池、风府，却与桂枝汤

答案 E

【30】下述何证不属桂枝汤证：

- A. 伤寒发汗已，半日许复烦，脉浮数者
B. 太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者
C. 太阳病，下之后，其气上冲者
D. 伤寒不大便六七日，头痛有热，小便清者
E. 太阳病，项背强几几，反汗出恶风者

答案 E

【31】太阳病，初服桂枝汤，反烦不解的病机是：

- A. 表邪不解，化热入里，伤津耗气
B. 表邪内陷，热邪扰于胸膈
C. 病邪内传，伤津化燥，胃热炽盛
D. 表邪较重，正气得药力之助，奋力抗邪，阳郁不宣
E. 汗出表解，心阴心阳受损

答案 D

【32】太阳病，初服桂枝汤，反烦不

解者，先刺风池、风府的作用是：

- A. 预防表邪向里传变
- B. 解除头痛
- C. 疏通经络以泄邪
- D. 治疗身痛
- E. 改用针刺法治疗

答案 C

【33】伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者，治疗当选用何方为宜：

- A. 枳子豉汤
- B. 大青龙汤
- C. 麻黄汤
- D. 麻杏石甘汤
- E. 桂枝汤

答案 E

【34】“伤寒发汗已解，半日许复烦，脉浮数者，可更发汗，宜桂枝汤”。其中“复烦”之意是指：

- A. 心烦重现
- B. 表邪入里，胃中燥热
- C. 热扰胸膈
- D. 余邪在表未尽
- E. 汗后心阴亏耗

答案 D

【35】“太阳痛，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，方用前法；若不上冲者，不得与之”。其中“气上冲”之涵义是指：

- A. 气从少腹上冲胸咽
- B. 胃气上逆
- C. 呕逆呕吐
- D. 咳嗽气逆
- E. 太阳经气向上与邪相争

答案 E

【36】“太阳病，下之后，其气上冲者”的病机是：

- A. 心阳被伤，肾中水寒之气上逆
- B. 脾虚水停，水气上逆
- C. 肝寒胃逆，浊阴上犯

- D. 正气较旺，外伸抗邪

- E. 胸中痰涎阻滞，气机上逆

答案 D

【37】原文：“伤寒发汗，已解，半日许复烦，脉浮数者”，证属：

- A. 余邪未尽传里化热，证属表寒兼里热证
- B. 余邪复聚，或正气不足复感外邪，证属风寒表证
- C. 外感风热之邪，证属风热表证
- D. 过汗损伤气血，心失所养，证属里虚证
- E. 以上都不是

答案 B

【38】下列诸脉中，除哪项外，均可为桂枝汤证之脉象：

- A. 脉浮缓
- B. 脉浮数
- C. 脉迟
- D. 脉洪大
- E. 脉浮紧

答案 E

【39】根据《伤寒论》原文精神，下列脉象中具有复言病机意义的是：

- A. 阴阳俱紧
- B. 阳浮而阴弱
- C. 阴阳俱浮
- D. 阳微而阴濡
- E. 阳微而阴浮

答案 B

【40】下列诸证中，除哪项以外为麻黄汤证与桂枝汤证的共有证侯？

- A. 恶寒
- B. 脉浮
- C. 头痛
- D. 呕
- E. 喘

答案 E

【41】原文：“若酒客病，不可与桂

枝汤，得之则呕，以酒客……故也。”

- A. 多湿邪内蕴
- B. 多胃热亢盛
- C. 不喜温
- D. 不喜甘
- E. 不喜辛

答案 D

【42】原文：“桂枝本为解肌，若其人……者，不可与之也，常须识此，勿令误也。”

- A. 脉浮，发热无汗
- B. 烦劳汗出，发作有时
- C. 脉微弱，汗出恶风
- D. 脉浮而缓，手足自温
- E. 脉浮紧，发热汗不出

答案 E

【43】杂病营卫不和所致“病常自汗出”，或“病人藏无他病，时发热自汗出”治宜选用下列何方：

- A. 理中汤
- B. 小建中汤
- C. 桂枝汤
- D. 桂甘龙牡汤
- E. 甘草干姜汤

答案 C

【44】下列哪一条可考虑使用桂枝汤：

- A. 湿热内蕴
- B. 胃热呕吐
- C. 表实无汗
- D. 伤寒解后，余邪未尽
- E. 肺热咳嗽

答案 D

【45】桂枝汤方的药物与药量是：

- A. 桂枝三两、芍药六两、甘草二两、生姜三两、大枣十二枚
- B. 桂枝五两、芍药三两、甘草二两、生姜三两、大枣十二枚
- C. 桂枝三两、芍药二两、甘草三

两、生姜三两、大枣十二枚

- D. 桂枝三两、芍药三两、甘草二两、生姜三两、大枣十二枚
- E. 桂枝三两、芍药三两、甘草二两、生姜二两、大枣四枚

答案 D

【46】桂枝汤治疗太阳中风证的用法上，下列哪项是错误的？

- A. 服已须臾，热稀粥一升
- B. 温服令一时许，汗出如水流漓
- C. 若一服汗出病差，停后服，不必尽剂
- D. 病重者，一日一夜服，周时观之
- E. 上五味，㕮咀，以水七升微火煮取三升去渣，适寒温

答案 B

【47】下列方剂除哪一首外，均有调和营卫的作用？

- A. 桂枝去芍药加附子汤
- B. 桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤
- C. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤
- D. 桂枝加厚朴杏子汤
- E. 桂枝甘草龙骨牡蛎汤

答案 E

【48】患者平素体弱畏寒，汗多，在大暑之夜，启窗而卧，仍周身汗出，至夜半因觉冷即覆被再睡，其冷不减，反加甚，次晨诊之，病者头额及双手微汗，舌淡苔薄白，脉来浮弱。其治宜：

- A. 桂枝加附子汤
- B. 桂枝附加子汤
- C. 桂枝汤
- D. 麻黄汤
- E. 以上都不可选用

答案 C

【49】伤寒不大便六七日，头痛有

热，小便清，治宜：

- A. 小承气汤
- B. 桂枝汤
- C. 桂枝加附子汤
- D. 小柴胡汤
- E. 柴胡加芒硝汤

答案 B

【50】可辨为桂枝加葛根汤证者是：

- A. 发热恶寒，头痛，汗出者
- B. 发热恶寒，身疼腰痛，无汗者
- C. 发热恶寒，汗出，项背强者
- D. 发热恶寒，无汗，项背强者
- E. 以上均不是

答案 C

【51】下列桂枝加葛根汤证的主证中，哪项最具特征？

- A. 发热恶寒
- B. 头痛
- C. 汗自出
- D. 项背强
- E. 脉浮缓

答案 D

【52】桂枝加葛根汤证的治法是：

- A. 解肌祛风，调和营血
- B. 解肌祛风，升津舒经
- C. 解肌祛风，生津止渴
- D. 解肌祛风，生津止利
- E. 解肌祛风，舒筋柔经

答案 B

【53】桂枝加葛根汤方的药物组成是：

- A. 桂枝、葛根、芍药、炙甘草、大枣、麻黄
- B. 桂枝、葛根、芍药、大枣、干姜、炙甘草
- C. 桂枝、葛根、芍药、大枣、生姜、炙甘草
- D. 桂枝、葛根、芍药、大枣、半夏、炙甘草

E. 桂枝、葛根、芍药、大枣、附子、炙甘草

答案 C

【54】桂枝加葛根汤和葛根汤中，重用葛根的目的，哪项是错误的？

- A. 升津液
- B. 舒经脉
- C. 解肌发表
- D. 引胃气下行
- E. 解表透疹

答案 D

【55】葛根汤证与桂枝加葛根汤证的主要鉴别点在于：

- A. 项背强几几之有无
- B. 下利之有无
- C. 无汗脉浮紧；汗出脉浮缓
- D. 呕吐之有无
- E. 恶寒，恶风

答案 C

【56】桂枝去芍药汤证中“脉促胸满”的机理是：

- A. 误下邪陷，与水气相结于上焦
- B. 误下邪陷，痰热阻于胸中
- C. 邪陷胸中，正气有抗邪外出之势
- D. 邪陷胸中，胸阳被遏，郁而不伸
- E. 下后里气受伤，邪热扰于胸膈

答案 C

【57】下列脉证中，除哪项外，均为桂枝去芍药加附子汤证的脉证表现：

- A. 胸满
- B. 恶寒
- C. 头痛
- D. 腹满
- E. 脉微

答案 D

【58】太阳病，下之后，胸满，恶寒，脉微。治宜：

- A. 麻黄附子甘草汤
- B. 桂枝加附子汤
- C. 桂枝附子汤
- D. 桂枝去芍药加附子汤
- E. 附子汤

答案 D

【59】原文：“太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸……”治疗宜：

- A. 桂枝去芍药加附子汤
- B. 桂枝附子汤
- C. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤
- D. 桂枝加附子汤
- E. 桂枝加桂汤

答案 D

【60】“太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。”治法所以择用扶阳解表，是因为其病机：

- A. 阳虚阴未虚，表病里未病
- B. 阴阳两虚以阳为主，表里同病以表为主
- C. 阳虚阴未虚，表里同病以表为主
- D. 阴阳两虚以阳为主，表病里未病
- E. 阳虚于表，阴虚于里，以阳虚为主

答案 B

【61】原文：“太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。其中“四肢微急，难以屈伸”的病机是：

- A. 发汗太过，损伤营气，筋脉失养
- B. 邪入太阳经输，经气不得，筋脉失养
- C. 营卫不利，气血凝滞，筋脉失

养

- D. 阳不足以温煦，阴不足以濡润，筋脉失养
- E. 以上都不是

答案 D

【62】桂枝加附子汤证，“小便难”的病机是：

- A. 阳虚汗漏，湿邪留滞
- B. 阳虚汗漏，津液不足
- C. 阳虚汗漏，水饮内停
- D. 阳虚阴盛，水寒互结
- E. 阳气虚衰，气化不利

答案 B

【63】患者顾×，忽感风邪，始则啬啬恶寒，淅淅恶风，继则翕翕发热，头项强痛，腰臀酸楚，自服发汗药，而汗出淋漓，小便较小，四肢拘急，屈伸不利，当用：

- A. 桂枝去芍药加附子汤
- B. 桂枝加附子汤
- C. 桂枝加葛根汤
- D. 桂枝新加汤
- E. 芍药甘草附子汤

答案 B

【64】下列方剂，哪一首的功效是调和营卫，扶阳解表？

- A. 桂枝附子汤
- B. 桂枝人参汤
- C. 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤

- D. 桂枝加附子汤
- E. 桂枝加芍药汤

答案 D

【65】病者男性，前天因受凉后，即见恶风寒，昨天起见流鼻涕，身微疼，项背不舒，微呕纳呆，小便正常，诊其头额微热，周身微汗，脉浮缓苔薄白。治宜：

- A. 桂枝汤
- B. 桂枝加厚朴杏子汤

- C. 桂枝加葛根汤
- D. 桂枝麻黄各半汤
- E. 桂枝二麻黄一汤

答案 C

【66】桂枝加葛根汤证和葛根汤证，证的异同是：

- A. 反汗出、经输不利和无汗、项背强几几
- B. 反汗出、经输不利和无汗、经输不利
- C. 中风、项背强几几和伤寒、项背强几几
- D. 反汗出、项背强几几和无汗、项背强几几
- E. 表虚、经输不利和表实、经输不利

答案 D

提示 本题问的是二汤证有证方面的异同，而答案 A、B、C、E 虽然内容没有错误，但有的是言病机，有的是病证、病机混言，因此均不符合题意。

【67】“发汗后，身疼痛，脉沉迟者”治宜：

- A. 先予四逆汤，再予桂枝汤
- B. 四逆汤
- C. 附子汤
- D. 桂枝新加汤
- E. 麻黄附子细辛汤

答案 D

【68】新加汤证中身痛的机理是：

- A. 寒邪外束，营阴郁滞
- B. 发汗太过，损伤营气，筋脉失养
- C. 阳虚风寒湿邪内侵
- D. 阳虚阴盛，水寒不化，寒凝筋骨
- E. 以上均不是

答案 B

【69】下列桂枝加芍药生姜各一两人

参三两新加汤证的脉证中，哪项最具特征？

- A. 发热
- B. 恶风
- C. 汗自出
- D. 头痛
- E. 身疼痛，脉沉迟

答案 E

【70】分析“服桂枝汤，或下之，仍头项强痛，翕翕发热，无汗，心下满微痛，小便不利者，桂枝去桂加茯苓白术汤主之。”下列机理可排除一项，这项是：

- A. 津液不能上输皮毛
- B. 津液不能下输膀胱
- C. 营卫不和
- D. 脾虚水饮内停中焦
- E. 卫阳闭郁

答案 E

【71】表证未解，兼脾虚水停之“小便不利”。治疗可用：

- A. 五苓散
- B. 猪苓汤
- C. 真武汤
- D. 桂枝去桂加茯苓白术汤
- E. 茯苓桂枝白术甘草汤

答案 D

【72】原文：“太阳病，下之微喘者，表未解也”，治疗宜：

- A. 桂枝汤
- B. 桂枝加厚朴杏子汤
- C. 小青龙汤
- D. 麻黄汤
- E. 以上都不适宜

答案 B

【73】“太阳病，下之微喘者，表未解故也，桂枝加厚朴杏子汤主之。”其微喘的机理应确切地分析为：

- A. 风寒外束，肺气不宜
- B. 风寒内传于肺，肺气壅逆