Studienbücherei

Quantenphysik

G. Röpke

Studienbücherei

Quantenphysik

G. Röpke

Studienbücherei

Quantenphysik

G. Röpke

2. Auflage

unter Mitarbeit von
H.-D. Pöltz

Mit 81 Abbildungen

VEB Deutscher Verlag
der Wissenschaften
Berlin 1983

Verlagslektor: Joachim Heine

Verlagshersteller: Doris Ahrends

Umschlaggestaltung: Rudolf Wendt

© 1980 VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, DDR · 1080 Berlin, Postfach 1216

Lizenz-Nr. 206 · 435/79/83

Printed in the German Democratic Republic

Satz: VEB Druckhaus „Maxim Gorki“, 7400 Altenburg

Fotomechanischer Nachdruck: Mühlhäuser Druckhaus

LSV 1114

Bestellnummer: 5707667

DDR 19,80 M

Vorwort

Im Rahmen der Quantenmechanik wird ein Begriffssystem entwickelt, welches uns gestattet, die Vorgänge der Mikrophysik widerspruchsfrei zu beschreiben. Die Beherrschung dieses neuen Begriffsystems ist Voraussetzung für das Verständnis der Effekte der Mikrophysik, die das Verhalten und die Eigenschaften auch makroskopischer Körper bestimmen und in zunehmendem Maße Anwendung in der modernen Technik gewinnen. Als Beispiel sei hier die Festkörperphysik genannt.

Im vorliegenden Band wird versucht, die Quantenmechanik knapp darzustellen, aber gleichzeitig eine möglichst korrekte Interpretation zu geben und ein Begriffssystem einzuführen, welches den Erfordernissen der Quantenphysik gerecht wird.

Ebenso, wie eine rationelle Darstellung der Elektrodynamik erst mit Hilfe der Vektoranalysis möglich ist, bedarf es zur rationalen Darstellung der Quantenmechanik auch eines angemessenen mathematischen Formalismus. Einige mathematische Grundlagen werden der Quantenmechanik vorangestellt.

Die Kapitel 1.—3., 5., 6., 8., 9. geben einschließlich der angeführten Aufgaben eine Darstellung wesentlicher Züge der Quantenmechanik. Insbesondere wurde Wert auf eine Einbeziehung der Streutheorie gelegt (Kapitel 6.), da in dieser Richtung mit weiteren wichtigen Entwicklungen im Rahmen der Quantenmechanik zu rechnen ist. Die Ergänzungen, Kapitel 4.*, 7.*, 10.*, sollen das Blickfeld erweitern, indem über einige weitere Probleme und Ergebnisse informiert wird, die in der Regel jedoch nicht für die Erarbeitung des oben angeführten Stoffes erforderlich sind.

Auf dem Gebiet der Quantenmechanik existiert bereits eine umfangreiche Lehrbuchliteratur. Hervorzuheben sind hier neue, moderne Zugänge zu diesem Wissensgebiet, die etwa in den Lehrbüchern von R. P. FEYNMAN, G. GRAEWERT, E. FICK aufgezeigt werden. Die vorliegende Darstellung der Quantenmechanik schließt sich diesen Lehrbüchern an.

Für zahlreiche Diskussionen bei der Vorbereitung des Manuskriptes danke ich recht herzlich Herrn Prof. Dr. W. KUHN sowie Herrn Dr. H. STÖCKEL, der mit einer gründlichen Durchsicht des Manuskriptes und zahlreichen Hinweisen und Änderungsvorschlägen wesentlich zu der Fertigstellung des Manuskriptes beigetragen hat. Weiterhin danke ich meiner Frau, RENATE RÖPKE, für die Unterstützung bei der Erarbeitung des Manuskriptes.

G. RÖPKE

Inhaltsverzeichnis

Zusammenstellung wichtiger Beziehungen und Symbole	10
Mathematische Grundlagen	13
Teil I. Grundlagen der Quantenmechanik	23
Einleitung	24
1. Beschreibung eines quantenmechanischen Systems, Zustandsbegriff	25
1.1. Der Ursprung der Quantentheorie	25
1.2. Der Dualismus Welle—Korpuskel	30
1.3. Übergangswahrscheinlichkeit und Wahrscheinlichkeitsamplitude	37
1.4. Beziehungen für Wahrscheinlichkeitsamplituden	40
1.5. Orts- und Impulsdarstellung. Die Zustandsfunktion	45
1.6. Fragen und Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 1.	50
2. Physikalische Meßgrößen und ihre Erwartungswerte	53
2.1. Meßprozeß und Operatorbegriff	53
2.2. Darstellung von Operatoren. Die Ortsdarstellung	59
2.3. Vertauschungsrelationen, Unschärferelation und vollständiger Satz von Operatoren	65
2.4. Der lineare harmonische Oszillator	70
2.5. Zusammenfassung zu Kapitel 2.	79
2.6. Fragen und Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 2.	79
3. Zeitliche Entwicklung eines Systems in der Quantenmechanik	82
3.1. Die Schrödinger-Gleichung	82
3.2. Stationäre Zustände	87
3.3. Zeitabhängige Prozesse	102
3.4. Fragen und Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 3.	106
4.* Ergänzungen zu Teil I. Grundlagen der Quantenmechanik	109
4.1.* Übergang von der Quantenmechanik zur klassischen Mechanik, WKB-Methode	109
4.2.* Einige Eigenschaften linearer Operatoren	112
4.3.* Die zeitliche Änderung der Zustände und Operatoren in der Quantenmechanik	114
4.4.* Der statistische Operator	119
4.5.* Postulate der Quantenmechanik	122

Teil II. Einteilchenprobleme	125
Einleitung	126
5. Der Drehimpuls und die Bewegung in einem Zentralkraftfeld	127
5.1. Allgemeine Behandlung des Drehimpulses in der Quantenmechanik	127
5.2. Der Bahndrehimpuls	131
5.3. Der Spin	134
5.4. Bewegung in einem Zentralkraftfeld	140
5.5. Das Wasserstoffatom	145
5.6. Dipolübergänge und Auswahlregeln	151
5.7. Fragen und Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 5.	155
6. Potentialstreuung	161
6.1. Differentieller Streuquerschnitt und Streuamplitude	161
6.2. Die Bornsche Reihe	167
6.3.* Partialwellenmethode und Streuphasen	171
6.4. Zusammenfassung zu Kapitel 6.	177
6.5. Fragen und Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 6.	178
7.* Ergänzungen zu Teil II. Einteilchenprobleme	181
7.1.** Die Dirac-Gleichung	181
7.2.** Streuthorie	183
7.3.* Das Ritzsche Variationsverfahren	186
7.4.* Zeitunabhängige Störungsrechnung	188
7.5.* Zeitabhängige Störungsrechnung	191
7.6. Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 7.	198
Teil III. Mehrteilchenprobleme	201
Einleitung	202
8. Identische Teilchen	203
8.1. Das Prinzip der Ununterscheidbarkeit identischer Teilchen	203
8.2. Basiszustände für Fermionen und Bosonen	209
8.3. Austauschwechselwirkung und Pauli-Prinzip	211
8.4. Fragen und Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 8.	217
9. Der Aufbau der Atome und die chemische Bindung	219
9.1. Das Heliumatom	219
9.2. Das Hartree-Fock-Verfahren und das Periodensystem der Elemente	224
9.3. Das Wasserstoffmolekion	227
9.4. Das Wasserstoffmolekül	231
9.5. Moleküle und Festkörper	233
9.6. Fragen und Lösungen der Aufgaben zu Kapitel 9.	238
10.* Ergänzungen zu Teil III. Mehrteilchenprobleme	240
10.1.* Streuung identischer Teilchen	240
10.2.** Besetzungszahldarstellung	242

10.3.*	Die Elektronengas-Näherung	245
10.4.*	Einige Quanteneffekte in Festkörpern.	246
10.5.*	Symmetrien und Erhaltungsgrößen	248
11.	Betrachtungen zu erkenntnistheoretischen Voraussetzungen der Mikro- physik	251
11.1	Wechselwirkung und Messung	251
11.2.	Gesetz und Kausalität	254
	Literatur zu Kapitel 11.	258
	Sachverzeichnis	259

Zusammenstellung wichtiger Beziehungen und Symbole

$|\psi\rangle, |\varphi\rangle, |\chi\rangle, \dots$: Zustandsvektoren (Abschnitte 1.2., 1.3.), speziell $|\mathbf{r}\rangle$: Ortszustand (Abschnitt 1.5.),

$|\mathbf{r}, S_z\rangle$: Zustand mit bestimmten Orts- und z-Koordinaten des Spins (Abschnitt 5.3.),

$|\mathbf{r}_1^{(1)} S_{z_1}^{(1)}, \mathbf{r}_2^{(2)} S_{z_2}^{(2)}, \dots\rangle$: Orts-Spin-Zustand für ein System mehrerer unterscheidbarer Teilchen (8,1),

$|\mathbf{r}_1 S_z, \mathbf{r}_2 S_z, \dots\rangle$: Orts-Spin-Zustand für ein System mehrerer identischer Teilchen (Abschnitt 8.2.).

Symmetriepostulat für zwei identische Teilchen (8,20):

$$|\mathbf{r}_2^{(1)} S_{z_2}^{(1)}, \mathbf{r}_1^{(2)} S_{z_1}^{(2)}\rangle = \pm |\mathbf{r}_1^{(1)} S_{z_1}^{(1)}, \mathbf{r}_2^{(2)} S_{z_2}^{(2)}\rangle,$$

+ : Bosonen, ganzzahliger Spin; - : Fermionen, halbzahliger Spin.

$\langle\varphi|\psi\rangle$: Skalarprodukt, komplexwertige Wahrscheinlichkeitsamplitude (Abschnitt 1.4.)

$|\langle\varphi|\psi\rangle|^2$: Übergangswahrscheinlichkeit aus dem Zustand $|\psi\rangle$ in den Zustand $|\varphi\rangle$ (1,18),

Normierungsbedingung für Zustandsvektoren (1,31): $\langle\psi|\psi\rangle = 1$.

Zerlegungssatz für Zustandsvektoren (1,36):

$$|\psi\rangle = \sum_i |\varphi_i\rangle \langle\varphi_i|\psi\rangle,$$

$|\varphi_i\rangle$: vollständiger orthonormaler Satz von Basiszuständen.

$\psi(\mathbf{r}) = \langle\mathbf{r}|\psi\rangle$: Zustandsfunktion (Wellenfunktion) in der Ortsdarstellung (Abschnitt 1.5.),

$|\psi(\mathbf{r})|^2$: Wahrscheinlichkeitsdichte (Abschnitt 1.5.).

Zustandsfunktion eines Zustandes mit Impuls $\mathbf{p}$ (1,63):

$$\psi_{\mathbf{p}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar^3}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}/\hbar},$$

$\hbar = 2\pi\hbar$: Plancksches Wirkungsquantum (1,5),

$\mathbf{p} = \hbar\mathbf{k}$. $\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{e}_n$: Wellenzahlvektor (1,7),

$E = \hbar\omega$, E : Energie, ω : Kreisfrequenz (1,6).

$L, A, H, \dots$: Operatoren (Abschnitt 2.1.), speziell

r : Ortsoperator, p : Impulsoperator, H : Hamilton-Operator.

Hermitezität des Operators A : $A^\dagger = A$ (2,9).

Mittelwert des Operators A im Zustand $|\psi\rangle$ (2,8):

$$\langle A \rangle = \langle \psi | A \psi \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle.$$

$[p_i, x_j] := p_i x_j - x_j p_i = \frac{\hbar}{i} \delta_{ij}$: Vertauschung, Kommutator von Impuls und Ort (2,59),

$[L_x, L_y] = i\hbar L_z$: Kommutator für die Koordinaten des Drehimpulses (5,4).

Unschärferelation (2,63):

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle \langle (\Delta B)^2 \rangle \geq \frac{1}{4} |\langle [A, B] \rangle|^2,$$

$\langle (\Delta A)^2 \rangle = \langle \psi | (A - \langle A \rangle)^2 | \psi \rangle$: Schwankungsquadrat von A im Zustand $|\psi\rangle$ (2,62).

Ortsdarstellung (Abschnitt 2.2.):

$$A(x_i, p_i) \rightarrow A\left(x_i, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x_i}\right),$$

$A(x_i, p_i)$: dynamische Variable der klassischen Mechanik,

A : quantenmechanischer Operator, der dieser Observablen zugeordnet ist.

Eigenwertgleichung für hermitesche Operatoren (2,10):

$$A|\varphi_i\rangle = a_i|\varphi_i\rangle,$$

a_i : Eigenwert,

$|\varphi_i\rangle$: Eigenvektor.

Energieeigenwertgleichung für den linearen harmonischen Oszillator (2,76):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \varphi_n(x) + \frac{m}{2} \omega^2 x^2 \varphi_n(x) = E_n \varphi_n(x),$$

$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right)$, $n = 0, 1, 2, \dots$: Energieeigenwerte (2,94),

$\varphi_0(x) = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar\pi}} e^{-\frac{m\omega}{\hbar} \frac{x^2}{2}}$: Grundzustand des harmonischen Oszillators (2,92).

Energieeigenwertgleichung für das Wasserstoffatom (Abschnitt 5.5.):

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial}{\partial r}\right)^2 \psi_{nlm_m_l}(r) - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \psi_{nlm_m_l}(r) = E_n \psi_{nlm_m_l}(r),$$

$E_n = -\left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\right)^2 \frac{m_e}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$: Energieeigenwerte (5,109),

$\psi_{1,0,0}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_B^3}} e^{-r/a_B}$: Orbitale für den Grundzustand (5,111),

a_B : Bohrscher Radius (5,94).

Eigenwertgleichung für das Quadrat des Drehimpulses (5,8):

$$\mathbf{L}^2 |\psi_{jm}\rangle = \hbar^2 j(j+1) |\psi_{jm}\rangle,$$

$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \dots$: Drehimpulsquantenzahl (Abschnitt 5.1),

Eigenwertgleichung für die z -Koordinate des Drehimpulses (5,8):

$$L_z |\psi_{jm}\rangle = \hbar m |\psi_{jm}\rangle,$$

$m = j, j-1, j-2, \dots, -j$; $\hbar m$: Eigenwerte von L_z (Abschnitt 5.1)

Bahndrehimpuls (Abschnitt 5.2): $j \rightarrow l, l = 0, 1, 2, \dots$

Winkelanteil der Eigenzustände in Ortsdarstellung (5,34):

$Y_{lm}(\theta, \varphi)$: Kugelfunktionen.

$$\sigma = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}: \text{Spinmatrizen (5,52).}$$

Schrödinger-Gleichung (Abschnitt 3.1):

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{r}, t) = H \left(\mathbf{r}, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \right) \psi(\mathbf{r}, t): \int d^3r |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 = 1.$$

$H \left(\mathbf{r}, \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \right)$: Hamilton-Operator;

$\psi(\mathbf{r}, t)$: zeitabhängige Zustandsfunktion (Wahrscheinlichkeitsdichteamplitude).

Stationäre Lösungen:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\varphi_n(\mathbf{r}, t)|^2 = 0, \quad \varphi_n(\mathbf{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t} \varphi_n(\mathbf{r}),$$

$$H \varphi_n(\mathbf{r}) = E_n \varphi_n(\mathbf{r}), \quad \int d^3r |\varphi_n(\mathbf{r})|^2 = 1.$$

Asymptotisches Verhalten der Zustandsfunktion für einen elastischen Streuprozess (einfallender Strahl in z -Richtung, kugelsymmetrisches Potential) (6,18):

$$\psi(\mathbf{r}) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} r \left(e^{ikz} + f(\theta) \frac{e^{ikr}}{r} \right),$$

$f(\theta)$: Streuamplitude.

Zusammenhang Streuamplitude – differentieller Streuquerschnitt (6,20):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f(\theta)|^2,$$

$d\sigma/d\Omega$: differentieller elastischer Streuquerschnitt (Wirkungsquerschnitt) pro Raumwinkelement.

Es sollen kurz einige mathematische Begriffe, die für die Formulierung der Quantenmechanik wichtig sind, eingeführt und anhand von Beispielen erläutert werden. Auf eine ausführliche Darstellung und auf mathematische Strenge wird hierbei verzichtet.

Wahrscheinlichkeiten. Man wiederhole hierzu H. MELCHER u. a., Lehrmaterial zur Ausbildung von Diplomalern, Heft 16a, Physik-Praktikum, Abschn. 1.1, Potsdam 1979.

1. Wir betrachten ein Experiment, dessen Ergebnis durch eine Messung festgehalten wird. Dieses Experiment sei beliebig oft unter den gleichen Bedingungen wiederholbar, wobei wir im allgemeinen *unterschiedliche Meßwerte* a_i feststellen. Was läßt sich über den Ausgang solcher Experimente vorhersagen?

Als *Beispiel* betrachten wir den Münzwurf; als Messung gilt die Feststellung, ob die Zahl oben liegt (diesem Ereignis können wir beispielsweise den Meßwert $+1$ zuordnen) oder nicht (Meßwert beispielsweise -1).

2. Wir führen das Experiment N -mal durch und stellen den Meßwert a_i N_i -mal fest. Es gilt, wenn über alle unterschiedlichen Meßwerte (Index i) summiert wird:

$$\sum_i N_i = N. \quad (1)$$

Der Quotient N_i/N wird als *relative Häufigkeit* für das Auftreten des Meßwertes a_i bezeichnet.

3. Für genügend häufige Wiederholungen des Experimentes nähern sich die relativen Häufigkeiten einem Wert, der als Meßvorschrift für die theoretisch zu berechnende *Wahrscheinlichkeit* w_i des entsprechenden Meßwertes a_i angesehen werden kann,

$$\frac{N_i}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} w_i. \quad (2)$$

Der Spezialfall, daß immer der gleiche Meßwert a_j angenommen wird (Sicherheit), ist in (2) für $w_i = \delta_{ij}$ enthalten. Aus (1) folgt, daß die Summe der Wahrscheinlichkeiten $\sum_i w_i$ eins ist.

4. Mit den durch (2) gegebenen relativen Häufigkeiten läßt sich ein mittlerer Meßwert $\langle A \rangle$, d. h. der *Mittelwert* der Meßreihe

$$\langle A \rangle = \frac{1}{N} \sum_i N_i a_i \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \sum_i w_i a_i, \quad (3)$$

für genügend großes N bestimmen.

5. Im allgemeinen streuen die einzelnen Meßwerte a_i um diesen Mittelwert (3). Als *Maß der Streuung* wird der Mittelwert $\langle (\Delta A)^2 \rangle$ des *Abweichungsquadrates* $(\Delta A)^2 = (A - \langle A \rangle)^2$ genommen:

$$\langle (\Delta A)^2 \rangle = \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_i N_i (a_i - \langle A \rangle)^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \sum_i w_i (a_i - \langle A \rangle)^2. \quad (4)$$

Dieses „mittlere Schwankungsquadrat“ wird null, wenn ein Meßwert mit Sicherheit angenommen wird.

Die Wurzel $\sqrt{\langle (\Delta A)^2 \rangle}$ aus dem mittleren Schwankungsquadrat wird als *Unschärfe* bezeichnet.

6. Als *Beispiel* hatten wir den Münzwurf betrachtet. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Zahl oben liegt, ist $1/2$. Was heißt das?

Für den Ausgang eines einzelnen Wurfes kann kein Ergebnis vorhergesagt werden. Betrachten wir aber ein Experiment, das aus K *Münzwürfen* besteht, so erwarten wir, daß bei der Hälfte der Würfe die Zahl oben liegt.

Wenn $Z^{(K)}$ die Anzahl der Würfe in der K -Serie ist, bei denen die Zahl oben liegt, heißt das: Der *Erwartungswert* von $Z^{(K)}/K$ ist

$$\langle Z^{(K)}/K \rangle = \frac{1}{2}. \quad (5)$$

Er stimmt gemäß (3) mit dem Mittelwert für $K \rightarrow \infty$ überein.

Jedem Experiment, d. h. jeder K -Serie, läßt sich nun ein Meßwert $a^{(K)}$ zuordnen, indem man jeden Wurf mit $+1$ zählt, wenn die Zahl oben liegt, und im anderen Fall mit -1 . Dann gilt

$$a^{(K)} = Z^{(K)} - (K - Z^{(K)}) = 2Z^{(K)} - K. \quad (6)$$

Mit (5) erhält man den Erwartungswert

$$\langle a^{(K)} \rangle = 2\langle Z^{(K)} \rangle - K = K - K = 0. \quad (7)$$

7. Wir führen dieses Experiment genügend oft durch und bestimmen die relativen Häufigkeiten, mit denen die einzelnen Meßwerte $a_i^{(K)}$ auftreten. Diese relativen Häufigkeiten nähern sich gemäß (2) den Wahrscheinlichkeiten $w_i^{(K)}$ für das Auftreten eines Meßwertes $a_i^{(K)}$.

In Abb. 1 sind diese Wahrscheinlichkeiten für $K = 5$ (ein Experiment besteht aus 5 Würfeln) aufgetragen. Die möglichen Meßwerte $a_i^{(K)}$ sind $5, 3, 1, -1, -3, -5$. Man prüfe die aufgetragenen Wahrscheinlichkeiten experimentell!

8. Insbesondere stellen wir fest, daß der Meßwert $a^{(K)}$ für ein Experiment im allgemeinen nicht mit dem Erwartungswert Null bzw. daß $Z^{(K)}$ nicht mit dem Erwartungswert $K/2$ übereinstimmt. Erst bei der wiederholten Durchführung des Versuches streben die Mittelwerte dieser Meßwerte gegen den Erwartungs-

Abb. 1
Wahrscheinlichkeiten $w_i^{(5)}$, Mittelwert $\langle A \rangle$ und Unschärfe $\sqrt{\langle (\Delta A)^2 \rangle}$ für eine Serie aus 5 Münzwürfen

wert. Die *Streuung* der Meßwerte $a^{(K)}$ um den Erwartungswert $\langle a^{(K)} \rangle = 0$ läßt sich berechnen, wenn man das Schwankungsquadrat $\langle (\Delta a^{(K)})^2 \rangle$ (4) mit dem Schwankungsquadrat $\langle (\Delta a^{(K-1)})^2 \rangle$ einer Serie aus $K - 1$ Münzwürfen vergleicht. Wegen

$$a^{(K)} = a^{(K-1)} \pm 1$$

für jedes Experiment und (7),

$$\langle a^{(K)} \rangle = \langle a^{(K-1)} \rangle = 0,$$

wird

$$\begin{aligned} \langle (\Delta a^{(K)})^2 \rangle &= \langle (a^{(K)})^2 \rangle = \langle (a^{(K-1)} \pm 1)^2 \rangle \\ &= \langle (a^{(K-1)})^2 \rangle \pm 2\langle a^{(K-1)} \rangle + 1 = \langle (a^{(K-1)})^2 \rangle + 1; \end{aligned} \tag{8}$$

bei K -facher Wiederholung dieses Schrittes ergibt sich

$$\langle (\Delta a^{(K)})^2 \rangle = K. \tag{9}$$

Mit zunehmendem K nimmt die Unschärfe $\sqrt{\langle (\Delta a^{(K)})^2 \rangle}$ mit $\sqrt{K}$ zu, die relative Unschärfe $\sqrt{\langle (\Delta a^{(K)})^2 \rangle}/K$ mit $1/\sqrt{K}$ ab. In diesem Sinne kann man sagen, daß der Erwartungswert $\langle a^{(K)} \rangle = 0$ um so besser angenommen wird, je größer K ist.

9. Die Verteilung $w_i^{(K)}$ der Meßwerte $a_i^{(K)}$, die bei einer häufigen Wiederholung des K -fachen Münzwurfes erhalten wird, ist die Binomialverteilung (Abb. 1). Dies läßt sich anhand des Pascalschen Dreiecks verdeutlichen, soll hier aber nicht gezeigt werden.

Der Hilbert-Raum. Die Sätze der Quantenmechanik lassen sich unter Verwendung des Hilbert-Raumes besonders einfach und durchsichtig formulieren. In Kapitel 1. werden wir zeigen, in welcher Weise die grundlegenden Aussagen der Quantenmechanik mathematisch durch Beziehungen im Hilbert-Raum erfaßt werden können.

Jedes spezielle Problem der Quantenmechanik läßt sich mit Hilfe der Rechenregeln für den Hilbert-Raum in übersichtlicher Weise formulieren und lösen.

Wir werden hier einige Eigenschaften des Hilbert-Raumes, der eine Verallgemeinerung des dreidimensionalen reellen Vektorraumes $\mathfrak{R}_3$ darstellt, nennen und erläutern. Zum Vergleich sollen diese Eigenschaften parallel für den $\mathfrak{R}_3$ betrachtet werden.

1. Der Hilbert-Raum ist ein *linearer komplexer Vektorraum*. Wenn wir zwei Elemente (Vektoren) dieses Vektorraumes mit $|x\rangle$, $|y\rangle$ bezeichnen, dann sind die Summe $|x\rangle + |y\rangle$ sowie $\lambda|x\rangle$ ebenfalls in diesem Vektorraum enthalten. λ ist eine beliebige komplexe Zahl.

Im Falle des $\mathfrak{R}_3$ sind mit den Elementen (Vektoren) r_1, r_2 die Elemente $r_1 + r_2$ und αr_1 ebenfalls in $\mathfrak{R}_3$ enthalten (Abb. 2). Im Gegensatz zum Hilbert-Raum muß α eine reelle Zahl sein.

Abb. 2
Summe und Vielfaches von Vektoren

2. Im Hilbert-Raum ist eine *multiplikative Verknüpfung (Skalarprodukt)* erklärt, die zwei Elementen $|x\rangle$, $|y\rangle$ eine komplexe Zahl $\langle x | y \rangle$ mit folgenden Eigenschaften zuordnet:

$$\langle x | y \rangle = \langle y | x \rangle^*, \quad (10)$$

$$\langle x | y_1 + y_2 \rangle = \langle x | y_1 \rangle + \langle x | y_2 \rangle, \quad (11)$$

$$\langle x | \lambda y \rangle = \lambda \langle x | y \rangle, \quad (12)$$

$$\langle x | x \rangle \geq 0. \quad (13)$$

Beispielsweise folgt aus (10), daß $\langle x | x \rangle$ reell sein muß, denn bei der Vertauschung der Elemente geht das Skalarprodukt in das Konjugiert-Komplexe über. Das Gleichheitszeichen in (13) gilt nur für das Null-Element $|0\rangle$. Die Eigenschaft (13) gestattet es, eine *Norm*

$$\text{Norm } |x\rangle := \sqrt{\langle x | x \rangle} \quad (14)$$

einzuführen.

Im Falle des $\mathfrak{R}_3$ erfüllt das übliche Skalarprodukt von Vektoren die Bedingungen (10) bis (13), es kann aber nur reelle Werte annehmen.

3. Jedes Element des Hilbert-Raumes läßt sich aus einem *Satz von linear unabhängigen Basiselementen* $|e_n\rangle$ durch Linearkombination erhalten.

Die Elemente $|e_n\rangle$ werden dann als linear unabhängig bezeichnet, wenn die Gleichung

$$\sum_n |e_n\rangle c_n = |0\rangle \quad (15)$$