



2007

卫生专业技术资格考试辅导丛书

总主编 金 宇

儿科主治医师资格 应试题库与 历年真题解析

主 编 谢雪兰

ERKE ZHUZHI YISHI ZIGE
YINGSHI TIKU YU LINIAN
ZHENTI JIEXI



军事医学科学出版社

卫生专业技术资格考试辅导丛书——

丛书总主编:金 宇

儿科主治医师资格应试题库与 历年真题解析

主 编:谢雪兰

副 主 编:石 宣 杨小巍 柏金秀

编 者:贾 浩 董巧丽 白 珍

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

内 容 提 要

本书以历年考试试题为模版,结合历年考生的应试经验和教训,以题库的形式(含往年真题)覆盖儿科主治医师资格考试大纲全部考核知识点,帮助考生在短时间内达到考核要求。模拟试卷尽量体现真题原貌,达到仿真练习的效果。

图书在版编目(CIP)数据

儿科主治医师资格应试题库与历年真题解析/谢雪兰.

-北京:军事医学科学出版社,2006.12

(卫生专业技术资格考试辅导丛书)

ISBN 978-7-80121-902-2/R·895

I. 儿… II. 谢… III. 儿科学-医师-资格考核-解题 IV. R72-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第150957号

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路27号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418,66884402 转 6213,6216,6315

传 真:(010)63801284

网 址:<http://www.mmsp.cn>

印 装:三河佳星印装有限公司

发 行:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:22.5

字 数:543千字

版 次:2007年2月第1版

印 次:2007年2月第1次

定 价:38.00元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

忧心的主治医师资格考试

——漫谈应考复习方法

报考主治医师资格的考生一般是三十刚出头的年龄,正是在工作岗位出力时,也开始进入上老下小的年龄阶段,家庭的重担,工作压力,社会关系的复杂已经让他们焦头烂额,再加上这个全国统考的主治医师资格考试,全国平均不到40%的通过率,这一年比一年难的事实更是让他们忧心忡忡。而考试又不能不参加,怎么办?作为一名常在医学教学一线的老师,我们愿意把这几年的教学经验告诉广大考生,希望对大家有所帮助有所裨益。

一、思想上一定要重视

毕竟主治医师资格考试属于国家级统一考试,从考试命题到组织管理是严格和规范的,尽管考的是本人所从事工作的专业知识,但内容繁多,考题灵活性强,往年考生对该考试议论也很多,比如超纲、难度过大、考题太偏等等。相当一部分考生自认为基础扎实或没时间看书仓促应考,注意力和重视程度不够,结果只会是丢下了两、三科留到第二年。

二、注意多收集一些信息

想办法多向往届考生打听考试的难度、考点,也可以到网上收集些应考的经验和评论,国内的丁香园、爱爱医网站都有专门的版块讨论卫生资格考试的帖子,很多信息对应考非常有帮助。本书的许多构思就来自一线考生的经验。比如有关主治医师资格考试命题与组卷的要求,外科以普外和外科总论为主,病例题非常灵活等,我们在编写本书的时候都体现了这些宝贵的经验和教训。

下面就是我们收集到的有关主治医师资格考试命题与组卷的要求,非常有益。

命题、组卷要求与注意事项

(1)命制试题时一定要考虑考试的目的、性质、要求和考试对象。初级与中级职称的要求和难度应有一定的差别。初级考试理想的通过率为60%左右;中级的理想通过率应为40%左右。考试的标准要考虑全国的平均水平,特别是基层医院考生的实际水平和要求,不应以某类或每级医院的水平,如教学医院或三级甲等医院的水平,作为卫生技术资格考试的标准。

(2)由于国家及格线为每科目均须达到60分,请注意试卷总体难度不能太高。请各专业委员会根据上年考试结果和试题统计分析资料,认真研究和确定下年试卷的总体难度。

(3)同一专业之间的亚专业,如内科学中的呼吸、循环、血液等的难度要基本相同;四个科目之间的难度也要基本平衡,特别是基础知识不能太难。

(4)亚专业各个科目的题型比例应基本相同。X型题可以不选用;如果选用则每科目不能超过10%,即10道题。

(5)X型题的5个备选答案不能都是正确答案,并且要有提示。如某X型题的正确答案有2个,在题干的后面要加上这样一句话:“……在5个备选答案中选出2个正确答案”。

(6)正确答案要随机排列,不能连续出现在相同位置,不能过多地集中在某一位置,也不能出现有规律的循环排列。

三、通过熟悉往年考题,掌握考试题型、难度和考核要求

主治医师资格考试题型如下:

(一)A1型题(单句型最佳选择题)

每道试题由1个题干和5个供选择的备选答案组成。备选答案中只有一个是最佳选择,称为正确答案,其余四个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确或是部分正确,相互排斥的答案可同时提供。这类试题常常具有比较意义,在答题时,应当找出最佳的或最恰当的备选答案,排除似乎有道理而实际是不恰当的选择。

这种题型一般可分为A1-1、A1-2、A1-3三个亚型。

从2003年起只要求命制A1-1型题,即标准的A1型题和A1-3型题,即否定型题。不允许选项出现“以上都不是”,更不允许出现“以上都是”的试题形式。

(1) A1-1型题

例1:预防风湿热复发的最有效药物是

- A. 阿司匹林 B. 对氨基苯甲酸 C. ACTH D. 青霉素 E. 考的松

答案:D

(2) A1-3型题

又称否定型题,如果试题涉及不只一个的相关问题或正确答案,可采用否定型。题目的题干中有一个特别标注的否定词(不、不是、不能、除、除外、错误、无关等)。五个备选答案中有一个是错误的,要求考生把这一答案找出来,加以排除。应试者要从备选答案中选出最不适用的一个;或者用得最少的一个;或者某一方面是个例外的一个。但是,这种命题方式在解题时,通常会给学生造成从肯定到否定的思维突变,影响答题,出现不该出现的错误,应尽量少用。除A1型题,其他多选题也可以使用否定型题。

例2:关于直肠肛管引流,错误的是

- A. 分为上、下二组 B. 上组在齿线以上 C. 向上流入髂内淋巴结
D. 两侧流入髂内淋巴结 E. 下组流入坐骨肛管间隙淋巴结

答案:D

(二) A2型题(病历摘要型最佳选择题)

每道题由一个叙述性主体(简要病历)作为题干,一个引导性问题和五个备选答案组成。

例3:男,30岁,近4年来经常间发四肢关节疼痛,近来感乏力、纳差、心悸、气促,肝在肋下2.5 cm触及,轻触痛。查血红蛋白97g/L,尿蛋白(+);双下肢轻度浮肿。最可能的原因是

- A. 肝硬化 B. 急性肾炎 C. 主动脉瓣狭窄致左心衰 D. 二尖瓣狭窄致右心衰
E. 营养不良

答案:D

(三) A3型题(病历组型最佳选择题)

每道题开始叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出2~3个相关问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立,每个问题都是一个单句型的最佳选择题。

例4:女性,24岁,尿频、尿急、尿痛病史3个月,多种抗生素治疗不见好转,尿常规有许多红、白细胞,最近患者症状加重,伴有尿失禁出现。

(1)此患者可能性大的临床诊断是

- A. 急性膀胱炎 B. 慢性膀胱炎 C. 腺性膀胱炎 D. 间质性膀胱炎 E. 泌尿系结核

答案:E

(2)此患者尿失禁属于

- A. 精神性尿失禁 B. 压力性尿失禁 C. 急迫性尿失禁 D. 充盈性尿失禁 E. 真性尿失禁

答案:C

(四) A4型题(病历串型最佳选择题)

每道试题开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景,然后提出3~6个相关的问题,问题之间也是相互独立的,每个问题都是一个单句型的最佳选择题。当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息,这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关,又与随后改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。

例5:男性,63岁。确诊慢性阻塞性肺病近10年,因呼吸困难一直需要家人护理和照顾起居。晨起大便

时突然气急显著加重,伴胸痛,送来急诊。

(1)采集病史时应特别注意询问

- A. 胸痛部位、性质和伴随症状 B. 冠心病、心绞痛病史 C. 吸烟史
D. 近期胸部 X 线检查情况 E. 近期服药史如支气管舒张剂、抗生素

答案:A

(2)体检重点应是

- A. 肺下界位置及肺下界移动度 B. 肺部啰音 C. 病理性支气管呼吸音
D. 胸部叩诊音及呼吸音的双侧比较 E. 颈动脉充盈

答案:D

(3)确诊最有价值的辅助检查是

- A. B 型超声显像 B. 心电图 C. X 线透视或摄片 D. MRI E. 核素肺扫描

答案:C

(4)若经检查确诊肺气肿并发左侧自发性气胸。其治疗拟选择胸腔插管水封瓶引流,主要目的是

- A. 尽早使肺复张,维护已经严重受损的肺功能,防止呼吸衰竭
B. 尽快使肺复张,缩短住院时间
C. 尽快使肺复张,防止形成慢性气胸
D. 尽快使肺复张,防止胸腔继发感染
E. 尽快使肺复张,防止循环系统受扰和引起并发症

答案:A

(5)[假设信息]如果床旁胸部 X 线摄片未显示明确气胸带,下列间接征象中最有助于气胸诊断的是

- A. 心脏移位 B. 左心缘透亮度增高、左膈压低 C. 肺大泡
D. 两肺透亮度增高,肺门血管纹理增多而外周突然减少
E. 肋间隙增宽

答案:B

(6)[假设信息]若已有检查仍不能证明气胸,尚需考虑可能的诊断是

- A. 肺炎 B. 心绞痛 C. ARDS D. 肺栓塞 E. 急性肺水肿

答案:D

(五)B1 型题(配伍题)

每道题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与两个或两个以上题干组成(本考试命题要求 B1 型题一律用 2 或 3 个题干),五个备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不选用。

例 6:A. 风疹 B. 艾滋病 C. 血友病 D. 红斑性狼疮 E. 支气管哮喘

(1)属自身免疫性疾病的是

(2)属免疫缺陷性疾病的是

答案:(1)D;(2)B

不允许命制 B2 型题(扩展的配伍题),即为 6 个及 6 个以上的备选答案的 B 型题。

(六)X 型题(多重是非选择题)

每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成,形式类似于 A1 型题,但正确答案不只 1 个,可以是 2 个、3 个、4 个备选答案都正确(不允许出现 5 个正确答案)。

例 7:胆囊壁的结构上缺少的是(从 5 个选项中选择 2 个正确答案)

- A. 黏膜层 B. 黏膜肌层 C. 黏膜下层 D. 固有肌层 E. 浆膜

答案:BC

例 8:与幽门螺杆菌感染相关的是(从 5 个选项中选择 3 个正确答案)

- A. 反流性食管炎 B. 萎缩性胃炎 C. 十二指肠溃疡复发
D. 胃淋巴瘤 E. 胃平滑肌瘤

答案:BCD

例9:口服胆囊造影术显影不良的因素中,下列哪项是正确的(从5个选项中选择4个正确答案)

A. 肠胃吸收功能不良 B. 黄疸 C. 胆囊管梗阻 D. 慢性胆囊炎 E. 胆囊腺肌病

答案:ABCD

X型题题干可以是一个问题、一段对话、一段病史,也可以是图表或临床检查资料等。选择项提供的正确答案或错误答案都应是肯定的,不能在选择项中有部分正确、部分错误或似是而非的答案,也不能同时存在两个相互矛盾的答案。

X型题如果不限定正确答案数量的话,从数学上讲可以有26种组合,如果按照考生实际选择正确答案的多少评分,用答题卡形式阅卷评分很难制定一套评分标准。如果规定每道题得分是一致的,则应试者多选或少选一个正确选项就不得分,难以公正评价应试者对某一个问题真正掌握的程度。考生多选或少选正确答案都不得分,难度非常大。从2003年起X型题都要在题干中对设置的正确答案的数(2、3、4个)做出提示。

按照备选答案的性质可以分为最佳选择题(A、B型题)和是非型题(X型题)。最佳选择题的几个备选答案可以是完全正确,完全错误,也可以是部分正确或部分错误。是非型题的备选答案要么完全正确,要么完全错误,不能有似是而非的答案。A型题中的否定性的试题也是是非型题。

(七)图表选择题

常见的图像、图表有X线片、心电图、CT片、MRI片、B超、核素图像、血片、病理图片、解剖图、示意图、统计表等。这种形式的试题可以出现在任何类型的选择题中。

图表试题的要求:

(1)图表各部分必须清晰。要保证图表资料按比例缩小后原图各部分仍能看清楚。

(2)所有图表应标明上下,必要时标明比例。

(3)题图如果集中放在试题后面,题图应注明题号,如“第×题题图”,试题题干中要相应提示“见第×题题图”。

众多的考生认为,考试多年了,题型谁都明白,但实际上并非如此,大家可以从中找出一些规律,如B1型题,往往选择具有比较、鉴别意义的一个主题,如发热、黄疸、营养性疾病的治疗等作为命题的重点对象。

主治医师资格考试采用的是标准化命题,与在医学院期间的考试题型区别很大,与医师资格考试要求的知识的广度性考核要求也有区别,更多的是以考核知识的灵活运用为目标,大量的病例分析题出现在试卷中就不足为奇了。所以总是出现五个备选答案中有两个难以决定取舍的情况。

四、吸取往届考生的经验和教训

考试题型和大纲没有变化,但从这几年的考题和考生反映来看,难度逐年加大,各专业集中体现为基础知识和相关专业两部分难度大,我们认为,基础知识并非本身难度大,而是考生没有领悟考试要求,大家看内科学基础知识的要求就会明白其中的道理。

基础知识考核要求:熟悉药理学、微生物、生理、病理、病理生理、生物化学等基础学科的相关内容,如药物的作用机制与副作用,感染性疾病病原生物,常见各科疾病的病理类型与发病机制(包括免疫、生化与异常代谢等),对疾病的解剖生理基础应有所了解。可以看出,反映基础知识难的原因是,那些与本专业关系不大的解剖、生理、病理、药理等知识早已经记忆模糊,不下工夫研读,考试自然不能过关。而相关专业知识的考核要求是指实验诊断学、影像诊断学与内科密切相关的知识,外科与妇产科等与内科疾病有关鉴别诊断或治疗的内容;对遗传病的遗传规律,流行病的理论与方法在内科中的应用,这些更是考生容易忽略的知识,专业分工越来越细,与本专业关系不大的知识更不容易掌握。被淘汰的考生往往是在此吃亏。

另外需要强调的是,尽管主治医师资格考试已经考了六年了,几乎每年都有不少考生还犯一些低级错误,自认为报心血管专业,就只考心血管方面的知识,不用复习其他内科各专业的知识了,加之市面上有个别所谓“全真模拟题”按照亚专业编排,误导了很多考生。尤其是在基层医院,通过率低与此不无关系。笔者在基层做调研的时候就遇到过好几位考生咨询此类问题,实在令人哭笑不得。

五、看哪本教材,做哪些题

目前考生都用的是主管部门编写的一套指定用书,但实际效果如何?据考生反映,很多题在书上找不到

答案,把《指导》看了好几遍,考试居然没过关。根据考生的体会和教训,建议大家认真读规划七、八年制本硕连读教材。要想通过专业实践能力单元测试,还得读本专业的权威参考书,如考外科,就得研读《黄家驷外科学》中的相关内容,报内科就得研读《实用内科学》的相关内容。习题则更为重要,决定了考生的复习重点和方向。目前相关习题类图书不是很多,不少专业还出现考生四处乱找题的窘状,结果如同病急乱投医,适得其反。我们这套应试题库就是在分析历年考题的基础上总结命题规律,结合考生的实际需要,吸取了往年考生的经验和教训编写的。尤其是考虑到基层医生时间紧张,我们把大纲要求的全部考点用题的方式进行全面覆盖,同时把近几年的考试真题分配到各章节,对大家复习时把握命题规律非常有益。其实很多考点的重复率很高,毕竟难题和偏题是少数,只要把那些基本知识掌握了,60分并不难。另外《指导》用书所附的习题一定是要做熟练的,一般有10%左右的原题。

六、注意掌握一些应考技巧

历经了许多次考试,考生都积累了很多应考的经验,但是做多选题是有一些技巧的,比如排除法、弃卒保帅法(实在不会的统一全部选C)、感觉法(第一感觉和临床经验直感往往是对的)等,如果你具备55分以上的水平,这些技巧基本可以帮你跨越60分大关。为什么很多考生书背得很熟,但一做题总是出错,究其原因就是他只会做问答题或者A型题而已,而没有注意知识的连贯性,没有将疾病的联系与区别进行横向比较,没有掌握出题的规律和答题技巧,因此只能在及格线以下苦苦挣扎。

本书有幸邀请了北京电力总医院(首都医科大学附属教学医院)的数位博士和专家亲自编写,凝聚了他们多年的心血,对考生也会大有裨益。

一家之言,不妥之处请考生批评指正。

军事医学科学出版社考试用书编辑室 金 宇

2006年10月

目 录

第一章	儿科学绪论	(1)
第二章	儿科基础	(2)
第三章	症状与鉴别诊断	(9)
第四章	新生儿与新生儿疾病	(14)
第五章	小儿营养与营养性疾病	(37)
第六章	消化系统疾病	(56)
第七章	呼吸系统疾病	(73)
第八章	循环系统疾病	(91)
第九章	血液系统疾病	(120)
第十章	泌尿系统疾病	(136)
第十一章	神经肌肉系统疾病	(154)
第十二章	心理及行为疾病	(176)
第十三章	风湿性疾病	(180)
第十四章	内分泌系统疾病	(191)
第十五章	遗传性和代谢性疾病	(200)
第十六章	小儿结核病	(209)
第十七章	感染性疾病	(219)
第十八章	免疫系统疾病	(260)
第十九章	变态反应疾病	(273)
第二十章	儿科急救	(277)
模拟试卷(一)		(285)
模拟试卷(二)		(317)

第一章 儿科学绪论

A1 型题

1. 胎儿期是指
 - A. 从精子和卵子结合到小儿出生统称
 - B. 自出生后脐带结扎起到刚满 28 天为止
 - C. 从出生到满 1 周岁
 - D. 1 周岁以后到 3 周岁之前
 - E. 3 周岁以后到 6~7 岁入小学前期
2. 小儿死亡率最高发生在哪一期
 - A. 胎儿期
 - B. 新生儿期
 - C. 婴儿期
 - D. 幼儿期
 - E. 学龄前期
3. 小儿生长发育最迅速的时期是
 - A. 胎儿期
 - B. 新生儿期
 - C. 婴儿期
 - D. 幼儿期
 - E. 学龄前期
4. 新生儿期保健的重点时间是
 - A. 生后 1 小时内
 - B. 生后 1 天内
 - C. 生后 3 天内
 - D. 生后 1 周内
 - E. 生后 2 周内
5. 胚胎期是指受孕后的
 - A. 8 周内
 - B. 9 周内
 - C. 10 周内
 - D. 11 周内
 - E. 12 周内
6. 小儿体格发育的两个高峰期是
 - A. 青春期、学龄期
 - B. 学龄期、学龄前期
 - C. 青春期、幼儿期
 - D. 青春期、婴儿期
 - E. 学龄期、新生儿期
7. 小儿容易发生意外伤害和中毒的时期是
 - A. 新生儿期
 - B. 婴儿期

- C. 幼儿期
- D. 学龄前期
- E. 学龄期

8. 幼儿期的保健重点不包括以下哪项
 - A. 防止意外创伤
 - B. 防止结核病
 - C. 防止中毒
 - D. 防止营养缺乏
 - E. 防止消化功能紊乱
9. 青春期发育最突出的特点是
 - A. 神经发育成熟
 - B. 免疫功能进一步增强
 - C. 生殖系统迅速发育,并趋向成熟
 - D. 体格加速
 - E. 内分泌调节尚不稳定

B 型题

- A. 发病率高,死亡率高
- B. 语言、思维和交往能力增强,但对各种危险的识别能力不足
- C. 智能发育进一步完善,好奇心强
- D. 生长迅速,对营养物质需求量相对较大,易发生消化系统疾病
- E. 生长速度减慢,智能发育更趋完善,好奇多问,模仿性强

小儿各个年龄期的特点是:

10. 婴儿期
11. 新生儿期
12. 幼儿期

X 型题

13. 生长发育的两个高峰是
 - A. 新生儿期
 - B. 婴儿期
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄前期
 - E. 青春期

【答案】

1. A 2. B 3. C 4. D 5. A
6. D 7. C 8. B 9. C 10. D
11. A 12. B 13. AE

第二章 儿科基础

一、生长发育

A1 型题

1. 婴儿体重 4kg, 前囟 1.5cm × 1.5cm, 后囟 0.2cm, 能微笑, 从俯卧位扶起时能仰头。其最可能的月龄为

- A. 2 个月
- B. 3 个月
- C. 4 个月
- D. 5 个月
- E. 6 个月

2. 小儿体重 9.2kg, 身长 75cm, 头围 46cm, 胸围 46cm, 出牙 8 只, 其最可能的月龄为

- A. 10 个月
- B. 12 个月
- C. 14 个月
- D. 16 个月
- E. 18 个月

3. 小儿有牙 8 只, 会用汤匙吃饭, 说 2~3 字拼成的短语, 会戴帽、踢球, 其最可能的年龄为

- A. 1 岁
- B. 1 岁半
- C. 2 岁
- D. 2 岁半
- E. 3 岁

4. 男孩, 5 岁, 营养发育中等, 平时少病。其标准体重、身长最可能为

- A. 15kg, 100cm
- B. 16kg, 110cm
- C. 16kg, 100cm
- D. 18kg, 115cm
- E. 18kg, 100cm

5. 小儿 5 岁, 体格发育正常, 营养中等, 其上臂围应该为

- A. 9.5~10.5cm
- B. 10.5~11.5cm
- C. 11.5~12.5cm
- D. 12.5~13.5cm
- E. 13.5~14.5cm

6. 男孩 1 岁, 发育正常, 如测得其头围为 46cm,

则其胸围最可能为

- A. 46cm
- B. 40cm
- C. 42cm
- D. 48cm
- E. 56cm

7. 幼儿 2 岁, 欲测试精神、运动状态, 宜选用下述哪项方法

- A. 皮博迪图画词汇测验 (PPVT)
- B. 50 项测验
- C. 丹佛儿童发育普查测验 (DDST)
- D. 绘人试验
- E. 韦氏智力量表

8. 幼儿 3 岁, 身高 90cm, 体重 14kg, 牙 20 颗, 可考虑

- A. 肥胖
- B. 在正常范围内
- C. 身材高大
- D. 体重、身高略低
- E. 营养不良

9. 生长发育的一般规律是

- A. 由上到下、由近到远、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂
- B. 由下到上、由近到远、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂
- C. 由上到下、由远到近、由粗到细、由低级到高级、由简单到复杂
- D. 由上到下、由近到远、由粗到细、由高级到低级、由简单到复杂
- E. 由上到下、由近到远、由粗到细、由高级到低级、由复杂到简单

10. 乳牙何时出齐

- A. 1.5 岁
- B. 2 岁
- C. 2.5 岁
- D. 3 岁
- E. 3.5 岁

11. 一男婴, 体重 7.5 公斤, 身长 66 厘米, 头围 44 厘米, 左腕骨骨化中心 2 个。此婴儿可能的月龄是

- A. 4 个月
- B. 5 个月

- C. 6个月
D. 7个月
E. 12个月
12. 小儿语言发育三个阶段的顺序是
A. 发音、理解、表达
B. 理解、表达、发音
C. 表达、理解、发音
D. 听觉、发音、理解
E. 模仿、表达、理解
13. 判断小儿体格发育最常用的指标是
A. 动作发育能力
B. 语言发育能力
C. 智能发育水平
D. 神经反射发育
E. 体重、身高、头围
14. 正常小儿前囟闭合最晚的时间是
A. 10个月
B. 1岁半
C. 1岁8个月
D. 2岁半
E. 3岁
15. 小儿腕骨骨化中心出全的数目是
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
E. 12
16. 2岁以内的小儿乳牙数目约为
A. 月龄减1~2
B. 月龄减2~4
C. 月龄减4~6
D. 月龄减6~8
E. 月龄减8~10
17. 小儿前囟闭合过早见于以下哪种疾病
A. 极度消瘦者
B. 佝偻病
C. 小头畸形
D. 克汀病
E. 脑炎
18. 乳牙开始萌出的时间是
A. 2~4个月
B. 4~10个月
C. 10~12个月
D. 12~15个月
E. 15~18个月
19. 小儿在2岁至12岁时体重每年约增长多少
A. 1kg
B. 2kg
C. 3kg
D. 4kg
E. 5kg
20. 新生儿生理性体重下降发生在出生后
A. 第1周
B. 第2周
C. 第3周
D. 第4周
E. 第5周
21. 一健康小儿,体重6.5kg,前囟2.2cm × 2.2cm,能独坐一会儿,用手摇玩具,能区分熟人和陌生人,其年龄约为
A. 3个月
B. 6个月
C. 9个月
D. 12个月
E. 15个月
22. 女孩,6岁,营养发育正常,其标准体重、身长最可能是
A. 16kg,100cm
B. 16kg,105cm
C. 18kg,105cm
D. 18kg,110cm
E. 20kg,112cm
23. 一小儿体重9kg,身高75cm,头围46cm,此小儿的年龄是
A. 9个月
B. 1岁
C. 2岁
D. 2岁半
E. 3岁
24. 一健康小儿,体重7.5kg,身长64cm,会翻身,能独坐很久,不会爬,能听懂自己的名字,能发出“爸爸”、“妈妈”等复音,但无意识,其月龄最可能
A. 3个月
B. 5个月
C. 7个月
D. 9个月
E. 11个月
25. 小儿,1岁,体格发育正常,体重9kg,身高75cm,头围46cm,其胸围最可能是
A. 34cm

- B. 40cm
- C. 46cm
- D. 48cm
- E. 52cm

26. 一小儿,体格发育正常,体重 20kg, 身高 110cm, 身高之中点位于脐与耻骨联合之间, 腕部骨化中心出现 7 个, 已出现第一磨牙, 没开始换牙。此小儿最可能的年龄是

- A. 4 岁
- B. 5 岁
- C. 6 岁
- D. 7 岁
- E. 8 岁

27. 小儿有牙 18 个, 会用汤匙吃饭, 能说 2~3 个字拼成的短语, 其年龄为

- A. 1 岁
- B. 1 岁半
- C. 2 岁
- D. 2 岁半
- E. 3 岁

28. 3 个月小儿按公式计算其身高、头围约是

- A. 55cm、38cm
- B. 60cm、40cm
- C. 65cm、42cm
- D. 70cm、44cm
- E. 75cm、46cm

29. 3 岁小儿, 身材矮小而匀称。下列哪项诊断不太可能

- A. 垂体性侏儒
- B. 克汀病
- C. 慢性腹泻
- D. 佝偻病
- E. 营养不良

30. 在一组个案记录中; 除了哪一例, 均有明显不当之处

- A. 男婴 3 个月, 发热 2 天伴轻咳。体检: 体温 38.2℃, 咽充血, 扁桃体 II 度肿大, 心、肺异常。
- B. 幼婴 2 个月, 体重 4kg, 身高 54cm, 前囟 1.5cm × 1.5cm, 心肺无异常, 肝在肋下 1cm 处可及, 拥抱反射仍存在。
- C. 幼儿 23 个月, 生后无特殊, 现走得好, 会叫自己的名字。体检: 营养发育佳, 身材匀称, 头围 48cm, 胸围 50cm。
- D. 婴儿, 10 个月, 活泼可爱, 会叫“爸”、

“妈”, 能独立行走, 前囟 1cm × 1cm, 克氏征阴性, 握持反射存在。

- E. 女孩 4 岁, 因牙痛就治。检查发现除第 3 乳磨牙外, 余齿均已蛀。

31. 一健康小儿, 体重 9kg, 前囟约 0.5cm × 0.5cm, 出牙 8 个, 开始能独走, 能叫出物品名字, 指出自己的手、眼, 其年龄大约为

- A. 6 个月
- B. 8 个月
- C. 12 个月
- D. 16 个月
- E. 20 个月

32. 一小儿, 体格发育正常, 身高 90cm, 体重 14kg, 乳牙 20 个, 腕骨骨化中心 4 个, 能说短歌谣, 不会穿鞋, 其最可能的年龄是

- A. 1 岁
- B. 1.5 岁
- C. 2 岁
- D. 3 岁
- E. 4 岁

33. 5 岁小儿按公式计算身高、体重及头围约是

- A. 90cm、12kg、44cm
- B. 95cm、14kg、46cm
- C. 100cm、16kg、48cm
- D. 105cm、18kg、50cm
- E. 110cm、20kg、52cm

34. 上部量指测量

- A. 头顶至坐骨结节的距离
- B. 头顶至耻骨联合上缘的距离
- C. 头顶至耻骨联合下缘的距离
- D. 头顶至脐部的距离
- E. 头顶至脐与耻骨联合中点的距离

35. 测量结果为上部量 5cm, 下部量 30cm。请问符合以下哪一情况

- A. 正常儿童
- B. 偏矮, 以上部量不足为主
- C. 偏矮, 以下部量不足为主
- D. 侏儒, 以上部量不足为主
- E. 侏儒, 以下部量不足为主

B 型题

(36~45 题共用备选答案)

- A. 4 周
- B. 8 周
- C. 6 个月
- D. 12 个月

- E. 1岁半
- F. 2岁
- G. 2岁半
- H. 3岁
- I. 6岁
- J. 10岁
- K. 12岁
- 36. 腕部骨化中心出全的年龄
- 37. 后囟闭合的时间
- 38. 可确定出乳齿延迟的时间
- 39. 乳齿通常萌出的时间
- 40. 第2恒磨牙萌出的时间
- 41. 前囟闭合的时间
- 42. 乳牙应出齐的时间
- 43. 第1恒磨牙萌出的时间
- 44. 桡骨远端骨化中心出现的时间
- 45. 尺骨远端骨化中心出现的时间

(46~48题共用备选答案)

- A. 抬头、微笑
- B. 伸手取物
- C. 独坐
- D. 独走
- E. 双脚跳

婴儿的运动发育:

- 46. 4个月儿应会的动作是
- 47. 6个月儿应会的动作是
- 48. 9个月儿应会的动作是

(49~53题共用备选答案)

- A. 6个月
- B. 1岁
- C. 1~1.5岁
- D. 2岁
- E. 2~2.5岁

小儿骨骼、运动的发育:

- 49. 乳牙开始萌出的时间是
- 50. 前囟闭合的时间是
- 51. 胸围与头围大致相等的时间是
- 52. 乳牙出齐的时间是
- 53. 能独坐一会,用手摇玩具的时间是

(54~58题共用备选答案)

- A. 2个月
- B. 7个月
- C. 10个月
- D. 12个月
- E. 3岁

小儿年龄与认知发育的关系:

- 54. 认识和指出身体各部分的名称
- 55. 发出“爸爸、妈妈”等发音
- 56. 能爬台阶,懂命令,会自己进食
- 57. 能学成人的动作,招手表示“再见”
- 58. 能微笑,发出和谐的喉音

(59~61题共用备选答案)

- A. 佝偻病
- B. 水肿
- C. 小头畸形
- D. 脱水
- E. 脑膜炎

小儿疾病时,前囟变化的临床意义:

- 59. 前囟早闭常见于
- 60. 前囟迟闭常见于
- 61. 前囟凹陷常见于

(62~64题共用备选答案)

乳牙数、身高(cm)、体重(kg)、头围(cm)、胸围(cm):

A. 0	65	6.6	42	40
B. 4	70	7.9	44	43
C. 16	82	11	47.5	49
D. 8	75	9.1	46	46
E. 6	76	10	46	42

- 62. 1岁发育正常的婴儿
- 63. 10个月发育正常的女婴
- 64. 18个月发育正常的女婴

X型题

65. 关于小儿骨骼发育下列叙述正确的是

- A. 头状骨、钩骨(3个月)
- B. 三角骨(2~2.5岁)
- C. 月骨(3~4岁)
- D. 大、小多角骨(4~6岁)
- E. 豆状骨(9~13岁)

66. 下列关于小儿脊柱发育叙述正确的是

- A. 2个月出现颈椎前凸
- B. 3个月出现颈椎前凸
- C. 6个月出现胸椎后凸
- D. 7个月出现胸椎后凸
- E. 1岁出现腰椎前凸

【答案】

- 1. B 2. B 3. C 4. E 5. D
- 6. A 7. B 8. B 9. A 10. C
- 11. C 12. A 13. E 14. B 15. D
- 16. C 17. C 18. B 19. B 20. A

21. B 22. E 23. B 24. C 25. C
 26. C 27. C 28. B 29. D 30. E
 31. C 32. D 33. D 34. A 35. D
 36. J 37. B 38. D 39. C 40. K
 41. E 42. G 43. I 44. E 45. I
 46. A 47. C 48. B 49. A 50. C
 51. B 52. D 53. E 54. D 55. B
 56. D 57. C 58. A 59. C 60. A
 61. D 62. D 63. E 64. C
 65. ABCDE 66. BDE

二、儿童保健

A1 型题

- 新生儿保健重点应放在
 - 生后第1小时
 - 生后第1天
 - 生后第1周
 - 生后2天内
 - 生后半个月内
- 适用小儿擦浴和淋浴的时间,分别为
 - 3~4个月, >2岁
 - 5~6个月, >3岁
 - 7~8个月, >3岁
 - 9~10个月, >4岁
 - 11~12个月, >4岁
- 白喉-百日咳-破伤风混合疫苗,初次免疫时需
 - 注射1次
 - 每月1次,注射2次
 - 每月1次,注射3次
 - 每周1次,注射2次
 - 每周1次,注射3次
- 婴儿期计划免疫,下列哪项正确
 - 2个月开始口服脊髓灰质炎疫苗
 - 2~3个月接种卡介苗
 - 4~5个月注射麻疹疫苗
 - 6~8个月接种牛痘
 - 8~10个月注射乙型脑炎疫苗
- 下列各种计划免疫制剂及其类别,哪组排列是正确的

类毒素	灭活菌(疫)苗	减毒活菌(疫)苗
A. 白喉	破伤风	麻疹
B. 百日咳	麻疹	流行性脑脊髓膜炎
C. 白喉	百日咳	卡介苗
- 破伤风 流行性脑脊髓膜炎 乙型脑炎
 破伤风 麻疹 脊髓灰质炎
- 可开始体育锻炼的年龄为
 - 2周~1个月
 - 2~3个月
 - 3~6个月
 - 7~8个月
 - 3岁以上
- 年龄越小,睡眠时间越多。以下哪项不正确
 - <6个月, 15~20h
 - 1岁, 15~16h
 - 2~3岁, 12~14h
 - 4~6岁, 11~12h
 - >7岁, 8h
- 关于空气浴,下列哪项不正确
 - 可自2~3个月先在室内进行
 - 移至室外进行时,应无强风,气温适宜
 - 实施时间以饭后1~1.5h最好
 - 每天做1次,持续时间勿超过3h
 - 可以与活动性游戏结合进行
- 关于日光浴,下列哪项不正确
 - 宜于22℃以上无大风时进行
 - 时间以早餐后1~1.5h最合适,不可空腹
 - 小儿应于空旷处躺在床上,头戴白帽,眼戴简易遮阳镜,脱去外衣,使皮肤充分暴露于阳光下
 - 一般先晒背部,再晒躯干两侧,最后晒胸、腹部
 - 应有医务人员在一旁观察、监护
- 小儿7岁时需复种的计划免疫制剂,以下哪项是错误的
 - 卡介苗
 - 麻疹疫苗
 - 脊髓灰质炎疫苗
 - 乙型脑炎疫苗
 - 百日咳-白喉-破伤风制剂
- 减毒活疫(菌)苗预防接种有下列优点,但除了
 - 接种剂量小
 - 接种次数少
 - 免疫效果好
 - 接种反应轻
 - 免疫持久
- 下列情况可使用免疫血清注射,但除了
 - 皮肤刺伤,而未经破伤风类毒素免疫者

- B. 密切接触白喉患者,而未经白喉类毒素免疫者
- C. 密切接触百日咳患者,而未接种过百日咳—白喉—破伤风疫苗者
- D. 接触麻疹,而未接种过麻疹减毒活疫苗者
- E. 被犬,尤其是狂犬咬伤者
13. 迄今仍有不少传染病尚无疫苗可用,可采取下列综合性预防措施,但除了
- A. 保持环境卫生
- B. 注意个人卫生
- C. 补充丰富营养
- D. 坚持体育锻炼
- E. 定期注射丙种球蛋白或胎盘球蛋白
14. 幼儿时期保健工作的重点包括下列各项,但除了
- A. 加强饮食卫生
- B. 预防佝偻病
- C. 防止意外事故
- D. 培养良好的生活习惯
- E. 加强传染病及常见病防治
15. 初种麻疹减毒活疫苗的时间为
- A. 生后 2 个月
- B. 生后 4 个月
- C. 生后 6 个月
- D. 生后 8 个月
- E. 生后 1 岁
16. 我国规定 1 岁内必须完成的计划免疫是
- A. 麻疹疫苗
- B. 乙脑疫苗
- C. 流脑疫苗
- D. 流感疫苗
- E. 甲型肝炎疫苗
17. 卡介苗的初种年龄在什么时间
- A. 2 天~2 个月
- B. 10 天~3 个月
- C. 15 天~4 个月
- D. 20 天~5 个月
- E. 1 个月~6 个月
18. 脊髓灰质炎初种的年龄自何时开始
- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 4 个月
- E. 5 个月
19. 关于小儿乙肝疫苗接种时间,正确的是
- A. 新生儿时期
- B. 新生儿期,满月时
- C. 新生儿期,满月时,生后 6 个月
- D. 新生儿期,满月时,生后 12 个月
- E. 生后 24 小时内,满月时,生后 6 个月
20. 百白破的初种年龄自何时开始
- A. 1 个月
- B. 2 个月
- C. 3 个月
- D. 4 个月
- E. 5 个月
21. 婴儿期计划免疫,正确的接种时间是
- A. 脊髓灰质炎疫苗 2 个月以上
- B. 卡介苗 2~3 个月
- C. 麻疹疫苗 4~5 个月
- D. 牛痘 6~8 个月
- E. 乙型脑炎疫苗 9~10 个月
22. 在我国 1 岁内小儿需完成的基础计划免疫中,不包括下列中哪项
- A. 卡介苗
- B. 脊髓灰质炎疫苗
- C. 麻疹疫苗
- D. 百日咳—白喉—破伤风混合疫苗
- E. 乙型脑炎疫苗
- B 型题**
- (23~26 题共用备选答案)
- A. 卡介苗
- B. 麻疹疫苗
- C. 乙型脑炎疫苗
- D. 百日咳—白喉—破伤风混合疫苗
- E. 脊髓灰质炎疫苗
- 下列年龄时应进行的计划免疫制剂为:
23. 2 个月小儿
24. 3~6 个月
25. 8 个月以上小儿
26. 1.5 岁小儿复种
- (27~31 题共用备选答案)
- A. 预防伤寒、副伤寒的制剂
- B. 预防结核病制剂
- C. 预防乙型脑炎制剂
- D. 预防麻疹制剂
- E. 预防白喉、破伤风制剂
- 请指出与下列计划免疫制剂类别相符的制剂名称:
27. 类毒素

28. 灭活疫苗
29. 减毒活疫苗
30. 减毒活菌苗
31. 灭活菌苗

(32~37 题共用备选答案)

- A. 新生儿
B. 2 个月
C. 3 个月
D. 8 个月
E. 4 岁

小儿疫苗接种时间:

32. 脊髓灰质炎三价混合疫苗开始接种的时间是
33. 乙肝疫苗开始接种的时间是
34. 麻疹疫苗开始接种的时间是
35. 百白破混合疫苗开始接种的时间是
36. 脊髓灰质炎三价混合疫苗复种的时间是
37. 卡介苗开始接种的时间是

(38~39 题共用备选答案)

- A. 16~18 小时
B. 15~16 小时
C. 14~15 小时
D. 13~14 小时
E. 12~11 小时

小儿睡眠时间每日是:

38. 12 个月
39. 2 个月

(40~41 题共用备选答案)

- A. 乙肝疫苗
B. 流感疫苗
C. 麻疹疫苗
D. 脊髓灰质炎疫苗
E. 白、百、破疫苗

40. 新生儿期接种的疫苗应是
41. 生后 2 个月时应接种的疫苗是

X 型题

42. 1 岁以上婴儿应完成以下预防接种

- A. 卡介苗
B. 麻疹疫苗
C. 乙型脑炎疫苗
D. 百日咳 - 白喉 - 破伤风混合疫苗
E. 脊髓灰质炎疫苗

【答案】

1. C 2. C 3. C 4. A 5. E
6. B 7. E 8. D 9. E 10. E
11. D 12. E 13. E 14. B 15. D
16. A 17. A 18. B 19. E 20. C
21. A 22. E 23. A 24. D 25. B
26. D 27. E 28. C 29. D 30. B
31. A 32. B 33. A 34. D 35. C
36. E 37. A 38. D 39. A 40. A
41. D 42. ABCDE