

演绎掩盖不住的西医综合考试经典品质

西医
综合系列
与你相约

西医综合**考研**

分科题库串考点

想象不出命题者还能如何超出这**5000**道内科学题目！
不容错过的“做题就是看书”

内科学

全国硕士研究生入学统一考试西医综合研究委员会 编写

态度：疯狂地研究考点
目标：固执地追求高分
信念：偏执地崇拜成功

西医综合考研分科题库串考点——

内 科 学

主 编 编 委	杨君宜	徐晓峰	魏永堂	考 试 西 医 综 合 研 究 委 员 会	
	全国硕士	研究生入	学统一		
	史京华	周德宾	王海艳		齐艾江
	李雪梅	王丽娟	高小娟		王丽敏
	王金路	赵亚东	闫文青		唐成刚
	何艳萍	朱建璋	姚翠萍		陈炳初
	栗虹	唐桂兰	沈敏		杨幸
	王平生	包宁	涂赞		徐海宾
	张亚军	陈永梅	魏天敏		郭立辉
	吕兴林	强雪娥	许倩		高宇宏
张越	王胜利	张雪妹	马明		

军事医学科学出版社
· 北 京 ·

内容简介

《西医综合考研分科题库串考点》包括生理学、生物化学、病理学、内科学(含诊断学)、外科学五个分册,本系列丛书严格根据国家教育部考试中心最新的《全国硕士研究生入学统一考试——西医综合考试大纲》的334个条目,把所有的考点按照大纲的顺序以题的形式串连起来(同时覆盖所有历年的考试真题),考生既可以结合课本同步巩固练习,又可以单独进行非常有针对性的训练,真正做到学习、记忆、应考三者有机地相结合,是一套真正的西医综合考试经典。

本书是系列中的一本,适合参加西医综合考研和本科学生使用,也可以作为执业医师考试、专业技术资格考试(职称)参考使用。

图书在版编目(CIP)数据

内科学/杨君宜,徐晓峰,魏永堂主编. —北京:军事医学科学出版社,2007.5
(西医综合考研分科题库串考点)
ISBN 978-7-80121-926-8

I. 内… II. ①杨…②徐…③魏… III. 内科学-研究生-入学考试-习题
IV. R5-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第046499号

出 版:军事医学科学出版社
地 址:北京市海淀区太平路27号
邮 编:100850
联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418,86702315,86702759
86703183,86702802

传 真:(010)63801284
网 址:<http://www.mmssp.cn>
印 装:京南印刷厂
发 行:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16
印 张:24.5
字 数:691千字
版 次:2007年5月第1版
印 次:2007年5月第1次
定 价:37.00元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

题库串考点,编者寄深情

——演绎掩盖不住的西医综合考试经典品质

考研西医综合考试其实是一门考察大家对整个西医的核心内容的一门考试,因此,它的特点就是覆盖面广、内容繁多,加之,本身医学知识就非常抽象,所以对于广大的考生确实是一项不小的考验。纵观市场上的西医综合考试辅导书籍,我们发现尚无一套以题目的形式串连所有考点的书籍,所以我们决定组织相关专家与教授编写一套真正能为大家解决西医综合考试难题的丛书,经过两年的努力,这套丛书终于与大家见面了。

《西医综合考研分科题库串考点》包括生理学、生物化学、病理学、内科学(含诊断学)、外科学五个分册,本系列丛书严格根据国家教育部考试中心最新的《全国硕士研究生入学统一考试——西医综合考试大纲》的334个条目,把所有的考点按照大纲的顺序以题的形式串连起来(同时覆盖所有历年的考试真题),考生既可以结合课本同步巩固练习,又可以单独进行非常有针对性的训练,真正做到学习、记忆、应考三者有机地相结合,是一套真正的西医综合考试经典。

本套题库丛书有如下特点:(1)针对性:专门针对西医综合考试设计,过滤了无关考试题;(2)全面性:既有常考点,又照顾了难点和考试的“死点”;(3)权威性:所有考题都通过专家、教授精心设计和挑选,或者“陷阱”重重,或者“似是而非”,有着与真题相似的巨大仿真性;(4)选择性:考生可以根据自己的实际情况,选择五个分册中任何一个自己认为考试有弱点的分册,或者选择自己不熟悉的考点进行有针对性的训练,节省时间和精力;(5)规律性:考虑到基础医学和临床医学的不同特点,基础医学(生理学、生物化学和病理学)在每一章题库后增加了考点回顾总结部分,使得考生对理论性强、前后连贯性强的基础医学有整体的把握。

尽管我们本着一切为考生着想,从策划到成书的每一步都尽力做好,但是不妥之处一定存在,请广大考生在使用过程中把有疑问之处及时反馈给我们,以便我们及时的更正、提高。

2007-3-22

编者

目 录

第1章 绪论	(1)
【大纲要求考点1:常见症状学:包括发热、水肿、呼吸困难、胸痛、呕血及黑便、咯血、昏迷】	(1)
【大纲要求考点2:体格检查:包括一般检查、头颈部的检查、胸部检查、腹部检查、四肢脊柱检查、常用神经系统检查】	(5)
【大纲要求考点3:实验室检查:包括血尿便常规检查,常规体液检查,骨髓检查,常用肝肾功能检查,血气分析,肺功能检查】	(39)
【大纲要求考点4:器械检查:包括心电图、超声波检查(常用腹部B超及超声心动图检查)、内窥镜检查(支气管镜及消化内窥镜检查)】	(49)
第2章 消化系统疾病和中毒	(61)
【大纲要求考点1:胃食管反流病的病因、临床表现、诊断和治疗】	(61)
【大纲要求考点2:慢性胃炎的分类、病因、临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗】	(62)
【大纲要求考点3:消化性溃疡的发病机制、临床表现、诊断、鉴别诊断、并发症、治疗和并发症的治疗】	(67)
【大纲要求考点4:肠结核的临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗】	(74)
【大纲要求考点5:肠易激综合症的病因、临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗】	(77)
【大纲要求考点6:肝硬化的病因、发病机制、临床表现、诊断、鉴别诊断、并发症和治疗】	(78)
【大纲要求考点7:原发性肝癌的临床表现、诊断和鉴别诊断】	(83)
【大纲要求考点8:肝性脑病的病因、发病机制、临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗】	(85)
【大纲要求考点9:结核性腹膜炎的临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗】	(88)
【大纲要求考点10:炎症性肠病(溃疡性结肠炎、Crohn病)的临床表现、诊断、鉴别诊断、治疗】	(89)
【大纲要求考点11:胰腺炎的病因、临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗】	(93)
【大纲要求考点12:急性中毒的抢救原则】	(95)
【大纲要求考点13:有机磷中毒的发病机制、临床表现、诊断和治疗】	(98)
第3章 循环系统疾病	(102)
【大纲要求考点1:心力衰竭的病因及诱因、病理生理、类型及心功能分级、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗】	(102)
【大纲要求考点2:急性左心衰竭的病因、发病机制、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗】	(113)
【大纲要求考点3:心律失常的分类。期前收缩、阵发性心动过速、扑动、颤动、房室传导阻滞及预激综合症的发病机制、临床表现、诊断(包括心电图诊断)和治疗(包括电复律、射频消融及人工起搏器的应用原则)】	(115)
【大纲要求考点4:心脏骤停和心脏性猝死的病因、病理生理、临床表现及急救处理】	(126)
【大纲要求考点5:心脏瓣膜病(左房室瓣和主动脉瓣病变)的病因、病理生理、临床表现、诊断、并发症及防治措施】	(127)
【大纲要求考点6:心绞痛的分型、发病机制、临床表现、诊断及鉴别诊断、防治(包括介入性治疗及外科治疗原则)】	(139)
【大纲要求考点7:急性心肌梗死的病因、发病机制、病理、临床表现、诊断及鉴别诊断、并发症及治疗(包括介入性治疗原则)】	(143)

【大纲要求考点 8:原发性高血压的病因、病理、临床表现、临床类型、危险度分层、诊断标准、鉴别诊断及防治措施】	(156)
【大纲要求考点 9:原发性心脏病的分类、病因、病理、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗】	(167)
【大纲要求考点 10:心肌炎的病因、病理、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗】	(173)
【大纲要求考点 11:急性心包炎及缩窄性心包炎的病因、病理、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗】	(174)
【大纲要求考点 12:感染性心内膜炎的病因、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗】	(179)
第 4 章 呼吸系统疾病	(185)
【大纲要求考点 1:慢性支气管炎及阻塞性肺气肿的病因、发病机制、病理生理、临床表现(包括分型、分期)、并发症、诊断及鉴别诊断、治疗和预防】	(185)
【大纲要求考点 2:慢性肺源性心脏病的病因、发病机制、临床表现、诊断及鉴别诊断、防治原则】	(197)
【大纲要求考点 3:支气管哮喘的病因、发病机制、临床类型、临床表现、诊断及鉴别诊断、并发症及治疗】	(203)
【大纲要求考点 4:支气管扩张的病因、发病机制、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗】	(211)
【大纲要求考点 5:呼吸衰竭的发病机制、病理生理(包括酸碱平衡失调及电解质紊乱)、临床表现、实验室检查(包括血气分析)及治疗】	(217)
【大纲要求考点 6:肺炎球菌肺炎、肺炎克雷白杆菌肺炎、军团菌肺炎、革兰阴性杆菌肺炎、肺炎支原体肺炎及病毒性肺炎的临床表现、并发症、诊断及鉴别诊断、治疗】	(227)
【大纲要求考点 7:弥漫性间质性肺疾病的病因、发病机制、临床表现、诊断及治疗】	(239)
【大纲要求考点 8:肺脓肿的病因、发病机制、临床表现、实验室检查、诊断及鉴别诊断、治疗】	(241)
【大纲要求考点 9:肺结核的病因、发病机制、结核菌感染和肺结核的发生与发展(包括临床类型)、临床表现、实验室检查、诊断及鉴别诊断、预防原则和措施、治疗】	(244)
【大纲要求考点 10:胸腔积液的病因、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗】	(253)
【大纲要求考点 11:气胸的病因、发病机制、临床类型、临床表现、诊断及鉴别诊断、并发症、治疗】	(259)
第 5 章 泌尿系统疾病	(265)
【大纲要求考点 1:泌尿系统疾病总论:包括肾脏的解剖与组织结构、肾脏生理功能、常用肾脏疾病检查及临床意义、肾脏疾病的症状、检查、诊断及防治原则】	(265)
【大纲要求考点 2:肾小球肾炎和肾病综合征的病因、发病机制、临床表现、分类方法、诊断、鉴别诊断和治疗】	(271)
【大纲要求考点 3:尿路感染的病因、发病机制、临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗】	(286)
【大纲要求考点 4:急性和慢性肾功能不全的病因、发病机制、临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗】	(291)
第 6 章 血液系统疾病	(304)
【大纲要求考点 1:贫血的分类、临床表现和诊断】	(304)
【大纲要求考点 2:缺铁性贫血的病因和发病机制、临床特征和防治方法】	(306)
【大纲要求考点 3:再生障碍性贫血的病因、临床特征、诊断、鉴别诊断和治疗】	(312)
【大纲要求考点 4:溶血性贫血的临床分类、发病机制、实验室检查、诊断、鉴别诊断和治疗】	(316)
【大纲要求考点 5:骨髓增生异常综合征的分型、临床表现、实验室检查、诊断和治疗】	(321)
【大纲要求考点 6:白血病的临床表现、诊断和治疗】	(322)
【大纲要求考点 7:淋巴瘤的临床表现、诊断、鉴别诊断、临床分期和治疗】	(335)
【大纲要求考点 8:特发性血小板减少性紫癜的临床表现、诊断和治疗】	(339)
第 7 章 内分泌系统和代谢疾病	(345)
【大纲要求考点 1:内分泌系统疾病总论:包括内分泌疾病的分类、主要症状及体征、主要诊断方法】	(345)

【大纲要求考点 2:甲状腺功能亢进症(主要是 Graves 病)的病因、发病机制、临床表现 (包括特殊临床表现)、实验室检查、诊断及鉴别诊断、治疗(包括甲状腺危象的防治)】	(345)
【大纲要求考点 3:糖尿病的临床表现、并发症、诊断及鉴别诊断、综合治疗(包括口服 降糖药物及胰岛素治疗)】	(355)
【大纲要求考点 4:糖尿病酮症酸中毒的发病机制、临床表现、实验室检查、诊断和治疗】	(367)
【大纲要求考点 5:Cushing 病的发病机制、临床表现、诊断、鉴别诊断及治疗】	(367)
【大纲要求考点 6:嗜铬细胞瘤的病理、临床表现、诊断、鉴别诊断和治疗】	(372)
第 8 章 结缔组织病和风湿病	(375)
【大纲要求考点 1:结缔组织病和风湿性疾病总论:包括疾病分类、主要症状及体征、主要实验室 检查及诊断思路】	(375)
【大纲要求考点 2:类风湿关节炎的病因、发病机制、临床表现、实验室检查、诊断、 鉴别诊断及治疗】	(375)
【大纲要求考点 3:系统性红斑狼疮的病因、发病机制、临床表现、实验室检查、诊断、 鉴别诊断及治疗】	(379)

第1章 诊断学

【大纲要求考点1:常见症状学:包括发热、水肿、呼吸困难、胸痛、呕血及黑便、咯血、昏迷】

1. 34岁,男,十二指肠球部溃疡5年,间断使用泰胃美治疗。3个月前停用,近3周来再次出现腹痛、反酸和烧心,并出现干咳,无发热。双肺未见异常,上腹部轻压痛。干咳的原因是

- A. 胸膜炎
- B. 胃食管反流病
- C. 吸入性肺炎
- D. 肺炎

答案:B

2. 45岁,男,自诉易患“感冒”2年余,受凉后出现鼻塞、流涕,有时为脓性涕,无发热。“感冒”时有咳嗽、咳痰,夜间咳嗽较重,影响睡眠,白天症状相对较轻。右上颌窦压痛(+),双肺呼吸音清晰。首先应当

- A. 拍上颌窦X线片
- B. 血气分析
- C. 痰培养
- D. 行纤维支气管镜检查

答案:A

3. 65岁,男,干咳1周余。无发热,服用阿奇霉素治疗无效。发现高血压1月余,最高为160/95 mmHg,开始用硝苯吡啶治疗效果不佳,最近加用卡托普利后血压控制满意。干咳最可能的原因为

- A. ACEI类药物所致
- B. 心功能衰竭
- C. 气管炎
- D. 上呼吸道感染

答案:A

4. 最常伴寒战的为

- A. 风湿热
- B. 结核病
- C. 猩红热
- D. 败血症

答案:D

5. 女,26岁,发热、左胸痛、胸闷2天,伴周身不适、乏力。查体:T 38.2℃,P 120次/min,R 24次/min,双肺呼吸音清晰,心界不大,HR 124次/min,可闻及早搏6次/min,未闻及杂音。ECG示:窦性心动过速,频发室早,ST段广泛压低,T波低平或倒置。下述检查中对诊断有重要意义的为

- A. 心肌酶谱
- B. 血常规
- C. Holter检查
- D. 胸片

答案:A

6. 女,36岁,发热伴咳嗽、咳痰3天,右上胸痛1天。体检:T 38.9℃,右上肺叩浊音,可闻及支气管

样呼吸音。心、腹(-)。白细胞 $12 \times 10^9/L$ 。最可能的为

- A. 肺炎
- B. 肺结核
- C. 阻塞性肺炎
- D. 急性胸膜炎

答案:A

7. 产热过多导致发热的为

- A. 大面积烧伤
- B. 细菌感染
- C. 风湿热
- D. 甲状腺功能亢进症

答案:D

8. 不属于全身性水肿的为

- A. 营养不良性水肿
- B. 肝源性水肿
- C. 乳腺癌根治术后的上肢水肿
- D. 药物性水肿

答案:C

9. 非凹陷性水肿发生在

- A. 黏液性水肿
- B. 肾源性水肿
- C. 特发性水肿
- D. 肝源性水肿

答案:A

10. 水肿不含

- A. 肺水肿
- B. 腹水
- C. 心包积液
- D. 胸腔积液

答案:A

11. 下列有关水肿病人既往史的问诊,意义最小的为

- A. 肝病史
- B. 心脏病史
- C. 肺病史
- D. 肾病史

答案:C

12. 不是肝源性水肿发生机制的为

- A. 门静脉压力增高
- B. 组织液胶体渗透压增高
- C. 血浆胶体渗透压降低
- D. 肝淋巴液生成增多

答案:B

13. 下述哪项不是产生水肿的因素

- A. 毛细血管通透性增加
- B. 钠与水潴留
- C. 毛细血管滤过压升高
- D. 血浆胶体渗透压升高

答案:D

14. 下述是右心衰竭致心源性水肿时的体征,除外

- A. 肝肿大
- B. 双下肢水肿
- C. 颈静脉怒张
- D. 双肺底对称性湿啰音

答案:D

15. 有助于肾源性水肿与心源性水肿的鉴别,除外

- A. 水肿严重程度
- B. 水肿发展快慢
- C. 伴随病征
- D. 水肿性质

答案:A

16. 30岁,男,间断咳嗽咳痰28年,多于冬春季发作,痰量较多。近2年来逐渐出现劳力性呼吸困难。2天前受凉后再次出现咳嗽、咳黄痰,呼吸困难加重,夜间难以平卧。最有可能的诊断是

- A. 支气管扩张
- B. 慢性支气管炎
- C. 哮喘
- D. 肺气肿

答案:A

17. 不表现为劳力性呼吸困难的为

- A. 瘰疬
- B. 肺气肿
- C. 肺间质纤维化
- D. 慢性充血性心力衰竭

答案:A

18. 呼吸困难患者胸片出现 Kerley B 线见于

- A. 急性左心衰
- B. 肺间质纤维化
- C. 慢性充血性心力衰竭
- D. ARDS

答案:C

19. 慢性劳力性呼吸困难患者,肺功能检查示限制性通气功能障碍,最可能的疾病为

- A. 肺气肿
- B. 慢性支气管炎
- C. 严重胸膜肥厚
- D. 原发性肺动脉高压

答案:C

20. 突发呼吸困难患者一侧胸部叩诊呈实音见于

- A. 一侧肺不张
- B. 肺栓塞
- C. 肺炎
- D. 结核性胸膜炎

答案:A

21. 18岁,男,运动时右侧胸痛、憋气3小时。查体:R 25次/min,体型瘦高。右侧胸廓略饱满,右肺叩鼓音,右肺呼吸音明显减弱,左肺呼吸音增强。可能的诊断为

- A. 肺气肿
- B. 肺大疱

C. 支气管哮喘

D. 气胸

答案:D

22. 下列有关心绞痛和心血管神经官能症所致胸痛的鉴别最重要的为

- A. ECG
- B. 病史
- C. 冠脉造影
- D. UOG

答案:B

23. 胸痛后双上肢血压差别悬殊的情况见于

- A. 心肌梗死
- B. 主动脉夹层
- C. 大动脉炎
- D. 心包炎

答案:B

24. 胸痛随深呼吸而加重的情况最常见于

- A. 带状疱疹
- B. 心肌梗死
- C. 胸膜炎
- D. 肺栓塞

答案:C

25. 餐后腹痛见于如下疾病,除外

- A. 十二指肠溃疡
- B. 胆囊疾病
- C. 胃部肿瘤
- D. 胰腺疾病

答案:A

26. 腹痛于躯体前屈时明显,而直立位时减轻的为

- A. 胃黏膜脱垂
- B. 反流性食管炎
- C. 胰体癌
- D. 十二指肠壅滞症

答案:B

27. 四肢对称性紫癜伴有关节痛、腹痛、血尿者的为

- A. 药物免疫性血小板减少性紫癜
- B. 血栓性血小板减少性紫癜
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 过敏性紫癜

答案:D

28. 下列导致慢性腹痛的疾病为

- A. 胆道蛔虫症
- B. 肠梗阻
- C. 异位妊娠破裂
- D. 胃、十二指肠溃疡

答案:D

29. 属于内脏性腹痛特点的为

- A. 腹痛部位不确切,接近腹中线
- B. 可有局部腹肌强直
- C. 常不伴恶心、呕吐、出汗等自主神经兴奋症状
- D. 腹痛可因咳嗽、体位变化而加重

答案:A

30. 出现黑便时,消化道出血量至少应超过

- A. 30 ml
- B. 10 ml
- C. 50 ml
- D. 80 ml

答案:C

31. 下列有关咯血和呕血的鉴别下述错误的为

- A. 咯血不会出现黑便
- B. 呕血常为咖啡色
- C. 咯血的 pH 为碱性
- D. 出血常混有痰液见于咯血

答案:A

32. 38岁,男,间断咳嗽、咳痰20余年,痰多为脓性痰,量多,2天来再次出现上述症状,伴大咯血,每日约600ml。查体,左下肺多量湿性啰音,杵状指(+)。最可能的诊断为

- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管扩张
- C. 左下叶肺炎
- D. 肺癌

答案:B

33. 大咯血的定义为日咯血量大于多少 ml

- A. 200
- B. 100
- C. 300
- D. 500

答案:D

34. 大咯血患者突然出现面色青紫,烦躁、出冷汗,原因可能为

- A. 精神紧张
- B. 窒息
- C. 低血糖
- D. 合并脑血管意外

答案:B

35. 咯血伴肾衰竭最常见于

- A. Goodpasture 综合征
- B. 肺癌
- C. 原发性肺动脉高压
- D. 肺结核

答案:A

36. 咯血的病因中最常见的为

- A. 炎症
- B. 肿瘤
- C. 肺栓塞
- D. 结核

答案:A

37. 咯血患者 ANCA 阳性常见于下述哪种情况

- A. Goodpasture 综合征
- B. 支气管扩张
- C. 原发性小血管炎
- D. Behcet 病

答案:C

38. 咯血患者抗 GBM 抗体阳性见于下述何种疾病

- A. 系统性红斑狼疮
- B. Goodpasture 综合征
- C. Behcet 病
- D. 原发性小血管炎

答案:B

39. 咯血是指从何部位出血而咳出

- A. 咽部以下呼吸道
- B. 呼吸道出血的统称
- C. 喉部以下的呼吸道
- D. 隆突以下的支气管

答案:C

40. 女,38岁,突然咯血2小时,红色鲜血,可见

血块。查体 BP 132/80 mmHg,双肺呼吸音清晰,未闻及啰音。HR 89 次/min,未闻及杂音。胸片未见异常。应当首先

- A. 行纤维支气管镜检查
- B. 痰找结核菌
- C. 检查是否是上呼吸道出血
- D. 肺通气灌注扫描

答案:C

41. 胸片有空洞的咯血不见于下述何种疾病

- A. 肺癌
- B. 肺结核
- C. 肺炎
- D. 特发性肺含铁血黄素沉着症

答案:D

42. 发热伴肝脾大常见于

- A. 急性白血病
- B. 病毒性肝炎
- C. 恶性淋巴瘤
- D. 大叶性肺炎

答案:ABC

43. 发热伴寒战常见于

- A. 败血症
- B. 大叶性肺炎
- C. 急性胆囊炎
- D. 急性肾盂肾炎

答案:ABCD

44. 发热伴结膜充血常见于

- A. 流行性出血热
- B. 麻疹
- C. 钩端螺旋体病
- D. 流行性脑脊髓膜炎

答案:ABC

45. 发热伴淋巴结肿大常见于

- A. 风疹
- B. 传染性单核细胞增多症
- C. 淋巴结结核
- D. 恶性淋巴瘤

答案:ABCD

46. 发热伴皮疹常见于

- A. 麻疹
- B. 猩红热
- C. 布氏杆菌病
- D. 风疹

答案:ABD

47. 呼气性呼吸困难的特点为

- A. 三凹征
- B. 呼气相延长
- C. 哮鸣音
- D. 可以有呼吸音减弱

答案:BCD

48. 呼吸困难伴双肺哮鸣音者见于

- A. 哮喘
- B. 支气管肺癌
- C. 慢性单纯性支气管炎
- D. 急性左心衰

答案:AD

49. 呼吸困难伴有奇脉见于

- A. 大量心包积液
- B. 全心衰
- C. 上腔静脉阻塞综合征
- D. 哮喘

答案:AD

50. 混合性呼吸困难见于

- A. 肺泡炎
- B. 哮喘
- C. 弥漫性肺间质纤维化
- D. 气胸

答案:ACD

51. 慢性咳嗽伴有呼吸困难者见于

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 肺气肿
- C. 慢性喘息型支气管炎
- D. 原发性肺动脉高压

答案:ABD

52. 吸气性呼吸困难的特点有

- A. 三凹征
- B. 吸气相延长
- C. 呼吸频率显著增快
- D. 吸气性喉鸣

答案:ABD

53. 心源性呼吸困难的发生机制有

- A. 肺泡张力增高
- B. 肺淤血
- C. 肺泡弹性减退
- D. 肺循环压力增高

答案:ABCD

54. 心源性呼吸困难可表现为

- A. 劳力性呼吸困难
- B. 呼气相延长
- C. 夜间阵发性呼吸困难
- D. 端坐呼吸

答案:AC

55. 胸痛和呼吸困难常常同时发生的情况常见

于

- A. 结核性胸膜炎
- B. 气胸
- C. 肺栓塞
- D. 心绞痛

答案:ABC

56. 夜间加重的呼吸困难常见于

- A. 充血性心力衰竭
- B. 肺栓塞
- C. 哮喘
- D. 心包积液

答案:AC

57. 干咳伴左侧胸痛,深吸气时加重见于

- A. 心包积液
- B. 肺炎
- C. 急性前壁心肌梗
- D. 结核性胸膜炎

答案:BD

58. 呼吸困难伴右侧胸痛的疾病有

- A. 肺炎
- B. 胸膜炎
- C. 支气管扩张
- D. 右肺中心型肺癌

答案:AB

59. 急性胸痛,深呼吸时加重见于

- A. 肋骨骨折
- B. 急性心肌梗死
- C. 急性心包炎
- D. 结核性胸膜炎伴大量胸腔积液

答案:AC

60. 胸膜性胸痛的特点为

- A. 体位变化时疼痛加重
- B. 深呼吸加重
- C. 是胸腔积液的典型表现
- D. 可见于肺栓塞

答案:ABD

61. 胸痛合并咯血的情况见于

- A. Goodpasture 综合征
- B. 特发性肺含铁血黄素沉着症
- C. 肺梗死
- D. 肺炎

答案:CD

62. 胸痛合并休克常见于

- A. 心肌梗死
- B. 肺栓塞
- C. 心包填塞
- D. 交通性气胸

答案:ABC

63. 胸痛患者 ECG 检查示 ST 段抬高可以出现在

- A. 肺栓塞
- B. 变异性心绞痛
- C. 急性心包炎
- D. 急性心肌梗死

答案:BCD

64. 植物神经功能紊乱性胸痛的特点为

- A. 胸痛部位固定
- B. 活动后胸痛加重
- C. 常呈针刺样疼痛
- D. 常伴有焦虑状态

答案:CD

65. 中心性胸痛的特点为

- A. 定位准确
- B. 可见于肺栓塞
- C. 多由于血管病变导致
- D. 深呼吸可以加重

答案:BC

66. 腹痛病人的问诊要点为

- A. 腹痛的部位

B. 腹痛的性质和严重程度

C. 腹痛的时间

D. 腹痛的伴随症状

答案: ABCD

67. 属于躯体性腹痛特点的为

A. 疼痛部位不确切

B. 可有局部腹肌强直

C. 程度剧烈而持续

D. 腹痛可因咳嗽、体位变化而加重

答案: BCD

68. 大咯血常见于

A. 肺炎

B. 二尖瓣狭窄

C. 支气管扩张

D. 肺栓塞

答案: BC

69. 咯血伴杵状指见于

A. 慢性肺脓肿

B. 肺癌

C. 支气管扩张

D. 肺栓塞

答案: AC

70. 咯血伴呼吸困难见于

A. 中央型肺癌

B. 肺栓塞

C. Goodpasture 综合征

D. Malloryweiss 综合征

答案: ABC

71. 咯血伴胸痛见于

A. 肺栓塞

B. 肺炎

C. 浸润性肺结核

D. 遗传性出血性毛细血管扩张症

答案: AB

72. 属于浅昏迷的表现为

A. 对声、光刺激无反应

B. 有自主运动

C. 意识大部分丧失

D. 瞳孔对光反射可存在

答案: ACD

【大纲要求考点2: 体格检查: 包括一般检查、头颈部的检查、胸部检查、腹部检查、四肢脊柱检查、常用神经系统检查】

1. 白化病是因为

A. 获得性酪氨酸酶合成缺陷

B. 遗传性酪氨酸酶合成缺陷

C. 获得性黑细胞生成素合成缺陷

D. 遗传性黑细胞生成素合成缺陷

答案: B

2. 出现急性病容的为

A. 胃溃疡

B. 肾功能不全

C. 脑梗死

D. 大叶性肺炎

答案: D

3. 冲击触诊法又称

A. 深部滑行触诊法

B. 深压触诊法

C. 双手触诊法

D. 浮沉触诊法

答案: D

4. 触诊包块时应观察

A. 震颤、色泽、摩擦感

B. 湿度、弹性、波动

C. 色素、皮疹、体温

D. 轮廓、硬度、移动度、大小

答案: D

5. 传染性单核细胞增多症可出现

A. 全身淋巴结肿大

B. 腋窝淋巴结肿大

C. 腋窝及滑车淋巴结肿大

D. 滑车淋巴结肿大

答案: A

6. 恶病质见于

A. 肺结核

B. 缺铁性贫血

C. 冠心病

D. 高血压病

答案: A

7. 符合视诊检查的为

A. 营养、体位、语颤

B. 发育、心界、表情

C. 舌苔、黏膜、姿势

D. 步态、皮疹、摩擦感

答案: C

8. 肝掌及蜘蛛痣是由于肝

A. 不能有效合成雄激素所致

B. 不能有效灭活雌激素所致

C. 不能有效合成醛固酮所致

D. 不能有效灭活孕激素所致

答案: B

9. 高胡萝卜素血症所致黄染好发于

A. 鼻、额部、手掌、足底部黄染, 无巩膜及黏膜黄染

B. 手掌、足底部、巩膜及黏膜黄染

C. 巩膜及黏膜黄染, 无鼻、额部黄染

D. 鼻、额部及巩膜、黏膜黄染最著

答案: A

10. 巩膜呈向心性黄染见于

A. 阿的平、呋喃类等药物

B. 阿托品、黄连素等药物

C. 肝胆疾患、溶血性疾患

D. 高胡萝卜素血症

答案:A

11. 过清音为

A. 介于清音与鼓音之间的音响

B. 介于浊音与鼓音之间的音响

C. 介于实音与鼓音之间的音响

D. 介于清音与浊音之间的音响

答案:A

12. 甲状腺癌易转移的淋巴结为

A. 颈深淋巴结上群

B. 耳后、乳突区淋巴结

C. 颈深淋巴结下群

D. 左锁骨上淋巴结

答案:C

13. 检查脂肪充实程度的最简易最适宜的部位

在

A. 前臂背侧或上臂曲侧上 1/4

B. 前臂曲侧或上臂背侧下 1/3

C. 前臂曲侧或上臂背侧上 1/2

D. 上臂曲侧或前臂背侧上 1/3

答案:B

14. 叩诊时叩击力量的轻重应视

A. 不同的体重及身高、范围大小而定

B. 不同的年龄与性别、位置深浅而定

C. 不同的腹壁脂肪厚度、病变性质而定

D. 不同的部位、病变性质、范围、位置深浅而定

答案:D

15. 叩诊时应注意

A. 以腕关节与掌指关节的活动为主, 避免肘关节及肩关节参与运动

B. 以腕关节的活动为主, 避免指关节及肘关节参与运动

C. 以腕关节的活动为主, 避免肘关节及肩关节参与运动

D. 以掌指关节的活动为主, 避免肘关节及腕关节参与运动

答案:A

16. 叩诊胸壁所产生的振动可判断肺组织的病变深

A. 5~6 cm

B. 2~3 cm

C. 4~5 cm

D. 3~4 cm

答案:A

17. 浅部触诊法适用于检查

A. 肺、脾、淋巴结

B. 关节、软组织、阴囊、精索

C. 浅部动静脉、肝、腹壁

D. 肾、心、胆囊

答案:B

18. 浅部触诊法恰当的手法为

A. 利用掌指关节和腕关节的协调动作, 进行轻柔滑动触摸

B. 利用指尖和腕关节的协调动作, 进行轻柔滑动触摸

C. 利用指尖和掌指关节的协调动作, 进行轻柔滑动触摸

D. 利用掌指关节和大小鱼际的协调动作, 进行轻柔滑动触摸

答案:A

19. 符合斑疹的为

A. 平于皮面, 局部色红, 圆形或多形性

B. 高出皮面, 顶部针尖样突起, 色红

C. 高出皮面, 白色或红色的风团样的局限性皮肤水肿, 速发速落

D. 基底部周围皮肤发红, 呈底盘状

答案:A

20. 全身(2组或以上)淋巴结肿大见于

A. 病毒感染

B. 寄生虫感染

C. 化脓性扁桃体炎

D. 心肌炎

答案:A

21. 容易发生局部坏死, 产生波动感, 破溃后可形成瘘管形成瘢痕的淋巴结病变为

A. 急性淋巴结炎

B. 非特异性淋巴结炎

C. 自身免疫性淋巴结炎

D. 淋巴结核

答案:D

22. 深部触诊法主要用于

A. 脾、腹腔淋巴结

B. 浅部动静脉、腹壁

C. 软组织、腹肌紧张度

D. 腹内脏器大小、腹部包块

答案:D

23. 深部滑行触诊法是用

A. 并拢的1、2、3指端逐渐触向腹腔脏器或包块

B. 分开的1、2、3指端逐渐触向腹腔脏器或包块

C. 分开的2、3、4指端逐渐触向腹腔脏器或包块

D. 并拢的2、3、4指端逐渐触向腹腔脏器或包块

答案:D

24. 深压触诊法用于检查

- A. 腹腔深在病变或确定腹腔压痛点
- B. 腹腔深在病变或腹壁软组织
- C. 深部动静脉、腹壁
- D. 肾、心、胆囊

答案:A

25. 生理情况下24小时体温波动幅度一般不超过

- A. 1.0℃
- B. 0.4℃
- C. 0.8℃
- D. 0.6℃

答案:A

26. 生命体征是指

- A. 体重指数、年龄、温度
- B. 年龄、性别、身高、体重
- C. 体温、脉搏、呼吸、血压
- D. 体温、脉搏、指距

答案:C

27. 双手触诊法适用于

- A. 肝脏及小肠的检查
- B. 结肠及小肠的检查
- C. 肝脏、脾脏、肾脏及腹腔肿物的检查
- D. 结肠、直肠、膀胱及腹腔肿物的检查

答案:C

28. 体重指数的计算公式为

- A. 身高(m²)/体重(kg)
- B. 身高(m)/体重(kg)
- C. 身高(m⁴)/体重(kg²)
- D. 体重(kg)/身高(m²)

答案:D

29. 无力体型(瘦长型)

- A. 颈细长,宽肩、下溜,胸厚,腹上角=90°
- B. 颈短粗,窄肩、下溜,胸扁平,腹上角<90°
- C. 颈细长,窄肩、下溜,胸扁平,腹上角<90°
- D. 颈细长,宽肩、端肩,胸厚,腹上角<90°

答案:C

30. 下腹部触诊时应注意

- A. 排空膀胱
- B. 用手掌深压
- C. 张口呼吸
- D. 屏住呼吸

答案:A

31. 下列不同体温测量方法恰当的为

- A. 口温>肛温>腋温
- B. 肛温>口温>腋温
- C. 口温=肛温>腋温
- D. 腋温>口温>肛温

答案:B

32. 下列情况时应使用重叩诊法

- A. 病变深达4cm时
- B. 病变深达7cm时
- C. 确定心肝脏相对浊音界
- D. 病变范围小

答案:A

33. 下列嗅诊恰当的为

- A. 氨味提示酮症酸中毒
- B. 痰液恶臭提示大叶性肺炎
- C. 烂苹果味提示肠梗阻
- D. 蒜味提示有机磷中毒

答案:D

34. 下列有关病理性脱发恰当的为

- A. 螨寄生虫感染以顶部脱发为著
- B. 斑秃多为不规则脱发,再生困难
- C. 甲状腺功能减退症一般不导致脱发
- D. 脂溢性皮炎的脱发以周边为著

答案:A

35. 下列有关风湿结节描述恰当的为

- A. 豌豆大小,硬,无触痛,多位于关节附近,枕、前额、脊突等骨质隆起或肌腱附着处
- B. 皮下小结紫或红色,稍高出皮面,1~2mm直径以上,压痛,位于指趾末端掌面、大小鱼际
- C. 沿动脉排列及分布
- D. 1~2个或数百个不等,位于皮下肌肉表面,活动,无粘连,不痛不痒,可陆续分批出现或可自动消失,头及躯干部为多

答案:A

36. 下列有关蜘蛛痣的描述恰当的为

- A. 由末端小静脉分支性扩张形成
- B. 加压后可消失,解除压力又复现
- C. 直径一般不超过1cm
- D. 多出现于下腔静脉分布区

答案:B

37. 消瘦是指体重减轻至低于正常的

- A. 8%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 15%

答案:C

38. 胸膜病变可能导致哪一组淋巴结肿大

- A. 左锁骨上淋巴结
- B. 右锁骨上淋巴结
- C. 乳突区淋巴结
- D. 颈深淋巴结下群

答案:B

39. 需借助于器械进行的视诊为

- A. 眼睑、表情、体位
- B. 黏膜、皮疹、鼓膜
- C. 胃肠黏膜、鼓膜、支气管黏膜
- D. 色素沉着、皮肤色泽

答案:C

40. 血中胡萝卜素水平增高至哪一水平可致皮肤黄染

- A. $>1\ 500\ \text{mg/L}$
- B. $>1\ 000\ \text{mg/L}$
- C. $>2\ 000\ \text{mg/L}$
- D. $>2\ 500\ \text{mg/L}$

答案:D

41. 应用钟型或膜型听诊器分别适用于听的病变变为

- A. 钟型适用于听高调音,膜型适用于听低调音
- B. 钟型适用于听低调音,膜型适用于听高调音
- C. 膜型适用雷鸣样舒张期杂音
- D. 钟型适用听叹息样舒张期杂音

答案:B

42. 瘀点、紫癜、瘀斑的直径(mm)分别为

- A. $<1, 2\sim4, >5$
- B. $<2, 3\sim5, >5$
- C. $<4, 5\sim7, >8$
- D. $<3, 4\sim6, >6$

答案:B

43. 正力体型为

- A. 腹上角 $<90^\circ$
- B. 腹上角 $<80^\circ$
- C. 腹上角为 90°
- D. 腹上角 $>90^\circ$

答案:C

44. 浊音在以下病理情况下出现

- A. 气胸
- B. 肺气肿
- C. 肺炎
- D. 一侧肺不张

答案:C

45. 紫绀是指血中还原 Hb

- A. $>4\ \text{g/dl}$
- B. $>2\ \text{g/dl}$
- C. $>5\ \text{g/dl}$
- D. $>7\ \text{g/dl}$

答案:C

46. 总胆红素水平超过多少可发生黄疸

- A. $>1\ \text{mg/dl}$
- B. $>2\ \text{mg/dl}$
- C. $>4\ \text{mg/dl}$
- D. $>3\ \text{mg/dl}$

答案:B

47. 最敏感的触诊部位为

- A. 指腹及掌指关节部掌面皮肤
- B. 掌腹及末指关节部掌面皮肤
- C. 指尖及指关节部掌面皮肤
- D. 掌尖及中指关节部掌面皮肤

答案:A

48. 左锁骨上淋巴结肿大(Virchow 淋巴结)提示

- A. 甲状腺癌
- B. 肺癌
- C. 胃癌
- D. 胰腺癌

答案:C

49. 安静状态下出现颈动脉的明显搏动见于

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 肺动脉瓣关闭不全
- D. 二尖瓣狭窄

答案:A

50. 鼻出血一般均为单侧,除了

- A. 鼻外伤
- B. 全身血液病
- C. 血管局部损伤
- D. 鼻咽癌

答案:B

51. 鼻窦炎时一般不会出现

- A. 鼻出血
- B. 鼻塞
- C. 头痛
- D. 流涕

答案:A

52. 病理情况下,瞳孔扩大见于

- A. 青光眼绝对期
- B. 虹膜炎症
- C. 吗啡
- D. 毛果芸香碱

答案:A

53. 病理情况下,瞳孔缩小见于

- A. 颈交感神经刺激
- B. 有机磷类农药中毒
- C. 视神经萎缩
- D. 完全失明

答案:B

54. 长时间舌体增大见于

- A. 口腔炎
- B. 舌炎
- C. 舌体蜂窝组织炎
- D. 黏液性水肿

答案:D

54. 出现落日现象的头颅畸形为

- A. 巨颅
- B. 方颅
- C. 小颅
- D. 尖颅

答案:A

55. 单侧上眼睑下垂见于

- A. 单侧动眼神经麻痹
- B. 单侧三叉神经麻痹
- C. 单侧迷走神经麻痹
- D. 单侧副神经麻痹

答案:A

56. 对于巩膜的描述,不恰当的为

- A. 胡萝卜素导致均匀黄染
- B. 儿童巩膜呈蓝白色
- C. 显性黄疸时呈均匀黄染
- D. 成人呈黄白色

答案:A

57. 对于虹膜的描述,不恰当的为

- A. 内有瞳孔括约肌和扩大肌
- B. 眼球葡萄膜的最前部分

C. 正常虹膜纹理近瞳孔部分呈环形排列

D. 纹理模糊或消失见于虹膜炎

答案:C

58. 对于颈静脉的描述,下列不恰当的为

A. 平卧时正常人可稍见充盈

B. 正常人立位或坐位时颈外静脉常不显露

C. 正常人充盈的水平仅限于锁骨上缘至下颌角距离的下1/3以内

D. 颈静脉怒张是指取 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 的半卧位时静脉充盈超过正常水平

答案:C

59. 对于口腔黏膜的描述,下列不恰当的为

A. 出血点或瘀斑可见于维生素C缺乏

B. 蓝黑色色素沉着斑片多见于肾上腺皮质功能减退症

C. Koplik斑为风疹的早期特征

D. 黏膜疹可见于猩红热

答案:C

60. 对于口咽部的检查方法,下列不恰当的为

A. 头稍后仰

B. 取坐位

C. 张大口并发出“啊”音

D. 压舌板下压舌的前1/3与后2/3的交界处

答案:D

61. 对于腮腺的描述,下列不恰当的为

A. 腮腺开口相当于上颌第三磨牙对面的颊黏膜上

B. 触诊时正常腮腺触不出腺体轮廓

C. 腮腺导管位于颧骨下1.5 cm处

D. 腮腺肿大时可见到以耳垂为中心的隆起

答案:A

62. 对于视力的描述,下列不恰当的为

A. 周边视力是指视网膜功能

B. 中央视力是检查眼底黄斑中心凹的功能

C. 中央视力的检测通用远距离视力表

D. 周边视力的检测通用近距离视力表

答案:D

63. 对于正常人的瞳孔对光反射,下列恰当的为

A. 光线突然刺激一侧眼瞳孔后,双瞳孔立即缩小,移开光源后瞳孔迅速恢复原状态

B. 光线突然刺激一侧眼瞳孔后,双瞳孔立即缩小,移开光源后瞳孔缓慢恢复原状态

C. 光线突然刺激一侧眼瞳孔后,另一眼瞳孔缓慢缩小,移开光源后瞳孔缓慢恢复原状态

D. 光线突然刺激一侧眼瞳孔后,另一眼瞳孔缓慢缩小,移开光源后瞳孔迅速恢复原状态

答案:A

64. 耳廓上触及痛性结节时多考虑为

A. 痛风结节

B. 风湿结节

C. 耳廓软骨炎

D. 类风湿结节

答案:A

65. 干燥舌见于如下疾病,除了

A. 恶性贫血

B. 应用阿托品后

C. 高度脱水

D. 放射治疗后

答案:A

66. 甲状腺I度肿大是指

A. 能看见肿大

B. 肿大未超过胸锁乳突肌前缘

C. 肿大未超过胸锁乳突肌后缘

D. 肿大达胸锁乳突肌前缘与后缘之间

答案:B

67. 甲状腺功能亢进症有如下眼征,除了

A. Musset征

B. Graefe征

C. Joffroy征

D. Mobius征

答案:A

68. 甲状腺肿大与颈前其他包块鉴别的最重要方法为

A. 是否随吞咽向上移动

B. 肿块质地

C. 表面是否光滑

D. 是否压痛

答案:A

69. 检查甲状腺的最重要方法为

A. 视诊

B. 触诊

C. 听诊

D. 叩诊

答案:B

70. 检查眼球各向运动时的顺序为

A. 左—左上一左下,右—右上一右下

B. 左—左下一左上,右—右下一右上

C. 左下一左一左上,右下一右一右上

D. 左上—左一左下,右上—右一右下

答案:A

71. 角膜的检查包括如下内容,除了

A. 角膜反射

B. 透明度

C. 溃疡

D. 云翳

答案:A

72. 口唇检查时颜色发绀见于

A. 急性发热性疾病

B. 呼吸衰竭

C. 主动脉瓣关闭不全

D. 虚脱

答案:B

73. 气管拉向患侧见于

- A. 肺不张 B. 胸腔积液
C. 单侧甲状腺肿大 D. 气胸

答案:A

74. 气管推向健侧见于

- A. 肺不张 B. 大叶性肺炎
C. 肺硬化 D. 气胸

答案:D

75. 乳突炎时,检查发现的最严重的体征为

- A. 脑膜炎体征 B. 耳廓后方皮肤肿胀
C. 乳突处见瘘管 D. 乳突明显压痛

答案:A

76. 色觉障碍者适于从事的工作为

- A. 服兵役(包括警察) B. 交通运输
C. 教师 D. 美术

答案:C

77. 舌震颤见于

- A. 黏液性水肿 B. 克汀病
C. 甲状腺功能亢进症 D. 舌下神经麻痹

答案:C

78. 双侧上眼睑下垂见于

- A. 脑炎 B. 蛛网膜下腔出血
C. 脑脓肿 D. 重症肌无力

答案:D

79. 瞳孔大小不等提示病情垂危而且最常见的病因为

- A. 脑肿瘤 B. 脑外伤
C. 中枢神经梅毒 D. 脑疝

答案:D

80. 蛙状鼻见于

- A. 肥大的鼻息肉 B. 鼻骨骨折
C. 麻风病 D. 鼻骨发育不良

答案:A

81. 外1/3的眉毛过于稀疏或脱落见于

- A. 肾上腺皮质功能减退症
B. 甲状腺功能减退症
C. 男性性腺功能减退症
D. 甲状旁腺功能减退症

答案:B

82. 外耳道有脓性分泌物伴臭味见于

- A. 脑炎 B. 急性中耳炎
C. 外耳道炎 D. 脑外伤

答案:B

83. 外耳道有血液或脑脊液流出见于

- A. 外耳道炎 B. 鼓膜穿孔

C. 颅底骨折

D. 耳廓感染

答案:C

84. 下列不用鼻镜时,可以检查的部位为

- A. 鼻底 B. 中鼻道
C. 鼻中隔上部 D. 嗅裂

答案:A

85. 下述都属于鼻窦,除了

- A. 额窦 B. 上颌窦
C. 筛窦 D. 矢状窦

答案:D

86. 下述关于头围的描述,不恰当的为

- A. 新生儿约34 cm
B. 第一年增加10 cm
C. 4~10岁共增加约1.5 cm
D. 第二年增加2 cm

答案:B

87. 下述甲状腺的体征中,不符合甲状腺功能亢进症的为

- A. 听到舒张期动脉杂音
B. 触诊质地柔软
C. 听到低调的连续性静脉“嗡嗡”声
D. 可有震颤

答案:A

88. 下述检查项目中,属于内眼部分的为

- A. 玻璃体 B. 晶状体
C. 视野 D. 泪器

答案:A

89. 下述哪项不是角膜的特点

- A. 没有感觉神经 B. 表面光滑
C. 没有血管 D. 湿润

答案:A

90. 下述哪项不属于头皮检查的内容

- A. 头癣 B. 颜色
C. 脱发 D. 外伤

答案:C

91. 需要用间接或直接喉镜才能完成检查的为

- A. 鼻咽 B. 喉咽
C. 软腭 D. 扁桃体

答案:B

92. 牙龈的游离缘出现蓝灰色或灰黑色点线是什么中毒的特征

- A. 铅 B. 铝
C. 铋 D. 铁

答案:A

93. 眼球震颤见于