

经全国中小学教材审定委员会 2006 年初审通过
普通高中课程标准实验教科书

数学



(选修 1-1)

SHUXUE



北京师范大学出版社

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
50 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-709-3000
WWW.UCP.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



经全国中小学教材审定委员会2006年初审通过
普通高中课程标准实验教科书

数 学



(选修1-1)

SHUXUE

主 编 严士健 王尚志
副 主 编 张怡慈 李延林 张思明
本册主编 李延林 汪香志
编写人员 (按 姓 氏 笔 画 排 序)
任志瑜 安振平 李延林
汪香志 顿继安 薛文叙

北京师范大学出版社

· 北 京 ·

北京师范大学出版社出版发行
(北京新街口外大街19号 邮政编码:100875)
<http://www.bnup.com.cn>

出版人:赖德胜

唐山市润丰印务有限公司印刷 全国新华书店经销
开本:210 mm × 297 mm 印张:7.25 字数:180千字
2006年6月第1版 2006年9月第1次印刷
定价:5.80元

前 言

你们将进入更加丰富多彩的数学世界。

你们将学到更多重要和有趣的数学知识、技能及应用。

你们将更多地感受到深刻的数学思想和方法。

你们将进一步体会数学对发展自己思维能力的作用，体会数学对推动社会进步和科学发展的意义，体会数学的文化价值。

你们正在长大，需要考虑自己未来的发展。要学习的东西很多，高中数学的内容都是基础的，时间有限，选择能力是很重要的，你们需要抓紧时间选择发展的方向，选择自己感兴趣的专题，这是一种锻炼。

在高中阶段，学习内容是很有限制的。中国古代有这样的说法：“授之以鱼，不如授之以渔”，学会打鱼的方法比得到鱼更重要。希望同学们不仅关注别人给予你们的知识，更应该关注如何获得知识。数学是提高“自学能力”最好的载体之一。

在数学中，什么是重要的 (What is the key in Mathematics)？20世纪六七十年代，在很多国家都讨论了这个问题。大部分人的意见是：问题是关键 (The problem is the key in Mathematics)。问题是思考的结果，是深入思考的开始，“有问题”也是创造的开始。在高中数学的学习中，同学们不仅应提高解决别人给出问题的能力，提高思考问题的能力，还应保持永不满足的好奇心，大胆地发现问题、提出问题，养成“问题意识”和交流的习惯，这对你们将来的发展是非常重要的。

在学习数学中，有时会遇到一些困难，树立信心是最重要的。不要着急，要有耐心，把基本的东西想清楚，逐步培养自己对数学的兴趣，你会慢慢地喜欢数学，她会给你带来乐趣。

本套教材由26册书组成：必修教材有5册；选修系列1有2册，选修系列2有3册，它们体现了发展的基本方向；选修系列3有6册，选修系列4有10册，同学们可以根据自己的兴趣选修其中部分专题。习题分为三类：一类是可供课堂教学使用的“练习”；一类是课后的“习题”，分为A、B两组；还有一类是复习题，分为A、B、C三组。

研究性学习是我们特别提倡的。在教材中强调了问题提出，抽象概括，分析理

解,思考交流等研究性学习过程.另外,还专门安排了“课题学习”和“探究活动”.

“课题学习”引导同学们递进地思考问题,充分动手实践,是需要完成的部分.

在高中阶段,根据课程标准的要求,学生需要至少完成一次数学探究活动,在必修课程的每一册书中,我们为同学们提供的“探究活动”案例,同学们在教师的引导下选做一个,有兴趣也可以多做几个,我们更希望同学们自己提出问题、解决问题,这是一件很有趣的工作.

同学们一定会感受到,信息技术发展得非常快,日新月异,计算机、数学软件、计算器、图形计算器、网络都是很好的工具和学习资源,在条件允许的情况下,希望同学们多用,“技不压身”.它们能帮助我们更好地理解一些数学的内容和思想.教材中有“信息技术建议”,为同学们使用信息技术帮助学习提出了一些具体的建议;还有“信息技术应用”栏目,我们选取了一些能较好体现信息技术应用的例子,帮助同学们加深对数学的理解.在使用信息技术条件暂时不够成熟的地方,我们建议同学们认真阅读这些材料,对相应的内容能有所了解.教材中信息技术的内容不是必学的,仅供参考.

另外,我们还为同学们编写了一些阅读材料,供同学们在课外学习,希望同学们不仅有坚实的知识基础,而且有开阔的视野,能从数学历史的发展足迹中获取营养和动力,全面地感受数学的科学价值、应用价值和文化价值.

我们祝愿同学们在高中数学的学习中获得成功.

严士健 王尚志

目 录

第一章 常用逻辑用语	(1)
§ 1 命题	(3)
习题 1—1	(5)
§ 2 充分条件与必要条件	(6)
2.1 充分条件	(6)
2.2 必要条件	(7)
2.3 充要条件	(9)
习题 1—2	(11)
§ 3 全称量词与存在量词	(12)
3.1 全称量词与全称命题	(12)
3.2 存在量词与特称命题	(12)
3.3 全称命题与特称命题的否定	(13)
习题 1—3	(15)
§ 4 逻辑联结词“且”“或”“非”	(16)
4.1 逻辑联结词“且”	(16)
4.2 逻辑联结词“或”	(17)
4.3 逻辑联结词“非”	(18)
习题 1—4	(19)
本章小结建议	(20)
复习题一	(22)
第二章 圆锥曲线与方程	(25)
§ 1 椭圆	(27)
1.1 椭圆及其标准方程	(27)
1.2 椭圆的简单性质	(31)
习题 2—1	(33)
§ 2 抛物线	(35)

2.1 抛物线及其标准方程	(35)
2.2 抛物线的简单性质	(37)
习题 2—2	(39)
§ 3 双曲线	(41)
3.1 双曲线及其标准方程	(41)
3.2 双曲线的简单性质	(43)
习题 2—3	(46)
阅读材料 1 圆锥曲线的光学性质	(48)
阅读材料 2 曲线与方程	(49)
本章小结建议	(50)
复习题二	(52)
第三章 变化率与导数	(53)
§ 1 变化的快慢与变化率	(55)
习题 3—1	(60)
§ 2 导数的概念及其几何意义	(62)
2.1 导数的概念	(62)
2.2 导数的几何意义	(64)
习题 3—2	(67)
§ 3 计算导数	(68)
习题 3—3	(72)
§ 4 导数的四则运算法则	(73)
4.1 导数的加法与减法法则	(73)
4.2 导数的乘法与除法法则	(75)
习题 3—4	(79)
本章小结建议	(80)
复习题三	(81)
第四章 导数应用	(83)
§ 1 函数的单调性与极值	(85)
1.1 导数与函数的单调性	(85)
1.2 函数的极值	(87)
习题 4—1	(91)
§ 2 导数在实际问题中的应用	(92)
2.1 实际问题中导数的意义	(92)

2.2 最大、最小值问题.....	(95)
习题 4—2	(98)
阅读材料 数学史上的丰碑——微积分.....	(100)
本章小结建议.....	(103)
复习题四.....	(104)
附录 1 部分数学专业词汇中英文对照表	(106)
附录 2 信息检索网址导引	(107)

第一章

常用逻辑用语


在初中的数学学习中,我们常常要思考下面的问题:

如何判断一个四边形是平行四边形?

我们知道,“若一个四边形两组对边分别平行,则这个四边形是平行四边形.”在这里,条件“两组对边平行”是判定“四边形是平行四边形”的条件,通常,称这类命题为判定定理.在数学中,寻求一个“数学对象”成立的条件是一件非常基本的工作.

如何用简洁的语言清晰地表达这些思想呢?

在本章,我们将学习常用逻辑用语. 正确地使用逻辑用语,不仅能反映数学内容的逻辑关系,而且能准确地帮助我们理解和表达数学内容. 在学习常用逻辑用语的过程中,我们应当不断体会逻辑用语在表述和论证中的作用,提高表达自己思想的能力,更好地进行交流.



- § 1 命题
- § 2 充分条件与必要条件
 - 2.1 充分条件
 - 2.2 必要条件
 - 2.3 充要条件
- § 3 全称量词与存在量词
 - 3.1 全称量词与全称命题
 - 3.2 存在量词与特称命题
 - 3.3 全称命题与特称命题的否定
- § 4 逻辑联结词“且”“或”“非”
 - 4.1 逻辑联结词“且”
 - 4.2 逻辑联结词“或”
 - 4.3 逻辑联结词“非”

§1 命题

我们在初中已经学习过命题. 可以判断真假、用文字或符号表述的语句叫作命题. 看下面的语句:

三角形三个内角的和等于 180° . ①

正弦函数 $y = \sin x$ 的定义域是实数集 \mathbf{R} . ②

$\sqrt{2} \in \mathbf{N}$. ③

这些语句都可以判断真假, 它们都是命题. 其中①②是正确的, 是真的, 叫作真命题, ③是错误的, 是假的, 叫作假命题.

有些语句不是命题, 例如下面的语句:

π 是无理数吗? (未涉及真假)

$x > 1$. (不能判断真假)

一般地, 一个命题由条件和结论两部分组成, 例如命题①的条件是“三个角是一个三角形的内角”, 结论是“它们的和等于 180° ”.

数学中, 通常把命题表示为“若 p 则 q ”的形式, 其中 p 是条件, q 是结论. 如果命题“若 p 则 q ”是真命题, 那么就意味着若条件 p 成立, 则可以推出结论 q 成立, 通常记作: $p \Rightarrow q$. 如果命题“若 p 则 q ”是假命题, 意味着若条件 p 成立, 不能推出结论 q 成立.

 问题提出

在初中, 我们还学习过命题与逆命题的知识, 下面给出两个命题, 请分别写出它们的逆命题, 并仔细分析条件与结论, 讨论它们之间有什么联系.

若 $\angle A = \angle B$, 则 $\sin A = \sin B$. ④

若 $\angle A \neq \angle B$, 则 $\sin A \neq \sin B$. ⑤

 分析理解

命题④的逆命题是

若 $\sin A = \sin B$, 则 $\angle A = \angle B$. ⑥

命题⑤的逆命题是

$$\text{若 } \sin A \neq \sin B, \text{ 则 } \angle A \neq \angle B. \quad \textcircled{7}$$

分析这四个命题的条件与结论, 容易发现它们之间有着内在联系, 在命题④与命题⑤中, 命题⑤的条件是命题④的条件的否定, 命题⑤的结论是命题④的结论的否定, 我们把这样的两个命题叫作**互为否命题**. 若把命题④叫作原命题, 则命题⑤就叫作原命题的否命题.

在命题④与命题⑦中, 命题⑦的条件是命题④的结论的否定, 命题⑦的结论是命题④的条件的否定, 我们把这样的两个命题叫作**互为逆否命题**, 若把命题④叫作原命题, 则命题⑦叫作原命题的逆否命题.

概括地说, 设命题④为原命题, 那么

命题⑥为其逆命题,

命题⑤为其否命题,

命题⑦为其逆否命题.

这个例子中, 原命题与逆否命题都是真命题, 而逆命题与否命题都是假命题.

例 1 写出命题“对顶角相等”的逆命题、否命题和逆否命题, 并判断这四个命题的真假.

分析 关键是找出原命题的条件和结论.

解 原命题可以写成“若两个角是对顶角, 则这两个角相等”. 如图 1-1 所示.




图 1-1

逆命题: 若两个角相等, 则这两个角是对顶角.

否命题: 若两个角不是对顶角, 则这两个角不相等.

逆否命题: 若两个角不相等, 则这两个角不是对顶角.

原命题和逆否命题都是真命题, 逆命题和否命题都是假命题.

例 2 设原命题是“若 $a=0$, 则 $ab=0$ ”.

(1) 写出它的逆命题、否命题及逆否命题;

(2) 判断这四个命题是真命题还是假命题.

解 (1) 原命题的逆命题为: “若 $ab=0$, 则 $a=0$ ”;

原命题的否命题为: “若 $a \neq 0$, 则 $ab \neq 0$ ”;

原命题的逆否命题为: “若 $ab \neq 0$, 则 $a \neq 0$ ”.

(2) 原命题和逆否命题都是真命题, 逆命题和否命题都是假

命题.

四种命题之间的关系,如图 1-2 所示.




图 1-2

练习

- 写出下列命题的逆命题、否命题与逆否命题并分别判断这些命题的真假.
 - 若 $xy=0$, 则 $x=0$ ($x, y \in \mathbf{R}$);
 - 若 $a=b$, 则 $a^2=ab$;
 - 若 $q>0$, 则方程 $x^2+x-q=0$ 有实数解;
 - 负数的平方是正数;
 - 正方形的四条边相等.
- 设原命题是“若 $a<b$, 则 $a+c<b+c$ ”, 写出它的逆命题、否命题及逆否命题, 并分别判断四个命题的真假.

习题 1-1

- 写出下列命题的逆命题、否命题及逆否命题, 并分别判断它们的真假:
 - 若 $a-2$ 是无理数, 则 a 是无理数;
 - 矩形的两条对角线相等.
- 判断下列命题的真假:
 - 命题“若 $x^2+y^2=0$, 则 x, y 全为 0”的逆命题;
 - 命题“全等三角形是相似三角形”的否命题.
- 写出命题“若 $a>b$, 则 $a \neq b$ ”的逆命题, 并判断其真假.
- 写出命题“若四边形是正方形, 则四边形是平行四边形”的否命题和逆否命题, 并分别判断其真假.

§2 充分条件与必要条件

本节我们讨论的命题都是真命题.

2.1 充分条件

问题提出

分析下列各组给出的 p 与 q 之间的关系:

- (1) p : 两条直线同垂直于一个平面, q : 这两条直线平行.
- (2) p : 在二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 中, $b^2-4ac>0$, q : 二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与 x 轴有两个交点.

分析理解

(1) “若两条直线同垂直于一个平面, 则这两条直线平行”是一个真命题, 记作“两条直线同垂直于一个平面” \Rightarrow “这两条直线平行”.

即 $p \Rightarrow q$, 读作“ p 推出 q ”.

(2) “在二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 中, 若 $b^2-4ac>0$, 则二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与 x 轴有两个交点”是一个真命题, 它可以写成“在二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 中, $b^2-4ac>0$ ” \Rightarrow “二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与 x 轴有两个交点”.

即 $p \Rightarrow q$.

“若 p 则 q ”为真命题, 它是指当 p 成立时, q 一定成立. 换句话说, p 成立可以推出 q 成立, 即 $p \Rightarrow q$, 此时我们称 p 是 q 的充分条件.

$p \Rightarrow q$ 可以理解为一旦 p 成立, q 一定成立, 即 p 对于 q 成立是充分的. 也就是说, 为使 q 成立, 具备条件 p 就足够了.

我们知道: “两条直线同垂直于一个平面”是判定“两条直线平行”的充分条件. 同样地, “在二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 中, $b^2-4ac>0$ ”是判定“二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与 x 轴有两个交点”的充

分条件.

在数学中,我们常常要讨论如下问题:

例如,一个几何图形满足什么条件,可以判定它是平行四边形;

又如一个方程满足什么条件,方程有实数解,我们学过如下定理:

若四边形的对角线相互平分,则它是平行四边形;

若一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 满足: $b^2-4ac \geq 0$, 则该方程有实根.

我们把这样的定理称作判定定理,判定定理是数学中一类重要的定理.在判定定理中,条件是结论的充分条件.



思考交流

下列各组中, p 是 q 的充分条件吗?

(1) p : α 是第一象限角, q : $\sin \alpha > 0$;

(2) p : $y=f(x)$ 是正弦函数, q : $y=f(x)$ 是周期函数;

(3) p : 直线 l_1 和 l_2 是异面直线, q : 直线 l_1 和 l_2 不相交.

请再举一些“若 p 则 q ”的命题,使 p 是 q 的充分条件.

2.2 必要条件

“若 p 则 q ”为真命题是指:当 p 成立时, q 一定成立.即 $p \Rightarrow q$. 我们称 q 是 p 的必要条件.

不难看出,“两条直线平行”是“两条直线同垂直于一个平面”的必要条件.同样地,“二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图像与 x 轴有两个交点”是“在二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 中, $b^2-4ac > 0$ ”的必要条件.

例 1 在下列各组中, q 是否是 p 的必要条件?

(1) p : 函数 $y=x^2$, q : 函数是偶函数;

(2) p : 四边形是正方形, q : 四边形的对角线相互垂直平分.

解 (1) 由于“若函数为 $y=x^2$, 则这个函数是偶函数”是一个真命题,它可以写成“函数 $y=x^2 \Rightarrow$ “函数是偶函数”.

即 $p \Rightarrow q$. “函数是偶函数”是“函数为 $y=x^2$ ”的必要条件.

(2) 由于“若四边形是正方形, 则它的对角线相互垂直平分”是一个真命题,它可以写成

“四边形是正方形” \Rightarrow “四边形的对角线相互垂直平分”.

即 $p \Rightarrow q$. “四边形的对角线相互垂直平分”是“四边形是正方形”的必要条件.

我们知道“函数是偶函数”是“函数为 $y=x^2$ ”的一个性质. 同样地, “四边形的对角线相互垂直平分”是“四边形是正方形”的一个性质. 在数学中, 我们还常常讨论一类事物有什么性质: 例如, 函数 $y=x^2$ 有什么性质; 正方形有什么性质. 我们把这样的定理称作性质定理, 性质定理也是数学中一类重要的定理. 在性质定理中, “定理的结论”是“定理的条件”的必要条件. “函数是偶函数”是“函数为 $y=x^2$ ”的必要条件; “四边形的对角线相互垂直平分”是“四边形是正方形”的必要条件.



抽象概括

“若 p 则 q ”为真命题, 即 $p \Rightarrow q$, 那么 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件.

例 2 在以下各组中, 哪些使 $p \Rightarrow q$ 成立, 哪些使 $q \Rightarrow p$ 成立, 并分析各组中的 p 与 q 的关系.

(1) p : 四边形是正方形, q : 四边形的四个角都是直角;

(2) p : 直线 l 和平面 α 内的一条直线垂直, q : 直线 l 和平面 α 垂直;

(3) p : a, b, c 成等比数列, $q: b^2 = ac$.

解 (1) 由于 $p \Rightarrow q$, 则 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件;

(2) 由于 $q \Rightarrow p$, 则 q 是 p 的充分条件, p 是 q 的必要条件;

(3) 由于 $p \Rightarrow q$, 则 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件.

例 3 分析下列各组中的 p 与 q 的关系.

(1) $p: x > 5, q: x > 3$;

(2) p : 四边形的对角线相等, q : 四边形是等腰梯形;

(3) p : 向量 $\alpha = \mathbf{0}$ 或向量 $\beta = \mathbf{0}$, $q: \alpha \cdot \beta = 0$.

解 (1) 由于 $p \Rightarrow q$, 则 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件;

(2) 由于 $q \Rightarrow p$, 则 q 是 p 的充分条件, p 是 q 的必要条件;

(3) 由于 $p \Rightarrow q$, 则 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件.