



2007

卫生专业技术资格考试辅导丛书

总主编 金宇

# 主管护师资格应试 全真模拟试卷

主 编 王爱平 王艳军

ZHUGUAN HUSHI ZIGE YINGSHI  
QUANZHEN MONI SHIJUAN



军事医学科学出版社

卫生专业技术资格考试辅导丛书—— 丛书总主编：金 宇

# 主管护师资格应试全真模拟试卷

主 编：王爱平 王艳军  
副 主 编：谢秀军 闫俊平 王茹欣 高志坤  
编 者：陈 靖 杨彦利 胥 磊 周金娜  
樊淑花 冯翠娜 赵淑君 王丽梅  
卢源元 石爱芬 郝迎春

军事医学科学出版社  
· 北 京 ·

## 内容提要

本书在分析近年主管护师资格考试试卷的难度和知识覆盖广度的基础上,设计了五套全真模拟试卷,并且把历年的考题尽量穿插其中,力争基本覆盖主管护师资格考试的绝大部分知识点。通过该模拟试卷练习,帮助考生顺利应考。

---

### 图书在版编目(CIP)数据

主管护师资格应试全真模拟试卷/王爱平,王艳军主编.

-北京:军事医学科学出版社,2006.12

(卫生专业技术资格考试辅导丛书)

ISBN 978-7-80121-901-5/R·894

I.主… II.①王… ②王… III.护士-资格考核-习题

IV.R192.6-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第151211号

---

出版:军事医学科学出版社

地址:北京市海淀区太平路27号

邮编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418,66884402 转 6213,6216,6315

传真:(010)63801284

网址:<http://www.mmsp.cn>

印装:三河佳星印装有限公司

发行:新华书店

---

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:19

字数:462千字

版次:2007年2月第1版

印次:2007年2月第1次

定价:32.00元

---

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

# 前 言

本书在参考了近年主管护师资格考试历年考题的基础上编写,突出了以下几方面:

1. 展现了相当一部分近年的考题?特别是2004年以后的考试试题,反映了主管资格考试的考核要求变化。

2. 为突出知识能力的运用,近年考试增加了很多病例题,反映了主管护师资格考试的命题方向,即重点突出了对其的应用能力的考核。体现到考卷上就是病例题越来越多,这就是考生反映考题一年比一年难的根本原因。

3. 抓住难点,重点突破。考试的难点是相关专业知识单元。由于考核的主要内容是临床知识,希望引起大家的关注。近两年来考生一致反映在第二单元吃了大亏。

4. 报考主管护师的考生都是各单位的骨干,工作紧张,通过大量的练习题的方式掌握知识是往年考生的经验。因此模拟试卷对考前练兵有非常之效果。五套模拟试卷基本覆盖了大纲绝大部分考核知识点。需要提醒大家的是,不要把题做过去了,对完答案就不管了,一定要回过头反复思考:错在何处?错题切记要多温习几遍,避免到考场以后还错。

5. 逐步适应新的考试方式。从2007年开始,卫生资格考试部分专业将推广采用计算机-人机对话的方式考核,意味着每人的考卷不一,可能出题的知识点越来越广,押题猜题等押宝式的复习方法更不适用了。基于此,我们在网上安排了一些人机对话的考核试题,欢迎大家登陆金宇医学培训学校网站。网址:YIXUE.BDEDU.CN(网络实名:医学考试)。

6. 本书内科部分由王爱平、胥磊、周金娜、石爱芬、王艳军、陈靖编写,  
外科部分由谢秀军、赵淑君、郝迎春、高志坤编写,  
妇产科部分由王爱平、樊淑花、冯翠娜编写,  
儿科部分由闫俊平、卢源元编写,  
医院感染、社区护理、健康教育部分由王茹欣、王丽梅、杨彦利编写。  
不妥之处,欢迎批评指正。

金 宇

2006年10月于北京

## 目 录

模拟试卷一 .....	(1)
模拟试卷二 .....	(60)
模拟试卷三 .....	(119)
模拟试卷四 .....	(178)
模拟试卷五 .....	(237)

# 模拟试卷一

## 基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 对消化性溃疡病人做健康教育,下列哪项是错误的

- A. 生活要有规律,注意休息
- B. 避免刺激性食物及饮料
- C. 抑酸药宜在空腹时服用
- D. 胃黏膜保护剂宜在饭后服
- E. 季节变换注意保暖

答案:D

2. 紫绀的原因是

- A. 血液还原血红蛋白增多
- B. 红细胞大量破坏
- C. 局部瘀血
- D. 毛细血管通透性增加
- E. 血红蛋白增多

答案:A

3. 尿毒症患者皮肤瘙痒,不妥的护理措施是

- A. 保持皮肤清洁
- B. 勤用温水洗皮肤
- C. 常用肥皂、酒精擦身
- D. 勤换衣裤、床单
- E. 被褥应平整、柔软

答案:C

4. 长期卧床的心力衰竭病人,形成下肢静脉血栓时,当下床活动,易栓塞哪个脏器

- A. 心脏
- B. 脑组织
- C. 肺组织
- D. 肾脏
- E. 脾脏

答案:C

5. 发生左心衰竭的病人最常见的症状是

- A. 便秘
- B. 体重下降

C. 呼吸困难

D. 肌肉酸痛

E. 腹胀

答案:C

6. 心肌的营养供应主要来自下列哪项血液供应

- A. 颈动脉
- B. 乳内动脉
- C. 头臂干动脉
- D. 冠状动脉
- E. 肱动脉

答案:D

7. 肺脓肿患者进行体位引流时护士最需要监护的问题是下列哪项

- A. 发生窒息
- B. 体温
- C. 血压
- D. 心率
- E. 肺部湿啰音

答案:A

8. 慢性肺原性心脏病急性加重期的常见诱因

- A. 过劳
- B. 大量利尿
- C. 使用镇静剂
- D. 呼吸道感染
- E. 使用支气管扩张剂

答案:D

9. 如发现大咯血患者有窒息先兆,应立即采取的抢救措施是

- A. 用导管吸除血块,保持呼吸道通畅
- B. 作气管插管
- C. 进行气管切开
- D. 加压吸氧
- E. 应用呼吸兴奋剂

答案:A

10. 肝性脑病的护理措施中,最重要的环节是

- A. 加强基础护理
- B. 注意休息保暖
- C. 消除诱发因素

- D. 严密观察病情
- E. 做好知识宣教

答案:C

11. 急性坏死型胰腺炎所发生的休克属于

- A. 中毒性休克
- B. 低血容量性休克
- C. 过敏性休克
- D. 心源性休克
- E. 神经源性休克

答案:B

12. 慢性胃炎的发病与哪种细菌感染有关

- A. 大肠杆菌
- B. 沙门菌
- C. 空肠弯曲菌
- D. 幽门螺杆菌
- E. 嗜盐杆菌

答案:D

13. 乙型病毒性肝炎最主要的传播途径是

- A. 粪-口传播
- B. 血行传播
- C. 呼吸道传播
- D. 蚊虫叮咬
- E. 水源传播

答案:B

14. 瘫痪病人的护理措施中,下列哪项不妥

- A. 保持肢体功能位
- B. 翻身、拍背
- C. 调整饮食以防便秘发生
- D. 鼓励病人多饮水
- E. 由于瘫痪肢体不易移动可将静脉输液放在瘫痪肢体侧

答案:E

15. 一般认为心脏停搏后脑组织对缺氧的耐受时间大约是:

- A. 3分钟
- B. 4~6分钟
- C. 7分钟
- D. 8分钟
- E. 10分钟

答案:B

16. 甲状腺功能亢进患者出现下列哪项表现,护士应警惕甲亢危象发生

- A. 高热(T>39℃)心率增快(140~240次/分)
- B. 甲状腺弥漫性,对称性肿大
- C. 情绪不稳,多言好动

- D. 怕热,多汗,常有消瘦
- E. 食欲亢进,大便次数增多

答案:A

17. 军团菌肺炎首选抗菌药物

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 丁胺卡那霉素
- D. 四环素
- E. 头孢菌素

答案:A

18. 急性左心衰病人进行酒精湿化给氧的目的是

- A. 稀释痰液
- B. 松弛支气管平滑肌
- C. 使肺泡内泡沫破裂而改善通气
- D. 加强心肌收缩力
- E. 消毒氧气湿化瓶

答案:C

19. 心源性呼吸困难的主要原因是

- A. 肺循环瘀血
- B. 体循环瘀血
- C. 气道痉挛狭窄
- D. 呼吸中枢兴奋
- E. 极度紧张、恐慌

答案:A

20. 右心衰病人常有的食欲不振、恶心、呕吐、腹痛等症状,是由于

- A. 肺循环瘀血
- B. 胃肠道瘀血
- C. 交感神经反射增强
- D. 迷走神经反射增强
- E. 左心室扩大压迫膈肌

答案:B

21. 护理评估开始的时间是

- A. 做完治疗后开始评估
- B. 第一次抽血后开始评估
- C. 为病人做完入院介绍后开始评估
- D. 与病人第一次见面时开始评估
- E. 参加医生查房后开始评估

答案:D

22. 下列需避光使用的药物是

- A. 速尿
- B. 消心痛
- C. 卡托普利
- D. 硝普钠

E. 西地兰

答案:D

23. 1999年世界卫生组织规定的高血压标准是

- A. 收缩压 $\geq 140$ mmHg 和(或)舒张压 $\geq 90$ mmHg
- B. 收缩压 $\geq 160$ mmHg 和(或)舒张压 $\geq 90$ mmHg
- C. 收缩压 $> 140$ mmHg
- D. 舒张压 $> 90$ mmHg
- E. 收缩压 $\geq 160$ mmHg

答案:A

24. 无尿是指成人24小时尿量少于

- A. 400ml
- B. 200ml
- C. 100ml
- D. 50ml
- E. 10ml

答案:C

25. 急性肾炎水肿部位最早多由下列哪项开始

- A. 眼睑
- B. 面部
- C. 腰部
- D. 胫前区
- E. 踝部

答案:A

26. 我国引起肝硬化最常见的原因是

- A. 病毒性肝炎
- B. 营养不良
- C. 酒精中毒
- D. 循环障碍
- E. 遗传因素

答案:A

27. 慢性阻塞性肺气肿常见的病因是

- A. 慢性支气管炎
- B. 尘肺
- C. 支气管扩张症
- D. 支气管哮喘
- E. 抗胰蛋白酶不足

答案:A

28. 会阴部手术患者手术时应取

- A. 截石位
- B. 侧卧位
- C. 颈仰卧位
- D. 平卧位
- E. 半卧位

答案:A

29. 全胃肠外营养时,中断或减慢下列哪种液

体,易引起低血糖

- A. 10%脂肪乳剂
- B. 等渗生理盐水
- C. 3%氨基酸溶液
- D. 5%葡萄糖液
- E. 20%葡萄糖液

答案:E

30. 高钠血症的诊断标准为血清钠

- A.  $> 150$ mmol/L
- B.  $> 160$ mmol/L
- C.  $> 165$ mmol/L
- D. 135 ~ 145mmol/L
- E. 125 ~ 135mmol/L

答案:A

31. 抗休克治疗首要而基本的措施是

- A. 改善心功能
- B. 补充血容量
- C. 纠正酸中毒
- D. 改善周围血管张力
- E. 防治急性肾衰

答案:B

32. 体表或浅在的肿瘤最早出现的局部症状是

- A. 肿块
- B. 疼痛
- C. 出血
- D. 功能性改变
- E. 转移部位出现的症状

答案:A

33. 破伤风最早累及的肌肉是

- A. 面肌
- B. 膈肌
- C. 咀嚼肌
- D. 四肢肌
- E. 颈项肌

答案:C

34. 诊断败血症最可靠的依据是

- A. 出现休克
- B. 皮下出现淤点
- C. 肝、脾肿大及黄疸
- D. 寒战、高热,呈稽留热
- E. 血培养阳性

答案:E

35. 气性坏疽病人用过的敷料最好的灭菌方法

- A. 高压蒸气灭菌

是



- B. 焚毁
- C. 煮沸消毒 1 小时
- D. 3% 碘酊浸泡
- E. 3% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 浸泡

答案:B

36. 心跳、呼吸骤停初期有效的抢救措施是

- A. 心内注射急救药
- B. 开胸心脏按压
- C. 口对口呼吸加胸外心脏按压
- D. 电击除颤
- E. 低温疗法

答案:C

37. 外伤急救时若安置止血带,放松止血带的间隔时间是

- A. 每 5 小时一次
- B. 每 4 小时一次
- C. 每 3 小时一次
- D. 每 2 小时一次
- E. 每 1 小时一次

答案:E

38. 烧伤休克期的主要病理生理改变是

- A. 大量红细胞丧失
- B. 大量水分蒸发
- C. 大量体液从血管渗出
- D. 疼痛
- E. 败血症

答案:C

39. 诊断恶性肿瘤最可靠的依据是

- A. 实验室检查
- B. B 型超声波
- C. 放射性核素检查
- D. 病理检查
- E. 血管造影

答案:D

40. 休克经处理后,好转的指标是

- A. 神志恢复清楚
- B. 皮肤颜色转红
- C. 肢端温度上升
- D. 血压回升
- E. 尿量增多

答案:E

41. 全麻术后出现急性肺不张的常见原因是

- A. 饱食后急诊手术
- B. 病人术前有急性呼吸道感染
- C. 术前进行肺功能锻炼

D. 术前应用抗生素

E. 病人紧张

答案:B

42. 纠正低血钾时,尿量达到多少以上时才能静

脉补钾

- A. 15ml/h
- B. 40ml/h
- C. 60ml/h
- D. 10ml/h
- E. 5ml/h

答案:B

43. 为监测 ICU 病室的环境情况,作空气培养的时间间隔是

- A. 10 天一次
- B. 20 天一次
- C. 30 天一次
- D. 45 天一次
- E. 60 天一次

答案:C

44. 输入贮存久的库存血时,易引起

- A. 高钠血症
- B. 低钙血症
- C. 高钾血症
- D. 低钾血症
- E. 低钠血症

答案:C

45. 骨盆的组成是由

- A. 骶骨、尾骨及髌骨
- B. 骶骨和尾骨
- C. 髌骨、坐骨及耻骨
- D. 髌骨、骶骨、尾骨
- E. 耻骨、髌骨和尾骨

答案:A

46. 外阴局部受伤易形成水肿的部位

- A. 大阴唇
- B. 小阴唇
- C. 阴阜
- D. 阴道前庭
- E. 阴蒂

答案:A

47. 月经周期 32 天,其排卵时间在月经

- A. 第 16 天
- B. 第 18 天
- C. 第 20 天
- D. 第 22 天

E. 第 24 天

答案:B

48. 女性内生殖器下述哪项正确

- A. 尿道
- B. 阴唇系带
- C. 处女膜
- D. 小阴唇
- E. 输卵管

答案:E

49. 卵巢功能最稳定、生育最旺盛的时期为

- A. 幼年期
- B. 青春期
- C. 性成熟期
- D. 老年期
- E. 更年期

答案:C

50. 头先露中,最常见的是

- A. 枕先露
- B. 面先露
- C. 前凶先露
- D. 颞先露
- E. 复合先露

答案:A

51. 下列各项,不能推算胎龄的是

- A. 末次月经
- B. 胎动出现时间
- C. 木质听筒开始听到胎心
- D. 黄体酮试验
- E. 早孕反应出现时间

答案:D

52. 影响子宫复旧的因素是

- A. 授乳
- B. 妊娠高血压综合征
- C. 子宫炎症
- D. 胎盘功能不良
- E. 以上都不是

答案:C

53. 异位妊娠时,受精卵最易着床的部位是

- A. 宫颈
- B. 卵巢
- C. 输卵管
- D. 腹腔
- E. 以上都不是

答案:C

54. 足月胎儿脐带平均长度为

A. 30cm

B. 40cm

C. 50cm

D. 75cm

E. 80cm

答案:C

55. 目前我国采用的围产期定义是

- A. 孕满 28 周至产后 7 天之内
- B. 孕满 30 周至产后 7 天
- C. 孕满 12 周至产后 7 天
- D. 孕满 28 周至产后 30 天
- E. 孕满 28 周至产后 3 天

答案:A

56. 高危妊娠是指

- A. 对胎儿有危害的妊娠
- B. 对孕妇有危险的妊娠
- C. 凡可能危害母儿或导致难产的妊娠
- D. 对新生儿有高度危险性
- E. 对母儿都有生命危险

答案:C

57. 下列哪项是胎儿娩出的主要力量

- A. 子宫收缩力
- B. 腹肌收缩力
- C. 膈肌收缩力
- D. 肛提肌收缩力
- E. 膈肌和腹肌的协同力量

答案:A

58. 目前我国引起产妇死亡占首位的原因是

- A. 妊娠合并心脏病
- B. 产后出血
- C. 妊高征
- D. 产后感染
- E. 羊水栓塞

答案:B

59. 女性生殖器结核最常见的是

- A. 输卵管结核
- B. 子宫内膜结核
- C. 子宫颈结核
- D. 卵巢结核
- E. 盆腔腹膜结核

答案:A

60. 下述哪项不是儿科护士为患儿家长宣教的内容

- A. 帮助患儿适应医院
- B. 教会家长为患儿作出护理诊断

- C. 帮助患儿接受各种治疗
- D. 指导家长如何观察患儿的病情
- E. 帮助家长掌握患儿出院后护理

答案:B

61. 生长发育的顺序中,哪项提法是错误的
- A. 生长发育遵循由上到下的顺序
  - B. 生长发育遵循由近到远的顺序
  - C. 生长发育遵循由细到粗的顺序
  - D. 生长发育由简单到复杂的顺序
  - E. 生长发育由低级到高级的顺序

答案:C

62. 正常1岁8个月小儿乳牙应有
- A. 8~10个
  - B. 10~12个
  - C. 14~16个
  - D. 18~20个
  - E. 20~22个

答案:C

63. 最晚到生后几岁仍不能自我控制排尿称遗尿
- A. 2岁
  - B. 3岁
  - C. 4岁
  - D. 5岁
  - E. 6岁

答案:D

64. 新生儿期应接种的疫苗是
- A. 麻疹减毒活疫苗
  - B. 破伤风抗毒素
  - C. 乙脑疫苗
  - D. 百、白、破疫苗
  - E. 卡介苗、乙肝疫苗

答案:E

65. 母亲正常分娩后何时喂哺自己的婴儿
- A. 产后立即
  - B. 产后2小时
  - C. 产后4小时
  - D. 产后6小时
  - E. 产后8小时

答案:A

66. 2个月以内婴儿,应添加的辅食是
- A. 维生素AD、果汁
  - B. 米汤、蛋黄
  - C. 粥、肝泥
  - D. 米糊、鱼泥
  - E. 菜泥、豆腐

答案:A

67. 体重2000g的早产儿,出生三天,暖箱设定的温度是

- A. 31℃
- B. 32℃
- C. 33℃
- D. 34℃
- E. 35℃

答案:C

68. 小儿腹泻静脉补钾治疗中,正确的浓度是

- A. 静脉推注0.3%氯化钾液体
- B. 静脉滴注0.3%氯化钾液体
- C. 静脉推注3%氯化钾液体
- D. 静脉滴注3%氯化钾液体
- E. 静脉滴注0.03%氯化钾液体

答案:B

69. 处理锐利器械应避免对人损伤,找出错误的方法

- A. 针头不复帽
- B. 利器用后放在黄色塑料袋内
- C. 利器用后放在防水耐刺的容器内
- D. 不用手去折断针头
- E. 利器原则上不复用

答案:B

70. 恶性肿瘤病人化疗期间,白细胞下降到 $4 \times 10^9/L$ ,首先应

- A. 服用利血生
- B. 少量多次输血
- C. 暂时停药
- D. 加强营养
- E. 中药治疗

答案:C

71. 患者男性,56岁,诊断为急性胰腺炎,经治疗后腹痛、呕吐基本消失,开始进食时应给

- A. 无渣半流质
- B. 低脂低蛋白流质
- C. 高脂高蛋白流质
- D. 高脂低蛋白流质
- E. 低脂高蛋白流质

答案:B

72. 某青年患者,平素体健,现因受凉后出现咳嗽伴少量黏痰发热,下列哪项护理措施不妥

- A. 应当适当休息饮水
- B. 咽痛可用淡盐水漱口
- C. 咳嗽时给予吸痰

D. 发热者可适量服退热剂

E. 按医嘱给予抗生素

答案:C

73. 患者女性,15岁,确诊为1型糖尿病1年,一直坚持胰岛素治疗,近期出现显著乏力,口渴严重,尿量增加并伴有头痛,此时应警惕发生

A. 脑血管意外

B. 糖尿病高渗性昏迷

C. 乳酸性酸中毒

D. 糖尿病酮症酸中毒

E. 低血糖性昏迷

答案:D

74. 5个月小儿接种百、白、破混合疫苗,1天后体温 $37.1^{\circ}\text{C}$ ,局部出现红、肿、热、痛

A. 接种后全身反应

B. 接种后全身中等反应

C. 接种过敏反应

D. 接种后局部强反应

E. 接种后局部弱反应

答案:E

75. 6个月婴儿,在儿科门诊检查,下列哪项情况认为是发育异常

A. 前囟未闭

B. 头围44cm

C. 乳牙未萌出

D. 俯卧时不能抬胸

E. 两手不会传递玩具

答案:D

76. 8个月早产儿,现15天。母乳喂养,为预防佝偻病首先应添加的是

A. 米汤

B. 菜汤

C. 鱼肝油

D. 水果汁

E. 蛋黄

答案:C

77. 女性,60岁,颈后局限性肿痛6天,伴有畏寒、发热 $38.5^{\circ}\text{C}$ ,来急诊时已用抗生素治疗3天,体格检查见颈后发际下方肿胀,皮肤红肿,质地坚韧,界限不清,中央多个小脓头伴坏死组织,白细胞数 $16 \times 10^9/\text{L}$ ,中性粒细胞0.90(90%)。此时最恰当的治疗选择是

A. 继续抗生素静脉应用

B. 理疗

C. 做“+”、“++”或“+++”形切口引流

D. 外敷中药膏

E. 免疫治疗

答案:C

78. 一个三岁小儿跌倒在热粥锅里,面、颈、发部及双上肢Ⅱ°烫伤,其烫伤面积为

A. 21%

B. 14%

C. 23%

D. 36%

E. 27%

答案:D

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据备考题题干所提供的信息,在每题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(79~80题共用题干)

某男性患者,58岁,有慢性支气管炎病史20年,已并发肺气肿。今晨因用力大便后突感右胸口疼痛,伴干咳、呼吸困难,并渐出现紫绀,体检见气管明显向左移位。

79. 此时患者最确切的医疗诊断是

A. 合并气胸

B. 急性心肌梗死

C. 急性右心衰竭

D. 急性呼吸窘迫综合征

E. 合并胸腔积液

答案:A

80. 此患者病变部位的叩诊音为

A. 清音

B. 浊音

C. 鼓音

D. 实音

E. 浊、实音

答案:C

(81~83题共用题干)

某新生儿,生后20天,体检正常,护士到家中做健康指导。

81. 居室温度应保持

A.  $16^{\circ}\text{C} \sim 18^{\circ}\text{C}$

B.  $18^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$

C.  $20^{\circ}\text{C} \sim 21^{\circ}\text{C}$

D.  $22^{\circ}\text{C} \sim 24^{\circ}\text{C}$

E.  $25^{\circ}\text{C} \sim 28^{\circ}\text{C}$

答案:D

82. 预防意外事故的重点是

- A. 坠床
- B. 玩锐利器
- C. 开水烫伤
- D. 喂奶后窒息
- E. 相互打闹

答案:D

83. 应使家属了解该儿已接种的疫苗是

- A. 卡介苗、乙肝疫苗
- B. 乙型脑炎疫苗
- C. 麻疹减毒活疫苗
- D. 百、白、破混合疫苗
- E. 脊髓灰质炎减毒活疫苗

答案:A

(84~86 题共用题干)

男性,18岁,体重60kg,反复呕吐10余天,主诉:乏力、头晕、视觉模糊。体检:血压12.5/8.5kPa(94/64mmHg),脉搏90次/分,呼吸20次/分,血清钠132mmol/L,血清钾3.5mmol/L,血pH值为7.35。

84. 该病人的水、电解质失衡属

- A. 高渗性脱水
- B. 低渗性缺水
- C. 代谢性碱中毒
- D. 低钾血症
- E. 代谢性酸中毒

答案:B

85. 根据上题水、电解质失衡的诊断,此病人应补哪种液体

- A. 等渗盐水
- B. 3%~5%盐水
- C. 5%的葡萄糖液
- D. 2%NaHCO<sub>3</sub>
- E. 10%葡萄糖液

答案:A

86. 若病人因病情需要进行胃肠减压时应用下列哪种溶液冲洗胃管

- A. 注射用水
- B. 生理盐水
- C. 凉开水
- D. 10%氯化钠
- E. 3%~5%氯化钠

答案:B

三、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题密切相关的答案,并在答题卡上将

相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(87~88 题共用备选答案)

- A. 呼气性呼吸困难
- B. 吸气性呼吸困难
- C. 深大呼吸
- D. 呼吸浅促
- E. 呼吸节律异常

87. 支气管哮喘

答案:A

88. 喉头水肿

答案:B

(89~92 题共用备选答案)

- A. 颈仰卧位
- B. 半侧卧位(30°~50°角)
- C. 俯卧位
- D. 截石位
- E. 折刀位

89. 脊柱手术采取

答案:C

90. 颈前部手术采取

答案:A

91. 胸腹联合切口手术

答案:B

(92~94 题共用备选答案)

- A. 自乳头至耻骨联合平面,两侧到腋后线
- B. 自剑突至大腿上1/3前内侧及外阴部,两侧到腋后线
- C. 自脐平线至大腿上1/3包括外阴
- D. 自乳头联线至耻骨联合,前后均过正中线
- E. 自唇下至乳头连线,两侧至斜方肌前缘

92. 下腹部手术的备皮范围为

答案:B

93. 颈部手术的备皮范围为

答案:E

94. 肾手术的备皮范围为

答案:D

四、以下每一道考题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择备选答案中所有正确答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

95. 体循环瘀血可能的症状是

- A. 肝肿大
- B. 少尿
- C. 恶心、食欲不振
- D. 呼吸困难伴咳粉红色泡沫痰

E. 血便

答案:ABC

96. 关于儿童生长发育的规律,正确的是

- A. 有一定的个体差异性
- B. 生长发育遵循一定规律
- C. 各系统器官发育速度不平衡
- D. 生长发育是一个连续过程
- E. 神经系统的发育先快而后回缩

答案:ABCD

97. 判断心跳骤停的临床表现是

- A. 意识消失
- B. 大动脉搏动消失
- C. 无自主呼吸
- D. 心电图呈直线
- E. 瞳孔散大

答案:ABCDE

98. 一般择期性手术前禁食、禁水的目的在于

- A. 保持胃肠道空虚
- B. 防止术中呕吐
- C. 减少消化道手术中的污染
- D. 减少消化腺分泌
- E. 避免尿滞留

答案:ABC

99. 中心静脉插管所致的并发症有

- A. 气胸
- B. 血胸
- C. 出血
- D. 败血症
- E. 臂丛神经损伤

答案:ABCDE

100. 外科护士的工作范畴包括

- A. 协助病人接受各项检查
- B. 进行护理咨询和健康教育
- C. 协助进行各种手术和非手术治疗
- D. 评估和满足病人的基本需要
- E. 协助预防并发症

答案:ABCDE

B. 早发现、早诊断、早治疗

C. 合理的诊断和护理

D. 防止并发症与残疾

E. 防止意外伤害

答案:D

2. 健康促进的目的是

- A. 改变个体不健康行为
- B. 改变群体不健康行为
- C. 改变人类生存环境
- D. 改变不良生活方式
- E. 改变政府行为

答案:B

3. 健康教育与卫生宣传的区别在于

- A. 注重知识灌输
- B. 注重环境改善
- C. 注重教育效果评价
- D. 不仅注重知识改变而且注重行为改变
- E. 注重计划教育

答案:D

4. 心理健康测量指标不包括下列哪一项

- A. 智力测量
- B. 人格测量
- C. 日常生活活动能力评估
- D. 神经心理测量
- E. 情绪评价

答案:C

5. 下列哪项不属于护患沟通技巧

- A. 交谈技巧
- B. 非语言沟通
- C. 开放式提问技巧
- D. 行为训练技巧
- E. 沉默技巧

答案:D

6. 下列哪项不属于病人学习目标

- A. 入院教育目标
- B. 认知目标
- C. 情感目标
- D. 技能目标
- E. 行为目标

答案:A

7. 下列哪一项是入院教育所要达到的行为结果

- A. 减轻焦虑
- B. 减少恐惧
- C. 减少并发症
- D. 建立健康行为

## 相关专业知 识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。

1. 第三级预防的重点是

- A. 防止疾病发生

E. 建立遵医行为

答案:E

8. 下列哪项不是腹式呼吸的适应证

- A. 肺切除手术
- B. 心脏手术
- C. 食道手术
- D. 腹部外伤
- E. 气胸

答案:D

9. 下列哪一项不属于行为训练方法

- A. 技能培训
- B. 询问式学习
- C. 模拟与游戏
- D. 模仿学习
- E. 行为矫正

答案:B

10. 应用文字教材的前提是

- A. 文字通俗易懂
- B. 设计图文并茂
- C. 学习者必须有阅读能力
- D. 内容实用
- E. 有适宜的场所

答案:C

11. 护理健康教育的学科性质是

- A. 护理学科
- B. 综合学科
- C. 交叉的边缘学科
- D. 教育学科
- E. 人文学科

答案:D

12. 社区健康教育的对象不包括

- A. 健康人群
- B. 病人家属
- C. 慢性疾病病人
- D. 临终病人
- E. 住院病人

答案:E

13. 为了预防高血压的发生,WHO 建议每人每天食盐摄入量不超过

- A. 12g
- B. 10g
- C. 8 g
- D. 6 g
- E. 4 g

答案:D

14. 一般提供早、中、晚三餐食量的分配为

- A. 20%、40%、40%
- B. 30%、40%、30%
- C. 40%、40%、20%
- D. 40%、30%、30%
- E. 30%、30%、40%

答案:B

15. 老年人消化系统的主要变化包括

- A. 胃肠蠕动减慢,胃排空延长
- B. 胸式呼吸减弱,腹式呼吸相对增强
- C. 膀胱容量减少
- D. 甲状腺功能降低
- E. 儿茶酚胺含量减少

答案:A

16. 男,63岁,肺癌晚期,身心非常痛苦,表现为悲伤、消沉、绝望。此病人对其疾病的心理反应属于

- A. 否认阶段
- B. 愤怒阶段
- C. 协议阶段
- D. 抑郁阶段
- E. 接受阶段

答案:D

17. 康复护理以\_\_\_\_\_为目标

- A. 功能恢复
- B. 恢复正常生活
- C. 恢复工作
- D. 恢复学习
- E. 最大限度地恢复功能、减轻障碍

答案:E

18. 家系图一般由三代人组成,其排列方式一般为

- A. 长辈在上,子辈在下;长辈在左,幼者在右
- B. 长辈在上,子辈在下;长辈在右,幼者在左
- C. 子辈在上,长辈在下;长辈在左,幼者在右
- D. 子辈在上,长辈在下;长辈在右,幼者在左
- E. 任意排列

答案:A

19. 在进行社区健康教育评价时,失访比例超过\_\_\_\_\_,便可造成偏倚

- A. 3%
- B. 5%
- C. 8%
- D. 10%
- E. 12%

答案:D

20. 静脉导管留置时间过长易发生感染,一般导管留置时间不宜超过

- A. 1 天
- B. 2 天
- C. 3 天
- D. 4 天
- E. 5 天

答案:C

21. 灭菌后的治疗巾包打开后,剩余的治疗巾有效期为

- A. <4 小时
- B. <12 小时
- C. <24 小时
- D. <36 小时
- E. <48 小时

答案:C

22. 医院感染研究的主要对象是

- A. 探视者
- B. 陪护家属
- C. 医护人员
- D. 门诊病人
- E. 住院病人

答案:E

23. 夏天高压蒸汽灭菌后的无菌包,保存有效期最长时间不能超过

- A. 3 天
- B. 7 天
- C. 14 天
- D. 21 天
- E. 28 天

答案:B

24. 医疗用品按其污染后造成危害的程度,可分为几类

- A. 1 类
- B. 2 类
- C. 3 类
- D. 4 类
- E. 5 类

答案:C

25. 医院感染不包括下列哪一种

- A. 病人在医院内获得的感染
- B. 入院时已处于潜伏期的感染
- C. 出院时已处于潜伏期且出院后不久发生的感染
- D. 新生儿经产道分娩时发生的感染

E. 手术后输血造成的病毒感染

答案:B

26. 对无明显潜伏期的疾病,判断医院感染的原则是

- A. 入院后 24 小时发生感染
- B. 入院后 48 小时发生感染
- C. 入院后 32 小时发生感染
- D. 入院后 16 小时发生感染
- E. 入院后 8 小时发生感染

答案:B

27. 高压蒸汽灭菌效果监督最可靠的方法是

- A. 化学指示胶带
- B. 程序监测
- C. 生物监测
- D. 化学指示卡
- E. 温度计

答案:C

28. 下列哪项不需要进行手消毒

- A. 进入和离开隔离病房
- B. 脱去无菌手套
- C. 接触特殊感染病原体后
- D. 接触病人血液后
- E. 接触病人体液后

答案:B

29. 口腔科牙钻结构复杂,且经常接触破损的黏膜,常有血液的污染。牙钻属于

- A. 高度危险性物品
- B. 中度危险性物品
- C. 低度危险性物品
- D. 需高水平消毒的物品
- E. 需中水平消毒的物品

答案:A

30. 预防术后切口感染使用抗菌药物的最佳时间是

- A. 术前 3 天给药
- B. 术前 30~60 分钟给药
- C. 术前 6 小时给药
- D. 术前 1 天给药
- E. 术后回病房即给药

答案:B

31. 促进长期卧床病人排痰的简单有效措施是

- A. 负压吸引
- B. 体液引流
- C. 提高机体免疫力
- D. 药物祛痰



E. 翻身、叩背

答案:E

32. 静脉采血以下哪项符合要求

- A. 一人一针一管
- B. 一人一针一管一巾
- C. 一人一针一管一巾一带
- D. 一人一针一巾
- E. 一人一针一带

答案:C

33. 凡高度危险性物品,必须选用

- A. 高效消毒法
- B. 中效消毒法
- C. 低效消毒法
- D. 灭菌法
- E. 机械清洗法

答案:D

34. 移位菌群失调原因与哪些因素无关

- A. 不适当使用抗菌药物
- B. 外科手术
- C. 插管或介入治疗
- D. 免疫功能下降
- E. 细菌结构变化

答案:E

35. 一旦医院发生急性胃肠道感染的暴发流行不应

- A. 立即将发病患者转入传染病院
- B. 调查了解发病情况
- C. 查阅病历及细菌检查结果
- D. 掌握暴发流行的时间及分布
- E. 切断传播途径

答案:A

36. 不属于中度危险性物品的是

- A. 体温表
- B. 透析器
- C. 呼吸机管道
- D. 麻醉机管道
- E. 气管镜

答案:B

37. 医院感染暴发流行时,以下哪项措施不正确

- A. 先将发病患者转移到安全区
- B. 先将未发病患者转移到安全区
- C. 分组护理
- D. 单元隔离
- E. 进行流行病学调查

答案:A

38. 抗菌药物是治疗感染的主要药物,所以

- A. 对一切感染症都应尽早使用高效广谱抗菌药物
- B. 在治疗感染性疾病时,考虑使用抗菌药物同时要考虑病原体对抗菌药物的敏感性
- C. 有了各种抗菌药物,预防医院感染就不成问题了
- D. 抗菌药物可用作消毒剂,对皮肤伤口消毒
- E. 发烧病人都是感染,均可用抗菌药物治疗

答案:B

39. 肺心病呼吸衰竭最确切的诊断根据是

- A. 发绀、呼吸困难
- B. 精神、神经症状
- C. 二氧化碳结合力明显升高
- D.  $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ ,  $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$
- E. 肺通气功能明显减退

答案:D

40. 可确诊糖尿病的有关检查指标是

- A. 空腹血糖  $\geq 7.8\text{mmol/L}$  和/(或)餐后2小时血糖  $\geq 11.1\text{mmol/L}$  水平
- B. 随机血糖  $\geq 7.8\text{mmol/L}$
- C. 糖耐量试验2小时  $\geq 7.8\text{mmol/L}$
- D. 口服葡萄糖后1小时血糖  $\geq 7.8\text{mmol/L}$
- E. 空腹血糖  $> 5.6\text{mmol/L}$

答案:A

41. 胸部触觉语颤增强见于哪种疾病

- A. 肺气肿
- B. 慢性支气管炎
- C. 肺心病
- D. 大叶性肺炎
- E. 胸腔积液

答案:D

42. 下列哪一项检查可直接观察溃疡的部位、病变大小

- A. X线钡餐检查
- B. 超声检查
- C. 胃镜检查
- D. 幽门杆菌感染的检测
- E. 胃液检查

答案:C

43. 甲胎蛋白阳性对下列哪种疾病最有诊断价值

- A. 原发性肝癌
- B. 肝转移癌
- C. 急性肝坏死
- D. 肝硬化