

临床医学试题库系列丛书

总主编 / 高国兰 龚洪翰 魏云峰

妇产科学 试题库

主编 高国兰 刘丝荪 蔡丽萍



总主编 高国兰 龚洪翰 魏云峰

临床医学试题库系列丛书

妇产科学试题库

主 编 高国兰 刘丝荪 蔡丽萍

副主编 张 萍 石玉发 黄筱金
刘小萍 郭彩霞

主 审 易为民

编 者 (以姓氏笔画为序)

付 蓉	石玉发	石 珍	刘小萍	刘丝荪	刘朝霞
何林生	余立群	张 萍	张 静	李冬水	李俊英
杜晓梅	陈新萍	胡 佳	聂春莲	郭彩霞	高国兰
黄玉婵	黄建贞	黄筱金	龚 慧	彭小莲	曾艳花
蔡丽萍					

人 民 卫 生 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

妇产科学试题库/高国兰等主编. —北京:人民卫生出版社,2006. 11

(临床医学试题库系列丛书)

ISBN 7-117-08172-4

I. 妇… II. 高… III. ①妇科学-医学院校-习题②产科学-医学院校-习题 IV. R71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 135234 号

本书本印次封底贴有防伪标。请注意识别。

临床医学试题库系列丛书

妇产科学试题库

主 编:高国兰 等

出版发行:人民卫生出版社(中继线 010-67616688)

地 址:北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编:100078

网 址:<http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线:010-67605754 010-65264830

印 刷:北京汇林印务有限公司

经 销:新华书店

开 本:787×1092 1/16 印张:22

字 数:496 千字

版 次:2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号:ISBN 7-117-08172-4/R·8173

定价(含光盘):41.00 元

版权所有,侵权必究,打击盗版举报电话:010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

序

医学科学与其他自然科学不很相同,学习内容多,学习时间长,既要求扎实的基础理论,又要求很好的专业技能,达到理论与实践的有机统一。在这种情况下,如何全面考核医学生的学习效果,培养真才实学的优秀医学生,是医学教育的一项重要课题。

考试仍然是用来检验教与学两者效果的重要环节,更是衡量学生成绩好坏的主要指标。但传统的考试方法基本上是笔试形式,基本上只考理论知识,而对实践知识难以考察,这种考试易使学生读死书,死记硬背,从而出现高分低能的现象,因而考试改革已是医学教学的重要内容之一,医学的考试方式需要重新进行探索。

南昌大学医学院第一临床医学院高国兰、龚洪翰、魏云峰三位教授有鉴于此,乃组织编写这套《临床医学试题库系列丛书》,由人民卫生出版社出版。该系列丛书全套共 20 册,涵盖了临床医学各个学科,题型多,题量大,可称临床医学试题全书。该试题库系列丛书与众不同之处在于既有书面的资料,又配有光盘(试题库软件)。该试题库软件分为学生版与教师版两个版本,学生版试题库软件主要功能是可让学生反复自考、自测、自学,同时为了便于学生学习,将临床医学的基本知识、基本技能和基础理论的内容以书面的形式承载。教师版试题库软件包括建题库、备题库、抽题库等部分,可让教师轻松建题、备题、抽题。该试题库适用于专科、本科、研究生及中级职称的考试,是一个多层面、立体式的融教学、实践、考试为一体的多功能软件。

应用该软件出题考试,既可提高医学生的考试兴趣,又能考核医学生的真实知识水平,促进医学生全面发展。这套软件是我国第一套系统而全面的师生共用的试题软件,也是我国医学考试改革的一次大胆尝试与探索。我非常乐意推荐这套《临床医学试题库系列丛书》给临床医学的学生们和教师们。

中国科学院院士
·中华医学会外科学分会
终生名誉主任委员

束法祖

前 言

为探索我国临床医学新的考试模式,将考试、考查、临床实习和课堂教学紧密结合,实现医学基础、医学理论与临床技能的有机统一,我们聚集了我院各学科领域在学术上有较深造诣的教授和专家,结合自身数十年临床教学与实践经验和资料,精心编写了这套《临床医学试题库系列丛书》,该丛书按学科共分成 20 册,涵盖了内科学、外科学、妇产科学、儿科学、神经病学、传染病学、口腔科学、眼科学、耳鼻咽喉-头颈外科学、肿瘤学、疼痛诊疗学、麻醉学、皮肤性病学、康复医学、病理学、精神病学·医学心理学、中医学、护理学、医学影像学及医学检验学等所有临床及医技学科。每个学科的试题库分教师版与学生版两种版本。两个版本的光盘内均有详细的使用说明。

学生版试题库系列丛书是供学生及相关专业使用的系列丛书,包括纸质材料和试题库软件。其中纸质材料约占试题库软件题量的 $1/3 \sim 1/2$,题型有临床常用单选题、多选题、病例串型最佳选择题(A3~A4 型题)、标准配伍型(B 型题)、名词解释、填空题、判断题、问答题和病例分析等九种题型。考虑到学生的学习等特点,将考查学生的基本知识、基本理论和基本技能的试题以纸质出版物(丛书)形式出版,便于学生随时随地使用。由于所有试题分为“易、中、难”三个等级,原则上是将“易”的试题放在书本上,但也随机提取了一些“中”和“难”的试题放入书中。试题的“易、中、难”三个等级的划分是相对的,带有编者的主观因素,不一定准确,仅供使用时参考。学生版试题库题量与教师版相同,但使用的方法不同,学生版试题库软件主要用于学生的自测、自习、自学,无建题、备题功能。

教师版试题库软件包括建题库、备题库、抽题库等部分。建题库软件用于建立试题库,使用者可根据教学需要,自行随时创建题库,确保试题的先进性。备题库软件主要用于储备试题。由于试题库内容丰富,题型多样,试题量大,使用者可预备多套试卷,以备急需。抽题库软件用于从题库中随意抽题。题库中的试题分门别类,编有序号,抽题时只需点击序号,试题即被选中,同时附有答案,使用非常方便快捷。教师版虽然也可以用于学生自测,但主要用于教师出题,所以以光盘的形式出版,没有纸质出版物。

本软件最大的特点是实现了对图、录像等普通纸质书籍难以显现的信息提供支持,尤其是对图的输入可以是单图,也可以是多图。试题打印功能可按照使用者要求,以 WORD、PDF、HTML、TXT 等多种格式,自动或手动生成试卷,亦可直接从打印机输出。本试题库软件另一个特点是实现了智能化。首选,试题筛选除了可根据试题号进行查询外,还提供了多参数复合查询功能,可以根据章节、子类、题型、阶段、难易度和关键词进行筛

选,其中,阶段和难易度中的项目还可以多选,进行复合查询。其次,试题自测部分能够按照使用者所选的阶段、章节、子类和设定的难易度比例进行自动组卷,测验完成自动评分。该试题库涉及的学科多、范围广、题量大,共有试题十二万道,共有示意图、解剖图及影像图等近两万幅,图文并茂,既是试题库,又是参考书、教学辅导材料。该试题库软件适用于专科、本科、研究生等不同层次、各类从事临床及教学人员的教学需要,同时,对广大医务工作者晋升中级职称、高级职称的考试均有很好的指导作用。

该系列丛书的编辑出版得到人民卫生出版社领导和编辑的悉心指导和大力支持;又承蒙我国著名医学教育家、医学泰斗裘法祖资深院士撰写序言;在此,一并深表谢意。由于试题库软件的开发和试题编撰的时间匆促,加之经验不足,水平有限,错误或不当之处在所难免,恳请专家学者、同道、使用者不吝批评指正。

总主编 高国兰 龚洪翰 魏云峰

目 录

第一章 女性生殖系统解剖·····	1
第二章 女性生殖系统生理·····	9
第三章 妊娠生理 ·····	23
第四章 妊娠病理 ·····	33
第五章 妊娠诊断 ·····	68
第六章 孕期监护及保健 ·····	76
第七章 正常分娩 ·····	85
第八章 异常分娩 ·····	94
第九章 正常产褥·····	106
第十章 异常产褥·····	112
第十一章 妊娠合并症·····	118
第十二章 分娩并发症·····	130
第十三章 妇科病史及检查·····	142
第十四章 外阴上皮内非瘤样病变·····	147
第十五章 女性生殖系统炎症·····	154
第十六章 女性生殖系统肿瘤·····	177
第十七章 妊娠滋养细胞疾病·····	218
第十八章 生殖内分泌疾病·····	225
第十九章 子宫内膜异位症和子宫腺肌病·····	233
第二十章 女性生殖器官发育异常·····	241
第二十一章 女性生殖器官损伤性疾病·····	245
第二十二章 不孕症与辅助生殖技术·····	250
第二十三章 计划生育·····	258

第二十四章 妇女保健·····	272
第二十五章 妇产科常用特殊检查·····	275
第二十六章 妇产科常用特殊药物·····	280
第二十七章 妇产科内镜·····	282
答案·····	285

第一章

女性生殖系统解剖

【选择题】

● 单选题

1. 卵巢动静脉经什么韧带进入卵巢门()
 - A. 圆韧带
 - B. 骨盆漏斗韧带
 - C. 主韧带
 - D. 子宫骶韧带
 - E. 卵巢固有韧带
2. 子宫最狭窄的部分为()
 - A. 子宫峡部
 - B. 子宫颈管
 - C. 组织学内口
 - D. 解剖学内口
 - E. 子宫颈外口
3. 关于输卵管下列哪项是正确的()
 - A. 间质部长约 2cm
 - B. 全长约 8~14cm
 - C. 峡部长 1~3cm
 - D. 壶腹部长 4~8cm
 - E. 伞部长 2~1.5cm
4. 从宫颈两侧到骨盆侧壁的韧带是()
 - A. 宫骶韧带
 - B. 主韧带
 - C. 圆韧带
 - D. 阔韧带
 - E. 骨盆漏斗韧带
5. 卵巢动脉为()
 - A. 髂内动脉前干分支
 - B. 肾动脉分出
 - C. 髂外动脉分出
 - D. 腹主动脉分出
 - E. 髂总动脉分出
6. 关于阴道,下列哪项正确()
 - A. 阴道下端比上端宽
 - B. 上端包绕子宫颈,下端开口于前庭的前部
 - C. 平时阴道前后壁互相贴近
 - D. 黏膜覆以单层柱状上皮

- E. 阴道有腺体分泌黏液
7. 关于成年人子宫,下列哪项是错误的()
- A. 宽4~5cm
B. 成年人子宫长约7~8cm
C. 宫体与宫颈比例2:1
D. 厚2~3cm
E. 容量约50ml
8. 关于宫颈,下列哪项是错误的()
- A. 主要由结缔组织构成
B. 宫颈腺体可分泌少量碱性黏液
C. 主韧带是固定宫颈的主要韧带
D. 宫颈管黏膜为单层高柱状上皮
E. 宫颈内口是宫颈癌的好发部位
9. 宫骶韧带的前端是在()
- A. 子宫后面侧方
B. 宫颈后面上侧方
C. 宫颈上侧方
D. 宫颈后面侧方
E. 以上都不是
10. 维持子宫正常位置的是()
- A. 骨盆底肌肉及其上下筋膜的支柱作用
B. 膀胱和直肠的支柱作用
C. 子宫四对韧带的作用
D. 子宫四对韧带及盆底肌肉筋膜的支托作用
E. 腹腔压力作用
11. 右侧的卵巢动脉来自()
- A. 子宫动脉
B. 腹主动脉
C. 髂外动脉
D. 髂内动脉
E. 肾动脉
12. 关于卵巢的叙述,下列哪项正确()
- A. 产生卵子和性激素
B. 卵巢表面由腹膜覆盖
C. 卵巢白膜是一层平滑肌组织
D. 髓质内含数以万计的原始卵泡
E. 皮质内不含卵泡
13. 关于女性骨盆,下列哪项是错误的()
- A. 入口平面的前后径小于横径
B. 中骨盆横径小于前后径
C. 骨盆最小平面即中骨盆平面
D. 骨盆最小平面的横径是坐骨棘间径
E. 出口平面的大小决定于骨盆出口前后径
14. 未生育过的成年妇女,其子宫大小、子宫腔容积分别为()
- A. $7 \times 5 \times 3 \text{cm}$, 5ml
B. $8 \times 6 \times 4 \text{cm}$, 10ml
C. $7 \times 5 \times 3 \text{cm}$, 10ml
D. $5 \times 4 \times 2 \text{cm}$, 5ml
E. $5 \times 3 \times 2 \text{cm}$, 2ml
15. 在我国妇女骨盆类型中哪种最常见()
- A. 男型
B. 偏斜骨盆

- C. 类人猿型
D. 女型
E. 扁平型
16. 关于女性外生殖器的解剖,下列哪项是正确的()
A. 前庭大腺称巴多林腺
B. 女性外生殖器即会阴
C. 双侧小阴唇前端为腹股沟韧带终止点
D. 耻骨阜即阴阜
E. 阴道前庭为双侧大阴唇之间的菱形区
17. 关于骨盆,下列哪项是正确的()
A. 骨盆由骶骨、尾骨及左右两块髂骨构成
B. 骨盆轴为贯穿骨盆腔各平面中点的假想轴线
C. 骨盆腔是所有生殖器所在部位
D. 骨盆各关节活动度在妊娠期极度增大
E. 骶棘韧带构成骨盆出口的侧界
18. 关于输卵管的解剖生理,下列哪项是正确的()
A. 全长为 6~8cm
B. 黏膜受性激素影响有周期性变化
C. 平滑肌收缩时输卵管由近端向远端蠕动
D. 内壁为复层柱状上皮
E. 伞端有腹膜遮盖
19. 关于会阴,下列哪项是正确的()
A. 会阴体厚 5~6cm
B. 其是从阴蒂到肛门之间的软组织
C. 其由外向内逐渐变宽
D. 分娩时,会阴伸展性极小,易撕裂
E. 由皮肤、筋膜及中心腱构成
20. 关于女型骨盆,下列哪项是正确的()
A. 骨盆入口前后径长而横径短
B. 骨盆入口横径较前后径稍长
C. 骨盆入口椭圆形
D. 骨盆入口三角形
E. 骨盆入口平面狭窄
21. 会阴侧切术时能切到哪些肌肉()
A. 会阴深横肌、髂尾肌
B. 球海绵体肌、坐骨海绵体肌及会阴深横肌
C. 会阴深横肌、球海绵体肌及耻尾肌
D. 会阴浅横肌、深横肌及坐尾肌
E. 会阴深横肌、坐骨海绵体肌及耻尾肌
22. 关于输尿管哪项是正确的()
A. 在子宫动脉的前方交叉
B. 输尿管在腹膜后
C. 输尿管长约 20cm
D. 有骶髂关节处经髂内动脉起点前方入盆腔
E. 最细部分内径为 2~3mm
23. 子宫动脉为()

- A. 髂内动脉前干分支
B. 阴道动脉分支
C. 阴部内动脉分支
D. 卵巢动脉分支
E. 髂总动脉
24. 关于卵巢下列哪项是错误的()
A. 是一对扁椭圆形的性腺
B. 卵巢由覆层立方上皮覆盖称生发上皮
C. 卵巢外侧以骨盆漏斗韧带连于骨盆壁
D. 卵巢系膜连接于阔韧带后叶的部位称卵巢门
E. 内有一层纤维组织称卵巢白膜
25. 关于尿道下列哪项是错误的()
A. 尿道穿过泌尿生殖膈
B. 终止于阴道前庭部的尿道外口
C. 尿道内括约肌为随意肌
D. 尿道长 4~5cm, 直径约 0.6cm
E. 女性尿道易引起泌尿系统感染
26. 骨盆最小平面的范围, 前面是耻骨联合下缘, 两侧为坐骨棘, 后面为()
A. 第 4~5 骶椎间
B. 骶岬
C. 骶骨下端
D. 骶尾关节
E. 第 3~4 骶椎间
27. 关于骨盆底哪项是正确的()
A. 外层即盆膈
B. 中层即泌尿生殖膈
C. 分娩时不易损伤骨盆底
D. 中层由尿道、阴道及直肠贯通
E. 内层即浅筋膜与肌肉
28. 关于阴道壁, 下列哪项是错误的()
A. 阴道黏膜呈鲜红色
B. 阴道壁富有静脉丛
C. 局部受损伤易出血或形成血肿
D. 阴道黏膜受性激素影响有周期性变化
E. 阴道黏膜由复层鳞状上皮细胞覆盖
29. 关于女性生殖器淋巴, 下列哪项是错误的()
A. 盆腔淋巴分两组, 髂淋巴组与骶淋巴组
B. 外生殖器淋巴分深浅两部分
C. 腹股沟深淋巴结位于股管内
D. 腹股沟浅淋巴分上、下两组
E. 分外生殖器淋巴与盆腔淋巴
30. 左侧卵巢动脉可来自()
A. 左髂外动脉
B. 左肾动脉
C. 右髂内动脉
D. 右髂外动脉
E. 阴部内动脉
31. 女性, 55 岁, 闭经 3 年, 阴道流血 3 次入院。妇科检查: 宫颈Ⅲ度糜烂, 触之出血, 宫体后位略小, 双侧附件增厚。病理为子宫颈鳞状细胞癌, 宫颈癌好发部位是()

- A. 鳞状上皮
B. 柱状上皮
C. 子宫颈外口
D. 柱状上皮与鳞状上皮交界处
E. 以上均不正确
32. 女性, 30岁, 因与人打架不慎被踢伤外阴部, 以致半小时后外阴部出现肿物, 疼痛难忍, 不敢行走, 最可能的是()
- A. 前庭大腺囊肿
B. 阴蒂血肿
C. 阴阜血肿
D. 大阴唇血肿
E. 小阴唇血肿
33. 关于生殖器官各部分覆盖之上皮下述哪项是错误的()
- A. 输卵管内膜为单层高柱状上皮, 有纤毛
B. 子宫体内膜为受卵巢周期影响的腺上皮
C. 子宫峡部内膜与宫颈管内膜相同
D. 宫颈管内膜为高柱状上皮有许多腺体
E. 宫颈阴道部为鳞状上皮
34. 有关女性大阴唇的解剖以下哪项是错误的()
- A. 为靠大腿两内侧的一对隆起的皮肤皱襞, 起自阴阜止于会阴
B. 前端为子宫圆韧带的终点, 后端在会阴体前相融合
C. 外侧面与皮肤相同, 内侧面为湿润的黏膜
D. 有很厚的皮下脂肪, 内含丰富的血管淋巴和神经
E. 因其皮下脂肪厚, 故局部受伤时易发生血肿

● 多选题

1. 下列各项哪些动脉为阴部内动脉的分支()
- A. 阴唇动脉
B. 阴蒂动脉
C. 会阴动脉
D. 痔下动脉
E. 阴道动脉
2. 肛提肌有哪几部分组成()
- A. 球海绵体肌
B. 坐骨海绵体肌
C. 耻尾肌
D. 髂尾肌
E. 坐尾肌
3. 关于女性生殖器黏膜上皮, 正确的是()
- A. 阴道黏膜上皮为复层鳞状上皮
B. 子宫颈阴道部黏膜为复层鳞状上皮
C. 子宫颈管黏膜为单层高柱上皮
D. 子宫体黏膜为柱状上皮
E. 输卵管黏膜为复层高柱状上皮
4. 胎先露部下降程度的重要标志为()
- A. 胎头颅骨最低点
B. 坐骨切迹
C. 骶坐切迹
D. 耻骨弓
E. 坐骨棘水平
5. 子宫内膜的功能层指()

- A. 功能层靠近宫腔
- B. 表面 1/3
- C. 表面 2/3
- D. 表面 1/2
- E. 表面 2/2

● 病例串型最佳选择题(A3~A4 型题)

女性,30岁,两天前外阴部发现囊肿,前来就诊,检查:体温 38℃,在大阴唇的后部、前庭后方小阴唇与处女膜之间的沟内有一囊性肿物约 7cm×5cm×4cm 大小,表面红、肿、热、触痛明显,无波动感。

1. 最可能的诊断是()
 - A. 前庭大腺炎
 - B. 外阴囊肿
 - C. 前庭大腺囊肿
 - D. 外阴肿瘤
 - E. 前庭大腺脓肿
2. 上述病症最恰当的处理方法为()
 - A. 观察
 - B. 局部用药
 - C. 局部热敷
 - D. 囊肿切开引流术
 - E. 用抗生素控制感染
3. 下述处理哪项不正确()
 - A. 中药治疗
 - B. 卧床休息
 - C. 选用抗生素及磺胺药
 - D. 确定病原体
 - E. 切开引流术后不易复发

● 标准配伍型(B 型题)

- A. 子宫动脉
 - B. 阴道动脉
 - C. 阴部内动脉
 - D. 卵巢动脉
 - E. 肾动脉
1. 自腹主动脉分出的是()
 2. 自髂内动脉前干分出的是()
 - A. 坐骨海绵体肌
 - B. 球海绵体肌
 - C. 会阴浅横肌
 - D. 肛提肌
 - E. 肛门外括约肌
 3. 覆盖前庭球及前庭大腺,向后与肛门外括约肌互相交叉而混合的肌肉是()
 4. 自两侧坐骨结节内侧面中线会合于中心腱的肌肉是()
 - A. 会阴
 - B. 肛提肌
 - C. 会阴浅横肌
 - D. 盆底肌
 - E. 肛门外括约肌
 5. 分娩时应保护好哪部分,可避免造成哪些肌肉裂伤()

6. 经产妇,32岁,产后 45 天参加体力劳动,产后 5 个月发现阴道脱出肿物,并伴有排尿困难,来院就诊,妇科检查:阴道前后壁膨出部暴露于阴道口外,宫颈及部分宫体已脱出

于阴道口,以上损伤哪部分肌肉()

7. 经产妇,40岁,产后11个月,发现阴道内脱出一肿物,行走时不便,前来院就诊,经过妇科检查后,确诊为子宫脱垂Ⅱ度重,考虑损伤以上哪部分肌肉()

- | | |
|---------|--------|
| A. 大阴唇 | B. 小阴唇 |
| C. 阴阜 | D. 阴蒂 |
| E. 前庭大腺 | |

8. 当外阴部发生炎症时,最易形成囊肿的部位是()

9. 当外阴部受到损伤时,最易形成血肿的部位是()

【名词解释】

1. 会阴(perineum)
2. 卵巢(ovary)
3. 阴道(vagina)
4. 骨盆(pelvis)
5. 输尿管(ureter)
6. 阑尾(vermiform appendix)
7. 阴道前庭(vaginal vestibule)
8. 阴蒂(clitoris)
9. 肛提肌(levator ani muscle)
10. 盆膈(pelvic diaphragm)
11. 子宫(uterus)
12. 直肠(rectum)
13. 前庭大腺(major vestibular glands)
14. 阴阜(mons pubis)
15. 输卵管(Fallopian tube or oviduct)
16. 大阴唇(labium majus)

【填空题】

1. 女性内生殖器包括_____、_____、_____和_____。
2. 根据骨盆形状(按 Callwell 与 molly 分类)将骨盆分为_____、_____、_____和_____。
3. 阴道黏膜由_____上皮细胞所覆盖,受_____影响有_____变化。
4. 输卵管的全长为_____ cm,根据输卵管的形态由内向外可分为_____、_____及_____。
5. 子宫共有_____、_____、_____和_____ 4对韧带。
6. 女性内外生殖器官的血液供应主要来自_____、_____、_____及_____。
7. 骨盆的关节_____、_____和_____。
8. 子宫动脉为_____分支,在腹膜后沿骨盆侧壁向下前行,经_____、宫旁组

织到达子宫外侧,距宫颈内口水平约_____cm处_____至子宫侧缘。

9. 骨盆由_____、_____及_____组成。
10. 骨盆各部之间的韧带中有两对重要的韧带,一对是_____与坐骨结节之间的_____,另一对是骶、尾骨与_____之间的_____。
11. 子宫附件包括_____及_____。
12. 骨盆漏斗韧带中有_____动脉穿过。
13. 输卵管末端为_____部,开口于腹腔,有_____作用。
14. 骨盆倾斜度一般为_____,若角度过大,常影响胎头_____。
15. 子宫颈管黏膜上皮细胞呈_____状,黏膜层有许多腺体,能分泌_____性黏液。
16. 子宫体与子宫颈的比例,在婴儿期为_____,成年妇女为_____。

【判断题】

1. 卵巢表面有腹膜。()
2. 会阴体呈楔形,厚约3~4cm。()
3. 阴道前庭包括前庭球、前庭大腺、尿道口、阴道口、处女膜。()
4. 宫体与宫颈之间形成最狭窄部分称子宫峡部。()
5. 子宫肌层分3层;外层纵行,内层环行,中层交叉排列。()
6. 骨盆底中层为盆膈。()
7. 肛提肌由一对梭形肌腹组成。()
8. 根据骨盆形状可以分为4种类型。()
9. 盆腔淋巴分为髂淋巴组、腰淋巴组和骶前淋巴组。()
10. 支配外阴部的神经,主要是阴部神经。()
11. 骨盆腔呈前深后浅的形态。()
12. 腹股沟浅淋巴结分为上、下两组。()
13. 子宫内膜表面2/3能发生周期性变化。()
14. 卵巢动脉自腹主动脉分出。()
15. 根据输卵管的形态由外向内分为间质部、峡部、壶腹部及伞部。()
16. 宫骶韧带间接地维持子宫处于前倾位置。()
17. 经产妇的宫颈外口呈“一”字形。()
18. 耻骨两降支的前部相连构成耻骨弓。()

【问答题】

1. 子宫内膜分几层?有何特点。
2. 骨盆底有哪三层组织。

第二章

女性生殖系统生理

【选择题】

● 单选题

1. 下列哪项是青春期开始的重要标志()
 - A. 月经初潮
 - B. 卵泡开始发育
 - C. 第二性征发育
 - D. 周期性排卵
 - E. 第一性征发育
2. 哪项因素与阴道自净作用无关()
 - A. 宫颈黏液
 - B. 雌激素
 - C. 阴道内的乳酸杆菌
 - D. 阴道黏膜上皮糖原含量
 - E. 阴道 pH 值
3. 下列哪种检查方法估计排卵日期最简便()
 - A. 孕激素试验
 - B. 尿孕二醇测定
 - C. 子宫内膜活检
 - D. 放射免疫法测血浆中 LH
 - E. 基础体温测定
4. 有关黄体形成,错误的是()
 - A. 卵泡内膜细胞形成卵泡膜黄体细胞
 - B. 正常月经周期第 22 天左右黄体发育达最高峰,为成熟黄体
 - C. 如果排卵后受精 4 周黄体退变形成白体
 - D. 如卵子未受精,排卵后 9~10 天黄体开始萎缩
 - E. 成熟黄体直径一般为 1~2cm
5. 关于黄体的萎缩下列哪项是正确的()
 - A. 4~5 日
 - B. 9~10 日
 - C. 11~12 日
 - D. 13~14 日
 - E. 15~16 日
6. 黄体体积达最高峰时应为月经周期第几日()
 - A. 第 19 日
 - B. 第 20 日
 - C. 第 21 日
 - D. 第 22 日左右