

“医考过”中医考试丛书



2007
版

中医执业医师 资格考试模拟试卷

● 案例模拟，
紧扣大纲，
强化训练。

● 考前冲刺，
查漏补缺，
从容应考。

1 权威编写团队

3 完整模拟试卷

10 把握得分技巧

北京中医药大学基础医学院

钱会南 主编
李峰

北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中医执业助理医师资格考试模拟试题/钱会南, 李峰主编. —北京: 北京科学技术出版社, 2007.6

(“医考过”中医考试丛书)

ISBN 978-7-5304-3545-8

I. 中… II. ①钱… ②李… III. 中医—资格考试—习题 IV. R2-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第079828号

中医执业助理医师资格考试模拟试题

主 编 钱会南 李 峰

责任编辑 赵 晶

设计编辑 韩玉子

出版人 李国栋

社 址 北京科学技术出版社

社 址 北京市宣武门外大街10号

邮政编码 100011 0-6380191(总编辑)

电话传真 0086-10-63801922

网 址 www.bjstp.com

印 刷 北京科印书局

开 本 787mm×1092mm 1/16

字 数 80千

印 次 2007年6月第1版

版 次 2007年6月第1版第1刷

ISBN 978-7-5304-3545-8

本书由北京中医药大学基础医学院具有丰富教学与命题经验的专家, 紧扣最新大纲, 按照国家执业

医师资格考试的实战要求编写而成。本书包括3套完整的模拟试卷。每套模拟试卷严格按照考试的题型、结构及难度命题, 并附有答案和答题卡。

本书适合参加国家执业医师资格考试的中医执业助理医师考前冲刺使用。

责任编辑: 赵 晶
责任校对: 黄立峰

ISBN 978-7-5304-3545-8

9 787530 435458 >

定价: 50.00元(全卷两册)

241 - 1

第 1 单元

2007 年中医执业医师资格考试模拟试卷 (一)

(医学综合笔试部分)

中医执业助理医师

(报考类别代码: 241)

考试日期: 2007 年 9 月 22 日

考试时间: 150 分钟

考生姓名: _____

准考证号: _____

北京科学技术出版社

编写人员名单

主 编 钱会南

(北京中医药大学基础医学院 教授 博士生导师)

李 峰

(北京中医药大学基础医学院副院长 教授 博士生导师)

副主编 马燕东 付红波 宋晓宇 杨毅玲

马小顺

编 委 (按姓氏笔画排列)

丁 洋 毛林进 王艳莉 白克江

宋月晗 张亚艳 张绍开 张莉芳

李 娟 杨 舒 杨新宇 苏 俊

陈庆勇 陈 静 周 俭 官淑敏

徐 薇 高 琳

A1 型题 (1 ~ 112 题)

答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 阴阳之中复有阴阳，则阴中之阴的时间是 ()
 - A. 前半夜
 - B. 后半夜
 - C. 上午
 - D. 下午
 - E. 以上都不是
2. 五官中属“木”的是 ()
 - A. 目
 - B. 舌
 - C. 口
 - D. 鼻
 - E. 耳
3. 藏象学说的中心是 ()
 - A. 神
 - B. 气血津液
 - C. 经络
 - D. 六腑
 - E. 五脏
4. 体现精血同源的两脏是 ()
 - A. 肝与脾
 - B. 脾与肺
 - C. 脾与肾
 - D. 肾与肝
 - E. 肺与肝
5. “利小便所以实大便”的理论依据是 ()
 - A. 肾司二便，故利小便可以实大便
 - B. 中气不足，洩便为之便，故二便相关
 - C. 淡渗利水，则脾阳得健而大便实
 - D. 二便之源均来自于小肠的泌别清浊
 - E. 利小便的药物本身具有止泻的作用
6. 下列不是“女子胞”别名的是 ()
 - A. 胞宫
 - B. 子宫
 - C. 血脏
 - D. 子门
 - E. 子处
7. 不属于气的运动失常的是 ()
 - A. 气滞
 - B. 气逆
 - C. 气化
 - D. 气陷
 - E. 气闭
8. 手太阴肺经在示指端与哪条经脉交接 ()
 - A. 手阳明大肠经
 - B. 手少阳三焦经
 - C. 手厥阴心包经
 - D. 手太阳小肠经
 - E. 手少阴心经
9. 临床见四肢困倦、胸闷呕恶、大便溏泄不爽等症，多是由于哪种邪气导致 ()
 - A. 暑邪
 - B. 风邪
 - C. 燥邪
 - D. 火邪
 - E. 寒邪
10. 下列哪项多为假象的表现 ()
 - A. 潮热
 - B. 舌苔黄

- C. 四肢厥冷
D. 腹痛拒按
E. 大便秘结
11. 下列不属于治则范畴的是 ()
A. 调摄精神
B. 治病求本
C. 调整阴阳
D. 活血化痰
E. 扶正祛邪
12. 四肢厥逆, 常属于 ()
A. 湿热蕴蒸
B. 亡阴
C. 亡阳
D. 上焦有热
E. 暑伤气津
13. 外伤引起的头痛, 其疼痛特点是 ()
A. 胀痛
B. 绞痛
C. 隐痛
D. 刺痛
E. 空痛
14. 下列哪项常表现为渐发耳鸣, 声小如闻蝉鸣, 按之鸣声减轻或暂止 ()
A. 肝风内动
B. 肝胆火盛
C. 肝肾阴亏
D. 气血亏损
E. 肝经火热
15. “除中”是指 ()
A. 久病之人, 不能进食
B. 久病中焦脾胃虚弱
C. 胃脘部痞满, 按之则舒
D. 久病之人, 本不能食, 突然暴食
E. 口渴欲漱水但不欲咽
16. 气化无力, 水湿内停者, 可出现 ()
A. 小便短少而清
B. 小便多而清
C. 小便黄赤而艰涩
D. 小便频数而短少
E. 小便短赤而急迫
17. 表现为神识不清, 语无伦次, 声高有力的是 ()
A. 错语
B. 独语
C. 谵语
D. 呓语
E. 郑声
18. 以下哪项不属病态呼吸的临床表现 ()
A. 上气
B. 哮喘
C. 少气
D. 打鼾
E. 短气
19. 下列何种脉象可出现于正常人 ()
A. 沉脉
B. 缓脉
C. 革脉
D. 涩脉
E. 实脉
20. 脉沉细而应指无力为 ()
A. 濡脉
B. 微脉
C. 细脉
D. 弱脉
E. 虚脉
21. 极细极软, 按之欲绝, 若有若无的脉象是 ()
A. 伏脉
B. 微脉
C. 虚脉
D. 动脉
E. 弱脉

22. 滑数脉主病常为 ()
- 痰热痰火
 - 肝火挟痰
 - 气分热盛
 - 肝郁化火
 - 素体痰盛, 又感外邪
23. 表邪入里的证候除……外都可见 ()
- 不恶寒而反恶热
 - 烦渴多饮
 - 舌红苔黄
 - 尿赤
 - 微恶寒
24. 症见发热恶寒, 头痛无汗, 口渴, 烦躁不安, 苔白糙而干, 此属 ()
- 表邪入里
 - 表寒里热
 - 表实里虚
 - 表虚里实
 - 表里俱热
25. 症见面色无华, 头晕目花, 心悸, 肢麻, 失眠, 舌淡脉细, 此是 ()
- 气虚
 - 津液不足
 - 血虚
 - 阳虚
 - 阴虚
26. 表情淡漠, 闷闷不乐, 喃喃自语, 举止失常, 舌苔白腻, 多属 ()
- 肝气横逆
 - 痰火扰心
 - 痰迷心窍
 - 心血瘀阻
 - 胆郁痰扰
27. 治疗外感风寒, 头痛鼻塞或鼻渊头痛等证应首选 ()
- 荆芥
 - 藜本
 - 辛夷
 - 羌活
 - 独活
28. 热病烦渴, 小便涩痛, 应选用 ()
- 芦根、天花粉
 - 芦根、淡竹叶
 - 知母、淡竹叶
 - 芦根、知母
 - 知母、天花粉
29. 被前人称为“疮家圣药”的药物是 ()
- 白芷
 - 连翘
 - 天花粉
 - 红藤
 - 金银花
30. 既清虚热又退实热, 并可解暑截疟的是 ()
- 青蒿
 - 地骨皮
 - 白薇
 - 银柴胡
 - 胡黄连
31. 既能祛风湿, 又擅长通行十二经脉的药物是 ()
- 独活
 - 威灵仙
 - 秦艽
 - 防己
 - 木瓜
32. 能祛风湿、补肝肾而安胎的药物是 ()
- 续断
 - 杜仲
 - 狗脊
 - 桑寄生

- E. 仙灵脾
33. 善于消积化石、固精缩尿止遗的药物是 ()
- A. 鸡内金
B. 神曲
C. 麦芽
D. 莱菔子
E. 山楂
34. 既能凉血止血又能解毒，多用于吐血、咯血的药物是 ()
- A. 大蓟
B. 小蓟
C. 侧柏叶
D. 地榆
E. 白及
35. 血瘀、血虚之证均可选用的药物是 ()
- A. 鸡血藤
B. 益母草
C. 川芎
D. 桃仁
E. 五灵脂
36. 马钱子的使用方法为 ()
- A. 久煎
B. 后下
C. 入丸散
D. 包煎
E. 先煎
37. 肝肾亏虚，胎动不安，腰膝酸软无力，治疗当选下列何种药物 ()
- A. 五加皮
B. 黄芩
C. 杜仲
D. 狗脊
E. 白术
38. 热病气阴两伤，烦倦，口渴者，应首选 ()
- A. 石斛
B. 太子参
C. 西洋参
D. 山药
E. 麦冬
39. 治气虚下陷、脱肛、子宫脱垂等证，黄芪最宜配伍 ()
- A. 人参、白术
B. 葛根、柴胡
C. 麻黄、细辛
D. 辛夷、苍耳子
E. 柴胡、升麻
40. 外用杀虫止痒，内服壮阳通便的药物是 ()
- A. 雄黄
B. 硫黄
C. 杜仲
D. 巴戟天
E. 蛇床子
41. 既能破血行气调经止痛，又能散风寒湿治疗上肢痹痛的药物是 ()
- A. 郁金
B. 没药
C. 姜黄
D. 红花
E. 鸡血藤
42. 属于桂枝汤的组成药物的是 ()
- A. 麻黄、杏仁
B. 芍药、五味子
C. 芍药、甘草
D. 荆芥、防风
E. 麻黄、细辛
43. 最适宜使用麻杏甘石汤进行治疗的是 ()
- A. 发热喘急，口渴，脉数
B. 发热头痛，苔燥，脉浮
C. 发热恶寒，喉痒咳嗽，苔白，脉浮

- D. 恶寒无汗，咳嗽痰白，苔白滑，脉浮
E. 发热咳嗽，痰黄黏稠，舌红苔腻，脉滑散
44. 治疗湿热瘀滞之肠痈初起，宜选用（ ）
A. 芍药汤
B. 仙方活命饮
C. 痛泻要方
D. 大黄牡丹汤
E. 白头翁汤
45. 不属于麻子仁丸功用的是（ ）
A. 泻热
B. 润肠
C. 行气
D. 益肾
E. 养阴
46. 十枣汤中除用十枚大枣外，还含有（ ）
A. 甘遂、大戟、大黄
B. 甘遂、大戟、芫花
C. 大戟、芫花、甘草
D. 甘遂、大黄、甘草
E. 甘遂、大黄、芒硝
47. 四逆散中具有“调和肝脾、和里缓急”功用的配伍药对是（ ）
A. 柴胡与枳实
B. 枳实与甘草
C. 柴胡与甘草
D. 枳实与芍药
E. 芍药与甘草
48. 半夏在竹叶石膏汤中的作用是（ ）
A. 化痰
B. 散结
C. 燥湿
D. 醒脾
E. 降逆
49. 下列各方中，柴胡的功效不涉及疏肝解郁的是（ ）
A. 四逆散
B. 小柴胡汤
C. 逍遥散
D. 普济消毒饮
E. 血府逐瘀汤
50. 龙胆泻肝汤中兼顾肝体阴用阳之性的药物配伍是（ ）
A. 龙胆草、当归、生地黄
B. 龙胆草、柴胡、当归
C. 柴胡、当归、生地黄
D. 柴胡、当归、芍药
E. 川楝子、生地黄、芍药
51. 清胃散中不含有的药物是（ ）
A. 生地黄
B. 当归
C. 牡丹皮
D. 升麻
E. 黄芩
52. 芍药散与白头翁汤组成中均含有的药物是（ ）
A. 黄连
B. 黄芩
C. 黄柏
D. 大黄
E. 甘草
53. 清暑益气汤的功用除清暑益气外，还具有（ ）
A. 养阴生津
B. 敛阴止汗
C. 益气复脉
D. 降逆止呕
E. 宁心安神
54. 小建中汤中具有酸甘化阴作用的药物是（ ）
A. 饴糖、桂枝
B. 饴糖、芍药

- C. 芍药、桂枝
D. 生姜、大枣
E. 甘草、桂枝
55. 用于治疗血痹，肌肤麻木不仁的方剂是（ ）
A. 当归补血汤
B. 黄芪桂枝五物汤
C. 独活寄生汤
D. 温经汤
E. 阳和汤
56. 下列各项中，能够补气升阳，甘温除热的代表方是（ ）
A. 小柴胡汤
B. 参苓白术散
C. 补中益气汤
D. 四君子汤
E. 归脾汤
57. 具有益气生津，敛阴止汗功用的方剂是（ ）
A. 当归六黄汤
B. 清暑益气汤
C. 生脉散
D. 百合固金汤
E. 玉屏风散
58. 现代医学人道主义新特点体现在（ ）
A. 动机和效果不仅包括自然的人，还包括社会的人
B. 赢得人们对医学的信赖
C. 重视生命的自然属性，忽视生命的社会属性
D. 以上均正确
E. 以上均错误
59. 我国社会主义医学伦理学的基本原则是（ ）
A. 尽职尽责，不图名利
B. 一视同仁，言行庄重
C. 救死扶伤，实行革命的人道主义
D. 救死扶伤，服务患者
E. 活人为务，重义轻利
60. 主动安乐死是指（ ）
A. 放弃抢救濒死者生命的措施，任其死亡
B. 患者自己结束痛苦的生命
C. 对濒死患者给予适当的维持治疗，使其安然死亡
D. 对治愈无望的患者，利用人工干预的医学方法加速其死亡
E. 以上均不正确
61. 下属哪类患者对治疗措施有自主选择医疗的权利（ ）
A. 年龄在10周岁以下的患者
B. 意识清醒的成年人
C. 处于昏迷状态的患者
D. 发作期的精神病患者
E. 以上患者均有自主选择权
62. 关于法律制裁，下面哪种说法是错误的（ ）
A. 是指由特定国家机关对违法者依其法律责任而实施的惩罚措施
B. 法律制裁与法律责任有密切的联系
C. 法律制裁具有强制性
D. 有法律责任必有法律制裁
E. 法律制裁是承担法律责任的重要方式
63. 属于卫生法律的是（ ）
A. 医疗事故处理办法
B. 医疗机构管理条例
C. 中药品种管理条例
D. 中华人民共和国药品管理法
E. 麻醉药品管理办法
64. 下列哪种情况需要承担刑事责任（ ）
A. 在诊疗过程中出现三级医疗技术

事故

- B. 在执业活动中未经患者或者家属同意, 对患者进行实验性临床医疗的
- C. 发现丙类传染病患者未按规定报告的
- D. 发生自然灾害, 不服从卫生行政部门调遣的
- E. 在诊疗过程中出现一级医疗事故事故的

65. 胸痛于咳嗽和深呼吸时加剧多见于 ()

- A. 心绞痛
- B. 心包炎
- C. 心内膜炎
- D. 干性胸膜炎
- E. 食管炎

66. 下列哪项不适用于浅部触诊法 ()

- A. 腹腔深部包块的检查
- B. 胃肠病变的检查
- C. 腹腔积液的检查
- D. 浅部动脉的检查
- E. 以上都不是

67. 共济失调步态最常见于 ()

- A. 佝偻病
- B. 脊髓结核病
- C. 腓总神经麻痹
- D. 大骨节病
- E. 以上都不是

68. 小颌畸形是指 ()

- A. 小儿囟门在 18~24 个月内闭合
- B. 小儿囟门在 12~18 个月内闭合
- C. 小儿囟门在 12 个月内闭合伴有智力发育障碍
- D. 小儿囟门在 12~18 个月内闭合不伴有智力发育障碍
- E. 小儿囟门在 18 个月闭合伴有智力发育障碍

69. 关于心前区隆起描述不正确的是 ()

- A. 是指胸骨下段与胸骨左缘第 3~5 肋间隙的局部隆起
- B. 只见于患有先天性心脏的儿童
- C. 可见于成人有大量心包积液时
- D. 叩诊肩胛间区时, 板指可与脊柱垂直
- E. 以上都不是

70. 对胃型和蠕动波叙述正确的一项是 ()

- A. 正常人一般都可看到
- B. 多见于极度消瘦的患者
- C. 可见于幽门梗阻
- D. 可见于腹壁松弛且菲薄的多产妇
- E. 以上都不是

71. 关于红细胞增多症的描述不正确的是 ()

- A. 原发性真性红细胞增多症主要见于骨髓增殖性疾病
- B. 原发性真性红细胞增多症的特点为红细胞持续性显著增多
- C. 原发性真性红细胞增多症的白细胞和血小板数量无明显变化
- D. 原发性真性红细胞增多症全身总血容量增加
- E. 继发性红细胞增多症多因缺氧红细胞生成素代偿性增加所致

72. 下列哪项不会导致血糖增高 ()

- A. 甲状腺功能亢进
- B. 肾上腺功能亢进
- C. 胰岛素使用过量
- D. 颅内高压
- E. 糖尿病

73. 阻塞性黄疸可出现 ()

- A. 水样便
- B. 黏液脓血便
- C. 柏油样便

- D. 灰白色便
E. 米泔水样便
74. 关于 X 线诊断应用的基本原理叙述不正确的是 ()
A. X 线具有穿透性
B. X 线具有荧光和感光效应
C. 人体组织之间有密度和厚度的差异
D. 密度高的物体吸收 X 线多
E. 厚度厚的物体吸收 X 线少
75. 下列哪项内容不属于一般项目 ()
A. 姓名、性别
B. 年龄、婚姻
C. 民族、籍贯
D. 出生地、住址
E. 家族史
76. 心肌梗死时, 心电图上常会出现 ()
A. 异常 Q 波
B. P-R 间期延长
C. S-T 段下移
D. T 波轻度增高
E. 以上都不是
77. 下列哪项是脑脊液检查的禁忌证 ()
A. 颅内压明显增高、显著视盘水肿者
B. 有脑膜刺激征者
C. 有剧烈头痛、昏迷、抽搐及瘫痪等
症状或体征而原因不明者
D. 某些诊断不明确神经系统疾病
E. 怀疑有颅内出血者
78. 下列叙述正确的一项是 ()
A. 如患者抗链球菌溶血素“O”阳性,
可明确诊断为风湿热
B. 类风湿因子阳性可见于部分健康人
C. 三期梅毒患者梅毒血清学检查阳性
率最高
D. 肥达反应阳性可明确诊断伤寒
E. 以上都不是
79. 中性粒细胞出现核左移可见于哪种情况 ()
A. 急性化脓性感染
B. 巨幼细胞贫血
C. 应用阿糖胞苷后
D. 造血功能衰退
E. 以上都不是
80. 对于神经反射检查叙述正确的是 ()
A. 双侧提睾反射减弱或消失见于腰
髓₁₋₂节病损
B. 正常肱二头肌反射为肱二头肌收缩,
前臂快速屈曲
C. 桡骨骨膜反射正常反应为前臂旋前、
屈肘
D. 膝腱反射正常反应为小腿伸展
E. 锥体束损害时可出现间断性的阵挛
81. 急性气管-支气管炎的临床表现不正确
的是 ()
A. 主要表现为咳嗽、咯痰
B. 全身症状不严重
C. 常有明显的流行性发病
D. 双肺可闻及散在干、湿啰音
E. 白细胞计数和分类多无明显改变
82. 慢性支气管炎急性期最重要的治疗措施
是 ()
A. 镇咳、祛痰
B. 抗感染
C. 解痉、平喘
D. 气雾疗法
E. 糖皮质激素治疗
83. 下列止喘药物中, 有咽部不适、声音嘶
哑及念珠菌感染等局部不良反应的是
()
A. 沙丁胺醇气雾剂
B. 特布他林气雾剂

- C. 二丙酸倍氯米松气雾剂
D. 溴化异丙托品气雾剂
E. 沙美特罗气雾剂
84. 下列哪种不是慢性支气管炎急性发作时的常见细菌 ()
A. 肺炎链球菌
B. 卡他莫拉菌
C. 甲型链球菌
D. 铜绿假单胞杆菌
E. 流感嗜血杆菌
85. 容易并发脓气胸的肺炎是 ()
A. 金黄色葡萄球菌肺炎
B. 克雷白杆菌肺炎
C. 支原体肺炎
D. 肺炎链球菌肺炎
E. 病毒性肺炎
86. 下列哪项是慢性纤维空洞型肺结核的 X 线表现 ()
A. 大小不等、边缘模糊的云絮状阴影
B. 厚壁空洞伴胸膜增厚, 肺纹呈垂柳状阴影
C. 均匀一致的阴影, 外侧上缘呈弧状升高
D. 淋巴管增粗, 肺门淋巴结肿大
E. 双肺布满边缘整齐、大小在 1~3mm 的致密阴影
87. 有关 PPD 试验下列说法正确的是 ()
A. 要在 48 小时内判断
B. 要在 48~72 小时内判断
C. 局部硬结及水疱直径小于 5mm 为阴性
D. 局部硬结直径 10mm 以上者为强阳性
E. 注射部位在左前臂内侧中下 1/3 交界处
88. 洋地黄中毒最容易引起哪种心电图改变

- ()
A. ST-T 鱼钩样改变
B. 室性期前收缩二联律
C. 窦房传导阻滞
D. 房室传导阻滞
E. 房性期前收缩
89. 急性心力衰竭时的给氧原则是 ()
A. 间断低流量给氧
B. 持续低流量给氧
C. 间断高流量给氧
D. 持续高流量给氧
E. 生理盐水超声雾化后给氧
90. 关于风湿热的治疗说法错误的是 ()
A. 无明显心脏受累表现者, 血沉正常后即可起床活动
B. 给予青霉素抗感染治疗
C. 水杨酸制剂对心脏瓣膜病变的形成有明显预防作用
D. 糖皮质激素用于有心脏损害、不能耐受阿司匹林者
E. 水杨酸制剂对风湿热的退热、消除关节的炎症和恢复血沉的正常均有较好作用
91. 风心病中最易引起晕厥的是 ()
A. 主动脉狭窄
B. 主动脉关闭不全
C. 二尖瓣狭窄
D. 二尖瓣关闭不全
E. 三尖瓣关闭不全
92. 高血压 2 级伴有 3 个危险因素, 而无靶器官损害及相关临床症状者属 ()
A. 低度危险组
B. 重度危险组
C. 高度危险组
D. 极高危险组
E. 以上均不是

93. 关于血管紧张素转换酶抑制剂说法错误的是 ()

- A. 抑制醛固酮的分泌
- B. 逆转心血管重构
- C. 可改善胰岛素抵抗
- D. 对糖、脂肪代谢有不良作用
- E. 高血钾者禁用

94. 下列哪种降压药是 β - 受体阻滞剂 ()

- A. 非洛地平
- B. 伊那普利
- C. 卡维地洛
- D. 特拉唑嗪
- E. 伊贝沙坦

95. 典型心绞痛含服硝酸甘油后的起效时间是 ()

- A. 1~2 分钟
- B. 3~5 分钟
- C. 10 分钟
- D. 5 分钟
- E. 30 分钟

96. 急性心肌梗死出现频发室性早搏, 有时形成短阵室速, 治疗的首选药物是 ()

- A. 钙离子拮抗剂
- B. 利多卡因
- C. 奎尼丁
- D. 维拉帕米
- E. β - 受体阻滞剂

97. 下列哪项不是病原体侵入人体后的即刻表现 ()

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 病原体携带状态
- C. 隐性感染
- D. 显性感染
- E. 感染进一步加重

98. 下列哪种肝炎病毒基因组为 DNA

()

- A. 甲型肝炎
- B. 乙型肝炎
- C. 丙型肝炎
- D. 丁型肝炎
- E. 戊型肝炎

99. 慢性乙型肝炎 (中度) 的治疗原则不包括下列哪项 ()

- A. 禁酒、避免劳累、适当休息
- B. 可用保肝、降酶、退黄药物
- C. 应用免疫调节药物
- D. 抗病毒治疗
- E. 注射乙肝疫苗

100. 一般不用于艾滋病治疗的药物是 ()

- A. 齐多夫定
- B. 英地那韦
- C. 双脱氧胸苷
- D. 利巴韦林
- E. α - 干扰素

101. 传染性非典型肺炎最主要治疗措施为 ()

- A. 抗菌治疗
- B. 抗病毒治疗
- C. 激素治疗
- D. 对症、支持为主的综合治疗
- E. 中医药治疗

102. 普通型流脑的脑脊液变化是 ()

- A. 细胞数升高, 蛋白正常, 糖降低
- B. 细胞数升高, 蛋白升高, 糖降低
- C. 细胞数升高, 蛋白升高, 糖正常
- D. 细胞数升高, 蛋白升高, 糖升高
- E. 细胞数升高, 蛋白正常, 糖正常

103. 预防细菌性痢疾综合措施的重点为 ()

- A. 切断传播途径
- B. 发现并处理带菌者

- C. 隔离及治疗患者
D. 服用痢疾活菌苗
E. 流行季节预防投药
104. 霍乱在我国的流行特点为 ()
A. 地方性流行
B. 外来性传染病
C. 男多于女
D. 多于冬春季发病
E. 城市多见于农村
105. 霍乱的最主要治疗方法是 ()
A. 补液
B. 补充碱性药物
C. 补充氯化钾
D. 口服多西环素
E. 口服 TMP - SMZ
106. 下列叙述正确的是 ()
A. 霍乱弧菌对热、干燥、酸及一般消毒剂均敏感
B. 在正常胃酸中霍乱弧菌仅能生存 10 分钟
C. 一般在河水、海水和井水中, 埃尔托生物型霍乱弧菌可生存 4~6 周
D. 在合适的外环境中霍乱弧菌至少可存活 6 个月
E. 当寄生在海藻或甲壳类动物时, 其存活时间会明显缩短
107. 保护易感人群所采用的各种免疫措施中最重要的是 ()
A. 转移因子等免疫激活剂
B. 减毒疫苗或活疫苗
C. 丙种球蛋白
D. 高价免疫球蛋白
E. 中草药预防
108. 下列哪项不属于流行性出血热少尿的原因 ()
A. 有效循环血量减少, 肾血流量减少
B. 肾间质水肿和出血
C. 下尿路阻塞, 尿液排出障碍
D. 尿蛋白和管型阻塞肾小管
E. 肾素、血管紧张素 II 的激活
109. 病毒性肝炎的临床类型不包括 ()
A. 急性肝炎
B. 慢性肝炎
C. 重型肝炎
D. 淤胆型肝炎
E. 药物性肝损害
110. 急性乙型肝炎血清中最迟出现的标志物是 ()
A. HBsAg
B. HBeAg
C. 抗 - HBs
D. 抗 - HBe
E. 抗 - HBc
111. 甲型病毒性肝炎的隔离期一般为 ()
A. 自发病之日起 3 周
B. 急性期症状消失后
C. 症状消失后 5 天
D. 隔离至体温正常
E. 症状消失后 3 天
112. 对“干性霍乱”的描述不准确的是 ()
A. 病例罕见
B. 以休克为首发症状
C. 泻吐显著
D. 病情发展迅猛
E. 多死于循环衰竭
108. 下列哪项不属于流行性出血热少尿的

A2 型题 (113 ~ 140 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

113. 某女,42岁,3年来月经量多,每次行经7~8天,经色先红后淡,经后小腹隐痛,面色淡白无华,纳少,稍多食即感脐腹胀满,气短,神疲乏力,大便正常,舌淡苔薄白,脉沉细无力,临床诊断最可能是 ()
- A. 气血两虚证
B. 脾不统血证
C. 心脾两虚证
D. 冲任虚寒证
E. 脾肾气虚证
114. 某男,50岁,患“慢性肾炎”7年,今年入冬以来,浮肿明显,下肢肿胀之凹陷不起,腰膝发冷,小便不利,面色晄白,神疲倦卧,畏寒肢冷,大便稀,舌淡胖有齿痕,苔白润,脉沉迟,尺部尤甚。辨证为 ()
- A. 脾气虚
B. 脾阳虚
C. 肾气不固
D. 肾阳虚
E. 肾不纳气
115. 某男,43岁,入冬后,肢体关节游走窜痛,沉重,苔薄白,脉弦缓。临床诊断最可能是 ()
- A. 表湿证
B. 里湿证
C. 风湿证
D. 寒湿证
E. 湿热证
116. 患者,女,55岁,发热,腹痛,里急后重,下痢脓血,赤多白少,舌红,苔黄腻,脉濡数。用药当首选 ()
- A. 赤芍
B. 白头翁
C. 木香
D. 升麻
E. 紫草
117. 患者,女,23岁。左膝关节红肿疼痛,活动受限,舌质红,脉数。用药宜首选 ()
- A. 鸡血藤
B. 络石藤
C. 首乌藤
D. 独活
E. 威灵仙
118. 患者,男,40岁。心悸而烦,失眠多梦,伴有梦遗,舌红苔少,脉细数。用药宜首选 ()
- A. 五味子、乌梅
B. 龙骨、牡蛎
C. 石决明、珍珠母
D. 紫贝齿、代赭石
E. 琥珀、合欢皮
119. 寒热如疟,寒轻热重,口苦胸闷,吐酸苦水或呕黄涎而黏,甚则干呕呃逆,胸胁胀满,舌红苔白,脉数而右滑左弦者。治宜选用 ()
- A. 温胆汤
B. 小柴胡汤
C. 逍遥散
D. 蒿芩清胆汤

- E. 败毒散
120. 患者，女，32岁，两胁作痛，头痛目眩，月经不调，乳房作胀，神疲食少，脉弦而虚，治宜选用（ ）
- A. 四逆散
B. 当归补血汤
C. 逍遥散
D. 一贯煎
E. 痛泻要方
121. 治疗气喘咳嗽，皮肤蒸热，日晡尤甚，舌红苔黄，脉细数者，最适宜的方剂是（ ）
- A. 小青龙汤
B. 麻黄杏仁甘草石膏汤
C. 泻白散
D. 止嗽散
E. 葶茎汤
122. 患者腹痛3个月，时有发作，喜温喜按，按之痛减，舌淡苔白，脉细弦而缓，治疗的苔选方剂为（ ）
- A. 理中汤
B. 小建中汤
C. 吴茱萸汤
D. 痛泻要方
E. 当归四逆汤
123. 某患者因颈椎病人院，医生劝其手术治疗，患者听从医生意见进行了手术。之后该患者了解到自己的病情无需进行手术治疗，手术不仅花费了大量金钱，而且对自己的身体也有不利影响，遂找到医院理论。对该医生的行为下列说法不正确的是（ ）
- A. 违反了临床诊疗手术中的道德要求
B. 医生征求了患者的意见所以进行手术是符合要求的
C. 该做法违反了手术必须是确实需要的道德要求

- D. 医生应该合理选择手术治疗
E. 以上说法均不正确
124. 民事责任构成要件不包括下列哪项（ ）
- A. 必须是不作为的违法行为
B. 行为的违法性
C. 损害事实的客观存在
D. 行为人的过错
E. 违法行为和损害事实之间有因果关系
125. 下面不属于疏忽大意过失的是（ ）
- A. 行为人擅离职守
B. 行为人擅自做无指征和有禁忌证的手术
C. 行为人虽然预见到自己的行为可能给患者导致损害后果，但是轻信自己的技术能够避免，因而导致判断上和行为上的失误，致使对患者的危害结果发生
D. 推诿患者
E. 对患者的检查、处理漫不经心，马虎草率
126. 老年男性，近1个月来时常出现胸前区针刺样疼痛，每次持续约15分钟，多于劳累或情绪激动时发作，与呼吸无关，必须首先进行问诊的项目是（ ）
- A. 疼痛缓解的方式
B. 疼痛的部位
C. 有无呼吸困难
D. 伴随症状
E. 有无外伤史
127. 女性19岁，视诊可见甲状腺肿大且能触及，质软，边缘光滑且在胸锁乳突肌以内，临床上应诊断为（ ）
- A. I度肿大
B. II度肿大