

全国卫生专业技术资格考试丛书

北京大学护理学院 编写

护理学专业[主管护师] 资格考试全真模拟及精解

2007年

- 紧扣全国卫生专业技术资格考试大纲
- 内容涵盖资格考试主要考点
- 专家解析，全真模拟

免费赠送20元
上网学习充值卡



北京大学医学出版社

全国卫生专业技术资格考试丛书

**2007 年护理学专业（主管护师）
资格考试全真模拟及精解**

北京大学护理学院 编写

北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业 (主管护师) 资格考试全真模拟及精解/
北京大学护理学院编写. —北京: 北京大学医学出版社,
2007.2

ISBN 978-7-81116-223-3

I. 护… II. 北… III. 护理学—护士—资格考核—
解题

IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 001661 号

护理学专业 (主管护师) 资格考试全真模拟及精解

编 写: 北京大学护理学院

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 北京东方圣雅印刷有限公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 许 云 药 勇 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16 印张: 20 字数: 506 千字

版 次: 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷 印数: 1-10000 册

书 号: ISBN 978-7-81116-223-3

定 价: 32.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

为配合全国卫生专业技术护理学专业（主管护师）资格考试，帮助考生在有限的时间内掌握考试要点，提高复习效率，北京大学护理学院组织相关学科专家，根据护理学专业（主管护师）考试大纲，共同编写了这套考试辅导丛书。本套书共分三本：

《护理学专业（主管护师）资格考试应试指导》

内容精练，重点突出，可帮助考生在考前高效快速地掌握考试重点和难点。

《护理学专业（主管护师）资格考试习题集》

题量大，内容丰富，涵盖资格考试主要考点，是考前强化训练的必备用书。

《护理学专业（主管护师）资格考试全真模拟及精解》

全方位模拟考试真题，并由专家解析，是考前冲刺的最佳选择。

编 者

目 录

护理学专业（主管护师）资格考试全真模拟试卷（一）	（1）
全真模拟试卷（一）答案及精解	（89）
护理学专业（主管护师）资格考试全真模拟试卷（二）	（157）
全真模拟试卷（二）答案及精解	（245）

护理学专业（主管护师） 资格考试全真模拟试卷（一）

- 一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑
1. 下列关于左、右主支气管的描述中错误的是
 - A. 气管在隆凸处分为左、右主支气管
 - B. 右主支气管较左主支气管粗、短、直
 - C. 进行气管插管时，若插入过深时易误插入右主支气管
 - D. 异物易吸入左主支气管
 - E. 肺脓肿好发于右肺与右主支气管的结构特点有关
 2. 下列哪项是慢性支气管炎急性发作的最常见原因
 - A. 吸烟
 - B. 感染
 - C. 大气污染
 - D. 气温下降
 - E. 过敏
 3. 循环系统的组成包括
 - A. 心脏、血管和血液
 - B. 心脏和血管
 - C. 心脏、血管和调节血液循环的神经
 - D. 心脏、血管和调节血液循环的体液
 - E. 心脏、血管和调节血液循环的神经、体液
 4. 心脏的血液供应主要来自于
 - A. 左冠状动脉
 - B. 右冠状动脉
 - C. 冠状动脉
 - D. 肺动脉
 - E. 肺静脉
 5. 交感神经对血液循环的调节不正确的是
 - A. 交感神经兴奋时使心率加快
 - B. 交感神经兴奋时使心肌收缩力增强
 - C. 交感神经兴奋 α 、 β 受体调节血液循环
 - D. 交感神经兴奋时使血压升高
 - E. 交感神经兴奋时通过乙酰胆碱能受体产生与副交感神经相反的作用
 6. 下列药物中抑制胃酸分泌作用最强的是
 - A. 西咪替丁
 - B. 雷尼替丁
 - C. 奥美拉唑
 - D. 硫糖铝
 - E. 胶体次枸橼酸铋
 7. 成人的主要造血器官是
 - A. 骨髓
 - B. 肝
 - C. 脾
 - D. 淋巴结
 - E. 胸腺
 8. 关于人体铁代谢，下列说法错误的是
 - A. 人体内的铁主要来源于食物
 - B. 人体能吸收的铁为三价铁
 - C. 女性铁的丢失形式主要为月经、粪便、哺乳、妊娠等
 - D. 合成红细胞的铁主要来源于衰老红细胞破坏释放铁的再利用
 - E. 人体铁的贮存形式主要为含铁血黄素和铁蛋白
 9. 慢性肾小球肾炎发病的起始因素为
 - A. 急性肾小球肾炎迁延不愈所致
 - B. 细菌感染所致
 - C. 病毒感染导致
 - D. 免疫介导炎症
 - E. 遗传因素
 10. 在我国引起慢性肾衰的第一位病因是

- A. 糖尿病肾病
 - B. 高血压肾病
 - C. 慢性肾盂肾炎
 - D. 慢性肾小球肾炎
 - E. 急性肾小球肾炎
11. 1型糖尿病的发生主要是由于
- A. 老年人肾小球排糖少
 - B. 吃糖过多短期内无法排出
 - C. 胰岛素分泌绝对不足
 - D. 靶细胞对胰岛素敏感性降低
 - E. 老年人肾小管重吸收糖多
12. 分泌生长激素的内分泌器官是
- A. 下丘脑
 - B. 腺垂体
 - C. 肾上腺
 - D. 甲状腺
 - E. 甲状旁腺
13. 对大多数传染病来说, 最多见的表现是
- A. 病原体被清除 (一过性感染)
 - B. 隐性感染
 - C. 显性感染
 - D. 病原携带状态
 - E. 潜伏性感染
14. 熟悉不同传染病潜伏期的最主要意义是
- A. 有助于明确诊断
 - B. 预测疫情
 - C. 确定传染期
 - D. 确定检疫期
 - E. 判断传播途径
15. 狂犬病毒在体内主要侵犯
- A. 肌肉组织
 - B. 神经组织
 - C. 上皮组织
 - D. 淋巴组织
 - E. 结缔组织
16. 与人体的呼吸中枢、血管运动中枢、呕吐中枢等生命中枢密切相关的中枢神经系统部位是
- A. 大脑
 - B. 间脑
 - C. 脑干
 - D. 小脑
 - E. 脊髓
17. 毒物吸收入血后, 代谢毒物的主要器官是
- A. 肝脏
 - B. 肠道
 - C. 肾脏和肝脏
 - D. 肾脏和肠道
 - E. 肾脏
18. 以下人群中体液含量占体重比例最少的是
- A. 老人
 - B. 中年人
 - C. 青年人
 - D. 儿童
 - E. 婴儿
19. 维持细胞外液渗透压的重要离子是
- A. K^+
 - B. Na^+
 - C. Mg^{2+}
 - D. H^+
 - E. Ca^{2+}
20. 低渗性脱水时, 体液的容量变化特点为
- A. 细胞外液正常, 细胞内液减少
 - B. 细胞外液减少, 细胞内液正常
 - C. 细胞外液显著减少, 细胞内液轻度减少
 - D. 细胞外液轻度减少, 细胞内液显著减少
 - E. 细胞外液、内液按比例减少
21. 休克期相当于
- A. 微循环收缩期
 - B. 微循环痉挛期
 - C. 微循环扩张期
 - D. 微循环衰竭期
 - E. 休克代偿期
22. 属于特异性感染的是
- A. 疔
 - B. 丹毒
 - C. 菌血症

- D. 破伤风
E. 阑尾炎
23. 浅表痛为锐痛, 其传入神经纤维是
A. α 纤维
B. β 纤维
C. C 纤维
D. A γ 纤维
E. A δ 纤维
24. 心跳呼吸停止后, 临床死亡期的时间大约持续
A. 2~3 分钟
B. 4~5 分钟
C. 7~8 分钟
D. 8~9 分钟
E. 10 分钟
25. 复苏药物的最主要的给药途径是
A. 心内注射
B. 肌肉注射
C. 静脉注射
D. 皮下注射
E. 气管内给药
26. 以下属于治疗性手术的是
A. 淋巴结活检术
B. 乳癌改良根治术
C. 食管癌的胃造口术
D. 重睑手术
E. 直肠癌的结肠造口术
27. 肝破裂的病人需要进行的手术是
A. 择期手术
B. 限期手术
C. 急症手术
D. 美容手术
E. 诊断手术
28. 烧伤低血容量性休克常发生在伤后
A. 8 小时以内
B. 12 小时以内
C. 24 小时以内
D. 48 小时以内
E. 72 小时以内
29. 以下最容易引起急性肾衰竭的外伤是
A. 挫伤
B. 扭伤
C. 穿透伤
D. 挤压伤
E. 切割伤
30. 急性乳房炎常发生于
A. 产前 3~4 周
B. 产前 1~2 周
C. 产后 1~2 周
D. 产后 3~4 周
E. 产后 5~6 周
31. 腹腔中最容易损伤的脏器是
A. 胃
B. 肝
C. 脾
D. 肾
E. 小肠
32. 原发性腹膜炎和继发性腹膜炎的区别主要在于
A. 腹痛性质
B. 腹胀程度
C. 病原菌种类
D. 体温升高程度
E. 有无腹腔原发病灶
33. 急性腹膜炎病人发生休克的主要原因是
A. 剧烈腹痛
B. 大量呕吐失液
C. 呼吸循环功能不全
D. 胃肠道渗出液刺激
E. 毒素吸收及血容量减少
34. 胃癌最常见的发生部位是
A. 胃小弯
B. 贲门部
C. 胃窦部
D. 胃底部
E. 胃体部
35. 急性阑尾炎腹痛起始于脐周或上腹部的机制是
A. 胃肠功能紊乱
B. 内脏神经反射

- C. 躯体神经反射
D. 阑尾位置不固定
E. 阑尾管壁痉挛
36. 构成腹外疝疝囊的是
A. 脏腹膜
B. 壁腹膜
C. 腹壁肌肉
D. 腹壁筋膜
E. 腹壁皮肤
37. 机械性肠梗阻的病因为
A. 慢性铅中毒
B. 腹膜后血肿或感染
C. 肠管受压
D. 肠系膜血管栓塞
E. 肠功能紊乱致肠痉挛
38. 与原发肝癌的发生关系最密切的是
A. 水土因素
B. 黄曲霉毒素
C. 肝炎后肝硬化
D. 酒精性肝硬化
E. 肝良性肿瘤恶变
39. 急性梗阻性化脓性胆管炎的最常见的梗阻因素是
A. 胆道肿瘤
B. 胆管结石
C. 胆道蛔虫
D. 胆管扭转
E. 胆管狭窄
40. 急性骨髓炎的主要致病菌是
A. 大肠杆菌
B. 乙型链球菌
C. 白色葡萄球菌
D. 溶血性链球菌
E. 金黄色葡萄球菌
41. 关于骨盆的组成, 下列说法正确的是
A. 两块耻骨, 两块坐骨, 一块尾骨
B. 两块坐骨, 一块尾骨, 一块骶骨
C. 两块髌骨, 一块尾骨, 一块骶骨
D. 两块髌骨, 一块尾骨, 一块骶骨
E. 两块耻骨, 一块尾骨, 一块骶骨
42. 有关卵巢的叙述, 正确的是
A. 是一对空腔器官
B. 分为两部分, 内为皮质, 外为髓质
C. 卵巢的大小和形状与年龄无关
D. 是产生卵子、分泌激素的器官
E. 正常卵巢约重 50g
43. 有关月经, 下述错误的是
A. 初潮是指第一次月经来潮
B. 经期是指每次月经持续的天数
C. 月经周期是指前次月经结束到下次月经开始的时间
D. 经期一般为 3~7 天
E. 月经周期一般 28~30 天
44. 正常月经周期的妇女, 宫颈粘液开始出现羊齿状结晶, 相当于在其周期的
A. 第 6~7 天
B. 第 9~10 天
C. 第 13~14 天
D. 第 15~16 天
E. 第 17~20 天
45. 有关原发性痛经的陈述, 正确的是
A. 病人体内雌激素水平异常升高致痛经
B. 痛经者子宫内膜和月经血中 PG 含量较正常妇女明显升高
C. 病人的平滑肌敏感性增加致子宫过度收缩的结果
D. 支配子宫的神经敏感性增高, 痛阈降低致痛经
E. 子宫内膜炎症致局部缺血缺氧, 引起痛经
46. 功能失调性子宫出血是指
A. 生育期妇女子宫异常出血
B. 青春期或围绝经期妇女的异常出血
C. 生殖器官无器质性病变的异常子宫出血
D. 绝经后妇女的异常出血
E. 人流术后妇女的异常出血
47. 淋病的好发部位应除外
A. 尿道旁腺
B. 子宫颈管

- C. 前庭大腺
D. 输卵管
E. 子宫内膜
48. 子宫肌瘤发病可能的相关因素是
A. 早婚早育, 性生活紊乱
B. 高血压, 糖尿病, 肥胖
C. 体内雌激素水平过高
D. 饮食环境
E. 环境因素
49. 导致发生自然流产的最主要原因是
A. 宫颈松弛
B. 染色体异常
C. 母儿血型不合
D. 内分泌功能失调
E. 子宫畸形
50. 围产期是指
A. 从孕期满 27 周至生后 7 天
B. 从孕期满 37 周至生后 7 天
C. 从孕期满 28 周至生后 7 天
D. 从孕期满 28 周至生后 1 个月
E. 从孕期满 37 周至生后 1 个月
51. 新生儿期是指
A. 自出生脐带结扎到 1 周岁
B. 自受孕到出生脐带结扎时
C. 自出生脐带结扎开始到满 28 天
D. 自出生后第 1 天到生后第 30 天
E. 自出生后第 1 天到生后第 40 天
52. 小儿上部量等于下部量的年龄是
A. 新生儿
B. 1 岁
C. 2 岁
D. 6 岁
E. 12 岁
53. 头围与胸围大致相等的年龄为
A. 新生儿
B. 1 岁
C. 2 岁
D. 6 岁
E. 12 岁
54. 小儿出生时的头围是
A. 34cm
B. 44cm
C. 46cm
D. 48cm
E. 50cm
55. 新生儿的房间湿度应保持在
A. 20%~30%
B. 30%~40%
C. 35%~45%
D. 45%~55%
E. 55%~65%
56. 预防接种属于
A. 非特异性免疫
B. 自然主动免疫
C. 自然被动免疫
D. 人工主动免疫
E. 人工被动免疫
57. 对于婴儿, 以下哪一项能量消耗占所需总能量的比例最大
A. 基础代谢所需
B. 生长发育所需
C. 食物特殊动力作用
D. 活动所需
E. 排泄损失能量
58. 婴儿期每日每公斤体重所需能量为
A. 140kcal
B. 130kcal
C. 120kcal
D. 110kcal
E. 100kcal
59. 患者, 女, 61 岁, 因头痛、心悸和心前区不适来医院, 门诊查血压: 160/95 mmHg, 据此可以推断该病人高血压分级属于
A. 正常高限
B. 轻度高血压
C. 中度高血压
D. 重度高血压
E. 临界高血压
60. 患者, 男, 因溃疡经常胃出血, 经医院检验 Hb90g/L, RBC 3.8×10^{12} /L, 确

诊为缺铁性贫血,此病的原因是

- A. 慢性失血
 - B. 蛋白丢失
 - C. 缺维生素 B_{12}
 - D. 缺胃蛋白酶
 - E. 缺叶酸
61. 患者,男性,34岁,公司经理。1个月前出现低热,伴乏力、纳差,因工作繁忙未诊治,近1周以来,上述症状明显加重,不思饮食,食后即吐,查体:重病容,皮肤重度黄染,并可见多处瘀斑,腹水征(+),被诊断为“亚急性重型肝炎”。导致该病人发展为重型肝炎的最可能原因是
- A. 原有肝脏疾病
 - B. 过度劳累
 - C. 服用对肝脏有损害的药物
 - D. 肝炎病毒的重叠感染
 - E. 肝炎病毒的变异
62. 男性,21岁,因跳水时头部着地造成高位截瘫,其致伤原因是
- A. 直接损伤
 - B. 间接损伤
 - C. 肌肉牵拉
 - D. 积累损伤
 - E. 骨骼疾病
63. 男性,50岁,饱餐后出现上腹持续性疼痛并向左肩、腰背部放射,伴有恶心、呕吐,诊断为急性胰腺炎。入院后收集的资料中与其疾病关系密切的是
- A. 父亲因冠心病去世
 - B. 平时喜食素食
 - C. 25年来每天饮酒半斤
 - D. 不喜欢活动
 - E. 有阑尾炎手术史
64. 女性病人,甲状腺大部切除术后第一天,出现甲状腺危象,医嘱给予心得安,其目的是
- A. 镇静催眠
 - B. 减轻组织缺氧

C. 降低应激反应

D. 给机体补充能量

E. 降低组织对儿茶酚胺的反应

65. 女性,27岁,于1年前经阴道自然分娩一健康女婴,现进行妇科查体发现其宫颈形态正常,则该妇女的宫颈口形状应该是
- A. 圆形
 - B. 横椭圆形
 - C. 横裂状
 - D. 纵椭圆形
 - E. 梯形
66. 赵女士在妇科检查中发现宫颈重度糜烂,宫颈刮片细胞学检查为巴氏Ⅲ级,提示为
- A. 正常
 - B. 炎症
 - C. 可疑癌症
 - D. 高度可疑癌症
 - E. 癌症
67. 某25公斤小儿体表面积为
- A. $0.58m^2$
 - B. $0.78m^2$
 - C. $0.98m^2$
 - D. $1.08m^2$
 - E. $1.18m^2$
68. 一新生儿胎龄38周,出生体重2700g,其出生体重在同胎龄儿平均体重的15百分位,该新生儿是
- A. 早产儿、大于胎龄儿
 - B. 早产儿、适于胎龄儿
 - C. 足月儿、小于胎龄儿
 - D. 足月儿、适于胎龄儿
 - E. 足月儿、大于胎龄儿

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每道题下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

(69~71 题共用题干)

患者, 男性, 28 岁, 因外出春游出现咳嗽、咳白粘痰伴喘息 1 天入院, 体检: 体温 36.5℃, 脉搏 90 次/分, 呼吸 28 次/分, 血压 120/80mmHg, 在肺部可闻及广泛哮鸣音, 既往有哮喘史。

69. 该病人哮喘发作最可能的诱因是

- A. 花粉
- B. 尘螨
- C. 动物毛屑
- D. 病毒感染
- E. 精神因素

70. 病人进一步表现为发绀明显、端坐呼吸、大汗淋漓, 24 小时经一般解痉治疗后症状无缓解, 判断病人为

- A. 混合性哮喘
- B. 内源性哮喘
- C. 重症哮喘
- D. 左心衰
- E. 右心衰

71. 对该病人采取的护理措施不妥的是

- A. 每日饮水量应在 2000ml 以上
- B. 在病室内摆放鲜花
- C. 遵医嘱给予祛痰药物
- D. 遵医嘱给予糖皮质激素
- E. 给予低流量持续吸氧

(72~74 题共用题干)

男性, 40 岁, 因车祸发生脾破裂, 就诊时血压 8/4kPa (60/30mmHg), 脉率 120 次/分, 病人烦躁不安, 皮肤苍白, 四肢湿冷。

72. 在等待配血期间, 静脉输液宜首选

- A. 生理盐水
- B. 5%葡萄糖液
- C. 平衡盐溶液
- D. 5%碳酸氢钠
- E. 5%葡萄糖盐水

73. 提示病人进入微循环衰竭期的表现是

- A. 表情淡漠

B. 皮肤苍白

C. 尿量减少

D. 血压下降

E. 全身广泛出血

74. 医嘱为病人补充以下液体, 能够降低血液粘滞度且疏通微循环的液体是

- A. 全血
- B. 平衡盐溶液
- C. 5%葡萄糖溶液
- D. 10%葡萄糖溶液
- E. 低分子右旋糖酐

(75~76 题共用题干)

某初产妇, 35 岁, 对其进行 B 超测量骨盆结果是: 入口平面前后径 11cm, 横径 13cm; 中骨盆横径 9.5cm, 前后径 11.5cm; 出口横径 8.3cm, 后矢状径 8.5cm。

75. 根据检查结果, 该产妇的骨盆形态是

- A. 均小骨盆
- B. 扁平骨盆
- C. 漏斗骨盆
- D. 畸形骨盆
- E. 正常骨盆

76. 该产妇是否可以试产, 及试产的时间是

- A. 不可试产
- B. 可试产 1 小时
- C. 可试产 1.5 小时
- D. 可试产 2 小时
- E. 可试产 4 小时

(77~78 题共用题干)

患儿, 女, 11 个月, 牛乳喂养, 未加辅食, 近 2 个月来食欲差, 面色苍白, 皮肤弹性差, 精神不振, 体重 6.5kg, 皮下脂肪 0.2cm。

77. 该患儿首优的护理诊断是

- A. 自我形象的紊乱
- B. 有感染的危险
- C. 知识缺乏

D. 营养失调: 低于机体需要量

E. 成长发展的改变

78. 关于该患儿的护理措施哪项不妥

A. 口服胃蛋白酶助消化

B. 补充维生素和微量元素

C. 做好皮肤的清洁护理

D. 预防低血糖

E. 尽快给予正常饮食

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

(79~81 题共用备选答案)

A. 盐酸

B. 胃蛋白酶原

C. 胃蛋白酶

D. 碱性粘液

E. 生长抑素

79. 胃粘膜主细胞可分泌

80. 胃粘膜壁细胞可分泌

81. 胃粘膜粘液细胞可分泌

(82~83 题共用备选答案)

A. 糖尿病

B. 动脉粥样硬化

C. 风湿性心瓣膜病

D. 高血压和动脉粥样硬化

E. 高脂血症

82. 短暂性脑缺血发作最常见的病因是

83. 脑栓塞最常见的病因是

(84~87 题共用备选答案)

A. 肾上腺素

B. 利多卡因

C. 阿托品

D. 碳酸氢钠

E. 洛贝林

84. 用于纠正酸中毒, 增加心肌应激性的药物是

85. 用于解除迷走神经心脏作用的药物是

86. 用于抑制室性心律不齐的药物是

87. 用于兴奋呼吸中枢的药物是

(88~90 题共用备选答案)

A. 月经周期不规则, 经期不定

B. 月经周期规则, 经期 3~5 天

C. 月经周期稀发, 经期 5~7 天

D. 月经周期缩短, 经期 3~5 天

E. 月经周期规则, 经期延长

88. 无排卵性功血

89. 黄体功能不全

90. 子宫内膜不规则脱落

(91~92 题共用备选答案)

A. 深绿色、粘稠、无臭味

B. 金黄色、糊状、无臭味, 每日 2~4 次

C. 淡黄色、成形、有臭味, 每日 1~2 次

D. 褐色半成形

E. 稀水奶瓣、蛋花汤样

91. 人乳喂养儿的粪便

92. 牛乳喂养儿的粪便

四、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择所有正确答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

93. 下列关于肾病综合征病因及发病机制的描述, 哪项正确

A. 肾小球滤过膜对血浆蛋白的通透性增加, 当超过近曲小管回吸收量时形成大量蛋白尿

B. 白蛋白从尿中丢失, 同时肾小管对重吸收的蛋白进行分解, 导致低白蛋白血症

C. 低白蛋白血症导致血浆胶体渗透压降低, 水分外渗, 加上水钠潴留, 导致水肿

D. “球-管失衡”和肾小球滤过分数下降, 导致水钠潴留, 形成肾性水肿

E. 肝合成脂蛋白增加及脂蛋白分解和

外周利用减弱导致高脂血症

94. 单纯性甲状腺肿的病因包括

- A. 碘缺乏
- B. 致甲状腺肿物质的作用
- C. 先天缺陷致激素合成障碍
- D. 感染
- E. 自身免疫

95. 病原体的致病作用包括

- A. 数量
- B. 侵袭力
- C. 繁殖能力
- D. 毒力
- E. 变异性

96. 属于肿瘤发生的内在性因素是

- A. 电离辐射
- B. 免疫因素
- C. 病毒感染
- D. 内分泌因素
- E. 黄曲霉毒素

97. 膀胱癌的危险因素有

- A. 吸烟
- B. 食用糖精

C. 长期服用镇痛药物

D. 长期尿失禁

E. 长期慢性膀胱炎症

98. 临床常用的免疫抑制剂有

- A. 泼尼松
- B. 环孢素 A
- C. 硫唑嘌呤
- D. 环磷酰胺
- E. 肾上腺素

99. 子宫内膜癌发病可能的相关因素有

- A. 性生活紊乱
- B. 糖尿病
- C. 雌激素持续刺激
- D. 绝经延迟
- E. 多育

100. 儿科护理学的任务是

- A. 减少儿童发病率
- B. 增强儿童体质
- C. 促进儿童身心健康
- D. 提高儿童保健和疾病防治质量
- E. 作为儿童和家属的代言人

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑




1. 健康促进的核心策略是
 - A. 健康宣传
 - B. 社会动员
 - C. 专业人员培训
 - D. 健康普查
 - E. 政府投资
2. 属于顺应的适应性行为有
 - A. 5岁小孩醒来后，没看到妈妈就开始哭
 - B. 生重病时拒绝休息，坚持工作
 - C. 听到邻居得癌症，自己害怕而不再去医院看病
 - D. 反复询问医护人员自己是否得病
 - E. 根据医嘱，按时服药
3. 小组讨论时，适宜的小组人数一般为
 - A. 2~5人
 - B. 3~6人
 - C. 6~10人
 - D. 10~15人以上
 - E. 15~20人
4. 在所提问的问题中包含着提问者的观点，以暗示对方做出提问者想要得到的答案。这种提问是
 - A. 开放式提问
 - B. 封闭式提问
 - C. 探索式提问
 - D. 复合式提问
 - E. 偏向式提问
5. 根据格林模式，健康教育诊断的六个方面不包括
 - A. 社会诊断
 - B. 流行病学诊断
 - C. 行为诊断
 - D. 环境诊断
 - E. 资源诊断
6. 在健康教育的行为诊断中属于高可变行为的是
 - A. 形成时间已久的行为
 - B. 深深植根于文化传统或传统的生活方式之中的行为
 - C. 既往无成功改变实例的行为
 - D. 正处在发展时期或刚刚形成的行为
 - E. 社会赞成的行为
7. 医院健康教育的重点是
 - A. 医护人员教育
 - B. 患者教育
 - C. 社区教育
 - D. 住院教育
 - E. 门诊教育
8. 随访教育的主要对象是
 - A. 有复发倾向的慢性疾病病人
 - B. 老年病人
 - C. 急性病人
 - D. 有并发症的病人
 - E. 重症病人
9. 社区的基本构成要素不包括
 - A. 一定的地域范围
 - B. 特定的文化背景
 - C. 必需的生活服务设施
 - D. 生活方式
 - E. 相对不固定的人群
10. 社区护士指导社区内有乳腺癌家族史的40岁以上女性进行乳房自检，这是
 - A. 一级预防
 - B. 二级预防
 - C. 三级预防
 - D. 临床期预防
 - E. 病因预防
11. 下列对社区卫生服务的描述中，正确的是
 - A. 社区卫生服务的对象是社区中的患病人群
 - B. 社区卫生服务的地点是社区医院
 - C. 社区卫生服务提供的时间，应适应居民的需求
 - D. 当居民的健康问题得到解决后，社区卫生服务即可停止
 - E. 社区卫生服务的内容是对居民进行

健康教育

12. 社区护理以什么为中心
 - A. 社区人群
 - B. 健康
 - C. 预防疾病
 - D. 减少残障
 - E. 维护社区的良好环境
13. 下列表述属于护理诊断中的相关因素的是
 - A. 潜在的精神健康增强
 - B. 有受伤的危险
 - C. 与咳嗽反射减弱有关
 - D. 自我角色认同紊乱
 - E. 腹痛
14. 下列关于各生命统计指标的描述, 错误的是
 - A. 发病率可用于描述疾病的分布情况
 - B. 病死率可用于衡量某种疾病的预后情况
 - C. 罹患率可用于描述局部地区的疾病暴发, 如食物中毒
 - D. 治愈率、有效率和生存率可用于衡量疾病的防治效果
 - E. 出生率、生育率、人口自然增长率和死亡率是计划生育的统计指标
15. 比较有针对性、且易于反馈的社区健康教育形式是
 - A. 个别教育
 - B. 群体教育
 - C. 文字教育
 - D. 电化教育
 - E. 形象教育
16. 人类行为的主要特征是
 - A. 随意的
 - B. 独立的
 - C. 有目的性的
 - D. 先天遗传的
 - E. 不可改变的
17. 酗酒属于
 - A. 日常危害健康行为
 - B. 致病性行为模式
 - C. 不良疾病行为
 - D. 违规行为
 - E. 预警行为
18. 下列关于社区健康教育的描述正确的是
 - A. 社区健康教育以疾病为中心
 - B. 社区健康教育的对象是社区中患病的人群
 - C. 社区健康教育的形式以群体教育为主
 - D. 直接评估是社区健康教育的主要评估方式
 - E. 社区健康教育评价分为即时评价、阶段评价和效果评价
19. 下列反映个体或人群卫生知识水平的指标是
 - A. 卫生知识及格率
 - B. 健康教育覆盖率
 - C. 不良行为转变率
 - D. 卫生保健活动参与率
 - E. 健康教育活动的自愿参与率
20. 下列关于家庭的描述, 错误的是
 - A. 由父母及未婚子女组成的家庭称为主干家庭
 - B. 家庭生活周期是指家庭经历从结婚、生儿育女到老年各阶段的过程
 - C. 处于新婚期的家庭主要任务之一是协调性生活及计划生育
 - D. 处于中年期的家庭主要任务是巩固婚姻关系
 - E. 处于老年期的家庭主要任务是应对疾病的来临及配偶的丧失
21. 下列关于家庭对个体健康影响的描述, 不正确的是
 - A. 不健康的家庭环境与儿童躯体及心理的疾病密切相关
 - B. 家庭是儿童生长发育的必要条件
 - C. 家庭的生活方式可影响家庭成员的疾病发病率
 - D. 家庭的支持和照顾对家庭中患病成员的康复有很大影响
 - E. 一些影响健康的生理特征受遗传的

影响,而心理特征则不受影响

22. 下列符号中,表示近亲结婚的是



23. 当前,我国正处于老龄化进程的阶段是

- A. 成年型
- B. 过渡阶段
- C. 发展阶段
- D. 高峰阶段
- E. 老年型

24. 下列不属于老年人安全用药原则的一项是

- A. 选用药物种类应尽量少,最好不超过 3~4 种
- B. 通常 60 岁以上老年人只用成人量的 3/4 或 1/2
- C. 老年人应尽量采用缓释剂型,因其相对安全
- D. 老年患者应尽量简化用药,减少用药的次数
- E. 可在医生指导下,适当服用保健药物

25. 下列关于发展中国家对老年型社会的划分标准的描述正确的一项是

- A. 60 岁及以上的老年人口比例在 14% 以上
- B. 65 岁及以上的老年人口比例在 10% 以上
- C. 60 岁及以上的老年人口比例在 10% 以上
- D. 65 岁及以上的老年人口比例在 7% 以上

E. 60 岁及以上的老年人口比例在 7% 以上

26. 我国建议成人每天摄取蛋白质的量以及其热能占总供热能的比例是

- A. 0.8~1.0g/kg, 10%~14%
- B. 1.0~1.2g/kg, 10%~14%
- C. 1.2~1.3g/kg, 10%~14%
- D. 1.0~1.2g/kg, 20%~25%
- E. 1.2~1.3g/kg, 20%~25%

27. 维生素 A 缺乏可引起

- A. 干眼病
- B. 脚气病
- C. 口角炎
- D. 坏血病
- E. 癞皮病

28. 食品中可能出现的有害因素主要包括

- A. 生物性污染、化学性污染、物理性污染
- B. 放射性污染、生物性污染、环境污染
- C. 化学性污染、放射性污染、环境污染
- D. 物理性污染、放射性污染、生物性污染
- E. 物理性污染、生物性污染、环境污染

29. 食品在用煤、炭和植物燃料烘烤或熏制时直接受到的污染是

- A. 使用亚硝酸盐
- B. 加工方法不当
- C. 多环芳烃化合物污染
- D. 微生物污染
- E. 农药残留

30. 关于感染的相关描述,不正确的一项是

- A. 感染是病原体与人体相互作用的过程
- B. 病原体通过各种途径进入人体,就开始了传染过程
- C. 病原体侵入人体后不一定都发病
- D. 感染又称传染,感染性疾病就是传染性疾病
- E. 构成传染过程必须具备病原体、人体、环境三个因素

31. 关于传染病的治疗原则,下列正确的一