

副食品仓储保管知识 和先进经验

河南省商业厅储运处编



河南人民出版社

內 容 提 要

本書主要是介紹我省各地几年來摸索、總結出來的保管副食品的知識和經驗，包括生豬倉庫的管理、傷病豬的治療、鷄蛋的檢驗與保管、蔬菜的儲存經驗和水菓的保管知識，以及糖業糕點類的儲存知識與保管經驗。是從事副食品保管工作的同志們的學習參考讀物。

副食品仓储保管知識和先進經驗

河南省商業廳儲運處編

*

河南人民出版社出版（鄭州市行政區經五路）

河南省書刊出版業營業許可證出字第1號

開封日報印刷廠印刷 河南省新华書店發行

*

總零售價：2214

787×1092耗1/32.1— $\frac{5}{8}$ 印張·33,000字

1960年5月第1版 1960年5月第1次印刷

印數：1——52095

統一書號：4105·75

定價：(5)0.13元

前



仓库部門保管的物資，是
果，也是用来保証市場供应的物資基础；特別是副食品，和
人民的生活有著更为密切的关系。保管好这些物資，是我們
保管人員的責任，是党和人民交給我們的任務，我們應
該很好的學習，提高我們的思想水平和業務水平，積極钻研
技术，积累經驗，出色地做好我們的工作。为了帮助大家學
习、便于大家參考，我們特从各地總結的關於副食品保管方
面的知識和創造出來的先进保管經驗，編印成这本小冊子。
由于水平所限，不妥之处恐所难免，請大家及时提出宝贵意
見，以便今后改正。

序言

一九五九年五月

目 錄

积极改善生猪仓库的經營管理，变仓库为生产 基地.....	(1)
大跃进中的生猪仓库.....	(6)
“猪院长”王国賢治疗病残猪的經驗.....	(13)
照蛋能手黃国英.....	(18)
查蛋神手李銀芝.....	(18)
鸡蛋的储存与保管.....	(21)
蔬菜的储存与保管.....	(24)
水菜储存保管知識.....	(36)
附：光山县商业局保管栗子不生虫的經驗.....	(39)
糖业糕点类的储存与保管.....	(40)

積極改善生豬倉庫的經營管理 變倉庫為生產基地

几年來，我省在生豬倉庫的經營管理方面，已取得了很大成績，創造了不少經驗。不少地區推廣了“八無一快”，實現了無臭味、無蛆蟲的衛生倉；有些地區豬倉已作到一猪三處（休息一處、大小便一處、飲食一處），使豬健康生長，杜絕了死亡，大大減少了急率率。在飼料方面，各地推廣了青代飼料，大大節約了糧食。科學育肥，推廣全省，大部分都成了無豬瘟倉，取得了很大成績。

根據全國生豬倉庫會議上的指示：“大搞生產，大搞代飼料，大搞防疫，大搞育肥，不喂一粒糧食，保證生豬增重長膘。”今后如何鼓足更大的革命干勁，改善生豬倉庫的經營管理，變生豬倉庫為生豬生產基地，多快好省地把生豬管好，是我們儲運工作人員的重要任務。今后如何搞？根據全國生豬倉庫會議精神，結合我省當前情況，特提出以下意見：

（一）變生豬倉庫為生豬生產基地，這是中央對今后生豬倉庫提出的发展方向。變生豬倉庫為生產基地，簡單的說，就是倉庫既養成品豬又養小豬，把兩者結合起來。為什麼要這樣作？道理很簡單：一、可以使生豬倉庫面向生產，通過生產來改變過去生豬倉庫單純看養成品豬而造成忙閒不均的現象。二、可以為完成生豬發展任務開辟基地，減輕社會生產負擔。三、可以充分利用生豬倉庫效能。

根据我省情况，要搞好这一工作，是有条件的。首先，我省大部分地区过去已经搞过，有了基础，有了经验。如漯河、开封、商丘、新乡等地生猪仓库还都正在搞着。这些经验给今后打下了有利基础。其次，全省的冷冻仓库将要陆续建立，分布在全省各地，形成了很大的冷冻仓库网，这样由分散到集中、由集中外调出口，成品猪均可就地加工冷冻，不再远送调运生猪，运输时装载量可提高百分之六十，节省了运费，减轻了运输负担，腾出大批生猪仓库，为养小猪、育肥猪提供了有利条件。

变生猪仓库为生产基地，必须解决两种思想问题。一种认为养小猪是仓库部门的额外负担，不是自己的任务，因此，表现不积极。另一种思想是认为养小猪不解渴，时间长、费用大、长得慢，表现也不积极。这两种思想都是错误的。要求已经着手搞的，今后要继续搞下去，并总结经验，加以推广；未着手搞的，要开始进行试验，并逐步扩大。

(二) 大搞青代饲料，节约粮食。在目前粮食不可能大量喂猪的情况下，需要积极利用代饲料喂猪，而且各地经验已经肯定不用一粒粮食能够达到增重长膘的目的。因此，在思想上要破“富养猪”，立“穷养猪”，彻底的批判那种认为没有粮食根本不能把猪养好的错误论调。

采集青代饲料，应本着因地制宜、靠山吃山、靠水吃水的原则，广泛地组织青代饲料货源。谚云：“猪吃百样草，树上、水上、地上找。”

现在江苏省又发现山上宁猪粉、石灰石、玻璃粉、白土等都可喂猪。上海采用纸浆喂猪。云南省采用除泥(黑泥)喂猪。咱河南省猪饲料更多，除各种树叶、青草应有尽有。

外，还有棉桃壳、花生皮、芝麻壳、玉米芯等等都是喂猪的好饲料。漯河发明用麦糟、谷草喂猪，安阳、洛阳、许昌等地用牛粪、马粪、猪粪等喂猪，安阳又有试用锯末喂猪的等等。总之，饲料来自四面八方，要大搞特搞，大干特干；只要如此，代饲料是取之不尽用之不竭的。

对青代饲料必须作好发酵和储存，绝大部分的青代饲料都必须经过发酵过程，繁殖乳酸菌和酵母菌以杀灭虫害和细菌，分解和软化粗硬成分，使猪吃后容易消化、适合胃口。青代饲料的发酵，我省经验不足。在全国生猪仓库会上外省各兄弟单位交流了不少宝贵经验，现将江苏省新港生猪中转站三种发酵办法介绍于后：一、快速发酸：缸底上先铺一层麸皮，约六市寸厚，将酵母星撒在麸皮上，再放上洗净、切碎的青草或树叶（约5市寸厚），用脚均匀的踏实，最后放上葱蒜碎梗（茎），约占青料的百分之零点五。这样一层一层的向上摆，最后一层距缸沿约5市寸，上面用热水（ 60°C — 80°C ）均匀的洒一下，再放三寸左右的麸皮，以隔绝空气。用这种发酵法，一般四至七天即可。二、储藏发酵：其方法有两种：1、加水发酵：将喂养的青代饲料逐层摆好，并逐层浇洒冷水，外层封闭严密，可保存六个月以上。2、干储发酵：不洒水，外层亦封闭严密，可保存八个月。三、水封发酵：除将缸上层的麸皮换成草木灰外，其他与快速发酵法相同，并要在草木灰上压重石头或木板，然后向里倒冷水，到饱满为止；并注意经常保持满水，这种用水密封法，可以起到隔绝作用，使用得当可保存一两年。这几种办法简单，成本很低，已在全国范围内推广。

根据我省情况，还有以下几种简单储存法：一、土坑储

藏：擇选地勢較高的地方，挖一圓或方形坑，下鋪麥稈，將青代飼料填滿、踏實，待青飼料露出地面五市寸時，从四角倒入清水，使其浸透，然后用稻草或麥稈（蓆子也可）蓋好，上邊再蓋五寸厚土，拍光拍實，严防透氣漏水。土蓋頂最好呈圓形尖頂，以便于利水、扫雪。如土頂下沉，应及时用土填封，必須保持不透氣不漏水。这样可保存六個月至一年時間。草色不变，仍青翠嫩綠，有时稍黃，质量不变；且保存量又大，又方便。

二、窖藏法：在地上挖一个大方塘，約一丈深，一头留出入道，把青代飼料裝滿、踏實，窖口用高粱稈或麥稈、稻草等密封即可。儲存時間一般為二至三個月。

三、干藏：各种粮食作物的莖和葉均可晒干堆成垛貯存。

（三）积极进行科学育肥，促使生猪增重长膘。科学育肥的方法有多种，如金霉素針催肥法、割除甲状腺、用甲基硫酸密定和注射溶液注射猪耳朵以及切尾（尖）育肥等等，这些方法費用小、收效大，合乎多快好省精神，应大力推广。

（四）防疫和治疗問題。生猪生病絕大多数是由于卫生条件不好或喂养不当的人为原因造成的，只要注意以下几个环节，是可以保証不病不死一头生猪的。

一、清洁卫生。猪仓无蝇、无臭味、无粪便，注意培养“一猪三处”（吃食、大小便、休息各一处）的卫生习惯。

二、喂养要有規律，配料要有計劃，不要忽多忽少、忽飢忽饱，以免影响猪的食慾。

三、經常防疫。目前土法防疫和治疗的办法很多，如用大葱、大蒜、甘草治猪花白痢疾（狗肉湯也可），用羊血治猪

瘟，用五黃素、四黃素治猪瘟，用桉树叶溶液治猪气喘病，等等都很有效。

(五)仓库的设备和管理。仓库应分健猪圈、病猪圈、高温猪圈、预检猪圈、饲料储存间、煮食房和生产猪圈。并建立健、病猪运动场，健、病猪圈(场)之间距离越远越好。每头猪(商品猪)占零点六平方尺面积，每圈(栏、棚)以容二十五头至五十头为宜，不可过多，但根据寒暑情况、猪的大小，可适当调整。同时圈内需设固定数量的食槽、水桶、消毒和消防设备，其它地磅、猪的洗澡池等都应根据情况进行设置，圈门口必须有消毒池。

生猪入库前，应询问在途情况，检查非疫证明及货单，然后入预检圈经过适当(二至四小时)休息后，检温验质过磅，按地区分别健、病、残入正式仓库(条件许可者设观察圈)，每圈(仓)旁设标牌证明头数、进仓日期和情况。

生猪入库后首先注射兔化疫苗，做好卫生工作，防止打架、咬伤、拥挤、上垛，发现病情及时隔离，治疗处理。夏季注意避暑(饮水、洒水、搭凉棚)，冬季注意防冻(圈门口挂草苫、铺稻草、喂热食)，使猪养成吃、便、睡各一处的生活习惯。生猪出库时应严格检温验质，一切病情猪禁止外调，送宰猪应在宰前十二小时停止喂食，出仓后及时交换标牌上的记录。生人禁止入仓，凡参观者必须先进行消毒，然后指定专人引导参观。

大躍進中的生豬倉庫

昔日情況如此

一九五八年四月份以前，新鄉專署商業局第一副食站倉庫的情況是這樣的：領導力量薄弱；政治空氣不高，飼養員對工作不負責任，衛生防疫工作搞的很不好，豬圈糞土長期不清除，豬食槽不刷，地不打扫。因此，從建倉起，年年月月都有病豬和死亡、急宰現象。豬圈內外蛆蟲很多，臭氣熏人，大門前馬路上的來往行人都掩鼻捂嘴而過，羣眾提出了很多的批評和建議，說這裡的清潔衛生工作搞的太不象話，應該大大加強，就連倉庫內的飼養員也覺得他們的倉庫確實很髒，甚至有不想在倉庫中工作的。

提出跃進課題

在黨的建設社會主義總路線的光輝照耀下，經過反右派運動，該倉庫黨支部發出響亮號召，要求倉庫徹底地大搞清潔衛生，保證生豬不病、不死、長膘增重。這是一條改革倉庫工作的綱。可是在當時十三名職工中敢子大膽接受這一光榮任務的人不多，甚至個別人思想還有抵觸，反映說：“人還生病，豬能不病、不死嗎？”並說：“人少豬多難以辦到，去年工人二十四個、干部三人，豬又少，還天天死豬；現在只有十一个工人、兩個干部，豬又多，要豬不病不死，讓什么也辦不到。”究竟辦到辦不到，確是一個值得辯論的問

總。党支部針對以上情況，通過擺事實、找有利條件，與其他地區先進經驗對比，全體職工終於在社會主義大躍進形勢的鼓舞下，提高了思想覺悟，集中了智慧，發揮了沖天干勁。不但積極響應黨組織的號召，而且積極主動地提出新的戰鬥口號和要求，大家下決心要作到：“來病豬變好豬，瘦豬變肥豬，打破常規，不分昼夜，星期天一股勁的干，一切從搞好衛生和防疫工作保證生豬健康出發；一切從方便羣眾出發，羣眾什麼時候送豬，就什麼時候收；國家什麼時候調，就什麼時候出庫；保證實現七元倉。”

緊張的戰鬥開始了

思想認識提高後，全體職工們精神飽滿，工作熱情空前高漲。搞好生豬衛生防疫，使生豬不病不死，長膘增重、支援出口和市場供應成為他們心目中的首要行動目標。他們的口號是：“苦戰一周，消灭蒼蠅、蛆蟲，使倉庫面貌煥然一新。”於是，緊張的戰鬥開始了。

大搞清潔衛生工作。豬圈、豬槽每天三打三刷洗，每週用六六六藥水消毒二至三次，環境衛生每日打扫一次，大門口設石灰池，二門口放消毒藥水，豬圈門口設消毒池，使生豬來往腳踏藥水自行消毒。參觀人員不經消毒不准進倉，倉庫內外糞土和髒物完全消除干淨。

防重於治，加強預防工作。凡外來的豬，均先隔離喂養，逐頭測溫，并作到四看、三摸、一聽。四看是：看豬眼結膜是否有眼瞼，有則是內部發熱；看豬嘴干濕，若發干則有內火；看毛色，若毛發干、發亂、不整齊，則有病征；看大小便是否干、黃，若干黃則有火氣。三摸是：摸耳溫是否

正常：摸皮肤是否发烫；摸尾巴是否有力。一听是听呼吸是否正常。通过以上环节，确定生猪的健康情况，然后再决定是否入正式仓库。

凡入正式仓库的生猪，均注射抗猪瘟血清、兔化疫苗等药剂，发现病症立即隔离治疗。作到了“爱猪如爱人”。每个职工都变成了猪护士。对生猪小心照料、细心喂养，严格执行定时、定量、定员、定额的管理方法，按时喂养，适时松圈，每天由两顿食改为三顿食，改生食为熟食，改生水为热水；饲料拌匀，先稀后稠，少添勤添，真正作到爱猪如爱人，猪不吃食，人不吃饭，猪不休息，人不睡觉，人不离圈，圈不离人。

大找代饲料，节约粮食。根据生猪食慾特点：吃素、吃鲜、吃软、吃酸、吃咸、吃甜、吃碎、吃嫩的情况，做到：粗食细喂、饼食净喂、青食鲜喂、生食熟喂、凉食温喂、淡食咸喂、杂食发酵、多食混喂，不断地调剂饲料。由于采用了代饲料，给国家节约了大批粮食。

辉煌的战果

经过半个月的紧张战斗，一九五八年五月十五日该仓库变成了“七无”仓。无蝇蛆、无臭味、无急宰、无疫情、无粪便、无污水、无任何杂物。因此，群众啧啧称赞，要求参观，不但附近群众聘请仓库职工去帮助养猪、介绍经验，而且当地驻军还多次进行采访，邀请职工去作养猪指导工作。仓库面貌焕然一新，过去是受批评多，现在是受表扬多，要求来仓库参观的多；过去是不愿在猪仓工作的多，现在是要求调到猪仓去工作的多；积极分子多；热爱报纸努力学习的

多。

跃进更跃进，一猪三处养

繼实现了“七无”后，全體职工又提出跃进的新課題：决定培养一猪三处（吃食、休息、大小便各一处）分养的卫生习惯，以保持經常地“七无”。

吃食方面：根据苏联的先进經驗，生猪是可以通过訓練成为驯服和通人性的动物，要使猪生活規律化是完全可能的；不过必須專心致志地去管理，使生猪熟悉管理人員的口号，与管理人員建立感情，逐步听从指揮。其具体办法是：每天三頓食先喂哪一圈、后喂哪一圈，次序固定，食槽固定。到喂食时吹哨为号，由一人开圈門赶猪。有十天左右的时间猪就習慣了。到吃食时，吹哨开门后，猪就自动跑到固定的槽边去吃食；同时紧紧掌握猪爱吃搶食的习惯，勤添少添，一般十五分钟即可喂饱。

粪便方面：猪吃过食后，管理員喊着“走”！“走”！的和謠口号，猪就离开食槽回活动圈，一小时左右后自動的到固定大小便处去大小便。这样白天松圈三次、晚上九点和下两点各一次，共計五次（不包括喂食时的松圈次数）。由于时间固定，猪的大小便很快的就会規律化。但在未規律化前，見到圈內有粪便要及时清除，否則，生猪嗅到有粪便味，牠很容易又隨地大小便。

休息方面：猪食后又經過大小便，将牠們赶到休息处（习惯后即不用赶了），如个别猪要大小便时，牠就会离开自己臥处，来回不安地走动，或者发出吱吱地叫声（意思是叫人开门），这时管理員就赶快开门让牠大小便，便后即迅速

巡回原处休息。但在未习惯前发现臥处有粪便要及时清除垫干。因此，在猪仓内一般是看不到猪粪的。

变仓库为生产基地，使生猪迅速长膘

学先进、超先进、跃进争强，成为該仓库每个职工的行动纲领。当六月三日人民日报第二版刊登了“生猪割除甲状腺，一天长四斤肉”的消息后，大家立即推选八人进行试验。头一次因缺乏实际操作经验，又没有手术工具，临时想办法，采用屠宰公鸡刀作试验，把猪翻个脸朝天，一直找了四十分钟，也沒找到甲状腺，试验失败了。但是在党和领导的支持下，职工们的决心更大，信心更足，异口同声的提出：“人家能作到的，我們一定能作得到。”当夜召开了猪师、卫生员、养猪工人的“诸葛亮会议”，在集体发挥智慧的情况下，找到了失败的原因：部位不够正确，深度不够；甲状腺不是乳白色的而是粉红色的象枣核一样的硬肉。同时领导上更鼓励大家：“一定要大胆试验大胆干。”第二天便向有关单位借了开剥工具，用木棍和绳网制了一个猪软床，按照既定部位和操作方法进行，迅速的找到了粉红色甲状腺，切除缝合后很安全，长膘增重效果良好。六月九日切除五头，到六月十二日增重的情况是：（见下页附表）

总的来看，最高的每头每天增重5.33斤，最低的1.88斤，平均3.13斤。

割除甲状腺的操作方法如下：

(一) 使用器械的准备：

一、用坚固的皮绳编成一个软床，使猪仰卧，便于开刀或者使用保定床(即手术床)。保定床用木料制成，长约五

單位：市斤

生猪編號	原重	現重	每头日平均增重
1	104	108	1.63
2	97	110	4.63
3	112	118	2
4	110	118	2.63
5	104	120	5.83
合計	527	574	8.13

尺至五尺半，高二尺半至三尺，寬二尺至二尺半，形状好象行軍床。

二、捆嘴繩。用白洋布（約四分之二那么寬）五至六尺長制，避免滑脫或捆傷嘴。

三、剪刀一把，大小刷子各一个，磁盆一个，創傷鉤兩把，镊子兩把，注射器一个，針头若干个，解剖刀一个，磁盤两个，手术手套一双，来苏尔若干，局部麻醉药若干（普魯卡因和副腎素），縫合用具一套（縫衣針線可代替），松留油（二零四魚石脂軟膏）、碘酒、酒精、脫脂棉、滑石粉各若干，毛巾两条，消毒鍋一个，以及桌子和木架等。

（二）操作過程：

一、捉猪上保定床。将猪倒放保定床上，臉朝天，前兩腿稍向后直伸，前上胸綫捆在床兩端的橫架上，用白布捆扎猪嘴。

二、定准部位，剪毛、消毒、打麻醉針。工作的开始，首先必须定准部位，因为这是能否找到甲状腺的首要关键。部位确定在猪喉头下，深度約二至三指。在确定部位上剪毛四寸长二寸寬（毛要剪淨），然后用刷子蘸来苏儿水溶液洗净，再用碘酒消毒。动手术时，为了使猪减少局部疼痛和出血过多現象，可用普魯卡因和副肾素混合（普魯卡因四C.C、副肾素五C.C）注射（每头六至七C.C，有效期为二十五分钟左右）。

三、集中精力，操作迅速，开刀稳妥的切除甲状腺。手术刀随着部位进入皮下，剖开皮肤后，用創傷鉤鉤起皮肤，再用刀分开皮下結締質，連切两层后，露出精紅色的单块膜体，甲状腺的周围被一层白色皮薄膜包围着。这时要集中精力，动作迅速，用手术刀将白色皮薄膜从中心切开挑剖出皮膜（挑时先左后右，先上后下，并要注意防止割破气管或搞坏甲状腺）后，便很清楚地看到甲状腺，这时手术刀应緊緊貼着甲状腺，稳妥地将甲状腺取出。

四、縫刀口、松繩，小心地放猪回圈去。甲状腺取出后伤口处要撒一层消炎粉，再用已經消过毒的縫合針線縫（衣針線也可）进行縫合，縫后再用碘酒涂擦消毒，伤口上边抹上松留油（防腐、杀外寄生虫、治皮肤病）。一切手术操作結束后，再用手輕輕地将繩解掉，人拖保定床呈斜坡状，放猪下床，徐徐地赶猪回圈休息。

（三）應注意事項：

- 一、未动手术前，要作好各种用具和药物的准备工作。
- 二、一切用具都要經過严密的消毒、檢查，以防病菌感染。

三、开刀的器具要有两套，替换使用。

四、割下甲状腺严禁食用，以防食后中毒。

(四)費用：

每头猪用四CC普魯卡因、五CC副腎素和一包消炎粉以及碘酒、酒精等，共值約三角錢。

“猪院長”王國賢治療病殘豬的經驗

王國賢是許昌專署商業局漯河中轉分送站生猪仓库的饲养員。他从十二岁起就干这一行，現在飼養保管生猪已有三十一年的历史了。他不但能够掌握猪的习性和特点，而且能够治疗病残猪，还保証每头每天增重一斤零七錢（平均数）。为此，別人送他一个尊敬的称号“猪院长”。現將他治疗病残猪的先进經驗介紹如下：

識別病殘情況，分類保管。

接收猪时要和检疫員取得密切联系，仔細听取生猪情况介绍；在剔病残猪的同时，分出肿耳、眼子、瘸腿、腸胃病、驟皮、猪气喘病，高溫等七大类，分圈保管。因为，高溫猪常带有傳染病，分开可以避免傳染；肿耳、眼子猪怕咬；驟皮猪易腐烂；瘸腿行动不便，吃食有困难；气喘猪出气困难。这样分开保管便于飼養和治疗。