


QUINTESSENCE OF MATERIA MEDICA


中华药大典

原色中草药植物图鉴



主 编 陈士林 林余霖 中国医学科学院药用植物研究所





QUINTESSENCE OF MATERIA MEDICA

中草药大典(下)

· 原色中草药植物图鉴 ·

主 编 陈士林 林余霖

中国医学科学院药用植物研究所



军事医学科学出版社



目 录 / 上 册

麦角菌科	
冬虫夏草	1
多孔菌科	
赤芝	2
紫芝	2
猪苓	3
茯苓	3
木耳科	
木耳	4
白蘑科	
雷丸	4
昆布科	
海带	5
马尾藻科	
羊栖菜	5
海蒿子	6
石杉科	
蛇足石杉	6
石松科	
灯笼草	7
石松	7
卷柏科	
兖州卷柏	8
垫状卷柏	8
卷柏	9
翠云草	9
木贼科	
笔管草	10
木贼	10
紫萁科	
紫萁	11
海金沙科	
海金沙	11
蚌壳蕨科	
金毛狗脊	12
鳞始蕨科	
乌蕨	12
凤尾蕨科	
井口边草	13
中国蕨科	
野鸡尾	13
球子蕨科	
荚果蕨	14

乌毛蕨科	
狗脊蕨	14
单芽狗脊蕨	15
鳞毛蕨科	
粗茎鳞毛蕨	15
水龙骨科	
江南星蕨	16
石韦	16
有柄石韦	17
庐山石韦	18
槲蕨科	
中华槲蕨	18
槲蕨	19
苏铁科	
苏铁	19
银杏科	
银杏	20
松科	
华山松	20
马尾松	21
油松	21
云南松	22
金钱松	22
柏科	
侧柏	23
罗汉松科	
罗汉松	23
三尖杉科	
三尖杉	24
中国粗榧	24
红豆杉科	
东北红豆杉	25
红豆杉	25
榧树	26
麻黄科	
木贼麻黄	26
中麻黄	27
草麻黄	27
木兰科	
鹅掌楸	28
黄兰	28
望春玉兰	29
玉兰	29
荷花玉兰	30
紫玉兰	30

厚朴	31
凹叶厚朴	31
武当玉兰	32
番荔枝科	
鹰爪	32
肉豆蔻科	
肉豆蔻	33
腊梅科	
腊梅	34
樟科	
钝叶桂	34
阴香	35
樟	35
肉桂	36
细叶香桂	36
天竺桂	37
川桂	37
乌药	38
山胡椒	38
山鸡椒	39
金粟兰科	
金粟兰	39
草珊瑚	40
三白草科	
戴菜	40
三白草	41
胡椒科	
荜茇	41
胡椒	42
马兜铃科	
长叶马兜铃	42
北马兜铃	43
马兜铃	43
广防己	44
广西马兜铃	44
木通马兜铃	45
绵毛马兜铃	45
宝兴马兜铃	46
耳叶马兜铃	46
管花马兜铃	47
北细辛	47
细辛	48
八角科	
地枫皮	48
八角	49

五味子科		淫羊藿	75	无花果	97
五味子	50	朝鲜淫羊藿	75	粗叶榕	98
华中五味子	50	柔毛淫羊藿	76	榕树	98
莲科		箭叶淫羊藿	76	薜荔果	99
莲	51	巫山淫羊藿	77	桑	99
睡莲科		阔叶十大功劳	77	荨麻科	
芡	51	细叶十大功劳	78	苎麻	100
毛茛科		南天竹	78	胡桃科	
牛扁	52	桃儿七	79	胡桃	100
伏毛铁棒锤	52	大血藤科		化香树	101
乌头	53	大血藤	79	壳斗科	
黄花乌头	53	木通科		栗	101
露蕊乌头	54	五叶木通	80	桦木科	
瓜叶乌头	54	白木通	80	尼泊尔桤木	102
北乌头	55	三叶木通	81	白桦	102
铁棒锤	55	防己科		商陆科	
松潘乌头	56	衡州乌药	82	商陆	103
类叶升麻	56	木防己	82	美国商陆	103
打破碗花花	57	蝙蝠葛	83	紫茉莉科	
楼斗菜	57	风龙	83	光叶子花	104
驴蹄草	58	地不容	84	仙人掌科	
兴安升麻	58	千金藤	84	仙人掌	104
升麻	59	粉防己	85	藜科	
大三叶升麻	59	青牛胆	85	藜	105
单穗升麻	60	罂粟科		土荆芥	105
芹叶铁线莲	60	白屈菜	86	刺藜	106
女娄	61	血水草	86	小藜	106
粗齿铁线莲	61	博落回	87	地肤	107
小木通	62	罂粟	87	苋科	
威灵仙	62	紫堇科		土牛膝	107
铁线莲	63	布氏紫堇	88	牛膝	108
大叶铁线莲	63	夏天无	88	柳叶牛膝	108
棉团铁线莲	64	紫堇	89	喜旱莲子草	109
黄花铁线莲	64	齿瓣延胡索	89	莲子草	109
绣球藤	65	延胡索	90	尾穗苋	110
辣蓼铁线莲	66	金缕梅科		苋	110
柱果铁线莲	66	枫香树	90	青葙	111
黄连	67	榧木	91	鸡冠花	111
三角叶黄连	67	交让木科		川牛膝	112
云南黄连	68	牛耳枫	91	千日红	112
还亮草	68	杜仲科		马齿苋科	
翠雀	69	杜仲	92	马齿苋	113
腺毛黑种草	69	榆科		土人參	114
朝鲜白头翁	70	榆树	92	落葵科	
白头翁	70	大麻科		落葵	114
毛茛	71	大麻	93	石竹科	
猫爪草	71	啤酒花	93	石竹	115
天葵	72	葎草	94	瞿麦	115
贝加尔唐松草	72	桑科		孩儿参	116
金莲花	73	菠萝蜜	94	银柴胡	116
小檗科		楮	95	麦蓝菜	117
细叶小檗	73	枸树	95	蓼科	
猫刺小檗	74	枸棘	96	金荞麦	117
八角莲	74	柘	96	荞麦	118

篇蓄	118	海南大风子	141	鹿蹄草科	
拳参	119	柞木	141	鹿蹄草	163
火炭母	119	红木科		普通鹿蹄草	163
毛脉蓼	120	红木	142	柿树科	
虎杖	120	旌节花科		柿	164
圆穗蓼	121	中国旌节花	142	君迁子	164
何首乌	121	西域旌节花	143	紫金牛科	
红蓼	122	堇菜科		九管血	165
草血竭	122	紫花地丁	143	朱砂根	165
杠板归	123	早开堇菜	144	紫金牛	166
见习蓼	123	柽柳科		虎舌红	166
蓼蓝	124	柽柳	144	九节龙	167
珠芽蓼	124	番木瓜科		罗伞树	167
翼蓼	125	番木瓜	145	报春花科	
华北大黄	125	葫芦科		点地梅	168
药用大黄	126	盒子草	146	过路黄	168
掌叶大黄	126	冬瓜	146	聚花过路黄	169
鸡爪大黄	127	假贝母	147	点腺过路黄	169
巴天酸模	127	西瓜	147	绣球花科	
蓝雪科		甜瓜	148	常山	170
白花丹	128	南瓜	148	景天科	
芍药科		绞股蓝	149	落地生根	170
芍药	128	广东丝瓜	149	瓦松	171
草芍药	129	丝瓜	150	大花红景天	171
牡丹	130	木鳖	150	费菜	172
川芍药	130	罗汉果	151	佛甲草	172
山茶科		栝楼	151	垂盆草	173
茶花	131	中华栝楼	152	虎耳草科	
油茶	131	秋海棠科		七叶鬼灯檠	173
茶	132	秋海棠	152	西南鬼灯檠	174
猕猴桃科		杨柳科		虎耳草	174
猕猴桃	132	垂柳	153	蔷薇科	
藤黄科		毛白杨	153	龙牙草	175
黄海棠	133	旱柳	154	山桃	175
地耳草	133	白花菜科		桃	176
贯叶连翘	134	白花菜	154	榆叶梅	176
椴树科		刺山柑	155	东北杏	177
破布叶	134	十字花科		梅	178
梧桐科		芥菜	155	山杏	178
梧桐	135	甘蓝	156	杏	179
山芝麻	135	油菜	156	野杏	179
胖大海	136	荠菜	157	欧李	180
锦葵科		播娘蒿	157	郁李	180
磨盘草	136	菘蓝	158	櫻桃	181
苘麻	137	独行菜	158	毛櫻桃	181
蜀葵	137	萝卜	159	木瓜	182
陆地棉	138	白芥	159	贴梗海棠	182
木芙蓉	138	芥苳	160	野山楂	183
木槿	139	杜鹃花科		山楂	183
野葵	139	岩须	160	山里红	184
木棉科		照山白	161	槲榔	184
木棉	140	羊蹄躄	162	蛇莓	185
大风子科		杜鹃花	162	枇杷	185
泰国大风子	140			路边青	186

棣棠花	186
石楠	187
委陵菜	187
翻白草	188
莓叶委陵菜	188
蕤核	189
李	189
月季	190
金樱子	190
刺梨	191
玫瑰	191
掌叶覆盆子	192
茅莓	192
地榆	193
长叶地榆	194
珍珠梅	194
花楸	195
含羞草科	
合欢	195
儿茶	196
金合欢	196
藤金合欢	197
云实科	
云实	197
苏木	198
腊肠树	198
含羞草决明	199
豆茶决明	199
望江南	200
铁刀树	200
槐叶决明	201
小决明	201
紫荆	202
皂荚	202
酸角	203
蝶形花科	
广州相思子	203
毛鸡骨草	204
相思子	204
沙冬青	205
小沙冬青	205
落花生	206
华黄芪	206
扁茎黄芪	207
膜荚黄芪	207
蒙古黄芪	208
紫云英	208
木豆	209
刀豆	210
响铃豆	210
假地兰	211
野百合	211
广东金钱草	212

鹦哥花	212
刺桐	213
大豆	213
光果甘草	214
胀果甘草	214
甘草	215
米口袋	215
多序岩黄芪	216
木蓝	216
扁豆	217
亮叶崖豆藤	217
排钱树	218
补骨脂	218
野葛	219
甘葛藤	219
白刺花	220
苦参	220
槐	221
越南槐	221
密花豆	222
葫芦茶	222
葫芦巴	223
赤豆	223
绿豆	224
赤小豆	224
紫藤	225
胡颓子科	
沙枣	226
胡颓子	226
中国沙棘	227
千屈菜科	
紫薇	227
千屈菜	228
瑞香科	
白木香	228
芫花	229
瑞香	229
瑞香狼毒	230
河朔莨花	230
了哥王	231
菱科	
乌菱	231
桃金娘科	
岗松	232
柠檬桉	232
蓝桉	233
桉树	233
丁香	234
番石榴	234
桃金娘	235
石榴科	
石榴	235

柳叶菜科	
露珠草	236
柳叶菜	236
锁阳科	
锁阳	237
使君子科	
使君子	237
诃子	238
绒毛诃子	238
八角枫科	
八角枫	239
蓝果树科	
喜树	239
山茱萸科	
西藏青荚叶	240
青荚叶	240
山茱萸	241
檀香科	
檀香	242
百蕊草	242
桑寄生科	
油茶离瓣寄生	243
红花寄生	243
广寄生	244
四川寄生	244
槲寄生科	
槲寄生	245
卫矛科	
苦皮藤	245
南蛇藤	246
卫矛	246
冬青卫矛	247
丝棉木	247
昆明山海棠	248
雷公藤	248
冬青科	
秤星树	249
枸骨	249
救必应	250
黄杨科	
匙叶黄杨	250
雀舌黄杨	251
顶花板凳果	251
大戟科	
铁苋菜	252
山麻杆	252
巴豆	253
月腺大戟	253
泽漆	254
飞扬草	254
地锦	255
甘遂	255
续随子	256
斑地锦	256

目 录 / 下 册

大戟	259	天师栗	278	黄柏	298
一叶萩	260	橄榄科		川黄柏	298
算盘子	260	橄榄	278	枳	299
白背叶	261	乌榄	279	芸香	299
粗糠柴	261	漆树科		椿叶花椒	300
余甘子	262	南酸枣	279	竹叶花椒	300
叶下珠	262	黄枏	280	花椒	301
蓖麻	263	芒果	280	两面针	301
乌桕	263	盐肤木	281	青椒	302
山乌桕	264	青麸杨	281	蒺藜科	
龙脷叶	264	红麸杨	282	骆驼蓬	302
地构叶	265	漆树	282	蒺藜	303
油桐	265	苦木科		酢浆草科	
鼠李科		臭椿	283	阳桃	303
云南勾儿茶	266	鸦胆子	283	感应草	304
北枳椇	266	苦木	284	牻牛儿苗科	
枣	267	楝科		熏倒牛	304
酸枣	267	米仔兰	284	牻牛儿苗	305
滇刺枣	268	灰毛浆果楝	285	鼠掌老鹳草	305
葡萄科		苦楝	285	紫地榆	306
乌头叶蛇葡萄	268	川楝	286	老鹳草	306
葎叶蛇葡萄	269	香椿	286	五加科	
白菝	269	芸香科		楸木	307
三叶崖爬藤	270	降真香	287	五加	308
葡萄	270	石椒草	287	糙叶五加	308
亚麻科		臭节草	288	刺五加	309
亚麻	271	代代花	288	无梗五加	309
远志科		酸橙	289	白勒	310
瓜子金	271	黎檬	289	常春藤	310
西伯利亚远志	272	柚	290	刺楸	311
远志	272	香橼	290	人参	311
省沽油科		佛手	291	珠子参	312
野鸦椿	273	橘	292	羽叶三七	312
无患子科		甜橙	292	竹节参	313
龙眼	273	香圆	293	三七	313
栾树	274	黄皮	293	西洋参	314
荔枝	274	白鲜	294	鹅掌藤	314
无患子	275	三叉苦	294	通脱木	315
文冠果	276	吴茱萸	295	伞形科	
凤仙花科		波氏吴茱萸	295	重齿当归	315
凤仙花	276	石虎	296	杭白芷	316
七叶树科		金橘	296	白芷	316
七叶树	277	山小橘	297	紫花前胡	317
浙江七叶树	277	千里香	297	当归	317

旱芹	318	芫花叶白前	343	筋骨草	368
柴胡	318	竹灵消	344	金疮小草	368
小柴胡	319	徐长卿	344	齿苞筋骨草	369
狭叶柴胡	319	柳叶白前	345	广防风	369
积雪草	320	地梢瓜	345	肾茶	370
明党参	320	蔓生白薇	346	风轮菜	370
蛇床	321	隔山牛皮消	346	光风轮菜	371
芫荽	321	杠柳	347	灯笼草	372
野胡萝卜	322	娃儿藤	347	香薷	372
茴香	322	茄科		活血丹	373
珊瑚菜	323	颠茄	348	蓝萼香茶菜	373
天胡荽	324	辣椒	348	碎米亚	374
辽藁本	324	木本曼陀罗	349	夏至草	374
川芎	325	毛曼陀罗	349	益母草	375
宽叶羌活	325	洋金花	350	蟹菜	375
羌活	326	莨菪	350	细叶益母草	376
水芹	326	宁夏枸杞	351	地笋	376
华中前胡	327	中华枸杞	351	毛叶地瓜儿苗	377
前胡	327	挂金灯	352	薄荷	377
防风	328	泡囊草	352	留兰香	378
小窃衣	328	白英	353	石香薷	378
马钱科		茄	353	毛叶丁香罗勒	379
马钱	329	龙葵	354	牛至	379
长籽马钱	329	旋花科		紫苏	380
龙胆科		肾叶打碗花	354	广藿香	380
粗茎秦艽	330	牵牛	355	长冠夏枯草	381
达乌里秦艽	330	圆叶牵牛	356	硬毛夏枯草	381
华南龙胆	331	南方菟丝子	356	夏枯草	382
秦艽	331	菟丝子	357	丹参	382
条叶龙胆	332	金灯藤	357	荔枝草	383
坚龙胆	332	紫草科		甘西鼠尾	383
龙胆	333	软紫草	358	荆芥	384
鳞叶龙胆	333	斑种草	358	黄芩	384
麻花苳	334	琉璃草	359	半枝莲	385
灰绿龙胆	334	紫草	359	百里香	385
夹竹桃科		滇紫草	360	展毛地椒	386
灯台树	335	马鞭草科		车前草科	
鸡骨常山	335	白棠子树	360	车前	386
罗布麻	336	裸花紫珠	361	平车前	387
长春花	336	光果莸	361	大车前	388
海芒果	337	三花莸	362	醉鱼草科	
夹竹桃	337	路边青	362	白背枫	388
鸡蛋花	338	苦郎树	363	大叶醉鱼草	389
萝芙木	338	海洲常山	363	密蒙花	389
黄花夹竹桃	339	假连翘	364	木犀科	
络石藤	340	马鞭草	364	连翘	390
萝藦科		黄荆	365	小叶芩	390
马利筋	340	荆条	365	白蜡树	391
青龙藤	341	牡荆	366	水曲柳	391
牛角瓜	341	蔓荆	366	花曲柳	392
白薇	342	单叶蔓荆	367	茉莉	392
牛皮消	342	唇形科		女贞	393
戟叶牛皮消	343	藿香	367		

木犀	393	忍冬科		灰毛川木香	441
玄参科		华南忍冬	416	驴欺口	441
毛花洋地黄	394	菰腺忍冬	416	鳢肠	442
洋地黄	394	忍冬	417	地胆草	442
毛泡桐	395	灰毡毛忍冬	417	一点红	443
地黄	395	陆英	418	多须公	443
玄参	396	接骨木	418	佩兰	444
阴行草	396	败酱科		白头婆	444
列当科		甘松	419	轮叶佩兰	445
肉苁蓉	397	墓头回	420	鼠曲草	445
苦苣苔科		黄花败酱	420	菊三七	446
牛耳草	397	糙叶败酱	421	向日葵	446
吊石苣苔	398	攀倒甑	421	欧亚旋覆花	447
爵床科		蜘蛛香	422	羊耳菊	447
穿心莲	398	缙草	422	藏木香	448
白接骨	399	川续断科		旋覆花	448
板蓝	399	川续断	423	线叶旋覆花	449
狗肝菜	400	日本续断	423	总状土木香	449
爵床	400	菊科		中华小苦荬	450
脂麻科		蓍	424	云木香	450
脂麻	401	藿香蓟	424	千里光	451
紫葳科		乳白香青	425	毛梗稀荬	452
凌霄	401	珠光香青	425	稀荬	452
厚萼凌霄	402	牛蒡	426	腺梗稀荬	453
梓树	402	黄花蒿	426	水飞蓟	453
木蝴蝶	403	奇蒿	427	一枝黄花	454
桔梗科		艾蒿	427	苣荬菜	454
石沙参	404	茵陈蒿	428	漏芦	455
轮叶沙参	404	白苞蒿	428	华蒲公英	455
西南风铃草	405	猪毛蒿	429	蒲公英	456
羊乳	405	菱蒿	429	款冬	456
党参	406	大籽蒿	430	蟛蜞菊	457
川党参	406	狭苞紫苑	430	苍耳	457
半边莲	407	紫苑	431	泽泻科	
桔梗	407	茅苍术	431	泽泻	458
蓝花参	408	白术	432	禾本科	
茜草科		婆婆针	432	青皮竹	458
细叶水团花	408	六耳铃	433	青秆竹	459
金鸡纳	409	天名精	433	蕙苳	459
虎刺	409	大花天名精	434	芸香草	460
猪殃殃	410	红花	434	牛筋草	460
栀子	410	石胡荽	435	大麦	461
白花蛇舌草	411	菊苣	436	白茅	461
巴戟天	411	蓟	436	淡竹叶	462
鸡矢藤	412	刺儿菜	437	稻	462
茜草	412	野苘蒿	437	芦苇	463
白马骨	413	还阳参	438	淡竹	463
毛钩藤	413	芙蓉菊	438	金丝草	464
大叶钩藤	414	野菊	439	粟	464
钩藤	414	甘菊	439	小麦	465
白钩藤	415	菊	440	玉米	465
华钩藤	415	川木香	440	莎草科	
				莎草	466

棕榈科	
槟榔	466
椰子	467
棕榈	468
天南星科	
水菖蒲	468
金钱蒲	469
石菖蒲	469
海芋	470
魔芋	470
东北南星	471
一把伞南星	471
异叶天南星	472
千年健	472
虎掌	473
半夏	473
鞭檐犁头尖	474
犁头尖	474
独角莲	475
浮萍科	
青萍	475
紫萍	476
谷精草科	
谷精草	476
鸭跖草科	
鸭跖草	477
灯心草科	
灯心草	477
黑三棱科	
黑三棱	478
香蒲科	
长苞蒲黄	478
水烛	479
东方香蒲	479
姜科	
云南草蔻	480
红豆蔻	480
草豆蔻	481
高良姜	481
益智	482
爪哇白豆蔻	482
白豆蔻	483
海南砂仁	484
砂仁	484
绿壳砂	485
广西莪术	485
姜黄	486
温郁金	486
山柰	487
姜	487
百合科	
薤	488

天蓝韭	488
葱	489
小根蒜	489
太白韭	490
大蒜	490
韭菜	491
芦荟	491
好望角芦荟	492
库拉索芦荟	492
知母	493
天门冬	493
短梗天门冬	494
大百合	494
朱蕉	495
川贝母	495
梭沙贝母	496
伊犁贝母	496
甘肃贝母	497
暗紫贝母	497
平贝母	498
浙贝母	498
黄花草	499
萱草	500
小黄花菜	500
玉簪	501
百合	501
麝香百合	502
山丹	502
卷丹	503
阔叶麦冬	503
山麦冬	504
麦冬	504
七叶一枝花	505
滇重楼	505
华重楼	506
多花黄精	506
小玉竹	507
滇黄精	507
玉竹	508
黄精	508
藜芦	509
石蒜科	
文殊兰	509
石蒜	510
水仙	510
鸢尾科	
射干	511
番红花	511
马蔺	512
鸢尾	512
仙茅科	
大叶仙茅	513

仙茅	513
百部科	
百部	514
直立百部	514
大百部	515
拔葜科	
菝葜	516
光叶菝葜	516
薯蓣科	
参薯	517
黄独	517
粉背薯蓣	518
穿龙薯蓣	518
薯蓣	519
绵草蓣	519
兰科	
小白及	520
黄花白及	520
白及	521
虾脊兰	521
杜鹃兰	522
毛杓兰	522
扇脉杓兰	523
美花石斛	523
石斛	524
铁皮石斛	524
天麻	525
独蒜兰	525





大戟 (京大戟) *Euphorbia pekinensis* Rupr.

基 源 京大戟为大戟科植物大戟的根。

原 植 物 多年生草本。全株含乳汁。根圆锥状。茎直立，上部分枝，被白色短柔毛，基部稍紫色。叶互生，近无柄，长圆状披针形或披针形，全缘，边缘反卷。伞形聚伞花序顶生，杯状花序总苞坛形，先端4裂，腺体4，椭圆形；花小，黄绿色，单性同株，生于杯状总苞中。蒴果三棱状球形，有疣状突起。花期6~8月。

生境分布 生于山坡路旁、荒地及较阴湿的林下。除海南、新疆、西藏外，全国各省、自治区有分布。

采收加工 春、秋季挖取根部，洗净，晒干。

性味功能 味苦，性寒，有毒。有泻水逐饮，消肿散结的功能。

主治用法 用于水肿胀满，痰饮积聚，胸膜炎积水，气逆喘咳，二便不利，晚期血吸虫病腹水，肝硬化腹水及精神分裂症；外用于疔疮疖肿。用量醋制品 1.5~3g；研粉吞服 0.3~1g，外用适量，研末调敷。孕妇忌服，体弱者慎用。不宜与甘草同用。

应 用 1. 胸腹积水：大戟、甘遂、白芥子各 1g，研末，装入胶囊，大枣 10 枚，煎汤，空服送服。
2. 急慢性肾炎水肿：大戟，加盐研末装入胶囊，口服。



一叶萩

Flueggea suffruticosa Baill. (*Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd.)

基 源 为大戟科植物一叶萩的叶及花。

原 植 物 别名：叶底珠

灌木。单叶互生，椭圆形或卵状椭圆形，先端短尖，基部楔形，全缘或具波状齿或微锯齿。夏季开淡黄色小花，雌雄异株，3~12朵簇生于叶腋；无花瓣，萼片5，卵形；雄花花盘腺体5，分离，2裂，雌花花盘几不分裂；蒴果三棱状扁球形，熟时红褐色，无毛，裂成3瓣。花期6~7月。果期8~9月。

生境分布 生于山坡或路旁。分布于东北及河北、陕西、山东、台湾、河南、湖北、广西、四川等省区。

采收加工 春季开花前采收晒干。

性味功能 味甘、苦，性平。有毒。有祛风活血，补肾强筋的功能。

主治用法 用于面神经麻痹，小儿麻痹后遗症，眩晕，耳聋，神经衰弱，嗜睡症，阳痿等症。用量3~6g。

应 用

1. 面神经麻痹：硝酸一叶萩碱3~4 mg/日，注射面部穴位，12次为一疗程。
2. 小儿麻痹后遗症：硝酸一叶萩碱0.2~0.3mg/kg体重，穴位注射。
3. 眩晕、耳聋，兴奋性降低的神经衰弱，嗜睡症：硝酸一叶萩碱2mg，皮下或肌肉注射，每日1次。

大戟科 Euphorbiaceae



算盘子 *Glochidion puberum* (L.) Hutch.

基 源 为大戟科植物算盘子的根和叶。

原 植 物 别名：算盘珠、野南瓜、果盒仔

灌木。单叶互生，纸质或近革质，长圆形、长圆状卵形或披针形，先端钝，基部宽楔形，全缘，上面仅脉上被疏短柔毛或几无毛，下面粉绿色，密被短柔毛；托叶三角形。花单性，雌雄同株或异株，黄绿色，无花瓣。蒴果扁球形，形如算盘珠。花期夏、秋季。

生境分布 生于山坡灌丛中。分布于长江流域及以南各省区。

采收加工 根全年可采，切片晒干。叶夏秋采集，晒干。

性味功能 味微苦、涩，性凉。有清热利湿，祛风活络的功能。

主治用法 用于感冒发热，咽喉痛，疟疾，急性胃肠炎，消化不良，痢疾，风湿性关节炎，跌打损伤。用量15~30g。

应 用

1. 急性胃肠炎、消化不良：算盘子叶、桃金娘叶各等量，研粉。每服1g，每日3次。
2. 细菌性痢疾：算盘子根、六月雪根各30g，铁扫帚根、甘草各15g，陈皮、陈芋头叶柄各9g，蒴藋60g。水煎服。

大戟科 Euphorbiaceae



白背叶 *Mallotus apelta* Muell.

基 源 为大戟科植物白背叶的根、叶。

原 植 物 灌木或乔木。单叶互生，近革质，长圆状卵形，先端渐尖，全缘或3浅裂，灰白色，被星状毛，具2腺体。花单性，雌雄异株，雄花穗状花序顶生，被灰白色星状毛；雌花穗状花序顶生或侧生；花萼3~6裂，外密被柔毛，无花瓣。蒴果近球形，密生羽毛状软刺及星状毛。花期5~6月。果期7~9月。

生境分布 生于山坡、灌丛。分布于我国南方大部分省区。

采收加工 根全年可采挖，切片晒干。叶夏秋采集，晒干或鲜用。

性味功能 味微苦，涩，性平，根有小毒。有清热平肝，健脾化湿，收敛固脱的功能。叶有清热利湿，消炎解毒，止血止痛的功能。

主治用法 根用于急慢性肝炎，肝脾肿大，胃痛，消化不良，风湿关节痛，目赤。叶外用于中耳炎，疖肿，湿疹，跌打损伤，外伤出血。用量15~30g。

应 用

1. 急、慢性肝炎：白背叶鲜根50g，水煎服。
2. 妊娠水肿：白背叶根、相思豆全草(除去种子)、大风艾。水煎服。
3. 化脓性中耳炎：白背叶，水煎，先用白醋洗耳，拭干，滴入药液擦涂。

大戟科 Euphorbiaceae



粗糠柴 *Mallotus philippinensis* (Lam.) Muell.-Arg.

基 源 为大戟科植物粗糠柴的果实表面粉状毛茸和根入药。

原 植 物 常绿小乔木。小枝被棕褐色星状柔毛。单叶互生，近革质，长圆状卵形或卵状披针形，先端渐尖，基部圆或宽楔形，全缘或有波状齿，上面深绿色，下面密被短星状毛及红色腺点，近叶柄处有2腺体。花单性，雌雄同株；穗状花序顶生或生于枝上部叶腋内，花序梗密被星状柔毛及腺点；雄花黄白色，无花瓣；雌花萼管状，4~5裂齿；子房外被红色颗粒状腺点。蒴果球形，密被鲜红色粉状茸毛。花期3~4月，果期7~8月。

生境分布 生于山坡丛林中。分布于四川、贵州、浙江、湖北、湖南、云南、广东、广西、福建、海南、台湾等省区。

采收加工 根全年可采。果实秋季采，收取腺毛及毛茸晒干。

性味功能 根味微苦，微涩，性凉。有清热利湿的功能。果毛(腺体粉)，有毒。有驱虫的功能。

主治用法 根用于急慢性痢疾，咽喉肿痛。腺体粉末用于驱绦虫，蛲虫，蛔虫。用量根15~30g。腺体粉末成人6~9g，小儿1.5g。

应 用

1. 绦虫：腺体粉末4.5g，咖啡碱2.1g，石榴皮碱0.9g，蓖麻油4.5g，混合装入胶囊，每服1~2g。
2. 疮疡溃烂久不收口：叶煎水外洗或用叶研粉撒敷患处。

大戟科 Euphorbiaceae



余甘子 *Phyllanthus emblica* L.

基 源 为大戟科植物余甘子的果实。

原 植 物 别名：柚柑、滇橄榄

落叶灌木。单叶互生，密集为二列，形似羽状复叶；先端钝，基部圆或偏斜，全缘。花单性，雌雄同株，花小，黄色，3~6朵呈团伞花序，簇生叶腋，每花簇有1朵雌花和数朵雄花。蒴果球形或扁圆形，淡黄色或紫红色，6棱，干后裂成6片。种子6，褐色，稍3棱形。花期4~5月。果期9~11月。

生境分布 生于林下、灌丛中或山坡阳处。分布于福建、台湾、广东、广西、四川、贵州、云南等省、自治区。

采收加工 秋季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

性味功能 味甘、酸、涩，性凉。有清热凉血，消食健胃，生津止咳的功能。

主治用法 用于高血压，消化不良，咳嗽，喉痛，口干，烦渴，牙痛，维生素C缺乏症。用量3~9g。多入丸散服。

应 用

1. 喉热，咽喉炎：鲜余甘子，含嚼。
2. 高血压，高血脂：余甘子，水煎服。
3. 糖尿病：余甘子，嚼服。
4. 感冒发热、咳嗽、口干烦渴：鲜余甘子30枚，水煎服。

附注：其根、叶亦供药用。味辛，性平。根用于高血压，胃痛，肠炎，淋巴结结核。叶用于水肿，皮肤湿疹，用量9~18g。

大戟科 Euphorbiaceae



叶下珠 *Phyllanthus urinaria* L.

基 源 为大戟科植物叶下珠的全草。

原 植 物 别名：珍珠菜、叶下珍珠、叶后珠

一年生小草本。茎直立，分枝，通常带红色。单叶互生，呈二列，极似羽状复叶，具短柄或近于无柄；叶片长椭圆形，先端斜尖或钝或有小凸尖，基部圆形或稍偏斜，全缘。花单性，雌雄同株，无花瓣。蒴果扁球形。花期秋季。

生境分布 生于山坡、路旁或田坎较干燥的地方。分布于长江流域至南部各省区。

采收加工 夏、秋季采集全草，去杂质，晒干。

性味功能 味微苦、甘，性凉。有清热利尿，明目，消积的功能。

主治用法 用于肾炎水肿，泌尿系感染、结石，肠炎，痢疾，黄疸型肝炎；外用于青竹蛇咬伤。用量15~30g。

应 用

1. 急性肾炎：叶下珠、白花蛇舌草各9g，紫珠草、石韦各15g。水煎服。
2. 肾盂肾炎：叶下珠、白花蛇舌草各60g，广金钱草30g，水煎服。
3. 青竹蛇咬伤：鲜叶下珠，捣烂涂敷患处。

大戟科 Euphorbiaceae



蓖 麻(蓖麻子) *Ricinus communis* L.

基 源 蓖麻子为大戟科植物蓖麻的干燥成熟种子。

原 植 物 一年生草本。茎直立，中空。叶盾形；掌状5~11裂，裂片缘具齿。花单性，雌雄同株，无花瓣；聚伞圆锥花序，顶生或与叶对生。雄花的萼3~5裂；雌花萼5裂。蒴果长圆形或近球形，稍扁，有灰白色、黑棕色或黄棕色交错的大理石样纹理，平滑，有光泽。种皮硬脆，较薄。种仁白色。花期7~8月，果期9~10月。

生境分布 全国各地均有栽培。

采收加工 秋季采摘成熟果实，晒干，除去果壳，收集种子。

性味功能 味甘、辛，性平。有毒。有消肿，排脓，拔毒，润肠通便的功能。

主治用法 外用于疮疖，肿毒。种仁油内服用于大便秘结。外用适量。

应 用

1. 面神经麻痹：蓖麻子，捣烂外敷。
2. 疮疡化脓未溃、淋巴结核：蓖麻子，捣烂成膏状，外敷。
3. 烫伤，烧伤：蓖麻子、蛤粉等份，研膏，油调涂敷患处。
4. 胃下垂，子宫脱垂：蓖麻子适量，捣烂，做成饼状，贴敷头顶百会穴。

大戟科 Euphorbiaceae



乌 柏 *Sapium sebiferum* (L.) Roxb.

基 源 大戟科植物乌柏的根皮，树皮及叶入药。

原 植 物 落叶乔木，有乳汁。幼枝淡黄绿色。单叶互生，纸质，菱状卵形或菱状卵圆形，先端长渐尖，基部宽楔形，全缘，两面无毛。穗状花序顶生；花单性，雌雄同株，无花瓣及花盘，雄花生于花序上部，雌花1~4，生于花序基部；着生处两侧各有肾形腺体1枚，花萼3深裂；子房光滑，3室，柱头3裂。蒴果卵球形或椭圆形，先端尖，室背开裂成3瓣。花期4~5月。果期8~10月。

生境分布 生于村边、堤岸、溪边或山坡上。分布于陕西、河南及华东、中南、华南、西南等省区。

采收加工 根皮或树皮全年可采，切片晒干。叶夏秋季采，鲜用。

性味功能 味微苦，性寒，有小毒。有破积逐水杀虫解毒的功能。

主治用法 用于血吸虫病，肝硬化腹水，传染性肝炎，大小便不利，毒蛇咬伤。外用于疔疮，鸡眼，乳腺炎，跌打损伤，湿疹，皮炎。用量，根皮或树皮3~9g。叶9~15g。外用适量。

应 用

1. 传染性肝炎：乌柏鲜根30g，加红糖炖服。
2. 疔疮：乌柏树皮捣烂(或烤干研粉)，加少量冰片，用蛋清调匀外敷。
3. 血吸虫病：乌柏叶9~30g，水煎服，20~30天1个疗程。
4. 湿疹、皮炎：外用鲜叶捣烂敷患处或煎水洗。

大戟科 Euphorbiaceae



山乌柏 *Sapium discolor* (Champ. ex Benth.) Muell.-Arg.

基 源 大戟科植物山乌柏的根皮、树皮及叶入药。

原 植 物 落叶乔木。叶互生，纸质，长椭圆形，基部宽楔形，全缘。叶柄顶端有1~2腺体。穗状花序顶生；花单性，雌雄同株，大部分为雄花，花萼杯状，无花瓣及花盘。花序近基部有雌花。萼片3，三角形。蒴果近球形，黑色，有3棱。花期5~6月。果期7~8月。

生境分布 生于山坡疏林中，河谷或杂木林中。分布于浙江、江西、福建、湖南、广东、海南、广西、贵州等省区。

采收加工 根皮或树皮全年可采，晒干。叶夏秋季采，晒干或鲜用。


性味功能 味苦，性寒，有小毒。有泻下逐水，散瘀消肿的功能。叶有散瘀消肿，祛风止痒的功能。

主治用法 根皮、树皮用于肾炎水肿，肝硬化腹水，大小便不利，痔疮，皮肤湿疹。叶外用于乳痈，跌打肿痛，湿疹，过敏性皮炎，带状疱疹，毒蛇咬伤。孕妇及体虚者忌服。用量，根皮、树皮3~9g。叶外用适量。鲜叶捣烂敷患处或煎水洗。

应 用

1. 大便秘结：山乌柏根 50g，水煎服。
2. 痔疮，皮肤湿疹：山乌柏根、金银花等各适量，水煎洗患处。
3. 毒蛇咬伤：山乌柏根 9~15g，水煎冲酒服，并用鲜叶捣烂敷伤口周围。

大戟科 Euphorbiaceae



龙脷叶 *Sauropus spatulifolius* Beille

基 源 为大戟科植物龙脷叶的干燥叶。

原 植 物 别名：龙舌叶、龙味叶、牛耳叶

常绿小灌木。叶互生，纸质，长倒卵形或卵状披针形，先端微凹，中间具一小棘尖，基部渐狭，全缘，被疏柔毛；托叶三角形。总状花序腋生；花小、单性，暗紫色；雄花花萼6裂，雄蕊3，花丝结合；雌花与雄花同形，花柱3，子房3室。蒴果具短柄，肾形，几为增长的萼所包藏。

生境分布 生于山谷丛林中，多为栽培。分布于广东、海南、广西等省区。

采收加工 于5~6月开始采集青绿色老叶，晒干或鲜用。通常每株每次采4~5片，每隔15天采一次。

性味功能 味甘、淡，性平。有清热化痰，润肠通便的功能。

主治用法 用于肺燥咳嗽，咯血，急性支气管炎，喉痛，大便秘结。用量6~15g。

应 用

1. 肺炎咳嗽：龙脷叶 15g，猪肉，水煎服。
2. 急性支气管炎，上呼吸道感染，支气管哮喘：龙脷叶 12g。水煎服。
3. 大便秘结：龙脷叶 15g。研末，蜂蜜冲服。

大戟科 Euphorbiaceae