

综合治疗 方便安全


百病自我疗法丛书

总主编/王海泉

胃溃疡的 自我疗法

- 按摩疗法 ○拔罐疗法 ○刮痧疗法 ○熏洗疗法
- 灸 疗 法 ○耳穴疗法 ○药物疗法 ○贴敷疗法
- 饮食疗法 ○运动疗法 ○音乐疗法 ○心理疗法

主 编/刘北京 王惠陵 刘玉霞



中国中医药出版社

百病自我疗法丛书

胃溃疡的自我疗法

胃溃疡的自我疗法

主编 刘北京 王惠陵 刘玉霞
副主编 张艳芬 尚炳英 韩守峰
编委 于静 刘瑞萍 宋军

中国中医药出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

胃溃疡的自我疗法 / 刘北京等主编. —北京：中国中医药出版社，2006. 12
(百病自我疗法丛书)
ISBN 7 - 80231 - 117 - 9

I. 胃... II. 刘... III. 胃溃疡 - 治疗
IV. R573. 105

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 131452 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码：100013

传真：64405750

河北欣航测绘院印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 850 × 1168 1/32 印张 8 字数 195 千字

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 7 - 80231 - 117 - 9 册数 5000

*

定价：16.00 元

网址：www.cptcm.com

如有质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线：010 64405720

读者服务部电话：010 64065415 010 84042153

书店网址：csln.net/qksd/

《百病自我疗法丛书》编委会



总策划 王海泉 肖培新

总主编 王海泉

编 委 (以姓氏笔画为序)

王 克 王 娟 王惠陵 刘北京

孙学芹 成兆强 牟振文 张春花

李 艳 李福玲 杜恩伟 杨传梅

周修平 胡厚君 费大东 赵秋玲

袁秀玲 崔永星 崔桂华 韩立国

前 言

“言不可治者，未得其术也。”这是《黄帝内经》中的一句名言。几千年来，中医治疗疾病一直以“辨证论治”为主，强调的是“因人、因时、因地制宜”。中医治疗讲究“扶正祛邪”，“标本兼治”，“虚症实治”，“实症虚治”，“寒者热之，热者寒之，虚者补之，实者泻之”。中医治疗的“辩证施治”思想，对后世影响深远。

进入 21 世纪以来，随着科学技术和社会经济的发展，人类疾病谱发生了巨大的改变，生活方式疾病、心身疾病代替感染性疾病跃居疾病谱前列。疾病的的发生也由过去单一因素致病演变为多因素共同作用致病。这一切转变开始引导医学界不只从纵深，也从更广的层面思考疾病，而各种化学药品带来的毒副作用更促使人们寻找自然、绿色的解决病痛的方式方法。两千多年前的中国医学典籍《黄帝内经》中说，“言不可治者，未得其术也。”认为疾病治不好，是因为没有掌握正确的方法。“人之患，患病多；医之患，患道少。”意思是说病人担心患病多，而医生担忧治疗疾病的方法少。古人的这些话在今天依然对我们的临床有深刻的启发和指导意义。

与疾病作斗争不只是医生、护士的事，每一个病人、病人家

前 言

属都应该参与，在医护人员的指导下，大家共同努力，才能有效地防病治病。尽管非医护人员的参与非常有限，但是这种参与非常重要。为了更好地使人们参与疾病的预防、治疗，我们密切结合临床，查阅大量资料，编写了这套《百病自我疗法丛书》，将传统医学中的按摩、拔罐、刮痧、熏洗、艾灸、手疗、足疗、耳疗、药物、贴敷、食疗以及现代医学中的运动、音乐、心理调护的治病方法介绍给读者，为患者提供更多自我治疗的途径，突出其自然性、实用性，使读者易读、易懂、易掌握，在家中就可进行自我治疗，充分发挥患者主观能动性，为患者开辟自我康复的新天地，希望能对患者有所裨益。

“海内存知己，天涯若比邻”。书中《跌打损伤》篇集学习固熟患，熟学而人”。此次组织五位掌中堂医编撰此书，诚不外乎希望广大读者主妇面，专家患者必能入脑。谨此《百病自我疗法丛书》编委会
敬录于北京2006年8月

目 录

>>>

第一章 认识胃溃疡	1
第一节 概述	1
第二节 胃溃疡的发病原因和机制	5
第三节 胃溃疡的诊断与分类	10
第四节 胃溃疡的西医药治疗	22
第五节 中医学对胃溃疡的认识	29
第二章 认识经络和腧穴	35
第一节 认识经络和腧穴	35
第二节 治疗胃溃疡的常用穴位	39
第三章 胃溃疡的中药疗法	48
第一节 中药简介	48
第二节 胃溃疡常用中药简介	52
第三节 胃溃疡常用方剂及偏方验方	60
第四章 胃溃疡的拔罐疗法	70
第一节 拔罐疗法简介	71
第二节 胃溃疡常用拔罐方法	75
第五章 胃溃疡的刮痧疗法	84

第一节	刮痧疗法简介	/ 85
第二节	胃溃疡常用的刮痧疗法	/ 89
第六章	胃溃疡的饮食疗法	/ 95
第一节	饮食疗法简介	/ 95
第二节	胃溃疡的饮食禁忌	/ 103
第三节	胃溃疡的饮食选择	/ 106
第四节	胃溃疡的常用药膳	/ 110
第七章	胃溃疡的躯体按摩法	/ 116
第一节	按摩疗法简介	/ 116
第二节	胃溃疡常用躯体按摩法	/ 128
第八章	胃溃疡足底按摩法	/ 141
第一节	足底按摩简介	/ 141
第二节	足底按摩手法	/ 145
第三节	胃溃疡的足底按摩法	/ 147
第九章	胃溃疡手部按摩法	/ 149
第一节	胃溃疡常用手穴	/ 149
第二节	胃溃疡手部按摩法	/ 150
第十章	胃溃疡耳穴按摩法	/ 152
第一节	胃溃疡常用耳穴	/ 152
第二节	胃溃疡耳穴治疗法	/ 154
第十一章	胃溃疡的贴敷疗法	/ 157
第一节	贴敷疗法简介	/ 157
第二节	胃溃疡常用贴敷法	/ 162
第十二章	胃溃疡的艾灸疗法	/ 171
第一节	艾灸疗法简介	/ 171
第二节	胃溃疡常用艾灸法	/ 173
第十三章	胃溃疡的熏洗疗法	/ 176
第一节	熏洗疗法简介	/ 177

	第二节 胃溃疡常用熏洗法	/ 181
第十四章	胃溃疡的运动疗法	/ 188
	第一节 运动疗法简介	/ 188
	第二节 胃溃疡的运动疗法	/ 194
第十五章	胃溃疡的音乐疗法	/ 208
	第一节 音乐疗法简介	/ 208
	第二节 胃溃疡常用的音乐疗法	/ 212
第十六章	胃溃疡的心理调护	/ 219
	第一节 心理疗法简介	/ 220
	第二节 胃溃疡的心理调护	/ 223
第十七章	胃溃疡的预防	/ 232

第一章 认识胃溃疡

胃溃疡是一种常见的、多发的慢性消化系统疾病。多发生在胃窦小弯和胃角，这种病主要与胃酸、胃蛋白酶的消化作用有关，故属于消化性溃疡的一种。19世纪时，本病少见，进入20世纪后，本病发病率逐渐上升。但各国的发病率有显著差异，说明地理、气候、民族、遗传和生活习惯等因素可能对本病有一定影响。它的发病率很高，据估计约有10%~12%的人在其一生中的某个时期患过此病。此病发病率虽高，但死亡率却很低，约为2.5/1000000。胃溃疡可发生在任何年龄，但以45~55岁中老年最多，在性别上男性和女性几乎相等。临幊上以慢性周期性发作的有节律的上腹部疼痛为主要特点，若防治不当可引起大出血、胃穿孔或幽门梗阻、癌变等严重并发症。胃溃疡病的发生与季节有一定关系，发病率在秋冬和冬春之交时期远比夏季增高。本病的发生由多种因素引起，因致溃疡的攻击因子和防御因子失去平衡而引发，其中攻击因子包括胃酸、胃蛋白酶、动力学异常、胆酸、溶血卵磷脂和某些药物、酒精、烟碱以及幽门螺旋杆菌等；防御因子包括黏膜屏障、黏膜血流、前列腺素、碳酸氢盐分泌以及上皮再生等。中枢神经和自主神经对调节平衡起作用，

开心
一乐

一天，一个男人愁眉苦脸地去找医生看病，说他的胃痛得很厉害。

医生仔细检查了一下，说：“我高兴地告诉你，你的胃没有任何问题，病因是你太焦虑了，知道吗？”

他停了一会，接着又说：“两周前，来过一个和你患同样病的男人，也是焦虑所致，他告诉我他欠了一个裁缝的钱，还不起，我告诉他，别理它，只当没有那回事，什么都会好起来的。他按照我的劝告去做了，果然，第二天就来告诉我‘自我感觉良好’！”

“是的，医生，他是好了，可是，我就难受起来了！”

“怎么回事？”医生奇怪地问。

“因为我就是那个裁缝！”



一、胃溃疡的临床表现

1. 腹部疼痛 胃溃疡以上腹部疼痛为主要症状。大约有10%的溃疡病患者可无疼痛。典型的胃溃疡疼痛具有以下特点：

(1) 慢性反复发作史：由于溃疡病容易复发，故有上腹痛长期反复发作的特点，有的病程可长达几年或数十年。有的溃疡病发作持续时间很短，经治疗后即很快好转，未引起病人注意。因没有经过系统、长期的药物巩固性治疗，所以容易复发。

(2) 疼痛的周期性：溃疡病的另一个



图 1-1

特点是呈反复周期性发作，所谓疼痛的周期性是指疼痛经数日、数周或数月缓解，而后又复发，以春、秋、冬季发作更为常见。有的发病时间较长，病情日渐严重，表现为发作更为频繁，发作的持续时间延长而缓解的时间相应缩短。逐渐进入慢性病程后，临幊上可失去疼痛的节律性和周期性。

(3) 疼痛的性质：由于个体的耐受性及对疼痛刺激的感受阈值不同，溃疡病疼痛的性质和程度是多种多样的，表现为隐痛、钝痛、刺痛、烧灼痛、刀割样痛、胀痛等。疼痛多不剧烈，以中度钝痛为主，范围比较局限，可以忍受，偶尔也有疼痛严重者。

(4) 疼痛的节律性：节律性疼痛是溃疡病的特征性临床表现。进食与疼痛有一定关系，一般的规律是，胃溃疡疼痛多出现于餐后1小时左右，经1~2小时胃排空后缓解，其规律是进食——疼痛——缓解。溃疡性疼痛之所以呈节律性，可能与胃酸分泌有关，进食后1小时左右胃酸分泌开始增多，胃酸刺激溃疡面而引起疼痛，食物对酸具有缓冲作用，可使胃液pH值升高（即酸度降低），所以进食或口服碱性药物可使疼痛症状暂时缓解。引起溃疡痛的原因可能涉及胃酸以外的因素，如胃蛋白酶、胃及十二指肠张力增高和痉挛、胆盐刺激等。

(5) 疼痛的部位：溃疡病疼痛的部位局限，胃溃疡疼痛多位于上腹部偏左，位于胃体和贲门下的胃溃疡呈现右胸下部或左上腹部疼痛，疼痛症状大致可反应溃疡灶所在的位置。

2. 疼痛的影响因素 疼痛常因精神刺激、过度疲劳、饮食不慎、药物刺激、气候变化等因素诱发和加重，可因休息、进食、服制酸药、用手按压疼痛部位等减轻和缓解。

3. 其他症状 溃疡病除上腹部疼痛外，可出现恶心、呕吐、上腹饱胀、食欲减退、嗳气、反酸、烧心等消化不良的症状，这些症状缺乏特异性。有部分病人同时伴有慢性胃炎，病程较长的

患者可因影响摄食和消化功能而出现体重减轻、营养不良、贫血等。

4. 体征 胃溃疡病患者缺少特异性的体征，在溃疡病发作期上腹部偏左可有压痛，缓解期无明显表现。



图 1-2

二、胃溃疡常见并发症

1. 大出血 一般指的大出血是在数分钟或数小时内失血量超过 1000ml 或循环血量的 20% 以上，以呕血或黑便为主要症状。

2. 溃疡急性穿孔 溃疡病变深达浆膜层时，胃壁变薄，或加上胃肠腔内容物突然增加，可向腹腔穿破，胃或（及）十二指肠内容物流入腹腔，称为溃疡急性穿孔。其后果是急性弥漫性腹膜炎。溃疡急性穿孔是消化性溃疡最严重的并发症，也是最常见的急腹症之一。

3. 幽门梗阻 大多由十二指肠溃疡引起，但也可发生于幽门前及幽门管溃疡。由溃疡周围组织的炎性充血、水肿或幽门痉挛引起者称之为功能性或内科性幽门梗阻；由瘢痕组织收缩或与周围组织粘连而阻塞幽门通道所致者称之为器质性或外科性幽门梗阻。

4. 癌变 目前尚无可靠的早期临床症状能提示胃溃疡癌变，出现以下情况时应疑有癌变的可能性。

(1) 上腹痛失去原有节律性，变成经常的和与进食无关的疼痛。

(2) 食欲和体重明显下降。

(3) 持续粪便隐血试验阳性并出现贫血。

是(4)长期低热。血沉加速和(或)胃酸分泌迅速降低。

第二节 胃溃疡的发病原因和机制

胃溃疡的发病机制较为复杂，迄今尚未完全阐明。概括起来讲，本病是胃、十二指肠局部黏膜损害（致溃疡）和黏膜保护（黏膜抵抗）因素之间失去平衡所致。当损害因素增强而保护因素削弱时，就可出现溃疡，这是溃疡病发生的基本原理。

1. 黏膜损害因素

(1) 胃酸和胃蛋白酶的消化作用：胃酸和胃蛋白酶是胃液的主要成分，也是对胃及十二指肠黏膜损害的主要因素。“无酸无溃疡”学说仍为众人所重视。胃酸是由壁细胞分泌产生的，壁细胞表面有3种受体：乙酰胆碱受体、组胺受体、胃泌素受体。这些受体在泌酸物质刺激下可使壁细胞分泌大量胃酸。

(2) 胃运动功能障碍：胃溃疡患者的胃运动功能障碍有两方面，一是幽门括约肌异常，二是胃排空延缓。有部分胃溃疡病人的幽门括约肌松弛，幽门关闭不全，容易引起十二指肠液反流于胃腔，反流液中的胆汁、胰液、溶血卵磷脂、胆盐等对胃黏膜上皮细胞有显著的损伤作用，使黏膜下血管扩张和毛细血管通透性增加，出现水肿、出血和炎性反应，受损黏膜在胃酸和胃蛋白酶的作用下易形成溃疡。有的胃溃疡病人胃排空时间常常延长，胃内容物滞留使胃窦部张力增高，进而增加胃酸分泌，是形成胃溃疡的重要原因。

(3) 精神、神经因素：长期精神紧张、焦虑和情绪波动均可影响胃的分泌和运动功能，其机制可能是通过自主神经系统使胃酸分泌增多，胃运动减弱；通过下丘脑-垂体-肾上腺轴而使



图 1-3

皮质酮释放，促进胃酸分泌，减少胃黏液分泌，削弱了黏膜自身防御机能。



图 1-4

(4) 饮食不节和失调：粗糙食物不易被胃液消化，可使胃黏膜发生物理性损伤；过酸和辛辣食物可致化学性损伤；酒、咖啡、浓茶、可乐等饮料能刺激胃酸分泌增多；酒精可直接损伤胃及十二指肠黏膜，促进胃酸分泌，是外来的黏膜攻击因子。

顺口溜

革命小酒天天醉，
喝坏了党风喝坏了胃，
喝得老婆背靠背，
该喝不喝也不对，
公家出钱我出胃，
吃喝为了本单位，
哪个不是天天醉！



(5) 药物的不良作用：有些药物对胃黏膜有损害作用，最主要的是非甾体类消炎药，如阿司匹林、保泰松、吲哚美辛等。长期口服这些药品的患者中，10% ~ 25% 发生溃疡。非甾体类抗炎药损伤胃肠黏膜的原因除了药物对胃黏膜的直接刺激作用外，

还可抑制体内的环氧化酶活性，从而干扰胃黏膜内前列腺素的合成，削弱后者对胃的保护作用。长期、大量应用肾上腺皮质激素可诱发溃疡病，这类药物可使黏液生成减少，从而影响黏膜的防御机能。

(6) 吸烟：吸烟可增加溃疡并发症的发生率，影响溃疡的愈合和促进溃疡复发。第一，吸烟可引起血管收缩，从而削弱了中和十二指肠近端内的酸性液体能力；第二，吸烟可影响胃及十二指肠黏膜内的前列腺素合成，减少黏液量，从而降低黏膜防御机能；第三，吸烟可以促使胃酸和胃蛋白酶原的分泌增多；第四，吸烟可以影响幽门括约肌的关闭功能而导致胆汁反流，破坏胃黏膜屏障。另外，吸烟也可使胃排空延缓，影响胃运动功能。所以，溃疡病患者戒烟是必要的。

(7) 应激和心理因素：急性应激可引起应激性溃疡已是共识。但在慢性溃疡患者，情绪应激和心理矛盾的致病作用一直有争论。临床观察表明，长期精神紧张、焦虑或情绪波动的人易患消化性溃疡。总之，应激和心理因素可通过迷走神经机制影响胃肠分泌、运动和黏膜血流的调控。

(8) 病毒感染：很少部分溃疡患者的胃窦溃疡或幽门前区溃疡边缘可检出I型单纯疱疹病毒，而离溃疡较远的组织中则呈阴性，这些患者亦无全身性感染或免疫缺陷的证据，提示可能与胃溃疡的形成有关。

(9) 遗传因素：随着幽门螺旋杆菌在胃溃疡发病中重要作用得到认识，遗传因素的重要性受到了重视。首先，胃溃疡的家庭群集现象可能主要是由于幽门螺旋杆菌感染在家庭内传播所



图 1-5

致；其次，高胃蛋白酶原血症和家族性高促胃液素血症，在根除幽门螺旋杆菌后大多可恢复正常，提示幽门螺旋杆菌感染是家庭遗传因素引起。

2. 黏膜保护因素

(1) 黏液-黏膜屏障的破坏：胃黏膜表面上皮是胃黏膜屏障的解剖基础。正常情况下，胃黏膜由上皮细胞分泌的黏液所覆盖，黏液与完整的上皮细胞膜及细胞间连接形成黏液-黏膜屏障。这个屏障可被过多的胃酸、醋酸、阿司匹林、非甾体类消炎药及十二指肠液反流所破坏。十二指肠黏膜也具有这种屏障，十二指肠腺主要分泌黏液和碳酸。




图 1-6

(2) 上皮细胞更新：胃黏膜上皮的快速修复是最重要的黏膜防御机制。在正常情况下，胃黏膜细胞更新很快，3~5天全部更新一次。因为胃内经常存在损伤因素，表面上皮一旦受损伤而脱落，通过修复过程便可及时将缺损部位覆盖起来，随后再由增殖区细胞的再生过程产生新细胞加以补充代偿。若循环障碍，黏膜缺血坏死，而细胞又不能及时更新，则在胃酸、胃蛋白酶的作用下就可形成溃疡。

(3) 黏膜血流和酸碱平衡：胃黏膜血流不仅为黏膜细胞供