

“建·设·社·会·主·义·新·农·村·”  
“新·型·生·育·文·化·工·程·建·设·”

# 丛书

अन्नस्य वित्तस्य विकासान्वयित्वा गृहकार्यालयों द्वारा आयोगीकृत ग्रन्थ।

ग्रन्थालय विभाग द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ।

## 孕期异常情况的处理



中国人口出版社

ଅନ୍ୟାନ୍ୟକିରଣ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ  
କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

## 孕期异常情况的处理

中国人口出版社

### 图书在版编目 (CIP) 数据

孕期异常情况的处理 — 北京：中国人口出版社，2007.7

(建设社会主义新农村新型生育文化建设丛书)

ISBN 978 - 7 - 80202 - 497 - 7

I. 孕 … II. 国 … III. 妊娠期—妇幼保健—基本知识  
IV. R715.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 099088 号

### 孕期异常情况的处理

---

出版发行 中国人口出版社  
印 刷 北京普瑞德印刷厂  
开 本 880×1230 1/32  
印 张 1.625  
字 数 38 千字  
版 次 2007 年 7 月第 1 版  
印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷  
印 数 1 - 5 000 册  
书 号 ISBN 978 - 7 - 80202 - 497 - 7/R · 605  
定 价 30.00 元 (共 4 册)

---

社 长 陶庆军  
电子信箱 chinapphouse@163.net  
电 话 (010) 83519390  
传 真 (010) 83519401  
地 址 北京市宣武区广安门南街 80 号中加大厦  
邮 编 100054

---

版权所有 侵权必究 质量问题 随时退换

ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି



## 前　　言

为使少数民族地区农牧民家庭享有基本的公共服务，提高生活质量和生命质量，2007年1月14日，国家人口计生委在云南省迪庆藏族自治州启动了“新农村新家庭——大香格里拉地区人口健康促进”项目。该项目是国家人口计生委贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》的具体行动，是一项扶贫济困、雪中送炭、解决少数民族地区人民群众最迫切、最现实、最具体利益的民心工程。项目的启动对于人口和计划生育系统积极参与新农村建设、构建和谐社会具有十分重要的探索和示范性意义。

和谐美丽的藏族地区由于种种原因同发达地区相比还有很大的差距。突出地体现在社会发展如教育、卫生、社会保障等公共服务水平上。健康是人类发展的宝贵资源和重要目标，倡导积极的健康行为和生活方式，改善少数民族地区居民的生存状况，促进农牧民家庭健康已经成为时代发展的必然要求。

出版藏汉双语《建设社会主义新农村新型生育文化工程建设丛书》是该项目的后续行动。项目领导小组专家组根据藏族地区实际情况，对中国人口出版社现有图书进行了筛选、组织编译与进行了绘图。西藏自治区人口计生委主任普布卓玛等人参与了丛书的编校工作。中国人口出版社快速高质完成了丛书有关的出版任务。

按照国家人口计生委的要求，丛书将发放云南省迪庆藏族自治州香格里拉、德钦、维西，四川省甘孜州藏族自治州得荣、乡城、稻城和西藏自治区昌都地区昌都、察雅、左贡等项目的9个项目县的自然村。让广大农牧民更便捷地学习科学知识，提高素质，关爱生命。希望丛书能满足广大藏族农牧民生殖健康的需求，为创建“健康、文明、和谐”的新农牧区贡献一份力量。

编者  
2007年5月

# 妊娠·产后

## 目 录

1. 孕妇早期阴道流血的常见原因有哪些	/ 1
2. 什么是流产	/ 3
3. 为什么不能盲目保胎	/ 4
4. 流产的主要表现是什么	/ 7
5. 什么是习惯性流产?如何防治	/ 8
6. 什么是早产?引起早产的原因有哪些	/ 11
7. 如何预防早产	/ 14
8. 妊娠呕吐有哪些临床表现?如何处理	/ 16
9. 胎位不正怎么办	/ 18
10. 孕期小腿抽筋怎么办	/ 20

၁၁. 妊娠后期为什么会下肢浮肿	/ 22
၁၂. 孕期贫血怎么办	/ 24
၁၃. 什么是妊娠高血压综合症	/ 26
၁၄. 如何防治妊娠高血压综合症	/ 28
၁၅. 怀孕中、晚期阴道出血有哪些常见原因	/ 31
၁၆. 羊水过多?羊水过多对母婴有什么危害	/ 32
၁၇. 羊水过少?羊水过少对胎儿有什么危害	/ 36
၁၈. 什么是过期妊娠?过期妊娠有何危害?如何处理	/ 38
၁၉. 什么是胎儿宫内发育迟缓	/ 41

। ຕະຫຼາພື້ນປົມຕົວລັບການປະຕິບັດການຄະດີເພື່ອການສຳເນົາ

## 1、怀孕早期阴道流血的常见原因有哪些

अद्यादर्शं पदे शृणु अदि नुस अक्षया य अद्याप्य द्वा ग्राम  
श्रुतं पदे की द रुद्र कुव शर्त रुद्र श्रुति कृत मेष रेता शृणु अपविलुप्ति  
कृत वृष्णि गुणिष्ठा रुद्र अवश्य अद्यादर्शं श्रृणु अद्याप्य द्वा ग्राम  
द्वृक्षु यदा द लुक ग्राम श्रुतं पदे कुव अवश्य रुद्र श्रुति कृत श्रृणु अपविलुप्ति  
अद्यादर्शं पदे कृत रुद्र नुस रुद्रि कृता अद्याप्य अपविलुप्ति कृता शुष्णु अपविलुप्ति

妊娠早期阴道流血是一种比较常见的症状，有 $1/5 \sim 1/4$ 的孕妇在妊娠早期有阴道流血，出血的常见原因主要包括妊娠因素、子宫颈因素、阴道因素及全身性因素等。

वद्य वर्णनं दिक्षुकं लभते शूक्रं तत् तत् तत् तत् तत् तत्  
कं शूक्रं शूक्रं शूक्रं शूक्रं शूक्रं शूक्रं शूक्रं शूक्रं शूक्रं शूक्रं

妊娠因素主要有先兆流产、不全流产、异位妊娠、葡萄胎等；

ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଦାର୍ଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମାନୁଷଙ୍କ ଜୀବନକାଳରେ ଉପରେ ଆହୁତିରେ ଉପରେ ଆହୁତିରେ

子宫颈因素包括子宫颈炎、子宫颈息肉、子宫颈肿瘤等；

阴道因素有阴道炎症及阴道外伤等：

ସମ୍ପଦ କରିବାରେ ଏହାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଏହାରେ ଯାତ୍ରା  
କରିବାରେ ଏହାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଏହାରେ ଯାତ୍ରା  
କରିବାରେ ଏହାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଏହାରେ ଯାତ୍ରା  
କରିବାରେ ଏହାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଏହାରେ ଯାତ୍ରା

全身性因素主要包括引起出血的全身性疾病，如白血病、再生障碍性贫血等。



୨ ଶନ୍ତିକାଳୀନାମାତ୍ରାଦିଷ୍ଟିକାଳୀନାମାତ୍ରା

## 2、什么是流产

妊娠不足28周，胎儿体重不足1000克而终止妊娠者称为流产。

ଶତାବ୍ଦୀରେ କୁଣ୍ଡଳିକା ପାଇଁ ଏହାର ଅଧିକାର ହେଲା ।

流产发生于怀孕12周以前称为早期流产；

ଅନ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ କଣ ଯତ୍ତା ପରିଦର୍ଶକ ଏହି କଣ ଯତ୍ତା ପରିଦର୍ଶକ  
ଏହି ଅନ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ କଣ ଯତ୍ତା ପରିଦର୍ଶକ ଏହି କଣ ଯତ୍ତା ପରିଦର୍ଶକ  
ଏହି

发生于怀孕12周以后至不足28周称为晚期流产。

ଆଦୟ·ଶ୍ରୀ·ପଦ·କୁଦ·ଦୁଇ·ବ·ରଦ·ଏଷା·ଶ୍ରୀ·ଆଦୟ·ଶ୍ରୀ·ପଦ  
ଶିଦି·ଶ୍ରୀ·ପଦ·ଶ୍ରୀ·ପଦ·ଏଷା·ଶ୍ରୀ·ପଦ·ଏଷା·ଶ୍ରୀ·ପଦ·  
ଶ୍ରୀ·କନ୍ଦମ·କି·ଶ୍ରୀ·ପଦ·ଏଷା·ଶ୍ରୀ·ପଦ·ଏଷା·ଶ୍ରୀ·ପଦ·ଏଷା·ଶ୍ରୀ·ପଦ  
ଅଦି·ଆଦୟ·ଶ୍ରୀ·ପଦ·ଏଷା·ଶ୍ରୀ·ପଦ·ଏଷା·ଶ୍ରୀ·ପଦ

流产又分为自然流产和人工流产。自然流产的发生率占全部妊娠的15%左右，多数为早期流产。

୧ କ୍ରିନଲ୍‌କ୍ଲିନିକ୍‌ରୁହାନ୍‌ଜାତୀୟନିମ୍ନାନ୍‌ଦ୍ୱାରା  
ପରିଚ୍ଯାନିତ ଅନୁମତି ପାଇଥାଏଇବା

### 3、为什么不能盲目保胎

ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁଟୁମ୍ବାର ଆମାର ପରିବାରର ଆମାର ଶିଳ୍ପରେ  
ଶୁଦ୍ଧାରୀ ଆମାର ପରିବାରର ଆମାର ଶିଳ୍ପରେ କୁଟୁମ୍ବାର ଆମାର ପରିବାରର

引起流产的原因很多，主要有胎儿和母体两方面的原因。

ଆମାର କର୍ମଶିଳ୍ପରେ ଶୁଦ୍ଧାରୀ ଆମାର କର୍ମଶିଳ୍ପରେ କୁଟୁମ୍ବାର ଆମାର  
ପରିବାରର ଆମାର କର୍ମଶିଳ୍ପରେ ଶୁଦ୍ଧାରୀ ଆମାର କର୍ମଶିଳ୍ପରେ ଆମାର ପରିବାରର  
ଶିଳ୍ପରେ ଆମାର କର୍ମଶିଳ୍ପରେ ଶୁଦ୍ଧାରୀ ଆମାର କର୍ମଶିଳ୍ପରେ ଆମାର ପରିବାରର  
ଆମାର କର୍ମଶିଳ୍ପରେ ଆମାର କର୍ମଶିଳ୍ପରେ ଆମାର ପରିବାରର

胎儿方面主要是由于胚胎发育异常或胎盘异常使胎儿死亡而流产，一般在怀孕1~2个月时发生。

ଆମାର ପରିବାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁଟୁମ୍ବାର ଆମାର ପରିବାରର ଆମାର  
ଶିଳ୍ପରେ ଆମାର ପରିବାରର ଆମାର ପରିବାରର ଆମାର ପରିବାରର  
ଆମାର ପରିବାରର ଆମାର ପରିବାରର ଆମାର ପରିବାରର ଆମାର  
ପରିବାରର ଆମାର ପରିବାରର ଆମାର ପରିବାରର ଆମାର ପରିବାରର

母体方面，有内分泌失调、生殖器官疾病、患病、外部撞击、精神创伤等多种原因。

ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁଟୁମ୍ବାର ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମାର  
ପରିବାରର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ସିଂହାଦି·ଜ୍ଵାଲାଦି·ଶରୀରକଣ୍ଠାବନ୍ଦାକେମା (50% ଦିନ·୬୦%  
ଧରା) ଶରୀରକଣ୍ଠାବନ୍ଦାପରିପାତାକୁଣ୍ଡଳା ଏହିକିଂକଣ୍ଠାପିକୁଣ୍ଡଳାଶ  
(染色体) କୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାବନ୍ଦାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା  
ଗର୍ଭାବନ୍ଦାକୁଣ୍ଡଳାପରିପାତାକୁଣ୍ଡଳା ଏହିକିଂକଣ୍ଠାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା  
ଶରୀରକଣ୍ଠାବନ୍ଦାକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା କୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା  
ପାକଣ୍ଠାବନ୍ଦାକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା ଏହିକିଂକଣ୍ଠା  
ବନ୍ଦାକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା

流产是人体的一种保护性机制，从优生学的观点来看，大多数(50%~60%)早期流产是由染色体异常造成的，还有很多对母婴有害的因素，也是造成流产的原因。这些不健全的胚胎在宫内就遭到自然淘汰，如果属于这类流产，则不必惋惜，切不可盲目保胎。

ସଫୁଦାବନ୍ଦାକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା  
ପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା  
କୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା  
କୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା  
କୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା  
କୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା  
କୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା

连续发生3次以上流产者，叫做习惯性流产。发生习惯性流产时，男女双方都应该去医院进行检查，包括做一些特殊的检查，以明确病因。不要稀里糊涂流了又怀，怀了又流。

କୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳାପିକୁଣ୍ଡଳା

अद्या वर्षा वर्षा अद्या कृष्ण तु न कृष्ण एवं एवं ते एवं जी  
त्रिष्टुप्पाद्यन्तर्माणा

原因不明的习惯性流产，在有妊娠征兆时就要开始保健。



#### 4、流产的主要表现是什么

流产的主要症状是阴道流血和腹痛。怀孕12周以前发生早期流产者，由于绒毛与胎膜分离，血窦开放，即开始出血，当胚胎完全剥离排出后，由于子宫收缩，出血停止，早期流产的全过程均伴有阴道流血。晚期流产时胎盘已形成，流产过程与早期相似，胎盘继胎儿分娩出后被排出，一般出血不多，往往先有腹痛，然后出现阴道流血，而早期流产时则先有阴道流血，然后再有腹痛。

၅ ရန်ပြောများထဲမှာ အမျိုးမျိုး ရန်ပြောများ ဖြစ်ပါသည်။

## 5、什么是习惯性流产?如何防治

自然流产连续发生3次或3次以上者，叫做习惯性流产，而每次流产多发生于同一妊娠月份，其临床经过与一般流产相同。早期流产的原因常为黄体功能不足、甲状腺功能低下、染色体异常等晚期流产，最常见的原因为宫颈内口松弛、子宫畸形、子宫肌瘤等。

କୁଳ-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-  
ଦେଶ-ପଦ-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-  
ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-  
ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-  
ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-ଶ୍ରୀପାତ୍ର-

有习惯性流产史的妇女，应在怀孕前进行必要检查，包括卵巢功能检查、夫妇双方染色体检查、血型及丈夫的精液检查等。女方需进行生殖道的详细检查，了解有无子宫肌瘤、宫腔黏连、宫颈内口松弛等。查出原因，若能纠治者，应于怀孕前进行治疗，怀孕后应注意休息，加强营养，禁止性生活，同时注意补充B类维生素及维生素C等。治疗期必须超过往次流产发生的妊娠月份。

ऐर-गुणश-कु-ष-प-व-ज्ञ-द-प-दि-र-प-द-ए-प-स-क-क्ष-क-ल-द-क-ष-  
ऐर-गुणश-कु-द- (黃体酮) ऐद-ज्ञ-द-क-ष-प-व-ज्ञ-द-प-स-क्ष-क्ष-क्ष-क्ष-  
म-र-ष-प-द-द-र-ष-ष- अ-द-प-ज-दि-र-प-क-द-व-ज्ञ-द-क्ष-द-क्ष-द-क्ष-द-क्ष-  
दि-र-प-स-क-ु-व-द-प-व-ज्ञ-व-ज्ञ-द-क-ष-प-ज-दि-र-प-क-द-व-ज-क-ष-द-क-ष-  
प-व-ष-ष-प-द-द-र-ष-ष- श-प-ज-द-व-ज्ञ-व-ज-द-क-े-अ-द-प-व-ज-द-क-ष-  
म-उ-द-व-ज-द-क-ष-ष- १५-प-व-ज-द-प-ज-दि-र-प-क-द-व- क-क-क-व-ज-य-म-त-