

2005 QUANGUOZHIYEYAOUSHI
JIXUJIAOYU
JIAOCAI

2005年度

全国执业药师继续教育教材

中国执业药师协会组织编写



中国中医药出版社

2005 年度全国执业药师 继续教育教材

中国执业药师协会组织编写

中国中医药出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

2005 年度全国执业药师继续教育教材/中国执业药师协会
组织编写. —北京: 中国中医药出版社, 2005. 4

ISBN 7-80156-529-0

I. 2… II. 中… III. 药剂人员 - 终生教育 - 教材 IV. R192.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 056320 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区北三环东路 28 号 易亨大厦 电话: 64405750

邮编: 100013)

(邮购联系电话: 84042153 64065413)

印刷者: 北京瑞达方舟印务有限公司

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开

字 数: 679 千字

印 张: 28.875

版 次: 2005 年 4 月第 1 版

印 次: 2005 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80156-529-0/R·529

定 价: 48.00 元

如有质量问题, 请与出版社发行部调换。

HTTP: //WWW. CPTCM. COM

前 言

为了进一步提高执业药师继续教育管理水平,2003年11月国家食品药品监督管理局印发了重新修订的《执业药师继续教育管理暂行办法》(国食药监人[2003]298号),对执业药师继续教育管理机制及管理政策进行了一系列的调整。

根据《执业药师继续教育管理暂行办法》的有关规定,为了保证各地执业药师继续教育机构顺利开展2005年度的执业药师继续教育工作,不断提高执业药师继续教育质量,中国执业药师协会以《2005年度全国执业药师继续教育必修内容和选修内容》为依据,组织编写了《2005年度全国执业药师继续教育教材》。

《2005年度全国执业药师继续教育教材》的内容涉及2005年度所有的执业药师继续教育必修内容和面向全国的选修内容,并已经国家食品药品监督管理局审定,作为2005年度全国执业药师继续教育教材,供执业药师继续教育机构及广大执业药师使用。

《2005年度全国执业药师继续教育教材》同时适用于从业药师继续教育及其他药学技术人员的培训。

中国执业药师协会

2005年4月

目 录

非处方药用药知识	(1)
药品不良反应报告和监测管理办法	(47)
抗菌药物临床应用指导原则	(51)
诊断学基础	(114)
论中药的有毒与无毒	(128)
常见病的中医药诊治—脾胃系疾病	(151)
常用中药材及其伪劣品、混淆品的鉴别	(177)
互联网药品信息服务管理办法	(200)
关于进一步规范医疗机构药品集中采购的若干规定	(204)
物流管理基本知识 (二)	(207)
医药市场终端开发与管理 (一)	(238)
国外药品流通模式	(275)
药品生产监督管理办法	(299)
直接接触药品的包装材料和容器管理办法	(308)
药品生产与 GMP 知识 (一)	(315)
现代生物技术与生物技术药物	(351)
膜分离技术及其应用	(378)
常见药物滥用及诊断和治疗	(388)
体内药物分析的现状与发展	(410)
关于执业药师注册管理暂行办法的补充意见	(425)
实施处方药与非处方药分类管理 2004 - 2005 年工作规划	(427)
医疗器械经营企业许可证管理办法	(432)
医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定	(439)
英国药师职业原则与责任	(443)
附录:	
关于公布《2005 年度全国执业药师继续教育必修内容和选修内容》的通知	(446)

非处方药用药知识

第一部分 中成药非处方药

一、内科用药

(一) 感冒类

发汗解热丸

【药物组成】白芷、薄荷、苍术、川芎、当归、防风、甘草、荆芥穗、麻黄、羌活、细辛。

【功能主治】疏风散寒，解表祛湿。用于风寒湿邪引起的感冒，鼻流清涕，身重恶寒。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 风热感冒者不适用，其表现为发热重，恶寒轻，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。
- ③ 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
- ④ 高血压、心脏病患者慎用。
- ⑤ 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
- ⑥ 对本品过敏者禁用。
- ⑦ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

感冒疏风片、丸

【药物组成】白芍、大枣、独活、防风、甘草、谷芽、桂枝、桔梗、苦杏仁、麻黄绒、生姜、紫苏叶。

【功能主治】辛温解表，宣肺和中。用于风寒感冒，发热咳嗽，头痛怕冷，鼻塞流涕，骨节酸痛，四肢疲倦。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 风热感冒者不适用，其表现为发热重，恶寒轻，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。
- ③ 高血压、心脏病患者慎用。

- ④ 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- ⑤ 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
- ⑥ 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
- ⑧ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

采云曲

【药物组成】白矾、白芍、白术、白芷、半夏、槟榔、薄荷、苍术、草果、陈皮、茯苓、干姜、甘草、广藿香、厚朴、桔梗、六神曲、麦芽、木香、片姜黄、羌活、青皮、肉桂、山楂、檀香、枳壳、紫苏。

【功能主治】祛风散寒，健胃消食。用于感受风寒，饮食停滞，胸闷腹胀，呕吐酸，消化不良。

【使用注意】

- ① 不适用于风热感冒，其表现为发热重，恶寒轻，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。
- ② 不适用于素体瘦弱，口干、舌红少津、大便干，手足心热者。
- ③ 孕妇忌服。哺乳期妇女慎用。
- ④ 儿童及年老体虚者，应在医师指导下服用。
- ⑤ 忌食生冷油腻及不易消化食物。

调胃消滞丸

【药物组成】白芷、半夏、薄荷、苍术、草果、陈皮、川芎、豆蔻、防风、茯苓、甘草、广藿香、厚朴、木香、前胡、羌活、砂仁、神曲、乌药、香附、枳壳、紫苏叶。

【功能主治】健胃消食，解表化湿。用于感冒风寒，发热头痛，消化不良，腹痛泄泻。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 风热感冒者不适用，其表现为发热重，恶寒轻，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。
- ③ 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
- ④ 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
- ⑤ 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

感冒解表丸

【药物组成】白芍、白芷、陈皮、川芎、防风、茯苓、甘草、葛根、广藿香、桂枝、连翘、麻黄、羌活、清半夏、升麻、紫苏叶。

【功能主治】清热解表。用于四时感冒，恶寒发热，头痛头晕，咳嗽，吐泻。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

② 风热感冒者不适用，其表现为发热重，恶寒轻，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

③ 孕妇忌服，高血压、心脏病患者慎用，对本品过敏者禁用。

④ 过敏体质者慎用，小儿、年老体弱者应在医师指导下服用。

⑤ 肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

⑥ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

藿香水

【药物组成】白术、白芷、半夏、陈皮、茯苓、甘草、广藿香、桔梗、乌药、茵陈、紫苏叶。

【功能主治】解表化湿，理气和中。用于外感风寒，内伤湿滞，寒热头痛，吐泻，胸膈满闷，脘腹疼痛，尤宜于暑月感寒伤湿，脾胃失和引起的上述各症。

【使用注意】

① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

② 风热感冒者不适用，其表现为发热重，恶寒轻，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

③ 对本品过敏者禁用，小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。

④ 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。

⑤ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

姜枣祛寒颗粒（冲剂）

【药物组成】大枣、干姜。

【功能主治】发散祛寒，和胃温中。用于风寒感冒，胃寒疼痛。

【使用注意】

① 风热感冒者不适用，其表现为发热重，恶寒轻，有汗，口渴，鼻流浊涕，咽喉肿痛，咳吐黄痰。

② 糖尿病患者慎用。对本品过敏者禁用。

③ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

复方野菊感冒颗粒

【药物组成】薄荷油、甘草、芦根、南沙参、枇杷仁、桑叶、野菊花、一枝黄花。

【功能主治】清热疏风，润燥止咳。用于风热、温燥之邪犯肺而致的发热，头晕咳嗽，咽干喉痛。

【使用注意】

① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。

② 风寒感冒者不适用，其表现为发热轻，恶寒重，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，咽痒咳嗽。

- ③ 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用，对本品过敏者禁用。
- ④ 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
- ⑤ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

甘和茶

【药物组成】苍术、柴胡、赤芍、防风、甘草、岗梅、高良姜、黄芩、金樱根、荆芥、救必应、桔梗、苦丁茶、麦芽、青蒿、青皮、山楂、神曲、水翁花、紫苏叶。

【功能主治】清暑散热，生津止渴。用于感冒发热，中暑口渴，预防感冒。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 风寒感冒者不适用，其表现为发热轻，恶寒重，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，咽痒咳嗽。对本品过敏者禁用。
- ③ 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用对本品过敏者禁用。
- ④ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

感冒解毒灵颗粒

【药物组成】板蓝根、陈皮、川芎、防风、金银忍冬叶、苦杏仁、连翘、麦冬、牛蒡子、前胡、羌活、桑白皮、紫苏叶。

【功能主治】解表散寒，宣肺止咳，清热解毒。用于感冒、头痛发烧，鼻塞流涕，咳嗽咽痛，肢体酸痛，亦可作防治流感常备药。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 对本品过敏者禁用。小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
- ③ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

感冒咳嗽颗粒（冲剂）

【药物组成】桉油、百部、金银花、桔梗、枇杷叶、天花粉。

【功能主治】清热解毒，止咳化痰。用于感冒发热，头痛、咳嗽。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 风寒感冒者不适用，其表现为发热轻，恶寒重，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，咽痒咳嗽。
- ③ 脾胃虚寒而见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。对本品过敏者禁用。
- ④ 高血压、心脏病、肝病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
- ⑤ 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
- ⑥ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

感冒舒颗粒

【药物组成】白芷、薄荷、大青叶、防风、甘草、荆芥、桔梗、连翘、牛蒡子。

【功能主治】疏风清热，发表宣肺。用于风热感冒所致的头痛体困，发热恶寒，鼻塞流涕，咳嗽咽痛。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 风寒感冒者不适用，其表现为发热轻，恶寒重，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，咽痒咳嗽。
- ③ 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。对本品过敏者禁用。
- ④ 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
- ⑤ 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
- ⑥ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

感冒退烧片

【药物组成】板蓝根、柴胡、葛根、荆芥穗、拳参。

【功能主治】清热散风，解表。用于内热外感风寒引起的四肢酸懒，发烧怕冷，鼻流清涕，咳嗽咽痒。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。对本品过敏者禁用。
- ③ 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
- ④ 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
- ⑤ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

感冒药片

【药物组成】板蓝根、薄荷油、柴胡、川芎、大青叶、防风、甘草、葛根、桔梗、前胡、羌活、石膏、竹茹。

【功能主治】解表，退热，止痛。用于感冒发烧，头痛，周身酸痛。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 风寒感冒者不适用，其表现为发热轻，恶寒重，无汗，头痛，鼻塞，流清涕，咽痒咳嗽。
- ③ 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用，对本品过敏者禁用。
- ④ 高血压、心脏病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
- ⑤ 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
- ⑥ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

贯黄感冒颗粒

【药物组成】贯众、黄皮叶、路边青、马来酸氯苯那敏、三叉苦、生姜。

【功能主治】辛凉解毒，宣肺止咳。用于风热感冒，发热恶风，头痛鼻塞；咳嗽痰多。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。
- ③ 膀胱颈梗阻、幽门十二指肠梗阻、甲状腺功能亢进、青光眼以及前列腺肥大等患者慎用。
- ④ 对本品过敏者禁用。小儿、年老体弱者、孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下服用。
- ⑤ 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
- ⑥ 用药期间不宜驾驶机动车、管理机器及高空作业等。
- ⑦ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

精制银翘解毒片

【药物组成】薄荷脑、淡豆豉、淡竹叶、甘草、金银花、荆芥穗、桔梗、连翘、牛蒡子、对乙酰氨基酚。

【功能主治】清热散风，解表退烧。用于流行性感冒，发冷发烧，四肢酸懒，头痛咳嗽，咽喉肿痛。

【使用注意】

- ① 不宜在服药期间同时服用滋补性中成药。
- ② 脾胃虚寒，症见腹痛、喜暖、泄泻者慎用。对本品过敏者禁用。
- ③ 孕妇慎用。
- ④ 小儿、年老体弱者、孕妇应在医师指导下服用。
- ⑤ 高血压、心脏病、肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用。
- ⑥ 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物。

(二) 咳嗽类

川贝止咳糖浆

【药物组成】陈皮、川贝母、甘草、桔梗、款冬花、前胡、杏仁水、紫苏叶、紫菀。

【功能主治】宣肺气，散风寒，镇咳祛痰。用于风寒感冒，咳嗽气逆。

【使用注意】

- ① 适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽，痰多色白，伴有鼻流清涕，口渴，头痛，恶风。
- ② 对本品过敏者禁用。
- ③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。
- ④ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰

量明显增多者应到医院就诊。

⑤ 忌食辛辣、油腻食物。

川贝止嗽合剂

【药物组成】薄荷水、川贝母、甘草、桔梗、清半夏、杏仁水、紫苏叶、紫菀。

【功能主治】解表宣肺，止咳化痰。用于外感咳嗽。

【使用注意】

① 适用于风寒咳嗽，其表现为咳嗽，痰多色白，伴有鼻流清涕，口渴，头痛，恶风。

② 对本品过敏者禁用。

③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

④ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

⑤ 忌食辛辣、油腻食物。

胆酸止咳片

【药物组成】陈皮、粗胆酸、甘草、前胡。

【功能主治】止咳化痰。用于感冒引起的咳嗽。

【使用注意】

① 适用于感冒后咳嗽有痰者。

② 对本品过敏者禁用。

③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

④ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

⑤ 忌食辛辣、油腻食物。

白绒止咳糖浆

【药物组成】白绒草、薄荷油、甘草、牛白藤、枇杷叶、一点红。

【功能主治】清肺祛痰，疏风止咳。用于风热犯肺或痰热阻肺之咳嗽。

【使用注意】

① 适用于风热咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，常伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热。

② 对本品过敏者禁用。长期服用应向医师或药师咨询。

③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。

④ 儿童、孕妇、糖尿病患者、体质虚弱及脾胃虚寒者应在医师指导下服用。

⑤ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

⑥ 忌食辛辣、油腻食物。

法制半夏曲

【药物组成】沉香、川贝母、法半夏、甘草、化橘红、藕粉、肉桂、山萮。

【功能主治】温肺止咳，降逆止呕。用于痰多咳嗽气喘，痰湿阻胃引起的恶心呕吐。

【使用注意】

- ① 适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰者。
- ② 阴虚燥咳及对本品过敏者禁用。长期服用应向医师或药师咨询。
- ③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。
- ④ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。
- ⑤ 忌食辛辣、油腻食物。

贝母花片

【药物组成】贝母花。

【功能主治】止咳，化痰。用于咳嗽痰多。

【使用注意】

- ① 适用于痰湿咳嗽，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰者。
- ② 对本品过敏者禁用。长期服用应向医师或药师咨询。
- ③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。
- ④ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多，痰由白变黄者应到医院就诊。
- ⑤ 忌食辛辣、油腻食物。

复方贝母散

【药物组成】百部、甘草、化橘红、苦杏仁、麻黄、硼砂、平贝母、石膏。

【功能主治】清热化痰，止咳平喘。用于肺热咳嗽，喘息。

【使用注意】

- ① 适用于风热咳嗽，其表现为咳嗽，咯痰不爽，痰黏稠或稠黄，常伴有鼻流黄涕，口渴，头痛，恶风，身热。
- ② 高血压、心脏病患者慎用。
- ③ 儿童、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。
- ④ 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
- ⑤ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。
- ⑥ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。
- ⑦ 忌食辛辣、油腻食物。

贝母梨膏

【药物组成】川贝母、梨膏。

【功能主治】润肺，止咳，化痰。用于咳嗽痰多，咯痰不爽，咽喉干痛。

【使用注意】

- ① 适用于肺热燥咳者，其表现为咳嗽气息粗促，痰质黏，伴身热，口干，咽痛。
- ② 脾胃虚寒者慎用。对本品过敏者禁用。长期服用应向医师或药师咨询。
- ③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。
- ④ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。
- ⑤ 忌食辛辣、油腻食物。

川贝末胶囊

【药物组成】川贝母。

【功能主治】清热润肺，化痰止咳。用于肺热燥咳，干咳少痰，阴虚劳嗽，咯痰不爽。

【使用注意】

- ① 适用于肺热燥咳痰少者，其表现为干咳，咽痒，痰少而质黏，不易咯出。
- ② 对本品过敏者禁用。
- ③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。
- ④ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。
- ⑤ 忌食辛辣、油腻食物。

除痰止嗽丸

【药物组成】白术、冰片、薄荷脑、陈皮、法半夏、防风、浮海石、甘草、黄柏、黄芩、桔梗、六神曲、前胡、熟大黄、天花粉、知母、栀子、枳实。

【功能主治】清肺降火，除痰止嗽。用于肺热痰盛引起的咳嗽气逆，痰黄黏稠，咽喉疼痛。大便干燥。

【使用注意】

- ① 适用于痰热咳嗽，其表现为咳嗽痰多稠黄，或喉中痰鸣，咯吐不爽，身热，口干欲饮。
- ② 儿童、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。对本品过敏者禁用。
- ③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。
- ④ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。
- ⑤ 忌食辛辣、油腻食物。

补肺丸

【药物组成】党参、黄芪、桑白皮、熟地黄、五味子、紫菀。

【功能主治】补肺益气，止咳平喘。用于肺气不足，气短喘咳，咳声低弱，干咳痰黏，咽干舌燥。

【使用注意】

- ① 适用于气虚咳嗽，其表现为咳嗽短气，咳声低弱，痰质稀薄，自汗畏风，体虚乏力。
- ② 外感咳嗽者忌服。对本品过敏者禁用。长期服用应向医师或药师咨询。
- ③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。
- ④ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。
- ⑤ 忌食辛辣、油腻食物。

参贝陈皮

【药物组成】陈皮、川贝母、党参、法半夏、甘草、食盐、乌梅。

【功能主治】止咳化痰，生津消渴。用于肺虚咳嗽，津少口渴。

【使用注意】

- ① 适用于气虚咳嗽，其表现为咳嗽短气，咳声低弱，痰质稀薄，自汗畏风，体虚乏力。
- ② 对本品过敏者禁用。长期服用应向医师或药师咨询。
- ③ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。
- ④ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。
- ⑤ 忌食辛辣、油腻食物。

贝母二冬膏

【药物组成】川贝母、麦冬、天冬。

【功能主治】润肺化痰止咳。用于阴虚肺燥，咳嗽咽干，痰少而黏之症。

【使用注意】

- ① 适用于阴虚燥咳，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，或手足心热，盗汗。
- ② 风寒咳嗽或寒痰咳嗽而见痰多色白清稀或带泡沫者忌服。服后便溏泻泄者停用。
- ③ 对本品过敏者禁用。长期服用应向医师或药师咨询。
- ④ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核患者应在医师指导下服用。
- ⑤ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。
- ⑥ 忌食辛辣、油腻食物。

川贝梨糖浆

【药物组成】川贝母、南沙参、雪梨清膏。

【功能主治】养阴润肺。用于肺热燥咳，阴虚久咳。

【使用注意】

① 适用于阴虚肺燥咳嗽，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，或手足心热，盗汗。

② 痰湿咳嗽者忌服，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

③ 对本品过敏者禁用。

④ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

⑤ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

⑥ 忌食辛辣、油腻食物。

川贝雪梨膏

【药物组成】百合、川贝母、款冬花、梨清膏、麦冬。

【功能主治】润肺止咳，生津利咽。用于阴虚肺热，咳嗽喘促，口燥咽干。

【使用注意】

① 适用于阴虚肺燥咳嗽，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，盗汗。

② 痰湿咳嗽者禁用，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

③ 对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

④ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

⑤ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

⑥ 忌食辛辣、油腻食物。

川贝银耳糖浆

【药物组成】川贝母、雪梨清膏、银耳。

【功能主治】养阴润肺，生津止咳。用于肺虚久咳，津伤烦渴。

【使用注意】

① 适用于阴虚肺燥咳嗽，其表现为干咳，咳声短促，痰少质黏，口干咽燥，盗汗。

② 痰湿咳嗽者禁服，其表现为咳嗽反复发作，咳声重浊，痰多，色白或带灰色。

③ 对本品过敏者禁用。

④ 支气管扩张、肺脓疡、肺心病、肺结核、糖尿病患者应在医师指导下服用。

⑤ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

⑥ 忌食辛辣、油腻食物。

(三) 哮喘类

保宁半夏曲

【药物组成】半夏、薄荷、陈皮、丁香、豆蔻、甘草、广藿香、木香、青皮、肉桂、砂仁、生姜、五味子、枳壳、枳实。

【功能主治】止咳化痰，平喘降逆，和胃止呕，消痞散结。用于风寒咳嗽，喘息气急，湿痰冷饮，胸脘满闷，久咳不愈，顽痰不化及老年咳嗽。

【使用注意】

① 适用于痰湿阻肺，其表现为呼吸急促，喉中哮鸣有声，胸膈满闷，痰少咯吐不爽，口不渴或渴喜冷饮，形寒怕冷。

② 儿童、孕妇、体质虚弱及脾胃虚寒者慎用。

③ 不宜长期服用，对本品过敏者禁用。

④ 哮喘急性发作，伴呼吸困难、心悸、发绀者；或喘息明显，表现为端坐呼吸者；或哮喘持续状态等均应去医院诊治。

⑤ 服药期间，若患者出现高热，体温超过 38℃，或出现喘促气急者，或咳嗽加重，痰量明显增多者应到医院就诊。

⑥ 忌食辛辣、油腻食物。

肺安片

【药物组成】阿胶、川贝母、甘草膏、姜半夏、桔梗、橘红、苦杏仁、款冬花、麻黄、马兜铃、葶苈子、旋覆花、知母。

【功能主治】润肺定喘，止嗽化痰。用于阴虚久咳，喘息不宁，痰壅气闷，夜卧不安。

【使用注意】

① 适用于痰浊阻肺及有阴虚久咳者。

② 不宜用于哮喘发作期。不宜长期服用。

③ 对本品过敏者禁用。

④ 高血压、心脏病及肾病患者慎用。

⑤ 儿童、孕妇、体质虚弱者慎用。

⑥ 服药期间，若患者哮喘有急性发作，或是出现外感发热恶寒，或是咳嗽喘息加重，痰量明显增多者均应停药，并到医院就诊。

⑦ 忌食辛辣、油腻食物。

息喘丸

【药物组成】白花鬼灯笼、白前、陈皮、穿破石、党参、甘草、胡颓子叶、苦杏仁、墨旱莲、枇杷叶、桑白皮、无患子根、五指柑、五指毛桃、盐酸麻黄碱。

【功能主治】益气养阴，清肺平喘，止咳化痰。用于气阴不足，痰热阻肺，喘息气短，