


国家临床

执业医师资格考试

仿真试卷

吴 非 主编



GUOJIALINCHUANGZHIXIYESHIZIGEKAOSHIFANGZHENSHIJUAN

清华大学出版社

吴非 主编

国家临床 执业医师资格考试 仿真试卷

清华大学出版社

北京

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13501256678 13801310933

图书在版编目(CIP)数据

国家临床执业医师资格考试仿真试卷/吴非主编. —北京:清华大学出版社,2007.8
ISBN 978-7-302-15494-5

I. 国… II. 吴… III. 临床医学—医师—资格考核—习题 IV. R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 089968 号

责任编辑:张建平

封面设计:色朗图文设计

责任校对:刘玉霞

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社 地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn> 邮 编:100084

c-service@tup.tsinghua.edu.cn

社 总 机:010-62770175 邮购热线:010-62786544

投稿咨询:010-62772015 客户服务:010-62776969

印 刷 者:北京密云胶印厂

装 订 者:三河市溧源装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185×230 印 张:23.75 字 数:487千字

附光盘 1 张

版 次:2007 年 8 月第 1 版 印 次:2007 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:53.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话:(010)62770177 转 3103 产品编号:026007-01

编者名单

主 编 吴 非

副主编 范治伟

编 者 (按姓氏笔画排序)

田 贇 白黎智 刘 莉

刘伟光 曲明阳 赵 莉

封艳辉 康 新 寇露鑫

焦裕霞

前 言

国家临床执业医师资格考试分为两级四类,即医师和助理医师两级;每级分为临床、中医(包括中医、民族医、中西医结合)、口腔、公共卫生四类。考试方式分为实践技能考试和医学综合笔试。

国家临床执业医师资格考试包括基础科目、专业科目和公共科目(卫生法规、预防医学、医学心理学和医学伦理学)三部分。该资格考试采用标准化考试方法,全国统一组织,包括统一考试大纲、统一命题、统一考试时间、统一阅卷。

考试全部采用客观性选择题,主要题型为 A、B 型题,A 型题中包含 A₁、A₂、A₃(A₄)型题,助理医师资格考试适当减少或不采用 A₃ 型题。医师资格考试总题量为 600 题,助理医师资格考试总题量为 300 题。

国家临床执业医师资格考试时间为 2 天,分 4 个单元;执业助理医师资格考试时间为 1 天,分 2 个单元,每单元均为 150 分钟。

为方便广大考生更好地熟悉考试内容,做好考前准备,我们以 2007 年考试大纲为依据,针对实际考试情况,编写了《国家临床执业医师资格考试仿真试卷》。

本书仿照真实考试的内容与出题比例,精选 4 套仿真试卷,使考生可以进行实战模拟,快速掌握自己对知识的掌握程度。本书除提供题目的参考答案以外,还提供题目所考知识点,此知识点为分级知识点,是作者根据考试大纲及历年考试真题出题情况,对知识点进行的重点等级的划分,使考生能够更加准确地进行备考。

本书还配套学习软件,软件中提供了章节练习、错题重做、做题计时、模拟考试、学习计划安排、每日学习记录、学习情况统计等多项功能。此软件是一种高效复习的考试方法,是参加考试的理想助考工具。

由于本书涉及学科广泛,虽经全体编者反复修改,但由于水平和能力有限,如有不当之处,恳请广大考生多提宝贵意见。

编 者
2007 年 3 月

目 录

国家临床执业医师资格考试题型说明	1
------------------------	---

仿真试卷(一)

第一单元	6
第二单元	24
第三单元	43
第四单元	61
参考答案与知识点	79

仿真试卷(二)

第一单元	98
第二单元	116
第三单元	134
第四单元	152
参考答案与知识点	170

仿真试卷(三)

第一单元	190
第二单元	208
第三单元	226
第四单元	244
参考答案与知识点	262

仿真试卷(四)

第一单元	282
第二单元	300
第三单元	318
第四单元	336
参考答案与知识点	355

国家临床执业医师资格考试题型说明

医师资格考试的性质是行业准入考试,是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试分实践技能考试和医学综合笔试两部分。

考试分为两级四类,即执业医师和执业助理医师两级;每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合,其中民族医又含蒙医、藏医和维医三类,其他民族医医师暂不开考。到目前为止,我国医师资格考试共有 24 种类别。

医师资格考试医学综合笔试部分采用 A 型题和 B 型题两大类型。其中 A 型题又分为四类,即 A₁、A₂、A₃、A₄ 型题。B 型题又分为两类,即 B₁、B₂ 型题,医师资格考试暂不采用 B₂ 型题。以下就各种题型分别说明并举例。

一、A 型题

(一) A₁ 型题(单句型最佳选择题)

以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】细胞坏死的主要形态标志是()。

- A. 线粒体肿胀
- B. 核碎裂
- C. 胞质嗜酸性增强
- D. 胞质脂滴增加
- E. 自噬泡增多

【答案】B

(二) A₂ 型题(病例摘要型最佳选择题)

以下每一道考题是以一个小病例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】35 岁女性,3 周前感冒伴咽痛,2 周前已痊愈。近 5 天颈前疼痛明显,有低热来门诊。查体:体温 37.8℃,皮肤无汗,甲状腺Ⅱ度肿大,右叶硬,明显触痛拒按,白细胞 $7.8 \times 10^9/L$ 。临床诊断最可能是()。

- A. 甲状腺右叶囊肿出血
- B. 甲状腺癌伴出血
- C. 慢性淋巴性甲状腺炎
- D. 急性化脓性甲状腺炎
- E. 亚急性甲状腺炎

【答案】E

(三) A₃ 型题(病例组型最佳选择题)

以下提供若干个病例,每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每

一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

【例题】(1~3 题共用题干)35 岁男性,因饱餐和饮酒后 6 小时出现中上腹疼痛,放射至两侧腰部,伴有呕吐 2 次,为胃内容物,自觉口干,出冷汗。查体:体温 38℃,四肢厥冷,脉搏 116 次/分,血压 10/6kPa,腹膨胀,全腹弥漫性压痛、反跳痛和肌紧张,肝浊音界存在,移动性浊音阳性,肠鸣音消失。

1. 根据病人的临床表现,不应考虑的诊断是()。

- A. 穿孔性阑尾炎
- B. 胃十二指肠溃疡穿孔
- C. 绞窄性肠梗阻
- D. 急性胰腺炎
- E. 急性盆腔炎

【答案】E

2. 患者经检查诊断为急性出血坏死性胰腺炎,如行腹腔穿刺,可能抽出液体的颜色是()。

- A. 无色清亮液体
- B. 棕褐色液体
- C. 胆汁样液体
- D. 脓性液体
- E. 血性液体

【答案】B

3. 治疗方针应是()。

- A. 胃肠减压,密切观察病情变化
- B. 中药与针刺
- C. 补液抗炎
- D. 紧急手术
- E. 纠正休克后手术

【答案】D

(四) A₄型题(病例串型最佳选择题)

以下提供若干个病例,每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。(随着问题的提出,可逐步增加新的信息,每个问题既与题干叙述的病例有关,又与新增加的信息有关。)

【例题】(1~3 题共用题干)18 岁女性,2 年来觉下前牙咬东西无力,近期牙齿感觉松动。检查下前牙松动 I 度。牙龈红肿,有牙石,其他牙龈微肿。

1. 采集病史重点了解()。

- A. 有无外伤史
- B. 家族史
- C. 不良习惯
- D. 口腔卫生习惯
- E. 有无服药史

【答案】B

2. 重点检查项目是()。

- A. 牙髓活力
- B. X 线片
- C. 松动度

D. 外周血象

E. 牙周附着丧失水平

【答案】B

3. 根据上述检查初步印象为牙周炎,有助于进一步确定诊断的检查是()。

A. 全身头颅 X 线

B. 龈下菌斑细菌学检查

C. 局部组织病理检查

D. 药物过敏试验

E. 内分泌检查

【答案】B

二、B₁型题(标准配伍题)

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

【例题】(1~2 共用备选答案)

A. 血源性

B. 腺源性

C. 损伤性

D. 牙源性

E. 医源性

1. 新生儿颌骨骨髓炎感染来源多为()。

2. 化脓性颌骨骨髓炎感染来源多为()。

【答案】1. A 2. D

仿 真 试 卷（一）

第一单元

一、每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母涂黑,以示正确答案。

- 形成 Na^+ 、 K^+ 在细胞内外不均衡分布的原因是()。
A. 安静时 K^+ 比 Na^+ 更易穿透细胞膜
B. 兴奋时 Na^+ 比 K^+ 更易穿透细胞膜
C. K^+ 的不断外流和 Na^+ 的不断内流
D. 膜上载体和通道蛋白的共同作用
E. 膜上 Na^+ - K^+ 依赖式 ATP 酶的活动
- 脑干网状结构上行激动系统是()。
A. 具有上行唤醒作用的功能系统
B. 通过丘脑特异投射而发挥作用的系统
C. 单突触接替的系统
D. 阻止巴比妥类药物发挥作用的系统
E. 与感觉无关的中枢神经系统
- 下列激素中,属于下丘脑调节肽的是()。
A. 促甲状腺激素
B. 促肾上腺皮质激素
C. 促性腺激素
D. 生长抑素
E. 促黑素细胞激素释放因子
- 关于酶的叙述正确的是()。
A. 不能在胞外发挥作用
B. 大多数酶的化学本质是核酸
C. 能改变反应的平衡点
D. 能大大降低反应的活化能
E. 与底物结合都具有绝对特异性
- 在酵解过程中催化产生 NADH 和消耗无机磷酸的酶是()。
A. 乳酸脱氢酶
B. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
C. 醛缩酶
D. 丙酮酸激酶
E. 烯醇化酶
- 转氨酶的辅酶是()。
A. 磷酸吡哆醛
B. 焦磷酸硫胺素
C. 生物素
D. 四氢叶酸
E. 泛酸
- 组成多聚核苷酸的骨架成分是()。
A. 碱基与戊糖
B. 碱基与磷酸
C. 碱基与碱基
D. 戊糖与磷酸
E. 戊糖与戊糖

8. 某弱酸性药物的 pKa 是 3.4, 在血浆中的解离百分率约为()。
A. 1% B. 10% C. 90%
D. 99% E. 99.99%
9. 蛋白质生物学价值的高低主要取决于()。
A. 蛋白质真消化率
B. 蛋白质表观消化率
C. 蛋白质的含量
D. 食物蛋白质所含氨基酸的数量
E. 蛋白质所含必需氨基酸的含量和比值
10. 有关血栓的论述, 错误的是()。
A. 静脉血栓多于动脉血栓 B. 下肢血栓多于上肢
C. 动脉瘤内血栓多为混合血栓 D. 静脉内血栓尾部多为红色血栓
E. 毛细血管内血栓多为白色血栓
11. 结核病最重要的社会传染源是()。
A. 原发性肺结核 B. 浸润型肺结核
C. 急性粟粒性肺结核 D. 慢性血行播散型肺结核
E. 慢性纤维空洞型肺结核
12. 一级消除动力学的特点为()。
A. 药物的半衰期不是恒定值
B. 一种少数药物的消除方式
C. 单位时间内实际消除的药量随时间递减
D. 一种恒速消除动力学
E. 其消除速度与初始血药浓度高低有关
13. 糖皮质激素类药物可用于治疗()。
A. 原发性血小板增多症 B. 急性淋巴细胞白血病 C. 慢性粒细胞白血病
D. 真性红细胞增多症 E. 骨质疏松
14. 关于感染性休克病人应用糖皮质激素的依据与方法, 不正确的是()。
A. 糖皮质激素可以稳定细胞及溶酶体膜, 免受内毒素破坏
B. 大剂量糖皮质激素对心脏发挥正性肌力作用
C. 适当应用糖皮质激素可以减少并发症
D. 糖皮质激素应从大剂量开始
E. 要取得疗效至少要使用 5 天
15. 能使冠状动脉血流量增多的因素是()。
A. 主动脉舒张压降低 B. 外周阻力减小 C. 心室舒张期延长
D. 心室收缩期延长 E. 心率增加

16. 可引起首关消除的主要给药途径是()。
- A. 吸入给药 B. 舌下给药 C. 口服给药
D. 直肠给药 E. 皮下注射
17. 解热镇痛药解热作用的主要机制是()。
- A. 抑制中枢 PG 合成 B. 抑制外周 PG 合成 C. 抑制中枢 PG 降解
D. 抑制外周 PG 降解 E. 增加中枢 PG 释放
18. 肺炎链球菌可引起()。
- A. 支气管肺炎 B. 肺脓肿
C. 大叶性肺炎(即典型肺炎) D. 支气管哮喘
E. 胸膜炎
19. 与慢性胃炎和消化性溃疡有密切关系的病原菌为()。
- A. 空肠弯曲菌 B. 幽门螺杆菌 C. 胎儿弯曲菌
D. 鼠伤寒沙门菌 E. 副溶血性弧菌
20. 产生 IL-2 的细胞是()。
- A. 巨噬细胞 B. 肥大细胞 C. T 淋巴细胞
D. B 细胞 E. 嗜酸性粒细胞
21. 只有 T 细胞才具有的表面标记为()。
- A. 识别抗原受体 B. C_3 受体 C. 细胞因子受体
D. CD_3 分子 E. 有丝分裂原受体
22. 急性胃炎的确诊依赖于()。
- A. 急诊纤维胃镜检查 B. B 型超声波检查 C. 腹 X 射线平片
D. 血常规检查 E. 胃黏膜活检
23. 下列叙述中不正确的是()。
- A. 异烟肼在细胞内外均有杀菌作用,称全杀菌剂
B. 链霉素很少渗入吞噬细胞,在偏酸环境下方能发挥最大作用
C. 吡嗪酰胺可渗入吞噬细胞,且只在偏酸环境下有杀菌作用
D. 对氨基水杨酸为抑制剂
E. 利福平为全杀菌剂
24. 治疗肠内外各型阿米巴病首选药物是()。
- A. 吐根碱(依米丁) B. 灭滴灵(甲硝唑) C. 氯喹
D. 喹碘方 E. 卡巴砷
25. 急性胰腺炎诊断中,不正确的是()。
- A. 血清淀粉酶在发病后 1~12 小时开始升高
B. 血清淀粉酶在发病后 24~48 小时开始升高

- C. 血清淀粉酶值高于 128Winslow 单位
D. 血清淀粉酶值高低与病情轻重呈正比
E. 尿清淀粉酶在发病后 12~24 小时后上升
26. 在神经-骨骼肌接头处,消除乙酰胆碱的酶是()。
A. 腺苷酸环化酶
B. ATP 酶
C. 胆碱酯酶
D. 单胺氧化酶
E. $\text{Na}^+ - \text{K}^+$ 依赖式 ATP 酶
27. 为将每日代谢所产生的大约 600mmol/L 的溶质(废物)完全溶解排出,需要的尿量至少是()。
A. 400ml
B. 500ml
C. 600ml
D. 800ml
E. 1000ml
28. 诊断冠心病最常用的非创伤性检查方法是()。
A. 休息时心电图
B. 24 小时动态心电图
C. 心电图运动负荷试验
D. 超声心动图
E. 心脏 CT 检查
29. 对原发性慢性肾上腺皮质功能减退症的诊断最有意义的血检结果是()。
A. 醛固酮↓
B. 血糖↓
C. 血钠↓
D. 皮质醇↓
E. ACTH↓
30. 急性心肌梗死后窦速伴有室性期前收缩,优先使用的抗心律失常药物是()。
A. 美西律(慢心律)
B. 普鲁帕酮(心律平)
C. 普萘洛尔(心得安)
D. 奎尼丁
E. 维拉帕米
31. 支气管-肺感染和阻塞是主要发病因素的疾病是()。
A. 支气管扩张症
B. 支气管肺癌
C. 慢性支气管炎
D. 支气管哮喘
E. 阻塞性肺气肿
32. 肺炎球菌肺炎患者若对青霉素过敏,宜选用的有效抗菌药物是()。
A. 庆大霉素
B. 阿米卡星
C. 链霉素
D. 左氧氟沙星
E. 阿莫西林
33. 急非淋白血病最佳诱导治疗缓解方案是()。
A. VP
B. ATRA
C. DA
D. CHOP
E. MTX
34. 尿毒症病人高血压最主要的原因是()。
A. 肾素增多
B. 促红素减少
C. 水钠潴留
D. 血管升压素增多
E. 交感神经兴奋
35. 关于甲亢手术治疗的适应证,不正确的是()。
A. 高功能腺瘤
B. 中度以上原发性甲亢

- C. 甲状腺肿大伴有压迫症状
D. 抗甲状腺药物或放射性 ^{131}I 治疗无效者
E. 少年儿童患者
36. 诊断慢性呼吸衰竭最重要的依据是()。
A. 有呼吸困难、发绀等症状
B. 意识障碍伴球结膜水肿
C. $\text{SaO}_2 < 90\%$
D. $\text{PaO}_2 < 80\text{mmHg}$, $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
E. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$, 或伴有 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
37. 原发性甲状腺功能减退症最早出现异常的是()。
A. 血 TSH
B. 血总 T_3
C. 血游离 T_3
D. 血总 T_4
E. 血游离 T_4
38. 在感染过程的 5 种表现中, 所占比例最低, 但最易识别的是()。
A. 病原体被清除
B. 隐性感染
C. 显性感染
D. 病原携带状态
E. 潜伏性感染
39. 在上运动神经元和感觉完好情况下, 右上腹壁反射消失提示()。
A. 右侧胸髓 3~4 节段病损
B. 右侧胸髓 5~6 节段病损
C. 右侧胸髓 7~8 节段病损
D. 右侧胸髓 9~10 节段病损
E. 右侧胸髓 11~12 节段病损
40. 惊厥性全身性癫痫持续状态必须从速控制发作, 并保持不再复发的时间至少为()。
A. 6 小时
B. 12 小时
C. 24 小时
D. 48 小时
E. 72 小时
41. 关于痴呆的说法中, 错误的是()。
A. 大脑发育成熟, 智能发育正常者由于各种因素引起大脑器质性损害
B. 分为全面性痴呆和部分性痴呆
C. 全面性痴呆无人格改变, 无定向力障碍
D. 动脉粥样硬化可引起部分性痴呆
E. 假性痴呆是一种功能性疾病
42. 抗精神病药物使用不当的是()。
A. 氯丙嗪适用于急性精神分裂症病人
B. 奋乃静对心血管系统、肝脏和造血系统的副作用较氯丙嗪重, 故一般不用于年老、躯体情况较差者
C. 氟奋乃静有兴奋、激活作用
D. 氨哌啶醇既可用于急性期, 对慢性症状也有用
E. 三氟拉嗪对慢性症状效果较好

43. 神经性厌食和神经性贪食不同的是()。
- A. 有担心发胖的心理
B. 采用引吐、导泻等方法减轻体重
C. 可有暴饮暴食
D. 体重明显下降
E. 不是精神障碍的继发症状
44. 失眠症治疗时,下列哪个药常用于白天()。
- A. 地西洋(安定)
B. 艾司唑仑
C. 利眠宁
D. 阿普唑仑
E. 氯硝西泮(氯硝安定)
45. 血管疾病时伴发的精神障碍主要表现为()。
- A. 幻觉
B. 妄想
C. 抑郁
D. 焦虑、紧张
E. 思维迟钝
46. 下列哪项措施属于对癌症的二级预防()。
- A. 注意保护环境,包括大气、水源与土壤等环境防污染
B. 改善生存质量,对症性治疗
C. 改进烟草质量使之无害化
D. 对高发区及高危人群定期检查
E. 减少职业性暴露于致癌物
47. 下列哪种肿瘤对放射线高度敏感()。
- A. 基底细胞癌
B. 胃肠道腺癌
C. 宫颈鳞癌
D. 乳癌
E. 多发性骨髓瘤
48. 小儿急性阑尾炎的特点是()。
- A. 大网膜发育不全,且盲肠位置较高,病情不同于成人
B. 病情发展快且重,早期即出现高热、呕吐等
C. 右下腹体征不明显、很少有局部的明显压痛和肌紧张
D. 穿孔率可达 30%,并发症及死亡率也比较高
E. 以上均是
49. 肘关节脱位固定复位后,在固定期间即应开始肌肉操作练习,在进行功能锻炼时最好避免()。
- A. 作肱二头肌收缩动作
B. 中药熏洗浸泡肘关节
C. 麻醉下作手法扳正
D. 练习肘关节屈、伸和前臂旋转活动
E. 理疗和体疗
50. 在心肺后期复苏中,不适宜的处理是()。
- A. 利用器械或呼吸器进行人工呼吸
B. 因胸内心脏挤压远比胸外心脏挤压更有效,故宜使用胸内心脏挤压
C. 肾上腺素是心脏复苏时最常用、效果最好的药物