



2007

卫生专业技术资格考试辅导丛书

总主编 金 宇

妇产科主治医师资格 应试题库与 历年真题汇析

主 编 秦 俭 苏梅香 卢瑜群

FUCHANKE ZHUZHUYISHI ZIGE
YINGSHI TIKU YU LINIAN
ZHENTI HUIXI



军事医学科学出版社

卫生专业技术资格考试辅导丛书—— 丛书总主编 金宇

妇产科主治医师资格应试题库与 历年真题汇析

主 编 秦 俭 苏梅香 卢瑜群
副主编 刘文萃 韩吉晶 王雪莹

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

内容提要

本书以历年考试试题为模版,结合历年考生的应试经验和教训,以题库的形式(含往年真题)覆盖妇科主治医师资格考试大纲全部考核知识点,帮助考生在短时间内达到考核要求。模拟试题尽量接近真题风格,达到仿真练习的效果。

图书在版编目(CIP)数据

妇产科主治医师资格应试题库与历年真题汇析/秦俭,苏梅香,卢瑜群主编.

-北京:军事医学科学出版社,2007

(卫生专业技术资格考试辅导丛书)

ISBN 978-7-80121-905-3

I. 妇… II. ①秦… ②苏… ③卢…

III. ①妇科学-医师-资格考核-习题 ②产科学-医师-资格考核-习题

IV. R71-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 151116 号

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418,66884402 转 6213,6216,6315

传 真:(010)63801284

网 址:<http://www.mmsp.cn>

印 装:三河佳星印装有限公司

发 行:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:13

字 数:307 千字

版 次:2007 年 1 月第 1 版

印 次:2007 年 1 月第 1 次

定 价:25.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

忧心的主治医师资格考试

——漫谈应考复习方法

报考主治医师资格的考生一般是三十刚出头的年龄,正是在工作岗位出力时,也开始进入上老下小的年龄阶段,家庭的重担,工作压力,社会关系的复杂已经让他们焦头烂额,再加上这个全国统考的主治医师资格考试,全国平均不到 40% 的通过率,这一年比一年难的事实更是让他们忧心忡忡。而考试又不能不参加,怎么办? 作为一名常年在医学教学一线的老师,我们愿意把这几年的教学经验告诉广大考生,希望对大家有所帮助。

一、思想上一定要重视

毕竟主治医师资格考试属于国家级统一考试,从考试命题到组织管理是严格和规范的,尽管考的是本人所从事工作的专业知识,但内容繁多,考题灵活性强,往年考生对该考试议论也很多,比如超纲、难度过大、考题太偏等等。相当一部分考生自认为基础扎实或没时间看书仓促应考,注意力和重视程度不够,结果只会是丢下了两、三科留到第二年。

二、注意多收集一些信息

想办法多向往届考生打听考试的难度、考点,也可以到网上收集些应考的经验和评论,国内的丁香园、爱爱医网站都有专门的版块讨论卫生资格考试的帖子,很多信息对应考非常有帮助。本书的许多构思就来自一线考生的经验。比如有关主治医师资格考试命题与组卷的要求,外科以普外和外科总论为主、病例题非常灵活等,我们在编写本书的时候都体现了这些宝贵的经验和教训。

下面就是我们收集到的有关主治医师资格考试命题与组卷的要求,非常有益。

命题、组卷要求与注意事项

(1) 命制试题时一定要考虑考试的目的、性质、要求和考试对象。初级与中级职称的要求和难度应有一定的差别。初级考试理想的通过率为 60% 左右;中级的理想通过率应为 40% 左右。考试的标准要考虑全国的平均水平,特别是基层医院考生的实际水平和要求,不应以某类或每级医院的水平,如教学医院或三级甲等医院的水平,作为卫生技术资格考试的标准。

(2) 由于国家及格线为每科目均须达到 60 分,请注意试卷总体难度不能太高。请各专业委员会根据上年考试结果和试题统计分析资料,认真研究和确定下年试卷的总体难度。

(3) 同一专业之间的亚专业,如内科学中的呼吸、循环、血液等的难度要基本相同;四个科目之间的难度也要基本平衡,特别是基础知识不能太难。

(4) 亚专业各个科目的题型比例应基本相同。X 型题可以不选用;如果选用则每科目不能超过 10%,即 10 道题。

(5) X 型题的 5 个备选答案不能都是正确答案,并且要有提示。如某 X 型题的正确答案

有2个,在题干的后面要加上这样一句话:“……在5个备选答案中选出2个正确答案”。

(6) 正确答案要随机排列,不能连续出现在相同位置,不能过多地集中在某一位置,也不能出现有规律的循环排列。

三、通过熟悉往年考题,掌握考试题型、难度和考核要求

主治医师资格考试题型如下:

(一) A1型题(单句型最佳选择题)

每道试题由1个题干和5个供选择的备选答案组成。备选答案中只有一个是最佳选择,称为正确答案,其余四个均为干扰答案。干扰答案或是完全不正确或是部分正确,相互排斥的答案可同时提供。这类试题常常具有比较意义,在答题时,应当找出最佳的或最恰当的备选答案,排除似乎有道理而实际是不恰当的选择。

这种题型一般可分为A1-1、A1-2、A1-3三个亚型。

从2003年起只要求命制A1-1型题,即标准的A1型题和A1-3型题,即否定型题。不允许选项出现“以上都不是”,更不允许出现“以上都是”的试题形式。

(1) A1-1型题

例1:预防风湿热复发的最有效药物是

A. 阿司匹林 B. 对氨基苯甲酸 C. ACTH D. 青霉素 E. 考的松

答案:D

(2) A1-3型题

又称否定型题,如果试题涉及不只一个的相关问题或正确答案,可采用否定型。题目的题干中有一个特别标注的否定词(不、不是、不能、除、除外、错误、无关等)。五个备选答案中有一个是错误的,要求考生把这一答案找出来,加以排除。应试者要从备选答案中选出最不适用的一个;或者用得最少的一个;或者某一方面是例外的一个。但是,这种命题方式在解题时,通常会给学生造成从肯定到否定的思维突变,影响答题,出现不该出现的错误,应尽量少用。除A1型题,其他多选题也可以使用否定型题。

例2:关于直肠肛管引流,错误的是

A. 分为上、下二组 B. 上组在齿线以上 C. 向上流入髂内淋巴结
D. 两侧流入髂内淋巴结 E. 下组流入坐骨肛管间隙淋巴结

答案:D

(二) A2型题(病历摘要型最佳选择题)

每道题由一个叙述性主体(简要病历)作为题干,一个引导性问题和五个备选答案组成。

例3:男,30岁,近4年来经常间发四肢关节疼痛,近来感乏力、纳差、心悸、气促,肝在肋下2.5 cm触及,轻触痛。查血红蛋白97g/L,尿蛋白(+);双下肢轻度浮肿。最可能的原因是

A. 肝硬化 B. 急性肾炎 C. 主动脉瓣狭窄致左心衰 D. 二尖瓣狭窄致右心衰
E. 营养不良

答案:D

(三) A3型题(病历组型最佳选择题)

每道题开始叙述一个以患者为中心的临床情景,然后提出2~3个相关问题,每个问题均与开始的临床情景有关,但测试要点不同,且问题之间相互独立,每个问题都是一个单句型的

最佳选择题。

例4:女性,24岁,尿频、尿急、尿痛病史3个月,多种抗生素治疗不见好转,尿常规有许多红、白细胞,最近患者症状加重,伴有尿失禁出现。

(1)此患者可能性大的临床诊断是

- A. 急性膀胱炎 B. 慢性膀胱炎 C. 腺性膀胱炎 D. 间质性膀胱炎 E. 泌尿系结核

答案:E

(2)此患者尿失禁属于

- A. 精神性尿失禁 B. 压力性尿失禁 C. 急迫性尿失禁 D. 充盈性尿失禁 E. 真性尿失禁

答案:C

(四)A4型题(病历串型最佳选择题)

每道试题开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床情景,然后提出3~6个相关的问题,问题之间也是相互独立的,每个问题都是一个单句型的最佳选择题。当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息。有时陈述了一些次要的或有前提的假设信息,这些信息与病例中叙述的具体病人并不一定有联系。提供信息的顺序对回答问题是非常重要的。每个问题均与开始的临床情景有关,又与随后改变有关。回答这样的试题一定要以试题提供的信息为基础。

例5:男性,63岁。确诊慢性阻塞性肺病近10年,因呼吸困难一直需要家人护理和照顾起居。晨起大便时突然气急显著加重,伴胸痛,送来急诊。

(1)采集病史时应特别注意询问

- A. 胸痛部位、性质和伴随症状 B. 冠心病、心绞痛病史 C. 吸烟史
D. 近期胸部X线检查情况 E. 近期服药史如支气管舒张剂、抗生素

答案:A

(2)体检重点应是

- A. 肺下界位置及肺下界移动度 B. 肺部啰音 C. 病理性支气管呼吸音
D. 胸部叩诊音及呼吸音的双侧比较 E. 颈动脉充盈

答案:D

(3)确诊最有价值的辅助检查是

- A. B型超声显像 B. 心电图 C. X线透视或摄片 D. MRI E. 核素肺扫描

答案:C

(4)若经检查确诊肺气肿并发左侧自发性气胸。其治疗拟选择胸腔插管水封瓶引流,主要目的是

- A. 尽早使肺复张,维护已经严重受损的肺功能,防止呼吸衰竭
B. 尽快使肺复张,缩短住院时间
C. 尽快使肺复张,防止形成慢性气胸
D. 尽快使肺复张,防止胸腔继发感染
E. 尽快使肺复张,防止循环系统受扰和引起并发症

答案:A

(5)[假设信息]如果床旁胸部X线摄片未显示明确气胸带,下列间接征象中最有助于气胸诊断的是

- A. 心脏移位 B. 左心缘透亮度增高、左膈压低 C. 肺大泡

D. 两肺透亮度增高,肺门血管纹理增多而外周突然减少

E. 肋间隙增宽

答案:B

(6)[假设信息]若已有检查仍不能证明气胸,尚需考虑可能的诊断是

A. 肺炎 B. 心绞痛 C. ARDS D. 肺栓塞 E. 急性肺水肿

答案:D

(五)B1 型题(配伍题)

每道题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与两个或两个以上题干组成(本考试命题要求 B1 型题一律用 2 或 3 个题干),五个备选答案在前,题干在后。答题时,要求为每个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不选用。

例 6:A. 风疹 B. 艾滋病 C. 血友病 D. 红斑性狼疮 E. 支气管哮喘

(1)属自身免疫性疾病的

(2)属免疫缺陷性疾病的

答案:(1)D;(2)B

不允许命制 B2 型题(扩展的配伍题),即为 6 个及 6 个以上的备选答案的 B 型题。

(六)X 型题(多重是非选择题)

每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成,形式类似于 A1 型题,但正确答案不只 1 个,可以是 2 个、3 个、4 个备选答案都正确(不允许出现 5 个正确答案)。

例 7:胆囊壁的结构上缺少的是(从 5 个选项中选择 2 个正确答案)

A. 黏膜层 B. 黏膜肌层 C. 黏膜下层 D. 固有肌层 E. 浆膜

答案:BC

例 8:与幽门螺杆菌感染相关的是(从 5 个选项中选择 3 个正确答案)

A. 反流性食管炎 B. 萎缩性胃炎 C. 十二指肠溃疡复发

D. 胃淋巴瘤 E. 胃平滑肌瘤

答案:BCD

例 9:口服胆囊造影术显影不良的因素中,下列哪项是正确的(从 5 个选项中选择 4 个正确答案)

A. 肠胃吸收功能不良 B. 黄疸 C. 胆囊管梗阻 D. 慢性胆囊炎 E. 胆囊腺肌病

答案:ABCD

X 型题题干可以是一个问题、一段对话、一段病史,也可以是图表或临床检查资料等。选择项提供的正确答案或错误答案都应是肯定的,不能在选择项中有部分正确、部分错误或似是而非的答案,也不能同时存在两个相互矛盾的答案。

X 型题如果不限定正确答案数量的话,从数学上讲可以有 26 种组合,如果按照考生实际选择正确答案的多少评分,用答题卡形式阅卷评分很难制定一套评分标准。如果规定每道题得分是一致的,则应试者多选或少选一个正确选项就不得分,难以公正评价应试者对某一个问题的真正掌握的程度。考生多选或少选正确答案都不得分,难度非常大。从 2003 年起 X 型题都要在题干中对设置的正确答案的数(2、3、4 个)做出提示。

按照备选答案的性质可以分为最佳选择题(A、B 型题)和是非型题(X 型题)。最佳选择题的几个备选答案可以是完全正确,完全错误,也可以是部分正确或部分错误。是非型题的备

选答案要么完全正确,要么完全错误,不能有似是而非的答案。A型题中的否定性的试题也是是非型题。

(七) 图表选择题

常见的图像、图表有X线片、心电图、CT片、MRI片、B超、核素图像、血片、病理图片、解剖图、示意图、统计表等。这种形式的试题可以出现在任何类型的选择题中。

图表试题的要求:

(1) 图表各部分必须清晰。要保证图表资料按比例缩小后原图各部分仍能看清楚。

(2) 所有图表应标明上下,必要时应标明比例。

(3) 题图如果集中放在试题后面,题图应注明题号,如“第×题题图”,试题题干中要相应提示“见第×题题图”。

众多的考生认为,考试多年了,题型谁都明白,但实际上并非如此,大家可以从中找出一些规律,如B1型题,往往选择具有比较、鉴别意义的一个主题,如发热、黄疸、营养性疾病的治疗等作为命题的重点对象。

主治医师资格考试采用的是标准化命题,与在医学院期间的考试题型区别很大,与医师资格考试要求的知识的广度性考核要求也有区别,更多的是以考核知识的灵活运用为目标,大量的病例分析题出现在试卷中就不足为奇了。所以总是出现五个备选答案中有两个难以决定取舍的情况。

四、吸取往届考生的经验和教训

考试题型和大纲没有变化,但从这几年的考题和考生反映来看,难度逐年加大,各专业集中体现为基础知识和相关专业两部分难度大,我们认为,基础知识并非本身难度大,而是考生没有领悟考试要求,大家看内科学基础知识的要求就会明白其中的道理。

基础知识考核要求:熟悉药理学、微生物、生理、病理、病理生理、生物化学等基础学科的相关内容,如药物的作用机制与副作用,感染性疾病病原生物,常见各科疾病的病理类型与发病机制(包括免疫、生化与异常代谢等),对疾病的解剖生理基础应有所了解。可以看出,反映基础知识难的原因是,那些与本专业关系不大的解剖、生理、病理、药理等知识早已经记忆模糊,不下工夫研读,考试自然不能过关。而相关专业知识的考核要求是指实验诊断学、影像诊断学与内科密切相关的知识,外科与妇产科等与内科疾病有关鉴别诊断或治疗的内容;对遗传病的遗传规律,流行病的理论与方法在内科中的应用,这些更是考生容易忽略的知识,专业分工越来越细,与本专业关系不大的知识更不容易掌握。被淘汰的考生往往是在此吃亏。

另外需要强调的是,尽管主治医师资格考试已经考了六年了,几乎每年都有不少考生还犯一些低级错误,自认为报心血管专业,就只考心血管方面的知识,不用复习其他内科各专业的知识了,加之市面上有个别所谓“全真模拟题”按照亚专业编排,误导了很多考生。尤其是在基层医院,通过率低与此不无关系。笔者在基层做调研的时候就遇到过好几位考生咨询此类问题,实在令人哭笑不得。

五、看哪本教材,做哪些题

目前考生都用的是主管部门编写的一套指定用书,但实际效果如何?据考生反映,很多题在书上找不到答案,把《指导》看了好几遍,考试居然没过关。根据考生的体会和教训,建议大

家认真读规划七、八年制本硕连读教材。要想通过专业实践能力单元测试,还得读本专业的权威参考书,如考外科,就得研读《黄家驷外科学》中的相关内容,报内科就得研读《实用内科学》的相关内容。习题则更为重要,决定了考生的复习重点和方向。目前相关习题类图书不是很多,不少专业还出现考生四处乱找题的窘状,结果如同病急乱投医,适得其反。我们这套应试题库就是在分析历年考题的基础上总结命题规律,结合考生的实际需要,吸取了往年考生的经验和教训编写的。尤其是考虑到基层医生时间紧张,我们把大纲要求的全部考点用题的方式进行全面覆盖,同时把近几年的考试真题分配到各章节,对大家复习时把握命题规律非常有益。其实很多考点的重复率很高,毕竟难题和偏题是少数,只要把那些基本知识掌握了,60分并不难。另外《指导》用书所附的习题一定是要做熟练的,一般有10%左右的原题。

六、注意掌握一些应考技巧

历经了许多次考试,考生都积累了很多应考的经验,但是做多选题是有一些技巧的,比如排除法、弃卒保帅法(实在不会的统一全部选C)、感觉法(第一感觉和临床经验直感往往是对的)等,如果你具备55分以上的水平,这些技巧基本可以帮你跨越60分大关。为什么很多考生书背得很熟,但一做题总是出错,究其原因就是他只会做问答题或者A型题而已,而没有注意知识的连贯性,没有将疾病的联系与区别进行横向比较,没有掌握出题的规律和答题技巧,因此只能在及格线以下苦苦挣扎。

本书有幸邀请了北京电力总医院(首都医科大学附属教学医院)的数位博士和专家亲自编写,凝聚了他们多年的心血,对考生也会大有裨益。

一家之言,不妥之处请考生批评指正。

军事医学科学出版社考试用书编辑室 金 宇

2006年10月

目 录

第一单元	女性生殖系统解剖	(1)
第二单元	女性生殖系统生理	(13)
第三单元	妊娠生理	(18)
第四单元	妊娠的诊断	(23)
第五单元	孕期监护与保健	(27)
第六单元	正常分娩	(37)
第七单元	正常产褥	(43)
第八单元	病理妊娠	(45)
第九单元	妊娠合并症	(69)
第十单元	妊娠合并性传播疾病	(75)
第十一单元	异常分娩	(78)
第十二单元	分娩期并发症	(88)
第十三单元	产褥期异常	(99)
第十四单元	妇科病史与检查	(102)
第十五单元	外阴色素减退与外阴瘙痒	(105)
第十六单元	女性生殖系统炎症	(107)
第十七单元	女性生殖器肿瘤	(126)
第十八单元	滋养细胞疾病	(165)
第十九单元	月经失调	(171)
第二十单元	子宫内膜异位症和子宫腺肌病	(182)
第二十一单元	女性生殖器畸形	(185)
第二十二单元	女性生殖器损伤性疾病	(187)
第二十三单元	不孕症	(190)
第二十四单元	计划生育	(192)
第二十五单元	妇女保健	(197)

第一单元 女性生殖系统解剖

【考纲要求】

女性生殖系统解剖	1. 骨盆	(1) 骨盆的类型 (2) 骨盆与分娩相关的解剖特点	掌握
	2. 外生殖器	外阴的范围和组成	掌握
	3. 内生殖器	内生殖器及其功能	掌握
	4. 女性生殖系统血管和淋巴	(1) 盆腔血管来源与分支 (2) 盆腔淋巴分布与各器官淋巴管的流经方向	熟悉
	5. 骨盆底	(1) 骨盆底 (2) 会阴	掌握
	6. 邻近器官		熟悉

【A型题】

1. 骶耻外径的距离是指
 - A. 耻骨联合至第5腰椎棘突
 - B. 耻骨联合中点至米氏菱形窝上角下1.5 cm
 - C. 耻骨联合中点至髂后上棘连线中点上1.5 cm
 - D. 耻骨联合上缘中点至米氏菱形窝上角上1.5 cm
 - E. 耻骨联合上缘中点至第5腰椎棘突下

参考答案:E

2. 骶结节韧带位于
 - A. 骶骨与坐骨棘之间
 - B. 骶骨与闭孔之间
 - C. 骶骨与尾骨之间
 - D. 骶骨与坐骨结节之间
 - E. 骶骨与耻骨联合之间

参考答案:D

3. 能固定宫颈,并保持子宫不向下脱垂

的主要结构为

- A. 圆韧带
- B. 阔韧带
- C. 主韧带
- D. 骶骨韧带
- E. 骨盆漏斗韧带

参考答案:C

4. 右侧卵巢动脉来自
 - A. 右髂总动脉
 - B. 右髂内动脉
 - C. 腹主动脉
 - D. 右髂外动脉
 - E. 右肾动脉

参考答案:C

5. 正常输卵管的长度为
 - A. 10 ~ 18 cm
 - B. 15 ~ 20 cm
 - C. 8 ~ 14 cm
 - D. 10 cm 左右
 - E. 20 cm 左右

参考答案:C

6. 关于子宫肌层不正确的是

- A. 由平滑肌束及弹力纤维组成
- B. 肌纤维的分布外层多为纵行,内层多为网状结构,中间为环行
- C. 非孕时厚约 0.8 cm
- D. 肌层是子宫体壁的 3 层结构中最厚的一层
- E. 子宫收缩时血管被压缩,能有效地制止产后出血

参考答案:B

7. 关于成人子宫,下列哪项不正确

- A. 子宫呈前后略扁的倒置梨形
- B. 宫腔容量约 5 ml
- C. 重约 50 g
- D. 长度 6~7 cm
- E. 子宫下段较上部稍窄

参考答案:D

8. 主韧带位于

- A. 子宫峡部两侧与骨盆侧壁之间
- B. 阴道穹隆两侧与骨盆侧壁之间
- C. 子宫动脉两侧与骨盆侧壁之间
- D. 宫颈两侧与骨盆侧壁之间
- E. 宫体两侧与骨盆侧壁之间

参考答案:D

9. 阴道下段淋巴引流主要入

- A. 腹股沟淋巴结
- B. 腰淋巴结
- C. 髂内淋巴结
- D. 髂外淋巴结
- E. 骶前淋巴结

参考答案:A

10. 骨盆的关节包括

- A. 耻骨联合与骶尾关节
- B. 耻骨联合与骶髂关节
- C. 耻骨联合、骶髂关节与骶尾关节
- D. 骶髂关节与骶尾关节
- E. 骶尾关节

参考答案:C

11. 关于女性生殖器的血管,下列哪项不正确

- A. 子宫动脉为髂内动脉前干的分支
- B. 右卵巢动脉可来自右肾动脉
- C. 左卵巢动脉可来自左肾动脉
- D. 阴部内动脉为髂内动脉前干的终支
- E. 会阴动脉为阴部内动脉的分支

参考答案:B

12. 关于子宫,下列哪项正确

- A. 表面 1/3 能发生周期性变化
- B. 靠近子宫肌层的内膜为功能层
- C. 子宫峡部黏膜组织与宫颈黏膜相同
- D. 基底层无周期性变化
- E. 功能层于月经期部分脱落

参考答案:D

13. 子宫体壁的组织结构中哪层最厚

- A. 内膜层
- B. 功能层
- C. 基层层
- D. 肌层
- E. 浆膜层

参考答案:D

14. 骶骨包括

- A. 3~4 块骶椎
- B. 4~5 块骶椎
- C. 5~6 块骶椎
- D. 6~7 块骶椎
- E. 3~5 块骶椎

参考答案:C

15. 骨盆底的前方为

- A. 耻骨联合
- B. 耻骨联合上缘
- C. 耻骨联合下缘
- D. 阴阜
- E. 阴道前庭

参考答案:C

16. 关于阴蒂,下列哪项不正确

- A. 位于两侧小阴唇顶端的联合处
- B. 位于两侧大阴唇顶端的联合处

- C. 具有勃起性
- D. 分为阴蒂头、阴蒂体和两个阴蒂脚
- E. 敏感性极高

参考答案:B

17. 子宫圆韧带长

- A. 8 ~ 10 cm
- B. 10 ~ 12 cm
- C. 11 ~ 13 cm
- D. 12 ~ 13 cm
- E. 12 ~ 14 cm

参考答案:E

18. 关于骨盆底的分区,下列哪项不正确

- A. 分为尿生殖区与肛区
- B. 尿道通过尿生殖区
- C. 肛区有肛管通过
- D. 阴道通过尿生殖区
- E. 以上均不正确

参考答案:E

19. 关于骨盆底,下列哪项正确

- A. 骨盆底由筋膜组成
- B. 骨盆底由多层肌肉组成
- C. 骨盆底与分娩无直接关系
- D. 骨盆底的结构和功能与盆腔脏器的位置和功能密切相关
- E. 以上均不正确

参考答案:D

20. 关于女性生殖器解剖,不正确的是

- A. 子宫颈管上皮为高柱状
- B. 阴道上皮为复层鳞状上皮
- C. 输卵管上皮细胞均为带纤毛的细胞
- D. 卵巢的表面由单层立方上皮覆盖称为生发上皮
- E. 宫颈管外口复层鳞状细胞和柱状细胞交界处是宫颈癌好发的部位

参考答案:C

21. 维持子宫正常位置的主要原因为

- A. 子宫的 4 对韧带
- B. 盆底肌肉及其上下筋膜的支撑

- C. 腹腔内器官的支撑
- D. 膀胱和直肠的支撑
- E. 子宫的 4 对韧带和盆底肌肉、筋膜的支托作用

参考答案:E

22. 判断中骨盆是否狭窄的重要指标是

- A. 髂棘间径
- B. 髂嵴间径
- C. 坐骨切迹宽度
- D. 骶耻外径
- E. 坐骨结节横径

参考答案:C

23. 关于阴道上段淋巴引流,下列哪项不正确

- A. 大部分汇入闭孔淋巴结与髂内淋巴结
- B. 小部分汇入髂外淋巴结
- C. 与阴道下段引流基本相同
- D. 与宫颈引流基本相同
- E. 不注入腹股沟淋巴结

参考答案:C

24. 下列哪项不是组成骨盆的骨骼

- A. 骶骨
- B. 髌骨
- C. 耻骨
- D. 腰椎
- E. 尾骨

参考答案:D

25. 骨盆腔是指

- A. 骨盆的入口平面和出口平面之间
- B. 大骨盆以下的腔
- C. 骨盆出口平面以上的腔
- D. 骨盆入口平面和中骨盆平面之间
- E. 中骨盆平面和出口平面之间

参考答案:A

26. 正常骨盆的坐骨棘间径为

- A. 8 cm
- B. 10 cm
- C. 8.5 ~ 9.5 cm

D. 9.5 ~ 10.5 cm

E. 12 cm

参考答案:B

27. 关于女性生殖系统,下列哪项不正确

A. 内生殖器官位于盆腔腹膜内

B. 骨盆的大小、形状对分娩有直接影响

C. 骨盆底组织承托盆腔脏器

D. 外生殖器官不包括阴道

E. 经产妇大阴唇受分娩的影响向两侧分开

参考答案:A

28. 关于子宫阔韧带,下列哪项不正确

A. 分为前后两叶

B. 内 1/3 包围输卵管

C. 外 1/3 部移行为骨盆漏斗韧带

D. 富含血管、神经及淋巴管

E. 两侧达盆壁

参考答案:B

29. 骨盆是由

A. 髌骨、骶骨、尾骨组成

B. 髌骨、坐骨、耻骨组成

C. 髌骨、骶骨、尾骨组成

D. 髌骨、耻骨、骶骨组成

E. 耻骨、骶骨、尾骨组成

参考答案:A

30. 下列哪项无腹膜覆盖

A. 子宫底部

B. 圆韧带

C. 子宫直肠陷凹

D. 膀胱子宫陷凹

E. 卵巢

参考答案:E

31. 阴道前庭包括

A. 前庭球、前庭大腺及尿道口

B. 前庭球、前庭大腺、尿道口、阴道口及处女膜

C. 阴蒂、前庭球及前庭大腺

D. 阴蒂、前庭球、前庭大腺及尿道口

E. 前庭大腺、尿道口及阴道口

参考答案:B

32. 阴部内动脉的分支有

A. 2 支

B. 3 支

C. 4 支

D. 5 支

E. 6 支

参考答案:C

33 卵巢门是指

A. 卵巢固有韧带连接于卵巢的部位

B. 卵巢系膜连接于输卵管的部位

C. 卵巢系膜连接于阔韧带后叶的部位

D. 卵巢连接于子宫的部位

E. 卵巢系膜连接于阔韧带前叶的部位

参考答案:C

34. 宫体两侧淋巴结沿圆韧带汇入

A. 腹股沟深淋巴结

B. 腹股沟浅淋巴结

C. 骶前淋巴结

D. 闭孔淋巴结

E. 髂内淋巴结

参考答案:B

35. 子宫的正常位置为

A. 轻度前倾前屈位

B. 轻度后倾后屈位

C. 前倾前屈位

D. 后倾后屈位

E. 水平位

参考答案:A

36. 做子宫与附件切除时,切断哪条韧带容易损伤输尿管

A. 主韧带

B. 圆韧带

C. 阔韧带

D. 骶骨韧带

E. 骨盆漏斗韧带

参考答案:A

37. 子宫动脉下支供应

- A. 宫颈与阴道
- B. 宫颈与阴道上段
- C. 阴道
- D. 宫体、宫颈与阴道上段
- E. 子宫峡部、宫颈与阴道

参考答案:B

38. 阴道动脉来自

- A. 腹主动脉
- B. 髂总动脉
- C. 髂外动脉
- D. 髂内动脉
- E. 肾动脉

参考答案:D

39. 关于骶棘韧带,下列哪项正确

- A. 位于骶骨与坐骨棘之间
- B. 位于骶髂关节与坐骨棘之间
- C. 位于骶尾关节与坐骨棘之间
- D. 其宽度即为坐骨切迹宽度
- E. 以上均不正确

参考答案:D

40. 关于卵巢,下列哪项正确

- A. 髓质中有数以万计的原始细胞
- B. 皮质含疏松结缔组织
- C. 髓质中含有平滑肌组织
- D. 髓质中含有致密结缔组织
- E. 以上均不正确

参考答案:C

41. 骨产道是指

- A. 大骨盆
- B. 小骨盆
- C. 大骨盆 + 小骨盆
- D. 骨盆入口平面以上
- E. 骨盆出口平面以上

参考答案:B

42. 子宫动脉上支又分为

- A. 宫底支、宫体支与宫颈支
- B. 宫体支、宫颈支与阴道支

C. 宫底支、卵巢支与输卵管支

D. 卵巢支与输卵管支

E. 宫体支、卵巢支与输卵管支

参考答案:C

43. 骨盆底组织有

- A. 1 层
- B. 2 层
- C. 3 层
- D. 4 层
- E. 5 层

参考答案:C

44. 肛提肌位于骨盆底的

- A. 内层
- B. 中层
- C. 外层
- D. 浅层
- E. 深层

参考答案:A

45. 右侧卵巢静脉汇入

- A. 下腔静脉
- B. 右肾静脉
- C. 右髂内静脉
- D. 右髂总静脉
- E. 右髂外静脉

参考答案:A

46. 关于女型骨盆,下列哪项正确

- A. 骨盆入口呈扁椭圆形,坐骨棘间径 ≥ 10 cm
- B. 骨盆入口呈长椭圆形,坐骨棘间径 ≤ 10 cm
- C. 骨盆入口呈横椭圆形,坐骨棘间径 ≥ 10 cm
- D. 骨盆入口呈横椭圆形,坐骨棘间径 ≤ 10 cm
- E. 骨盆入口呈圆形,坐骨棘间径 ≤ 10 cm

参考答案:C

47. 关于女性内生殖器的神经支配,下列哪项不正确

- A. 由交感神经与副交感神经支配
- B. 交感神经纤维由腹主动脉前神经丛分出
- C. 卵巢神经丛与骶前神经丛均支配内生殖器
- D. 卵巢神经丛分布于卵巢、输卵管和子宫
- E. 子宫平滑肌的收缩不受神经支配

参考答案:D

48. 子宫动脉是哪条动脉的分支

- A. 髂总动脉
- B. 髂内动脉
- C. 髂外动脉
- D. 腹主动脉
- E. 肾动脉

参考答案:B

49. 维持子宫前倾的韧带是

- A. 圆韧带
- B. 阔韧带
- C. 主韧带
- D. 骶骨韧带
- E. 圆韧带 + 骶骨韧带

参考答案:E

50. 关于子宫的解剖不正确的是

- A. 大小为 7 cm × 5 cm × 3 cm
- B. 容积为 5 ml
- C. 重量约 50 g
- D. 成年女性的宫颈和宫体之比为 1:2
- E. 子宫峡部在非孕状态约为 2 ~ 3 cm

参考答案:E

51. 关于骨盆出口,错误的是

- A. 前三角的顶端为耻骨联合的下缘,两侧为耻骨降支
- B. 后三角的顶端为骶尾关节,两侧为骶棘韧带
- C. 坐骨结节间的距离为出口横径
- D. 耻骨联合下缘至骶尾关节间的距离为出口前后径
- E. 骶尾关节至坐骨结节间径中点的

距离为出口后矢状径

参考答案:B

52. 关于阴道壁,下述哪项是错误的

- A. 阴道黏膜为复层鳞状上皮
- B. 阴道壁富有静脉丛,局部损伤易形成血肿
- C. 阴道黏膜受卵巢激素的影响有周期性变化
- D. 阴道上皮富有腺体,故妇女常有白带多的症状
- E. 阴道有很多横纹皱襞及外覆有弹力纤维,故有很大的伸展力

参考答案:D

53. 关于正常骨产道,下述哪项是正确的

- A. 骨盆入口前后径比横径大
- B. 中骨盆平面横径比前后径大
- C. 骨盆入口平面是骨盆的最宽平面
- D. 中骨盆平面是骨盆最窄平面
- E. 站立时骨盆入口平面与地平面平行

参考答案:D

54. 骨盆出口横径是指

- A. 坐骨结节前端内侧缘之间的距离
- B. 坐骨结节中段外侧缘之间的距离
- C. 坐骨结节后端外侧缘之间的距离
- D. 坐骨结节后端内侧缘之间的距离
- E. 坐骨结节前端外侧缘之间的距离

参考答案:A

55. 正常骨盆骶耻内径(对角径)的值应

为

- A. 不小于 13 cm
- B. 不小于 12 cm
- C. 不小于 11 cm
- D. 不小于 10 cm
- E. 不小于 9 cm

参考答案:B

56. 骨盆外测量骶耻外径(E. C)的后据点是

- A. 第五腰椎棘突上

- B. 米氏菱形窝的上角
- C. 腰骶部菱形窝的中央
- D. 髂后上棘连线中点下 2 ~ 2.5 cm
- E. 髂嵴后连线中点上 1.5 cm

参考答案: B

57. 关于骨产道, 下述哪项是正确的

- A. 骨盆是由骶骨、耻骨、尾骨组成
- B. 真骨盆两侧为髂骨翼, 后面为第 5 腰椎
- C. 骨盆入口平面为骶岬、髂耻缘与耻骨联合上缘
- D. 骨盆出口平面是由骶尾关节、两侧坐骨棘、耻骨联合下缘围绕的盆腔最低平面
- E. 中骨盆平面横径为坐骨结节间径

参考答案: C

58. 关于骨盆下列哪项是正确的

- A. 入口前后径又称真结合径
- B. 类人猿型骨盆的入口横径长而前后径短
- C. 出口后矢状径是骶尾关节至双坐骨棘连线中点之间的距离
- D. 骨盆上段向下向前, 中段向下, 下段向前向下
- E. 骨盆倾斜度为 60 度, 它的大小和胎头衔接无关

参考答案: A

59. 骨盆最小平面其前方是耻骨联合下缘, 两侧为坐骨棘, 后方为

- A. 第 4 ~ 5 骶椎间
- B. 第 3 ~ 4 骶椎间
- C. 骶岬
- D. 骶骨下端
- E. 骶尾关节

参考答案: D

60. 关于阴道正确的是

- A. 上端包绕子宫颈, 下端开口于阴道前庭前部
- B. 阴道壁仅由黏膜与弹力纤维构成

C. 后穹隆顶端与子宫直肠陷凹贴近, 后者是腹腔最低部分

D. 后壁短于前壁

E. 黏膜由复层鳞状上皮细胞所覆盖, 有腺体

参考答案: C

61. 关于女性生殖器黏膜上皮, 正确的是

- A. 阴道黏膜上皮为单层鳞状上皮
- B. 子宫颈管黏膜为复层鳞状上皮
- C. 子宫颈阴道部黏膜为高柱状上皮
- D. 子宫内膜为柱状上皮
- E. 输卵管黏膜为复层高柱状上皮

参考答案: D

62. 下列哪组器官的黏膜为高柱状上皮

- A. 阴道 子宫颈管
- B. 子宫体 子宫峡部
- C. 输卵管 子宫体
- D. 阴道 输卵管
- E. 子宫颈管 输卵管

参考答案: E

63. 行全子宫及单侧附件切除术时, 切除下列哪项最不易损伤输尿管

- A. 骨盆漏斗韧带
- B. 卵巢固有韧带
- C. 子宫骶骨韧带
- D. 子宫动脉
- E. 主韧带

参考答案: B

64. 加强盆底托力的肌肉是

- A. 球海绵体肌
- B. 会阴浅横肌
- C. 会阴深横肌
- D. 坐骨海绵体肌
- E. 肛提肌

参考答案: E

65. 保持子宫前倾位置的主要韧带是

- A. 圆韧带
- B. 阔韧带
- C. 卵巢固有韧带