

常用中草药

彩色图集



福建科学技术出版社

FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

常用中草药 彩色图集

编著 华碧春 陈小峰 庄朝安
绘图 余汉平 邓盈丰 余 峰 陈文虎



福建科学技术出版社
FUJIAN SCIENCE & TECHNOLOGY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

常用中草药彩色图集/华碧春,陈小峰,庄朝安编著.
福州:福建科学技术出版社,2007.11
ISBN 978-7-5335-3026-6

I. 常… II. ①华…②陈…③庄… III. 中草药—图集
IV. R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 101552 号

书 名	常用中草药彩色图集
编 著	华碧春 陈小峰 庄朝安
出版发行	福建科学技术出版社(福州市东水路 76 号,邮编 350001)
网 址	www.fjstp.com
经 销	各地新华书店
排 版	福建科学技术出版社美编室
印 刷	福建彩色印刷有限公司
开 本	890 毫米×1240 毫米 1/64
印 张	6.5
字 数	255 千字
版 次	2007 年 11 月第 1 版
印 次	2007 年 11 月第 1 次印刷
印 数	1—6 000
书 号	ISBN 978-7-5335-3026-6
定 价	20.00 元

书中如有印装质量问题,可直接向本社调换

本图集收录了临床常用的255种中药，依功效分为16大类29小类。各味药包括文字介绍和彩图两部分。文字介绍包括以下几项内容：

1.药名：本书所列中药名原则上取通用药材名，主要根据《中华人民共和国药典》（一部，2005年版）。

2.来源：指原植(动)物的科名、植(动)物名和药用部位。矿物药则注明类、族、矿石名或岩石名以及主要成分。

3.形态：配合彩图扼要描述形态特征，尤其是药用部分的特征，并指明生长特性和分布地区，以利于识别、采收。

4.采制：指明采收时节，简介采收、炮制方法以及炮制品种，并介绍其药材的性状、优质药材的特征，以便于识别药材的优劣。

5.功用：包括药物性味、毒性、功效和应用。为了方便掌握应用，本书以药物功效为纲，对应分述各功效范围内的主要适应证及同一病症的不同证型，适当介绍现代研究新进展和临床新用途。传统功用以中医术语表达，现代应用以西医术语表述。

6.用法：煎服用量指干燥药物成人一日常用量，无特殊说明的鲜品加倍。外用药无特殊要求者只写适量。有不同炮制品的写明不同炮制品的性味功用。同时写明病证、妊娠或配伍等用药禁忌，以及用药后可能出现的毒性或副作用。本书十分注意药物的不良反应问题，以求

更加安全地使用中药。

7.选方：简要介绍药物在不同病症或不同证型中的具体应用和不同配伍，同时也介绍一些简便方、常用药膳和现代新用途。选方中突出主药的功效和应用(限于篇幅，未指明处方名)，临床应用时可随证加减应用。

为了充分利用篇幅，一些来源相同但入药部位不同的药物附于同基源的主要药物之后。

书末附录有3个部分。“索引”收录本书各药的中药名及基源名(若基源与中药名同，则不重复收录)，按拼音顺序排列。“常见病症选药指南”以西医病名为主，综合古今用药经验和现代研究成果，以供临床配方选用药物。

“常用植物形态描述术语图解”用图解的形式介绍了常用植物形态描述术语，便于读者理解掌握有关术语，更好地识别药物。

华碧春 陈小峰

2007年2月于福建中医学院

解表药·发散风寒

麻黄	2
桂枝	4
紫苏(附:紫苏子)	6
荆芥	8
防风	10
羌活	12
白芷	14
细辛	16
辛夷	18
生姜	20

解表药·发散风热

蝉蜕	21
薄荷	22
牛蒡子(附:牛蒡根)	24
桑叶	26
菊花	28
葛根(附:葛花)	30
柴胡	32

清热药·清热泻火

知母	34
栀子	36
芦根	38
天花粉	40
淡竹叶	42
夏枯草	44
决明子	46
石膏	48

清热药·清热解毒

青黛	49
大青叶(附:板蓝根)	50

金银花(附:忍冬藤)	52
连翘	54
蒲公英	56
野菊花	58
鱼腥草	60
败酱草	62
射干	64
马齿苋	66
半边莲	68
白花蛇舌草	70
绞股蓝	72

清热药·清热燥湿

黄芩	74
黄连	76
黄柏	78
龙胆草	80
苦参	82

清热药·清热凉血

生地黄	84
玄参	86
牡丹皮	88
赤芍	90

清热药·清虚热

紫草	92
青蒿	94
地骨皮	96
银柴胡	98

温里药

吴茱萸	100
花椒	102
荜澄茄(附:荜澄茄叶、荜澄	

茄根	104
附子	106
胡椒	108
肉桂	109
干姜 (附: 炮姜)	110

祛湿药·祛风湿

川乌	111
独活	112
威灵仙	114
木瓜	116
徐长卿	118
秦艽	120
汉防己	122
络石藤	124
五加皮	126
桑寄生	128
狗脊(附: 狗脊茸毛)	130
桑枝	132
蕲蛇	133

祛湿药·化湿

广藿香	134
佩兰	136
苍术	138
厚朴	140
砂仁	142
豆蔻	144

祛湿药·利水渗湿

薏苡仁	146
泽泻	148
车前子(附: 车前草)	150
通草	152
瞿麦	154
地肤子	156
海金沙(附: 海金沙藤)	158
石韦	160

灯心草	162
萆薢	164
茵陈	166
金钱草	168
虎杖	170
茯苓(附: 茯苓皮、茯神)	172
滑石	173

化痰止咳平喘药·化痰

半夏	174
天南星	176
旋覆花	178
前胡	180
桔梗	182
川贝母	184
浙贝母	186
竹茹	188
胖大海	190
瓜蒌(附: 瓜蒌皮、瓜蒌仁)	192

化痰止咳平喘药·止咳平喘

桑白皮	193
苦杏仁	194
百部	196
紫菀	198
款冬花	200
葶苈子	202
枇杷叶(附: 枇杷肉)	204
白果(附: 银杏叶、白果根)	206

理气药

化橘红(附: 柚叶)	208
大腹皮(附: 大腹毛)	210
绿萼梅	212
枳实(附: 枳壳)	214
木香	216

沉香	218
香附	220
川楝子	222
乌药	224
佛手	226
薤白	228
陈皮	230
橘核、橘络、橘叶、青皮	232

理血药·活血化淤

乳香、没药	233
川芎	234
延胡索	236
牛膝	238
丹参	240
郁金	242
桃仁	244
红花	246
益母草(附：茺蔚子)	248
鸡血藤	250
莪术	252

理血药·止血

大蓟	254
小蓟	256
地榆	258
槐花(附：槐角)	260
侧柏叶	262
白茅根	264
三七	266
茜草	268
蒲黄	270
白及	272
仙鹤草	274
艾叶(附：艾条、艾饼)	276

补虚药·补气

人参(附：人参叶)	278
-----------	-----

西洋参	280
党参	282
太子参	284
黄芪	286
白术	288
山药(附：零余子)	290
甘草	292

补虚药·补阳

巴戟天	294
淫羊藿	296
补骨脂	298
益智仁	300
肉苁蓉	302
菟丝子	304
杜仲	306
鹿茸(附：鹿茸胶、鹿茸霜)	308
蛤蚧	309
冬虫夏草	310

补虚药·补血

熟地黄	311
当归	312
何首乌	314
枸杞	316
白芍	318
阿胶	319

补虚药·补阴

北沙参	320
百合(附：百合花)	322
麦冬	324
石斛	326
黄精	328
女贞子(附：女贞茎、女贞叶)	330
龟甲(附：龟甲胶)	332
鳖甲(附：鳖血)	333

安神药

酸枣仁	334
远志	336
柏子仁	338
夜交藤	339
朱砂	340
龙骨	341

平肝息风药

钩藤	342
天麻	344
石决明	346
牡蛎	347
代赭石	348
地龙	349
全蝎	350
蜈蚣	351
僵蚕	352

开窍药

冰片	353
石菖蒲	354

消食药

山楂	356
鸡内金	358
神曲	359
莱菔子	360
麦芽	361

驱虫药

使君子	362
槟榔	364

泻下药·攻下

芒硝(附:朴硝、玄明粉)	365
大黄	366

番泻叶	368
-----	-----

泻下药·润下

火麻仁	370
-----	-----

固涩药

山茱萸	372
五味子	374
芡实	376
莲子	378
乌梅	380
海螵蛸	381

外用药


蛇床子	382
白矾(附:枯矾)	384

附 录

索引	385
常见病症选药指南	392
常用植物形态描述术语 图解	404

常用

中草药彩色图集



麻 黄

来源 为麻黄科植物草麻黄的草质茎。

形态 草本状小灌木。高20~40厘米，无直立的木质茎。小枝圆表面细纵槽纹，常不明显，对生或轮生。叶膜质鞘状，生于节上，2裂，裂片锐三角形。雌雄异株。种子2。花期5月，种子成熟期7月。生于河床、沙滩、干草原。分布于甘肃、新疆、内蒙古、四川西部等地。

采制 秋季采收绿色草质茎，晒干。气微香，味涩、微苦。药材以干燥、茎粗、淡绿色、内心充实、味苦涩者为佳。生用或蜜炙用。

功用 ①发汗散寒：治风寒感冒无汗发热。②宣肺平喘：治肺气不宜、胸闷喘咳。③利水消肿：治风水浮肿。

用法 2~9克，水煎服。发汗生用，止咳平喘多蜜炙用。自汗、盗汗及虚喘者慎用。高血压、心功能不全、甲状腺功能亢进、糖尿病、失眠、运动员均忌用。

选方 ①风寒感冒：麻黄、苦杏仁各6克，桂枝8克，甘草3克，水煎服。②肺寒咳喘(慢性支气管炎)：蜜麻黄8克，苦杏仁6克，细辛3克，干姜10克，水煎服。③急性肾炎水肿：麻黄8克，石膏15克，生姜5克，白术12克，甘草3克，水煎服。④风湿性关节疼痛：麻黄8克，羌活、当归、川芎各12克，细辛3克，黄芪15克，水煎服。

附注 同科植物木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bunge、中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Mey. 同等入药。



草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf.

桂 枝

来源 为樟科植物肉桂的嫩枝。

形态 常绿乔木。树皮灰棕色，有细皱纹及小裂纹，皮孔椭圆形，芳香而味甜。叶互生，叶片革质，长椭圆形或披针形，全缘，具离基3出脉。花顶生或腋生，聚成圆锥花序，黄绿色，花被6片。果实椭圆状，熟时暗紫色。花期6~7月，果期次年2~3月。生于山坡、丛林。分布于广东、广西、云南等地，福建南部有栽培。

采制 春季割嫩枝，晒干或阴干。有特异香气，味辛辣、微甜。药材以幼嫩、色棕红、气香者为佳。切片或切段用。

功用 辛、甘，温。①发汗解肌：治风寒感冒。②温通经脉：治胸痹心痛、脘腹冷痛、经闭腹痛、风湿肩臂冷痛。③助阳化气：治痰饮眩晕、小便不利、水肿等。

用法 3~10克，水煎服。热病、阴虚火旺、出血、孕妇、月经过多者忌用或慎用。

选方 ①感冒：无汗，桂枝、麻黄各9克，荆芥、防风各6克，水煎服；汗出恶风，桂枝、白芍各10克，生姜3克，大枣10枚，水煎服。②冠心病胸闷胸痛：桂枝、枳实、薤白各10克，生姜3克，水煎服。③闭经：桂枝10克，当归、川芎各8克，吴茱萸、艾叶各6克，水煎服。④关节炎疼痛：桂枝、熟附子各9克，姜黄、威灵仙各12克，水煎服。⑤冻疮(未溃破)：桂枝60克，白萝卜皮适量，加水1000毫升，煎煮后熏洗。



肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl

紫苏(附: 紫苏子)

来源 为唇形科植物紫苏的茎、叶。叶为紫苏叶，茎为紫苏梗，成熟果实为紫苏子。

形态 一年生草本，被长柔毛。有芳香气味。茎四棱形。叶对生，有长柄；叶片卵形，边缘有粗圆齿，背面紫色或两面紫色；疏生柔毛。夏秋开花，总状花序顶生和腋生，花红色或淡红色。小坚果近球状，灰棕色。花期6~7月，果期7~8月。生于山坡路边阴湿处，或栽培。分布于全国各地。

采制 夏秋采茎，大暑前后采叶。气清香，味微辛。紫苏以叶大、色紫、不碎、枝梗粗壮、香气浓、无杂质者为佳。紫苏子以颗粒饱满、均匀、灰棕色、无杂质者为佳。阴干，生用。

功用 辛，温。(1)紫苏：①疏风散寒：治风寒感冒、咳嗽。②理气宽中：治脾胃气滞胸闷呕吐、妊娠恶阻。③解鱼蟹中毒：治食鱼蟹中毒之腹痛泄泻。紫苏叶偏于发表，紫苏梗偏于理气。(2)紫苏子：①降气化痰、止咳平喘：治咳嗽气喘。②润肠通便：治肠燥便秘。

用法 紫苏 3~10克，水煎服。不宜久煎。紫苏子捣碎，水煎服。

选方 ①感冒发热、呕吐腹泻：紫苏12克，广藿香8克，陈皮10克，荆芥、防风各8克，水煎服。②妊娠胸闷呕恶：紫苏梗、姜制竹茹各10克，砂仁6克，水煎服。③鱼蟹食物中毒：紫苏叶10克，甘草5克，生姜5片，水煎服。④感冒：紫苏叶10克，生姜5克，鱼适量，水煎热服，取汗。⑤肠燥便秘：紫苏子、火麻仁、瓜蒌仁各10克，水煎服。



紫 苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. var.
acuta (Thunb.) Kubo

荆 芥

来源 为唇形科植物荆芥的地上部分。

形态 一年生草本，高60~80厘米；有强烈香气。茎直立，四棱形，全株被灰白色短柔毛。叶对生，指状3裂，裂片3~5，中部及上部叶无柄。轮伞花序，多轮密集生于枝端而成穗状；花冠青紫色或淡红色，唇形；雄蕊4，2强；子房4深裂。小坚果卵状或椭圆状。花期7~8月，果期9~10月。多为栽培。分布于江苏、浙江、江西及山东等地。

采制 夏秋花开到顶、穗绿时采割，阴干切段。气芳香，味微涩而辛凉。药材以色淡黄绿、穗长而密、香气浓者为佳。生用或炒黄、炒炭用。

功用 辛，微温。①祛风解表：治感冒发热。②透疹止痒：治麻疹、风疹、皮肤瘙痒。③消疮止痛：治疮疡初起、痔疮肿痛。④止血：治便血、崩漏、产后血晕。

用法 5~10克，水煎服。止血炒炭用。

选方 ①感冒发热头痛：荆芥、防风各8克，川芎、白芷各10克，水煎服。②风疹不透：荆芥8克，葛根15克，薄荷5克，水煎服。③皮肤瘙痒：荆芥、薄荷各6克，蝉蜕5克，白蒺藜10克，水煎服。④疮疡初起，发热恶寒、肿痛：荆芥10克，金银花15克，土茯苓15克，水煎服。⑤痔疮肿痛：荆芥30克，煎汤熏洗。⑥扁桃体肿大：荆芥、薄荷各6克，玄明粉、青黛各10克，研末，蜜水调点患处。