

国家执业医师 资格考试丛书

口腔助理医师考试 全真模拟及精解

(第三版)

北京大学医学部专家组 编

- 专家出题 全真模拟
- 考试冲刺 实战演练

2007



北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

口腔助理医师考试全真模拟及精解/北京大学医学部
专家组编. —3 版. —北京: 北京大学医学出版社,
2007. 1

ISBN 978-7-81071-912-4

I. 口… II. 北… III. 口腔科学—医师—资格考
核—解题 IV. R78-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 137670 号

此书于 2007 年 1 月印刷起, 封面无防伪标不准销售。

口腔助理医师考试全真模拟及精解 (第三版)

编 写: 北京大学医学部专家组

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E-mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 北京地泰德印刷有限公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 靳新强 责任校对: 杜 悦 责任印制: 郭桂兰

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 11.25 字数: 271 千字

版 次: 2007 年 1 月第 3 版 2007 年 1 月第 1 次印刷 印数: 1—10000 册

书 号: ISBN 978-7-81071-912-4/R·912

定 价: 20.00 元

版权所有 不得翻印 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

第三版前言

出版这套丛书的动机源自执业医师（助理医师）资格考试后的座谈会，与会的考生及有关人士一致认为执业医师资格考试是成功的，试题内容涉及作为合格医师必须掌握的基本理论、基本技能和相应的法规知识，对提高我国医师队伍的总体素质将起到积极的作用。但也有不少考生反映医学课程门类多，内容广泛，虽然经过较长时间的复习，临考前仍感到“心中无底，思路不清”；还有些考生对题意理解偏差而未能答对，尤其工作了多年的考生，对现行的试题题型不熟悉。基于此，为了帮助考生复习，增强应试信心；为了帮助考生熟悉试题题型，避免无谓的失误；为了帮助考生熟悉考试过程和自我测试，加强临考前的“冲刺”练习；我们组编了这套试题精解及全真模拟丛书，包括临床、口腔、公卫医师及助理医师共6册，与医师资格考试的门类相一致。正式出版以来，深受广大考生的欢迎，予以好评。

2007年版的全真模拟丛书，针对新的考试形式与内容对旧版本进行了相应的更新与修订，使本套丛书与当前的考试大纲、考试内容、考试形式相一致，真正达到全真模拟的效果。

每本书的主要内容：①国家执业医师资格考试试题题型介绍与答题技巧；②三套全真模拟国家执业医师（助理医师）资格考试试卷，在试题所侧重的知识点、各学科试题在试卷中的比重、各类题型的比例以及考试的时间要求等方面进行了全真模拟。

祝愿本书读者顺利通过国家执业医师资格考试！

编 者

目 录

考试题型介绍与答题技巧	(1)
口腔助理医师考试全真模拟试卷(一)	(4)
第一单元	(4)
第二单元	(20)
答题卡	(37)
试卷(一)答案及试题分析	(41)
第一单元	(41)
第二单元	(52)
口腔助理医师考试全真模拟试卷(二)	(62)
第一单元	(62)
第二单元	(78)
答题卡	(95)
试卷(二)答案及试题分析	(99)
第一单元	(99)
第二单元	(110)
口腔助理医师考试全真模拟试卷(三)	(119)
第一单元	(119)
第二单元	(135)
答题卡	(151)
试卷(三) 答案及试题分析	(155)
第一单元	(155)
第二单元	(165)

考试题型介绍与答题技巧

国家医师资格考试采用的题型有 A 型选择题和 B 型选择题。A 型选择题中, A1、A2、A3/A4 型选择题均出现了; B 型选择题中只出现了 B1 型选择题。现分别介绍于下(所列例题均选自历届口腔助理医师资格考试试卷):

一、A1 型选择题

A 型选择题属于最佳选择题类型。A1 型选择题为单个最佳选择题, 每道题由 1 个题干和 5 个备选答案组成(见例题 1)。要求应考者找出 1 个符合题干要求的最佳或恰当的答案, 此为正确答案, 其余 4 个则为干扰答案。5 个备选答案之间往往具有比较意义, 干扰答案或是完全不符合题干要求, 也可以是部分符合题干要求, 因此答题时应审慎选择, 以排除似乎有理而实际是不合适的答案。有时在备选答案中出现“以上都不是”(见例题 2), 这有两种情况: ①“以上都不是”作为正确答案, 其他 4 个答案均是干扰答案, 而且是绝对不符合题干要求的, 真正的正确答案没有出现; ② 5 个备选答案中已含有正确答案, 而“以上都不是”只是 1 个干扰答案而已, 答题者应慎之! A1 型选择题中还有一种否定型形式, 试题有多个正确答案或涉及不止 1 个相关问题时常采用否定型形式(见例题 3)。题干中有 1 个特别标注的(用黑体或加着重号标注)否定词(不、不是、不能、除外、错误、无关等), 要求应试者在 5 个备选答案中选出符合题干要求的答案, 而答案的内容与题干的主旨陈述是相悖的, 或者是最不合适的, 或者是例外的, 或者是用得最少的。

例题 1 恒牙列中, 患龋率最高为

- A. 下颌第二磨牙
- B. 下颌第一磨牙
- C. 下颌前磨牙
- D. 上颌前磨牙
- E. 上颌第一磨牙

正确答案: B

例题 2 会引起翼静脉丛血肿的局麻方法有

- A. 上颌结节麻醉
- B. 腭大孔麻醉
- C. 鼻腭神经麻醉
- D. 颊长神经麻醉

E. 以上都不是

正确答案: A

例题 3 《医疗机构管理条件》规定, 医疗机构必须将有关文件悬挂于明显处所, 除了

- A. 医疗机构批准书
- B. 医疗机构执业许可证
- C. 诊疗科目
- D. 诊疗时间
- E. 收费标准

正确答案: A

二、A2 型选择题

A2 型选择题是病历摘要型最佳选择题, 多用于考查临床学科的知识与技能(见例题 4), 但基础医学与其他学科也常采用(见例题 5)。试题由一个叙述性的简要病历(或其他

主体)作为题干和5个备选答案组成。也有否定型和“以上都不是”型。

例题4 一成人患者,腮腺区反复肿胀、疼痛2年,腮腺导管口红肿,有脓性渗出物溢出。X线造影检查显示主导管呈腊肠状,末梢导管无明显改变,拟诊断为

- A. 腮腺恶性肿瘤
- B. 腮腺良性肿瘤
- C. 慢性化脓性腮腺炎
- D. 腮性结核
- E. 良性腮腺肥大

正确答案:C

例题5 某稳定型心绞痛患者,近期发生过性脑缺血,在给予常规抗心绞痛

药物的同时,选用小剂量阿司匹林治疗,其理论依据是药物

- A. 抑制PG合成酶,使 PGI_2 合成减少
- B. 抑制PG合成酶,使 TXA_2 合成减少
- C. 抑制PG合成酶,使 PGE_2 合成减少
- D. 抑制PG合成酶,消除痛觉增敏效应
- E. 抑制PG合成酶,使致炎物质释放减少

正确答案:B

三、A3/A4型选择题

A3型选择题为病历组型最佳选择题。此类题的结构是先叙述一个临床案例,然后在案例下提出若干道考题,每道考题均与案例有关,但测试点不同,各考题之间相互独立(见例题6)。每道考题备有5个备选答案,要求选择1个最佳的答案,其余的答案可以是错误的,也可以是部分正确的。但只能有1个最佳的答案。此类型也有否定型形式。A3型选择题和后面讲述的A4型选择题多用来考查临床学科的知识 and 技能,但也有可能在此类试题中提出某个问题来考查基础医学或其他学科的知识 and 技能。

A4型选择题为病历串型最佳选择题。试题的结构类似A3型选择题,也是先叙述1个临床案例,然后提出若干个相关的问题,与A3型选择题不同的是当病情逐渐展开时,可逐步增加新的信息(见例题7)。每个问题均与开始叙述的临床案例有关,又与随后增加的信息有关,所以回答这样的试题一定要仔细考虑两者的要求。A4型选择题中的每个问题也有5个备选答案,要求找出1个最佳的答案,其余的备选答案可以是部分正确,也可以是错误的。A4型选择题也有否定形式,否定词常用黑体字以提醒应试者。

例题6 (1~2题共用题干)

女性,22岁,去某医院行拔牙术,注射麻药时,患者出现头晕、恶心、胸闷、四肢无力。查:血压90/60mmHg,脉搏65次/分,面部及口唇苍白。

1. 该患者的诊断是

- A. 中毒
- B. 过敏
- C. 晕厥
- D. 白血病

E. 中风

2. 对该病人上述情况的正确处理是

- A. 立即送往急诊室
- B. 注射麻药完成后抢救
- C. 停止注药,立即抢救
- D. 继续注射,完成拔牙
- E. 观察,暂不处理

正确答案:1.C 2.C

例题7 (1~2题共用题干)

某无牙颌患者，要求制作全口义齿修复。主诉：曾多次全口义齿修复，均不合适。检查发现：下颌牙槽嵴极度低平，口腔粘膜薄，舌体增大，下颌呈习惯性前伸，殆关系不稳定

1. 取印模时应注意

- A. 用解剖印模法
- B. 取功能性印模
- C. 用石膏一次印模

D. 用有孔托盘

E. 舌侧托盘边缘加高

2. 确定殆关系时注意

- A. 采用患者的习惯位
- B. 利用旧义齿确定
- C. 帮助患者下颌后退
- D. 面下 1/3 的高度
- E. 殆骨的垂直关系

正确答案：1. B 2. C

四、B1 型选择题

B 型选择题为配伍题。B1 型选择题是标准配伍题，试题的形式为开始是 5 个备选答案，其后提出至少 2 道试题，要求应试者为每一道试题从备选答案中选出与其关系最密切的答案（见例题 8），每个备选答案可以被选用 1 次，多次或不被选用。

例题 8 （1~5 题共用备选答案）

- A. 四环素牙
- B. 氟牙症
- C. 先天性梅毒牙
- D. 牙震荡
- E. 牙釉内陷

1. 微量元素摄入过多造成

2. 药物因素造成

3. 感染造成

4. 外伤造成

5. 牙发育异常造成

正确答案：1. B 2. A 3. C 4. D 5. E

口腔助理医师考试全真模拟试卷 (一)

第一单元

A1 型选择题 (1~95 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 组成核酸的基本单位是
 - A. 含氮碱基
 - B. 单核苷酸
 - C. 多核苷酸
 - D. 核糖核苷
 - E. 脱氧核糖核苷
2. 一分子乙酰 CoA 经有氧氧化 (三羧酸循环) 可生成几分子 ATP
 - A. 6
 - B. 9
 - C. 12
 - D. 15
 - E. 24
3. 下列叙述中, 错误的是
 - A. 四氢叶酸 (FH_4) 是一碳单位转移酶的辅酶
 - B. 一碳单位参与核酸合成
 - C. 叶酸缺乏时可引起巨幼细胞性贫血
 - D. 维生素 B_{12} 含有金属元素
 - E. 维生素 B_{12} 和一碳单位代谢无关
4. 关于结合胆红素的叙述, 错误的是
 - A. 和清蛋白结合
 - B. 和葡萄糖醛酸结合
 - C. 极性强, 便于随胆汁排出
 - D. 分子小, 可被肾小球滤过
 - E. 与重氮试剂直接反应, 呈紫红色
5. 鸟氨酸循环合成尿素, 一个氮原子来自 NH_3 , 另一个来自
 - A. 谷氨酸
 - B. 谷氨酰胺
 - C. 天冬氨酸
 - D. 天冬酰胺
 - E. 氨基甲酰磷酸
6. 有关糖酵解的叙述, 下列哪项是错误的
 - A. 葡萄糖在无氧情况下分解为乳酸的过程称为酵解
 - B. 酵解中每分子葡萄糖可产生 2 分子 ATP
 - C. 成熟红细胞没有线粒体, 不能进行酵解
 - D. 1, 6-二磷酸果糖是酵解中间产物

- E. 丙酮酸激酶是酵解的限速酶
7. 关于氯丙嗪等抗精神失常药的临床应用哪一项是错误的
- A. 主要用于治疗精神分裂症
 - B. 可用于躁狂-抑郁症的躁狂相
 - C. 氯丙嗪对放射治疗引起的呕吐有效
 - D. 利用其对内分泌影响试用于侏儒症
 - E. 氯丙嗪作为“冬眠合剂”成分用于严重感染
8. 催产和引产可选用
- A. 缩宫素
 - B. 麦角新碱
 - C. 糖皮质激素
 - D. 维生素 K
 - E. 麦角胺
9. 使用过量最易引起心律失常的药物是
- A. 去甲肾上腺素
 - B. 间羟胺
 - C. 麻黄碱
 - D. 多巴胺
 - E. 肾上腺素
10. 有机磷酸酯类农药中毒的机制是
- A. 促进胆碱能神经释放乙酰胆碱
 - B. 抑制胆碱能神经释放乙酰胆碱
 - C. 促进肾上腺素能神经释放去甲肾上腺素
 - D. 抑制单胺氧化酶
 - E. 抑制胆碱酯酶
11. 毛果芸香碱滴眼后, 对视力的影响是
- A. 视近物清楚, 视远物模糊
 - B. 视近物模糊, 视远物清楚
 - C. 视近物、远物均清楚
 - D. 视近物、远物均模糊
 - E. 视物基本无改变
12. 四环素牙主要着色的部位是
- A. 牙釉质
 - B. 牙本质
 - C. 牙骨质
 - D. 牙颈部
 - E. 牙尖部
13. 呋塞米的利尿作用是由于
- A. 抑制肾的稀释功能
 - B. 抑制肾的浓缩功能
 - C. 抑制肾的稀释和浓缩功能
 - D. 对抗醛固酮的作用
 - E. 阻断 Na^+ 通道, 减少 Na^+ 的重吸收
14. 糖尿病伴有水肿的患者不宜选用
- A. 氢氯噻嗪
 - B. 速尿
 - C. 安体舒通
 - D. 乙酰唑胺
 - E. 山梨醇
15. 强心苷治疗心衰疗效最好的适应证是
- A. 甲状腺功能亢进诱发的心衰
 - B. 高度二尖瓣狭窄诱发的心衰
 - C. 伴有心房纤颤或心室率快的心衰
 - D. 肺源性心脏病引起的心衰
 - E. 严重贫血诱发的心衰
16. 长期使用利尿药的降压机制是
- A. 排 Na^+ 、利尿, 血容量减少
 - B. 降低血浆肾素活性
 - C. 增加血浆肾素活性
 - D. 减少血管平滑肌细胞内 Ca^{2+}
 - E. 抑制醛固酮的分泌
17. 牙釉质最厚的部位是
- A. 牙颈部
 - B. 窝沟处
 - C. 牙尖部
 - D. 无釉柱牙釉质

E. 釉板处

18. 有关牙本质小管的结构, 以下哪项是错误的

- A. 在牙尖部小管较直
- B. 小管越近牙髓一端越细
- C. 小管贯穿牙本质全层
- D. 牙本质小管可有许多分支
- E. 在牙颈部弯曲呈“~”形

19. 牙齿萌出规律的描述中, 错误的是

- A. 在一定时间内萌出
- B. 按一定的先后顺序萌出
- C. 左右同名牙成对萌出
- D. 下颌牙萌出的时间略早于上颌牙
- E. 男性萌出的时间略早于女性

20. 根管数目与牙根数目之间的关系是

- A. 不完全一致
- B. 完全一致
- C. 很相似
- D. 每一个牙根中有一个根管
- E. 每一个牙根中有两个根管

21. 有关乳牙和恒牙的区别, 错误的是

- A. 恒牙冠呈乳白偏黄, 乳牙冠呈白垩色
- B. 乳牙与同名恒牙体积相似
- C. 恒牙颈嵴突起较乳牙不明显
- D. 乳牙牙冠颈嵴突出, 冠根分明。恒牙冠根分界不太明显
- E. 恒磨牙根干较长、分叉小; 乳磨牙根干短、分叉大

22. 根管最狭窄的地方在

- A. 约距根尖孔 1mm 处
- B. 约距根尖 1mm 处
- C. 约距根中 1/3 与根尖 1/3 交界处
- D. 约距根颈 1/3 与根尖 1/3 交界处
- E. 约在根管口处

23. 上颌牙列中牙周膜面积最小的是

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

24. 属纯粘液腺的小涎腺是

- A. 唇腺
- B. 颊腺
- C. 味腺
- D. 磨牙后腺
- E. 腭腺

25. 加强医德建设的根本目的是

- A. 保证社会主义市场经济对医疗活动的促进
- B. 防止和最大限度地限制市场经济对医疗活动的副作用
- C. 解决医疗卫生单位内部的矛盾
- D. 实现医疗活动的道德本质
- E. 为医疗卫生体制改革奠定基础

26. 以下情形中不予医师执业注册的是

- A. 受过刑事处罚的
- B. 受刑事处罚, 自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止满三年的
- C. 不具有完全民事行为能力的
- D. 受过吊销医师执业证书行政处罚的
- E. 受吊销医师执业证书行政处罚, 自处罚之日起至申请注册之日止不满三年的

27. 管理本行政区域内医师工作的机构是

- A. 县级以上人民政府劳动人事部门
- B. 县级以上人民政府工商行政部门
- C. 县级以上人民政府卫生行政部门
- D. 各级医师协会
- E. 各级人民政府

28. 《医疗事故处理条件》规定, 医患双方不能确定患者死因或对死因有异议时, 应在患者死亡后多长时间内进行尸检, 或者具备尸体冻存条件的, 可以延长至多少天
- A. 24 小时; 5 天
 - B. 24 小时; 7 天
 - C. 48 小时; 7 天
 - D. 48 小时; 5 天
 - E. 72 小时; 10 天
29. 流行病学实验研究中, 研究对象服从实验设计安排, 并坚持合作到底, 对此称之为
- A. 依从性
 - B. 长期性
 - C. 完整性
 - D. 持续性
 - E. 服从性
30. 作为水质被粪便污染最合适的细菌学指标是
- A. 厌氧芽孢菌
 - B. 粪链球菌
 - C. 大肠菌群
 - D. 伤寒杆菌
 - E. 痢疾杆菌
31. 急性氟中毒没有如下症状
- A. 流涎
 - B. 发烧
 - C. 恶心
 - D. 呕吐
 - E. 腹痛
32. 评价食物蛋白质营养价值的主要依据是
- A. 蛋白质的含量
 - B. 蛋白质的表现消化率
 - C. 蛋白质的真消化率
 - D. 蛋白质的生物利用率
 - E. 氮平衡试验
33. 生物医学模式转变为生物-心理-社会医学模式, 本质上可反映出
- A. 医学道德的进步
 - B. 医疗技术的进步
 - C. 对社会、对后代的关心
 - D. 重视人的生命的社会价值
 - E. 重视人的心理健康
34. 关于医学实践, 错误的是
- A. 医学实践是医学伦理学的基础
 - B. 医学实践是医学伦理学动力
 - C. 医学实践是检验医学伦理学理论正确性的唯一标准
 - D. 医学实践是检验医学伦理学理论正确性的主要标准
 - E. 医学实践是医学伦理学理论和规范的来源
35. 关于医师的特殊干涉权, 完全正确的是
- A. 是医师特殊的职业权力, 不具有自主性
 - B. 是医师特殊的职业权力, 具有普遍性
 - C. 目的是限制病人的自主权利
 - D. 在特殊情况下, 限制病人的自主权利, 以确保病人自身、他人和社会的利益
 - E. 依据医师特殊的职业特点, 在职业范围内可任意行使
36. 在人本主义(询者中心)治疗中最重要的是
- A. 表达
 - B. 分析
 - C. 指导
 - D. 倾听
 - E. 同情

37. 与意志自觉性相反的特征是
- 独断
 - 果断
 - 冲动
 - 武断
 - 动摇
38. 人的心理活动的动力特征从属于个性中的
- 能力
 - 气质
 - 性格
 - 人格
 - 兴趣
39. 关于白斑, 以下哪项是**错误**的
- 是指在粘膜表面发生的白色斑块, 不能擦掉
 - 在临床和病理上可诊断为其他疾病的病变也可称为白斑
 - 上皮单纯性增生属于良性病变
 - 白斑属癌前病变
 - 白斑可表现不同程度的上皮异常增生
40. 窝沟封闭的适应证是
- 患较多邻面龋的牙
 - 对侧同名牙有龋
 - 已充填的牙
 - 牙萌出4年以上无龋
 - 恒切牙
41. 下颌后部牙槽嵴骨吸收的方向为
- 向下、向后
 - 向下、向外
 - 向下、向内
 - 向后、向外
 - 向下、向前
42. 失活剂烧伤的临床表现**除外**
- 封药后自觉胀痛不适
 - 龈组织呈暗灰色坏死
 - 牙龈组织的探痛明显
 - 牙轻度咬合痛和叩痛
 - 严重者牙槽骨可坏死
43. 用器械去除牙周袋内根面牙石、菌斑的治疗称为
- 龈上洁治术
 - 根面磨光
 - 龈下刮治术
 - 龈下冲洗
 - 调骀
44. 逆行性牙髓炎的临床表现**除外**
- 阵发性自发痛
 - 牙体完好无损
 - 未探及牙周袋
 - 温度测引起痛
 - 牙松动有叩痛
45. 根管治疗过程发生的并发症中, 可能引起严重后果的是
- 器械折断
 - 急性根尖周炎
 - 侧壁穿刺
 - 急性根尖炎
 - 器械误吞误吸
46. 用于急性期牙周脓肿治疗的手段是
- 避免用抗生素
 - 不能用止痛药
 - 急性期不能刷牙
 - 切开脓肿引流
 - 牙周翻瓣术
47. 关于边缘性骨髓炎 X 线片表现, 哪种说法是**错误**的
- 可见弥漫性骨密度增高
 - 可有局限性骨质破坏

- C. 大量死骨形成
D. 骨密质外有骨质增生
E. 可见骨膜反应
48. 理想的根管充填材料要求中, 不能达到的是
A. 不刺激根尖周组织
B. 体积不收缩
C. X线阻射
D. 操作简便易取出
E. 持久的抗菌作用
49. 咬合创伤时 X 线片上常表现为
A. 牙槽骨水平吸收
B. 牙槽骨密度普遍减低
C. 牙槽骨无吸收
D. 骨小梁普遍模糊
E. 牙周膜间隙增宽
50. 骨膜下脓肿阶段是患者疼痛症状高峰期, 其临床表现除外
A. 剧烈持续的跳痛
B. 触痛(+++), III度松动
C. 根尖部牙龈红肿和扪痛
D. 相应面部的反应性水肿
E. 体温和白细胞计数正常
51. 牙周病活动期牙槽嵴吸收表现为
A. 牙槽骨吸收边缘整齐、平滑
B. 牙槽骨吸收边缘可见薄层致密骨形成
C. 骨硬板不清晰, 部分或全部消失
D. 骨纹理增粗, 骨硬板增厚
E. 牙骨质增生, 牙周膜间隙变窄甚至消失
52. 死髓牙根尖部牙龈出现瘘管应考虑为
A. 根尖囊肿
B. 慢性牙髓炎
C. 慢性根尖脓肿
D. 慢性根尖肉芽肿
E. 慢性根尖炎急性发作
53. 龈上洁治术前应先含漱, 最好用
A. 清水
B. 蒸馏水
C. 高锰酸钾液
D. 新洁尔灭
E. 3%双氧水
54. 根管充填时, 选择主尖时应考虑的依据除外
A. 照诊断丝 X 片
B. 根管口的粗细
C. 与工作长度一致
D. 同主根管锉的型号
E. 根管内试狭窄部有阻力
55. 急性根尖周炎应急处理的措施除外
A. 安抚治疗
B. 消炎止痛
C. 开放髓腔
D. 脓肿切开
E. 降低咬合
56. 根尖囊肿的诊断要点除外
A. 牙髓活力正常, 不松动
B. 根管内有浅黄透明囊液
C. 镜下囊液中胆固醇结晶
D. X线透射区周边白线围绕
E. 压迫邻牙, 使邻牙牙根吸收或使邻牙移位现象
57. 青少年牙周炎的特点为
A. 青少年男性多发
B. 一般口腔较清洁、牙石少
C. 牙龈重度炎症
D. 好发于所有前牙
E. 牙槽骨致密

58. 根尖周炎的主要病因是
- A. 感染因素
 - B. 创伤因素
 - C. 化学因素
 - D. 医源因素
 - E. 免疫因素
59. 急性牙槽脓肿排脓通道对根尖周组织破坏最小的是
- A. 根尖孔—根管内—龋洞
 - B. 根尖周—骨膜下—粘膜下
 - C. 骨髓腔—面部间隙—皮下
 - D. 根尖周—骨髓腔—鼻腔
 - E. 根尖周—骨髓腔—上颌窦
60. 造成牙槽骨吸收速度快的原因不是
- A. 骨质疏松
 - B. 牙周病
 - C. 猖獗龋
 - D. 全身健康差
 - E. 义齿设计制作不合理
61. 磨耗多发生在牙冠的
- A. 唇面、颊面和殆面
 - B. 舌面、殆面和邻面
 - C. 切缘、邻面和轴面
 - D. 切缘、殆面和邻面
 - E. 轴面、殆面和切缘
62. 龋病的三级预防包括
- A. 应用氟化物
 - B. 窝沟封闭
 - C. 防止并发症
 - D. 合理饮食
 - E. 口腔健康教育
63. 假性牙周袋与真性牙周袋的区别是
- A. 牙周袋的深度
 - B. 牙周袋的形状
 - C. 牙周袋底的位置
 - D. 牙龈有无增生或肿胀
 - E. 牙龈有无炎症
64. 急性根尖周炎脓肿切开的主要临床依据是
- A. 剧烈疼痛后 3~4 天
 - B. 根尖部移行沟变平
 - C. 脓肿扪诊有波动感
 - D. 患者体温升高 38℃
 - E. 白细胞计数升高
65. 牙髓失活法最严重的并发症是
- A. 封药后疼痛
 - B. 失活剂烧伤
 - C. 急性牙髓炎
 - D. 急性根尖炎
 - E. 急性龈乳头炎
66. 关于恶性黑色素瘤, 下列哪种说法是错误的
- A. 早期表现为皮肤痣或粘膜黑斑, 可有卫星结节
 - B. 恶性程度高, 可以侵犯骨组织, 引起牙槽突及颌骨破坏, 牙齿松动
 - C. 常发生广泛转移
 - D. 发现病变后应尽早活检明确诊断, 以免耽误治疗
 - E. 治疗以手术为主, 辅以化疗
67. 乳牙最容易患龋的部位是
- A. 乳磨牙殆面
 - B. 第一乳磨牙远中面
 - C. 第二乳磨牙近中面
 - D. 乳前牙的唇面
 - E. 乳切牙的近中面
68. 牙本质龋最前缘的改变是
- A. 脱矿
 - B. 细菌侵入
 - C. 透明牙本质形成

- D. 成牙本质细胞突起脂肪变性
E. 再矿化
69. 牙周炎在 X 线片上的表现为
A. 牙周膜呈黑线
B. 骨硬板为白线
C. 前牙牙槽嵴顶尖锐
D. 后牙牙槽嵴顶平坦
E. 嵴顶位于根长 1/2 处
70. 酸蚀术处理合格的牙釉面呈
A. 乳白色
B. 白垩色
C. 黄褐色
D. 乳黄色
E. 暗灰色
71. 随楔状缺损加深可出现的并发症除外
A. 牙本质过敏症
B. 可复性牙髓炎
C. 牙龈乳头炎
D. 根尖周炎
E. 牙齿折裂
72. 牙周炎与牙龈炎的主要区别是
A. 牙龈出血
B. 牙龈肿胀
C. 牙周袋形成
D. 牙龈质地松软
E. 牙龈鲜红色
73. 对于诊断为“第Ⅱ类近中位颊侧移位阻生智齿”下列描述错误的是
A. 阻生智齿大部分位于下颌升支内
B. 阻生智齿的长轴向近中倾斜
C. 阻生智齿的最高点低于殆平面
D. 阻生智齿的最高点高于第二磨牙颈部
E. 阻生智齿偏向正常牙列中线的颊侧
74. 诊断为龋齿时，温度测验的结果是
A. 正常
B. 敏感
C. 迟钝
D. 一过性敏感
E. 无反应
75. 乳牙牙髓治疗中正确的是
A. 乳牙根管充填可用氧化锌丁香油糊剂
B. 牙髓坏疽时最好拔除
C. 牙根开始吸收时不能做活髓切断
D. 乳牙不能做氢氧化钙活髓切断
E. 乳牙保存活髓没意义
76. 急性牙髓炎自发痛时间的特点为
A. 吃饭痛
B. 饭后痛
C. 遇冷痛
D. 遇热痛
E. 夜间痛
77. 探诊慢性溃疡性牙髓炎患牙的龋洞为
A. 洞底硬，不敏感
B. 洞内探穿髓孔痛
C. 洞内有肉芽组织
D. 洞底大量软腐质
E. 以上无一项正确
78. 下列何种情况不属于干槽症的表现
A. 以疼痛为主要症状
B. 为阵发性轻微疼痛
C. 拔牙窝常有腐败坏死物
D. 拔牙窝内有明显腐臭味
E. 骨壁常有明显触痛
79. 鉴别急性牙髓炎患牙的上或下牙位可用
A. 嗅诊
B. 染色法
C. 麻醉试法

- D. 牙髓电诊法
E. X线片检查
80. 长期服用苯妥英钠易引起的牙周组织疾病是
A. 牙龈纤维瘤病
B. 药物性牙龈增生
C. 青春期龈炎
D. 单纯性肥大性龈炎
E. 牙龈炎
81. 妊娠期龈炎的表现为
A. 牙龈肥大鲜红色
B. 龈缘菲薄紧贴牙面
C. 牙龈质地坚韧
D. 龈沟深度在 2mm 以内
E. 探诊后牙龈无出血
82. 牙齿温度测验的注意事项除外
A. 先测患牙
B. 隔离唾液
C. 冷测用小冰棍
D. 热测温度为 50~60℃
E. 置牙齿颊面中部测试
83. 恒牙最不易发生龋齿的部位是
A. 咬合面点隙和裂沟
B. 牙齿邻面和牙颈部
C. 牙尖和切缘
D. 釉质发育缺陷牙面
E. 下颌第一磨牙
84. 磷酸锌粘固粉用于垫底有局限性的原因是
A. 抗压强度 98 MPa
B. 有一定的粘结性
C. 绝缘性能很优良
D. 对牙髓有刺激性
E. 唾液中可被溶解

85. 龋病发生的四联因素指
A. 牙齿形态、排列、结构和唾液
B. 细菌、菌斑、葡聚糖和有机酸
C. 细菌、食物、宿主和时间因素
D. 蔗糖、菌斑、牙齿和口腔卫生
E. 细菌、蔗糖、唾液和时间因素
86. 处理深龋前，最重要的是
A. 问清患者的主诉
B. 判断牙髓的情况
C. 查清龋洞的深度
D. 探查腐质软硬度
E. 进行 X 线片检查
87. 年轻恒牙深龋保留部分龋坏牙本质的目的是
A. 观察牙髓状况
B. 促进牙本质形成
C. 杀灭细菌
D. 保护牙髓
E. 再矿化
88. 龈下牙石是
A. 沉积于龈缘以上牙面的牙石
B. 沉积于牙周袋内根面上的牙石
C. 肉眼可见，呈浅黄色
D. 形成较快，质地较松的牙石
E. 用器械较易去除的牙石
89. 能增加菌斑滞留的因素中不包括
A. 银汞充填体的悬突
B. 位于龈下的修复体
C. 外形凸度过大的冠修复体
D. 设计或制作不良的局部义齿
E. 龈端较为密合且光洁度高的修复体
90. 以下哪种牙体缺损不适合用充填的方法治疗
A. 后牙骀面洞
B. 前牙切角缺损