

全国卫生专业技术资格考试丛书

北京大学护理学院 编写

护理学专业[执业护士含护士] 资格考试全真模拟及精解

2007年

- 紧扣全国卫生专业技术资格考试大纲
- 内容涵盖资格考试主要考点
- 专家解析，全真模拟

免费赠送20元
上网学习充值卡



北京大学医学出版社

全国卫生专业技术资格考试丛书

**2007 年护理学专业（执业护士含护士）
资格考试全真模拟及精解**

北京大学护理学院 编写

北京大学医学出版社

HULIXUE ZHUANYE (ZHIYE HUSHI HAN HUSHI) ZIGE KAOSHI QUANZHEN MONI JI JINGJIE

图书在版编目 (CIP) 数据

护理学专业 (执业护士含护士) 资格考试全真模拟
及精解/北京大学护理学院编写. —北京: 北京大学医学
出版社, 2004. 3 (2007. 3 重印)

ISBN 978-7-81071-558-4

I. 护… II. 北… III. 护理学—资格考核—解题
IV. R47—44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 007457 号

护理学专业 (执业护士含护士) 资格考试全真模拟及精解

编 写: 北京大学护理学院

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumppress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 许 云 药 勇 责任校对: 周 励 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 15.25 字数: 382 千字

版 次: 2004 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 9 次印刷 印数: 72001—75000 册

书 号: ISBN 978-7-81071-558-4

定 价: 25.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

为配合全国卫生专业技术护理学专业（执业护士含护士）资格考试，帮助考生在有限的时间内掌握考试要点，提高复习效率，北京大学护理学院组织相关学科专家，根据护理学专业（执业护士含护士）考试大纲，共同编写了这套考试辅导丛书。本套书共分三本：

《护理学专业（执业护士含护士）资格考试应试指导》

内容精练，重点突出，可以帮助考生在考前高效快速地掌握考试重点和难点。

《护理学专业（执业护士含护士）资格考试习题集》

题量大，内容丰富，涵盖资格考试主要考点，是考前强化训练的必备用书。

《护理学专业（执业护士含护士）资格考试全真模拟及精解》

全方位模拟考试真题，题后由专家解析，是考前冲刺的最佳选择。

编 者

目 录

护理学专业（执业护士含护士）资格考试全真模拟试卷（一）	(1)
全真模拟试卷（一）答案及精解	(47)
护理学专业（执业护士含护士）资格考试全真模拟试卷（二）	(80)
全真模拟试卷（二）答案及精解	(125)
护理学专业（执业护士含护士）资格考试全真模拟试卷（三）	(159)
全真模拟试卷（三）答案及精解	(203)

护理学专业（执业护士含护士） 资格考试全真模拟试卷（一）

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

1. 支气管扩张及肺脓肿病人痰液的典型表现是
 - A. 只有少量粘液
 - B. 草绿色
 - C. 红棕色胶冻状
 - D. 灰黑色
 - E. 痰液分层现象
2. 下列血气分析结果哪项符合Ⅱ型呼衰
 - A. PaO_2 65mmHg, PaCO_2 35mmHg
 - B. PaO_2 55mmHg, PaCO_2 55mmHg
 - C. PaO_2 40mmHg, PaCO_2 40mmHg
 - D. PaO_2 70mmHg, PaCO_2 40mmHg
 - E. PaO_2 80mmHg, PaCO_2 45mmHg
3. 预防外源性哮喘发作最关键的措施是
 - A. 监测病情
 - B. 避免接触过敏原
 - C. 避免感染
 - D. 应用支气管扩张剂
 - E. 坚持服药
4. 哮喘持续状态是指严重哮喘持续时间达
 - A. 6 小时
 - B. 10 小时
 - C. 12 小时
 - D. 16 小时
 - E. 24 小时
5. 肺炎链球菌肺炎典型的表現中不包括
 - A. 寒战
 - B. 高热
 - C. 咳嗽
 - D. 咳铁锈色痰
 - E. 哮鸣
6. 有关端坐呼吸的描述正确的是
 - A. 多发生在夜间，睡眠中可突然憋醒
 - B. 体力活动时发生呼吸困难，休息可缓解
 - C. 休息时病人感到呼吸困难，不能平卧，被迫取坐位或半卧位
 - D. 体力活动时发生呼吸困难，口含硝酸甘油可缓解
 - E. 睡眠中可憋醒，被迫站立位伴咳粉红色泡沫痰
7. 风心病最常见的心律失常是
 - A. 室性早搏
 - B. 房性早搏
 - C. 心房颤动
 - D. 阵发性室上速
 - E. 窦性心动过缓
8. 急性心肌梗死患者最早出现、最突出的症状是
 - A. 心源性休克
 - B. 心律失常
 - C. 疼痛
 - D. 心力衰竭
 - E. 胃肠道症状
9. 下列哪项不是原发性高血压的相关因素
 - A. 遗传因素
 - B. 年龄增大
 - C. 脑力活动过度紧张
 - D. 自身免疫缺陷
 - E. 高盐饮食及肥胖
10. 胃溃疡病人上腹部疼痛的典型节律是
 - A. 疼痛—进食—缓解
 - B. 进食—缓解—疼痛
 - C. 缓解—疼痛—进食

- D. 进食—疼痛—缓解
E. 疼痛—进食—疼痛
11. 溃疡性结肠炎最常见的临床表现为
A. 明显的上腹痛
B. 腹泻
C. 发热
D. 腹水
E. 腹胀
12. 在我国急性胰腺炎最常见的病因是
A. 胆道疾病
B. 腹部外伤
C. 暴饮暴食
D. 酗酒
E. 十二指肠乳头邻近部位病变
13. 下列关于泌尿系统疾病的症状描述错误的是
A. 肾性高血压多数为容量依赖性的
B. 肾性水肿常发生于下垂部位
C. 夜尿增多常是肾浓缩功能减退的早期表现
D. 尿路刺激征常为膀胱三角区及膀胱颈受刺激所致, 多见于尿路感染
E. 肾区疼痛多由于肾包膜受牵拉所致
14. 引起尿毒症贫血最重要的原因是
A. 毒素使红细胞寿命缩短
B. 铁、叶酸缺乏
C. 严重呕血、便血
D. 肾产生 EPO 减少
E. 代谢产物抑制骨髓造血
15. 我国最常见的贫血类型是
A. 巨幼细胞贫血
B. 缺铁性贫血
C. 再生障碍性贫血
D. 地中海贫血
E. 溶血性贫血
16. 甲亢病人最具特征性的体征是
A. 双手震颤
B. 心动过速
C. 眼球突出
D. 甲状腺肿大
E. 心律失常
17. 糖尿病酮症酸中毒的特征性表现是
A. 极度口渴
B. 厌食恶心
C. 眼球下陷
D. 呼气有烂苹果味
E. 呼吸加速
18. SLE 最常见的皮肤损害部位是
A. 腹部
B. 颈部
C. 暴露部位
D. 前胸上部
E. 下肢
19. 类风湿性关节炎最常累及的关节是
A. 肘关节
B. 脊柱小关节
C. 肩关节
D. 膝关节
E. 四肢小关节
20. 急性有机磷农药中毒引起的毒蕈碱样症状是
A. 肌束颤动
B. 血压升高
C. 瞳孔缩小
D. 大小便失禁
E. 心律失常
21. 脑出血最常见的发病部位为
A. 延髓
B. 脑室
C. 小脑
D. 内囊
E. 脑叶
22. 患者女性, 45 岁, 有哮喘史 5 年, 近几天来为他人代养一只小狗, 每于给小狗洗澡后出现咳嗽咳痰伴喘息。护士为其宣教时, 应指出此次哮喘发作最可能的过敏原是
A. 花粉
B. 尘螨
C. 动物的毛屑

- D. 病毒感染
E. 精神因素
23. 患者, 女性, 70 岁, 冠心病心绞痛 5 年, 平日心绞痛发作时口含硝酸甘油 1~3 分钟可止痛, 此次心绞痛发生 3 小时来服上述药物无效, 急送医院。心电图检查发现为急性心肌梗死入监护室, 监测血压 70/50mmHg, 患者烦躁不安, 皮肤湿冷、脉搏细速, 此时护士考虑病人病情变化是
- A. 心力衰竭
B. 心源性休克
C. 心律失常
D. 心脏破裂
E. 脑供血不全
24. 患者, 男, 28 岁, 8 小时前因暴饮暴食后出现上腹部绞痛, 向肩背部放射, 送到医院急诊, 怀疑为急性胰腺炎, 此时最具诊断意义的实验室检查为
- A. 血清淀粉酶测定
B. 尿淀粉酶测定
C. 血钙测定
D. 血清脂肪酶测定
E. 血糖测定
25. 患者, 男, 30 岁, 因在高温环境下持续工作 12 小时, 出现意识不清入院。患者皮肤湿冷, 血压 90/50mmHg, 脉搏细速, 体温 37.5℃, 心率 170 次/分, 肺 (一)。此时护士首先考虑的护理诊断是
- A. 有感染的危险
B. 清理呼吸道无效
C. 体液不足
D. 知识缺乏
E. 体温过高
26. 能消灭物品上包括芽胞在内一切微生物的方法是
- A. 清洁
B. 消毒
C. 抑菌
D. 抗菌
E. 灭菌
27. 若将体内每日的代谢产物经肾脏排出, 需要的尿量至少为
- A. 100~200 ml
B. 300~400 ml
C. 500~600 ml
D. 800~1000 ml
E. 1000~1500 ml
28. 细胞外液最主要的阳离子是
- A. K^+
B. Na^+
C. Mg^{2+}
D. H^+
E. Ca^{2+}
29. 各型休克的共同特点是
- A. 血压下降
B. 中心静脉压下降
C. 脉压下降
D. 尿量减少
E. 微循环灌流不足
30. 全脊椎麻醉的主要危险是
- A. 低血压
B. 剧烈疼痛
C. 麻醉作用过久
D. 呼吸心跳骤停
E. 损伤脊髓导致截瘫
31. 以下属于治疗性手术的是
- A. 淋巴结活检术
B. 阑尾切除术
C. 食管癌的胃造口术
D. 重睑手术
E. 直肠癌的结肠造口术
32. 随意挤压面部“危险三角区”疖的危险为
- A. 引起眼球后感染
B. 抗生素治疗无效
C. 可并发上颌窦炎
D. 容易形成痈
E. 引起海绵状静脉窦炎
33. 以下不属于开放性损伤的是

- A. 擦伤
B. 挫伤
C. 刺伤
D. 割伤
E. 火器伤
34. 恶性肿瘤的 TNM 分期法中 N 表示
A. 预后情况
B. 淋巴结
C. 恶性程度
D. 原发肿瘤
E. 远处转移
35. 乳腺癌病变发展过程中最常见的转移部位是
A. 肺
B. 肝
C. 腋窝淋巴结
D. 锁骨下淋巴结
E. 胸骨旁淋巴结
36. 腹外疝的发病因素中最重要的是
A. 妊娠
B. 长期便秘
C. 慢性咳嗽
D. 排尿困难
E. 腹壁强度降低
37. 切口疝最主要的发病原因是
A. 营养不良
B. 切口感染
C. 放置引流物时间过长
D. 术后咳嗽、腹胀
E. 切口血肿
38. 继发性腹膜炎最常见的致病菌是
A. 溶血性链球菌
B. 肺炎双球菌
C. 变形杆菌
D. 大肠杆菌
E. 厌氧类杆菌
39. 急性腹膜炎病人发生休克的主要原因是
A. 发热
B. 大量呕吐
C. 剧烈疼痛
D. 血容量减少及毒素吸收
E. 细菌毒力强
40. 溃疡病最重要的发病因素是
A. 胃酸分泌过多
B. 幽门螺杆菌感染
C. 胃粘膜屏障损害
D. 遗传因素
E. 精神神经因素
41. 急性阑尾炎易发生坏死、穿孔的主要原因是
A. 阑尾开口小
B. 阑尾淋巴丰富
C. 阑尾蠕动慢而弱
D. 阑尾动脉为终末动脉
E. 阑尾系膜短
42. 关于肛门周围脓肿的叙述正确的是
A. 肛周疼痛不剧烈
B. 是慢性化脓性感染
C. 可自行破溃, 形成低位肛瘘
D. 在直肠肛管周围脓肿中最少见
E. 多有高热、寒战、全身疲乏不适
43. 门静脉高压症形成后首先出现的病理改变是
A. 腹水
B. 脾肿大
C. 肝肿大
D. 交通支扩张
E. 呕血
44. 急性梗阻性化脓性胆管炎的最常见的梗阻因素是
A. 胆道肿瘤
B. 胆管结石
C. 胆道蛔虫
D. 胆管扭转
E. 胆管狭窄
45. 胰腺癌好发的部位是
A. 胰体、尾部
B. 胰颈、体部
C. 全胰腺
D. 胰头、颈部

- E. 胰尾部
46. 反常呼吸运动常见于
- A. 多根多处肋骨骨折
 - B. 开放性气胸
 - C. 闭合性气胸
 - D. 张力性气胸
 - E. 血胸
47. 男性最常见的泌尿系损伤部位是
- A. 肾
 - B. 输尿管
 - C. 膀胱
 - D. 前尿道
 - E. 后尿道
48. 影响骨折愈合最主要的因素是
- A. 高龄
 - B. 伤口感染
 - C. 粉碎性骨折
 - D. 血液供应不良
 - E. 复位时过度牵引
49. 子宫肌瘤发病可能的相关因素是
- A. 早婚早育, 性生活紊乱
 - B. 高血压, 糖尿病, 肥胖
 - C. 体内雌激素水平过高
 - D. 饮食因素
 - E. 环境因素
50. 原发性闭经是指
- A. 年龄已满 14 岁, 而月经尚未来潮
 - B. 年龄已满 15 岁, 而月经尚未来潮
 - C. 年龄已满 16 岁, 而月经尚未来潮
 - D. 年龄已满 17 岁, 而月经尚未来潮
 - E. 年龄已满 18 岁, 而月经尚未来潮
51. 化疗前需要准确测量病人体重的理由是
- A. 精确计算输入量
 - B. 精确计算药物剂量
 - C. 精确计算病人饮食需要量
 - D. 精确计算补液量
 - E. 确定化疗的疗效
52. 使用短效口服避孕药的妇女开始服第一片药的时间一般为
- A. 月经来潮前第 5 天
 - B. 月经来潮的第 5 天
 - C. 月经来潮的第 10 天
 - D. 月经干净后第 5 天
 - E. 性生活前 8 小时
53. 正常足月妊娠时, 羊水量约为
- A. 350ml
 - B. 500ml
 - C. 1000ml
 - D. 2000ml
 - E. 250ml
54. 临产观察先露下降程度的标志是
- A. 耻骨弓
 - B. 骶尾关节
 - C. 坐骨结节水平
 - D. 坐骨棘水平
 - E. 骶骨岬
55. 某健康妇女, 28 岁, 已婚, 未孕, 其子宫峡部长度正常情况下约为
- A. 0.5cm
 - B. 1.0cm
 - C. 1.5cm
 - D. 2.0cm
 - E. 2.5cm
56. 某妇女, 50 岁, 6 个月前开始月经紊乱, 并且出现潮热潮红, 易于激动, 那么, 她处在其生命中的
- A. 青春期
 - B. 生育期
 - C. 性成熟期
 - D. 更年期
 - E. 老年期
57. 母乳中的乙型乳糖可促进肠道中
- A. 乳酸杆菌的生长
 - B. 变形杆菌的生长
 - C. 大肠杆菌的生长
 - D. 白色念珠菌的生长
 - E. 葡萄球菌的生长
58. 小儿 1 岁时的头围是
- A. 34cm
 - B. 44cm

- C. 46cm
D. 48cm
E. 50cm
59. 初种麻疹疫苗的年龄是
A. 初生
B. 3个月
C. 4~6个月
D. 8个月以上
E. 12个月以上
60. 易合并脓胸、脓气胸的肺炎是
A. 呼吸道合胞病毒肺炎
B. 腺病毒肺炎
C. 金黄色葡萄球菌肺炎
D. 支原体肺炎
E. 霉菌性肺炎
61. 影响心脏形成的关键时期是胚胎的
A. 2周前
B. 4周前
C. 6周前
D. 8周前
E. 12周前
62. 小儿受结核菌感染至 PPD 试验阳性的时间为
A. 2~4周
B. 4~8周
C. 8~10周
D. 10~12周
E. 12~16周
63. ABO 血型不合引起的新生儿溶血症最常见于
A. 母亲为 O 型, 新生儿为 A
B. 母亲为 A 型, 新生儿为 B
C. 母亲为 B 型, 新生儿为 A
D. 母亲为 A 型, 新生儿为 O
E. 母亲为 AB 型, 新生儿为 O
64. 婴儿手足搐搦症主要死亡原因是
A. 无热惊厥
B. 心力衰竭
C. 喉痉挛
D. 呼吸衰竭
E. 手足搐搦
65. 脂肪细胞数目增加最快的年龄段是
A. 胎儿期头 3 个月
B. 胎儿出生前 3 个月及出生后第 1 年
C. 幼儿期
D. 学龄前期
E. 学龄期
66. 小儿肺炎合并心力衰竭是由于
A. 循环充血
B. 心肌水肿
C. DIC
D. 肺动脉高压和中毒性心肌炎
E. 代谢性酸中毒和呼吸性酸中毒
67. 正常小儿, 身高 108cm, 体重 21kg, 身长之中点位于脐与耻骨联合上缘之间, 刚开始出恒牙, 其可能的年龄是
A. 5岁
B. 6岁
C. 7岁
D. 8岁
E. 9岁
- 二、以下提供若干个案例, 每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息, 在每道题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑
(68~70 题共用题干)
- 患者, 女性, 70 岁, 因冠心病间断发生左心衰竭 3 年, 半天来与家人争吵后心悸、气短、不能平卧, 咳粉红色泡沫痰, 急诊入院。体检: BP 90/60mmHg, R 28 次/分, 神清, 坐位, 口唇紫绀, 心率 130 次/分, 律齐, 两肺满布湿啰音及哮鸣音。
68. 急诊护士应给予患者的吸氧方式为
A. 持续低流量给氧
B. 间断低流量给氧
C. 低流量酒精湿化给氧
D. 高流量给氧
E. 高流量酒精湿化给氧

69. 责任护士进行病情观察时, 出现下列哪项与洋地黄疗效有关

- A. 心率增快
- B. 肺内啰音减少
- C. 血压下降
- D. 腹痛、腹泻
- E. 呼吸困难加重

70. 患者来急诊时最主要的护理诊断是

- A. 体温过高
- B. 焦虑
- C. 活动无耐力
- D. 营养失调: 低于机体需要量
- E. 气体交换受损

(71~73 题共用题干)

某健康妇女, 进行查体, 其骨盆型态各径线均等于正常平均值, 则其:

71. 骨盆入口平面前后径值为

- A. 11cm
- B. 12cm
- C. 13cm
- D. 14cm
- E. 15cm

72. 中骨盆平面前后径为

- A. 11cm
- B. 11.5 cm
- C. 12cm
- D. 12.5cm
- E. 13cm

73. 中骨盆平面横径长为

- A. 9cm
- B. 9.5cm
- C. 10cm
- D. 10.5cm
- E. 11cm

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

(74~77 题共用备选答案)

- A. 完全不能动 (无肌肉收缩)
- B. 可见或仅在触摸中感到肌肉轻微收缩, 但不能牵动关节肢体运动
- C. 肢体能够在床上移动, 但不能抬起肢体
- D. 肢体能克服地心引力, 可以抬高, 离开床面, 但不能抗阻力
- E. 肢体稍能抗阻力的运动

74. I 级肌力是指

75. II 级肌力是指

76. III 级肌力是指

77. IV 级肌力是指

(78~79 题共用备选答案)

- A. 代谢性酸中毒
- B. 代谢性碱中毒
- C. 呼吸性酸中毒
- D. 呼吸性碱中毒
- E. 高钾血症

78. 手术后并发肺炎的病人可发生

79. 胰痿病人可发生

(80~81 题共用备选答案)

- A. 中心静脉压低, 血压低
- B. 中心静脉压高; 血压低
- C. 中心静脉压高, 血压正常
- D. 中心静脉压低, 血压正常
- E. 中心静脉压正常, 血压低

80. 提示血容量相对不足

81. 说明血管过度收缩

(82~83 题共用备选答案)

- A. 腹壁浅动脉外侧, 腹股沟韧带上方
- B. 腹壁浅动脉内侧, 腹股沟韧带上方
- C. 陷窝韧带外侧, 腹股沟韧带下方
- D. 腹壁下动脉外侧, 腹股沟韧带上方
- E. 腹壁下动脉内侧, 腹股沟韧带上方

82. 腹股沟斜疝的疝囊颈位于

83. 股疝的疝囊颈位于

(84~85 题共用备选答案)

- A. 声调降低
- B. 声音嘶哑
- C. 饮水呛咳
- D. 手足抽搐
- E. 进行性呼吸困难

84. 甲状旁腺损伤

85. 喉上神经外支损伤

(86~90 题共用备选答案)

- A. 月经期
- B. 增生期
- C. 分泌期
- D. 月经前期
- E. 月经周期

86. 两次月经第一天相间隔的时间为

87. 月经的第 25~28 天, 称为

88. 月经的第 1~4 天, 称为

89. 月经的第 5~14 天, 称为

90. 月经的第 15~24 天, 称为

(91~92 题共用备选答案)

- A. 轻度贫血
- B. 中度贫血
- C. 重度贫血
- D. 极重度贫血
- E. 贫血

91. 血红蛋白 110~90g/L 为

92. 7 个月小儿血红蛋白 <110g/L 为

四、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择所有正确答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

93. 有机磷农药中毒患者接受阿托品治疗时, 可以提示出现阿托品中毒的是

- A. 瞳孔极度放大
- B. 高热、意识模糊、躁动
- C. 肺部啰音减少或消失, 心率 90 次/分

D. 谵妄、抽搐

E. 口干、皮肤干燥

94. 慢性肾炎的临床表现包括

- A. 轻、中度蛋白尿
- B. 高血压
- C. 血尿
- D. 轻、中度水肿
- E. 进行性肾功能损害

95. 典型心绞痛发作的临床表现包括

- A. 发作性胸骨后或心前区疼痛
- B. 休息或含服硝酸甘油后 1~5 分钟内缓解
- C. 疼痛性质为压迫性、紧缩或烧灼感
- D. 心电图出现病理性 Q 波
- E. 常出现心力衰竭

96. 与蛛网膜下腔麻醉相比, 硬膜外麻醉的特点是

- A. 并发症多
- B. 可用于上腹部手术
- C. 可用于长时间的手术
- D. 更容易引起低血压性头痛
- E. 最严重的并发症是全脊椎麻醉

97. 门静脉高压症引起腹水的原因是

- A. 门静脉系的毛细血管床滤过压增加
- B. 血浆白蛋白降低
- C. 肝内淋巴液容量增加, 回流不畅
- D. 醛固酮和抗利尿激素增加
- E. 醛固酮减少

98. 急性胰腺炎发病原因包括

- A. 梗阻因素
- B. 酒精中毒
- C. 暴饮暴食
- D. 外伤
- E. 病毒感染

99. 下肢静脉曲张的并发症有

- A. 血栓性静脉炎
- B. 溃疡形成
- C. 湿疹
- D. 急性出血

- E. 肢端坏疽
100. 儿科护士的角色是
- A. 直接护理者
- B. 患儿的代言人

- C. 患儿与家长的教育者
- D. 康复与预防的指导者
- E. 合作与协调者

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑

1. 前胸壁计数肋骨的重要标志是
 - A. 胸骨上窝
 - B. 胸骨角
 - C. 胸骨柄
 - D. 剑突
 - E. 胸骨下角
2. 下列关于静脉采血的叙述，错误的是
 - A. 应根据采血的目的不同选择不同的时间采血
 - B. 止血带压迫时间过长会影响测定结果
 - C. 建议使用真空采血器
 - D. 需空腹采血时，应尽可能延长空腹的时间
 - E. 不能从输液的血管采血
3. 临床上，通常作为贫血早期疗效观察指标的是
 - A. 红细胞计数
 - B. 血红蛋白定量
 - C. 网织红细胞计数
 - D. 红细胞沉降率
 - E. 红细胞比容
4. 少尿是指 24 小时尿量少于
 - A. 800ml
 - B. 500ml
 - C. 400ml
 - D. 100ml
 - E. 80ml
5. 下列 B 超检查宜在清晨空腹条件下进行的是
 - A. 甲状腺
 - B. 肝脏
 - C. 肾脏
 - D. 前列腺
 - E. 子宫
6. 关于氨茶碱的应用描述不正确的是
 - A. 是支气管扩张剂
 - B. 常用给药途径为肌肉注射
 - C. 静脉注射时应稀释后慢推
 - D. 速度过快可引起头晕、心律失常
 - E. 浓度过高可导致血压下降、心跳骤停
7. 判断结核菌素试验为弱阳性，则皮肤结节的直径为
 - A. 小于 5mm
 - B. 5~9mm
 - C. 10~19mm
 - D. 20mm 及以上
 - E. 不足 20mm 但出现水泡
8. 结核病最主要的传播途径是
 - A. 飞沫
 - B. 尘埃
 - C. 食物和水
 - D. 皮肤接触
 - E. 毛巾或餐具
9. 呼吸衰竭病人最早、最突出的表现是
 - A. 紫绀
 - B. 呼吸困难
 - C. 心率加快
 - D. 血压下降
 - E. 肝、肾功能损害
10. 使用洋地黄类药物的绝对禁忌证是
 - A. 急性心肌梗死发生 24 小时内
 - B. 严重房室传导阻滞
 - C. 肥厚型梗阻型心肌病
 - D. 洋地黄中毒或过量
 - E. 心房颤动或扑动
11. 成人正常窦房结冲动频率是
 - A. 小于 20 次/分
 - B. 40~60 次/分
 - C. 60~100 次/分
 - D. 100~160 次/分
 - E. 180~200 次/分
12. 1999 年世界卫生组织规定的高血压诊断标准是
 - A. 收缩压 $\geq 120\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压 $\geq 70\text{mmHg}$
 - B. 收缩压 $\geq 130\text{mmHg}$ 和 (或) 舒张压

- $\geq 75\text{mmHg}$
- C. 收缩压 $\geq 140\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
- D. 收缩压 $\geq 150\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 90\text{mmHg}$
- E. 收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 100\text{mmHg}$
13. 急性心肌梗死患者血清心肌酶测定中最早升高的是
- A. 门冬氨酸转移酶
- B. 乳酸脱氢酶
- C. 缓激肽酶
- D. 细胞色素氧化酶
- E. 肌酸磷酸激酶
14. 上消化道大量出血是指数小时内失血量超过
- A. 200ml
- B. 400ml
- C. 600ml
- D. 800ml
- E. 1000ml
15. 关于血尿的描述错误的是
- A. 新鲜尿离心沉渣后每高倍镜视野红细胞 >3 个为镜下血尿
- B. 尿沉渣 Addis 计数 12 小时排泄的红细胞数 >50 万为镜下血尿
- C. 尿液外观为洗肉水样、血样或有血凝块时，称为肉眼血尿
- D. 1L 尿含 10ml 血液即呈现肉眼血尿
- E. 血尿发生原因多为肾小球肾炎、肾盂肾炎、结石、肿瘤、结核等
16. 尿沉渣检查中对肾盂肾炎的诊断最有价值的是
- A. 蜡样管型
- B. 红细胞管型
- C. 白细胞管型
- D. 颗粒管型
- E. 透明管型
17. 血小板低于下列哪个值时，临床应警惕颅内出血
- A. $100 \times 10^9/\text{L}$
- B. $80 \times 10^9/\text{L}$
- C. $60 \times 10^9/\text{L}$
- D. $40 \times 10^9/\text{L}$
- E. $20 \times 10^9/\text{L}$
18. 氯磷定治疗有机磷中毒的作用机理为
- A. 促进毒物排泄
- B. 改善毒蕈碱样症状
- C. 抑制腺体分泌
- D. 解除平滑肌痉挛
- E. 恢复胆碱酯酶活性
19. 一只上肢或下肢的运动不能或运动无力，称为
- A. 偏瘫
- B. 局限性瘫痪
- C. 单瘫
- D. 交叉性瘫痪
- E. 僵硬
20. 患者，男性，65 岁，冠心病心绞痛 1 年，心绞痛发作时经休息或含服硝酸甘油可以缓解，平日不犯病时也不可服用的药物为
- A. 消心痛
- B. 倍他乐克
- C. 硝苯地平
- D. 利尿剂如氨苯蝶啶
- E. 阿司匹林、潘生丁
21. 患者，女性，因颜面浮肿 3 天而收治入院，查内生肌酐清除率为 $45\text{ml}/\text{min}$ 。可判断其肾功能为
- A. 正常
- B. 代偿期
- C. 失代偿期
- D. 衰竭期
- E. 尿毒症期
22. 对有机磷农药中毒患者，使用阿托品、解磷定治疗中，患者神志变清醒、呼吸困难减轻、肺部湿啰音减少。约半小时左右，患者突然出现意识模糊、躁动、抽搐，体温高达 39.5°C 。护士应想到可

- 能发生的是
- A. 阿托品量不足, 中毒症状加重
 - B. 脑水肿
 - C. 脑出血
 - D. 解磷定中毒
 - E. 阿托品中毒
23. 某男性病人, 因急性脑出血入院 2 天, 连续睡眠 19 小时, 期间呼之能醒, 可进行简单对话, 过后很快又入睡, 此时病人处于
- A. 浅昏迷状态
 - B. 昏睡状态
 - C. 深昏迷状态
 - D. 嗜睡状态
 - E. 清醒状态
24. 高钾血症病人出现心律失常时, 首先应给予
- A. 5%NaHCO₃ 溶液
 - B. 5%葡萄糖加胰岛素
 - C. 10%葡萄糖酸钙
 - D. 生理盐水
 - E. 透析疗法
25. 在无菌条件下配制的要素饮食冷藏有效期为
- A. 2 小时
 - B. 4 小时
 - C. 8 小时
 - D. 12 小时
 - E. 24 小时
26. 可以用 2.5% 碘酊消毒的是
- A. 会阴部皮肤
 - B. 面部皮肤
 - C. 臀部皮肤
 - D. 婴幼儿皮肤
 - E. 植皮供皮区皮肤
27. 严重高渗性脱水病人首选的补液液体是
- A. 生理盐水
 - B. 平衡盐溶液
 - C. 5%葡萄糖溶液
 - D. 5%NaHCO₃ 溶液
 - E. 5%葡萄糖盐水
28. 休克病人在补充足够液体后, 血压偏低, 中心静脉压正常, 应给予
- A. 强心药
 - B. 利尿剂
 - C. 血管扩张药
 - D. 血管收缩药
 - E. 大量皮质激素
29. 急性肾功能衰竭少尿期病人的饮食要求为
- A. 高蛋白、高糖、多维生素
 - B. 高脂、高糖、高蛋白
 - C. 低蛋白、高脂、低维生素
 - D. 低蛋白、低糖、多维生素
 - E. 低蛋白、高糖、多维生素
30. 麻醉前禁食禁水最主要的目的是
- A. 便于术中操作
 - B. 防止术后便秘
 - C. 防止术后腹胀
 - D. 防止术后尿潴留
 - E. 预防术中、术后呕吐误吸
31. 为了预防蛛网膜下腔麻醉后头痛, 应采取的措施是
- A. 保持环境安静
 - B. 减少术中输液量
 - C. 垫枕平卧 4 小时
 - D. 去枕平卧 6 小时
 - E. 做好麻醉前心理准备
32. 为心跳呼吸骤停的病人行心肺复苏时首先应
- A. 心前区叩击
 - B. 心脏按压
 - C. 口对口人工呼吸
 - D. 开放呼吸道
 - E. 心内注射
33. 成人胸外心脏按压时, 应使胸骨下陷
- A. 1~2cm
 - B. 2~3cm
 - C. 3~4cm
 - D. 5~6cm