

基础与专科 临床护理知识 强化训练

主 编 ● 王国权
范 静

 科学技术文献出版社

基础与专科 临床护理知识强化训练

主 编 王国权 范 静

副主编 宋雁宾 马丽丽

编 委 (按姓氏笔画为序)

马丽丽 王国权 朱 军

仲 慧 安海英 李 莉

宋雁宾 范 静 周染云

郭庆玲 原艳丽 盖绿华

翟红岩

主 审 耿莉华

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北 京

图书在版编目(CIP)数据

基础与专科临床护理知识强化训练/王国权,范静主编.-北京:科学技术文献出版社, 2007.5

ISBN 978-7-5023-5627-9

I. 基… II. ①王… ②范… III. 护理学-习题 IV. R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 036287 号

出 版 者 科学技术文献出版社

地 址 北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

图书编务部电话 (010)51501739

图书发行部电话 (010)51501720,(010)68514035(传真)

邮 购 部 电 话 (010)51501729

网 址 <http://www.stdph.com>

E-mail: stdph@istic.ac.cn

策 划 编 辑 李卫东

责 任 编 辑 陈家显

责 任 校 对 赵文珍

责 任 出 版 王杰馨

发 行 者 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者 北京国马印刷厂

版 (印) 次 2007 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 787×1092 16 开

字 数 318 千

印 张 14

印 数 1~6000 册

定 价 20.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

(京)新登字 130 号

内 容 简 介

本书系长期从事护理管理、临床护理和教学工作,具有丰富经验的专家撰写。全书介绍了基础护理、内科、外科、妇产科、小儿科及五官科护理的基础复习题和强化练习题,共计 2100 道标准化试题,单选题和多选题各占一半。书后还附有参考答案。可供广大护士、医学院校护理专业的师生阅读参考。

科学技术文献出版社是国家科学技术部系统唯一一家中央级综合性科技出版机构,我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干。

向您推荐我社部分
优秀畅销书

.....

现代护理培训教程

最新基础护理技术	8.50
腰椎间盘突出症患者的家庭养护	18.00
新编护理技术考评指南	19.00
脂肪肝患者的家庭养护	16.00
最新特殊护理技术操作流程	8.50
产后养护	15.00
家庭护理技术指南	12.00
痛风患者的家庭养护	15.00
心理护理临床问答	18.00
骨科临床实用护理	20.00
老年人照护	26.00

注:邮费按书款总价另加 20%

前 言

随着卫生事业的不断发展,护理力量的需求量不断增加,加之护理队伍流动性比较大,需要不断地补充新生力量。为了使这些新生的护理力量在较短时间内掌握临床所需的专业知识,我们依照基础护理和专科护理教材(包括基础护理、内科、外科、妇产科、小儿科及五官科护理共6个部分),根据临床实际工作需要,提炼出基础复习题和强化练习题(全书每道题都附有标准答案)。

本书包含基础护理和专科护理共2100道标准化试题,单选题和多选题各占一半。基础复习题的1050题中,其中内科和外科分别是250题和200题,基础护理、妇产、小儿和五官科各包含150题;强化练习题紧附在基础复习题之后,共有21套试题,对应性比较强,其数量和基础复习题一致。内科和外科护理分别有5套和4套试题,基础护理、妇产科、小儿科及五官科护理均有3套试题,每套试题分别有25道单选题和多选题,每套题都考虑到本教材的知识覆盖面,而且没有重复性。因强化练习题是以套题方式编写,每题2分,当你做完每套题后,参照标准答案即可得知自己对本专科知识所掌握的程度。

本书的使用方法是:第一步要仔细阅读教材;第二步是依照基础复习题逐一进行练习,练习的方法是每题都要对照教材找出答案,最后用标准答案进行验证,切不可走捷径,即直接跨入第二步,对照标准答案进行练习;第三步是强化练习,即做所对应的强化练习题,每套练习题做完后即可对照标准答案判定分数,根据所得分数得出对本专科知识

所掌握的程度。当所测得分数不够理想时,如 60 分以下,建议再重新进行第一步和第二步,然后再做第二套强化试题进行检验,这样根据每套教材的套题数量,反复进行。当经过前两步复习之后,一进入第三步强化练习,成绩就能在 80 分以上者,即可连续进行强化练习,一直做完所属的每套试题,以保证牢固地掌握本专科知识。

本书是为解放军 307 医院“新军事变革下军事反恐护理体系研究”课题而编写,其初衷是尽快培养合格的临床护士。此教材已通过对该院和兄弟医院两届共 400 多名临床实习生的强化练习试验,一致反映按照以上使用方法,做完这本基础复习和强化练习后,不但帮助自己掌握了基础与临床护理知识要点,而且提高了临床病情观察和处理能力,减轻了注册复习的压力,提高了护士注册率。可以说,本书弥补了我国护理教育模式的不足,即:“坐在课堂集中学理论,学完理论再实践”而导致的高分低能的现象,为课本知识与临床需要架起了桥梁。

本书适合护理专业在校学生参考学习,是护理实习生强化提高临床理论的教材;是护士注册辅助练习的助手;是临床护士综合能力全面提高的指南;是临床护理带教的教学参考书。

本书的作者们长期从事护理管理、临床护理和临床教学工作,具有丰富的临床护理和教学经验,所以提炼出的基础复习题和强化练习题具有很强的实用性。

编 者

目 录

护理学基础单选复习题	(1)
护理学基础多选复习题	(8)
护理学基础第一套试题	(15)
护理学基础第二套试题	(20)
护理学基础第三套试题	(25)
内科护理学单选复习题	(30)
内科护理学多选复习题	(41)
内科护理学第一套试题	(52)
内科护理学第二套试题	(57)
内科护理学第三套试题	(62)
内科护理学第四套试题	(67)
内科护理学第五套试题	(72)
外科护理学单选复习题	(78)
外科护理学多选复习题	(88)
外科护理学第一套试题	(98)
外科护理学第二套试题	(103)
外科护理学第三套试题	(108)
外科护理学第四套试题	(113)
妇产科护理学单选复习题	(118)
妇产科护理学多选复习题	(125)
妇产科护理学第一套试题	(131)

妇产科护理学第二套试题	(136)
妇产科护理学第三套试题	(141)
儿科护理学单选复习题	(146)
儿科护理学多选复习题	(153)
儿科护理学第一套试题	(160)
儿科护理学第二套试题	(165)
儿科护理学第三套试题	(170)
五官科护理学单选复习题	(175)
五官科护理学多选复习题	(182)
五官科护理学第一套试题	(189)
五官科护理学第二套试题	(194)
五官科护理学第三套试题	(199)
参考文献	(204)

护理学基础单选复习题

1. 易培养“我的患者”，“我的护士”的概念的护理工作方式是()
 - A. 个案护理
 - B. 功能制护理
 - C. 小组制护理
 - D. 责任制护理
 - E. 系统化整体护理
2. 传染科属于医院组织结构中的哪个部门()
 - A. 门诊部
 - B. 行政部
 - C. 医疗科室
 - D. 医技科室
3. 患者角色适应中的一种变态现象是()
 - A. 角色行为缺如
 - B. 角色行为冲突
 - C. 角色行为强化
 - D. 角色行为消退
4. 对患者治疗检查前,要充分解释是属于尊重患者的哪项权利()
 - A. 隐私保密的权利
 - B. 知情,同意权利
 - C. 自由选择权利
 - D. 享受平等医疗权利
 - E. 监督医护权益实现的权利
5. 对于股骨骨折术后第三天的患者,一般采取的最佳护患关系模式为()
 - A. 主动-被动模式
 - B. 指导-合作模式
 - C. 共同参与模式
 - D. 以上模式均可
6. 护理属于以下哪个系统()
 - A. 护理是一个开放系统
 - B. 护理是一个封闭系统
 - C. 护理是一个静态系统
 - D. 护理是一个人造系统
7. 与护理工作无关的压力源是()
 - A. 护理技术不熟练
 - B. 病情变化没有及时处理
 - C. 护患之间不信任
 - D. 护理过程中与家属合作
8. 关于系统的基本属性错误的是()
 - A. 系统的功能等于各要素功能的总和
 - B. 系统的各要素之间既相互独立,又相互联系,相互制约
 - C. 系统是随时间的变化而变化的
 - D. 系统有明确的目的
 - E. 系统的层次间存在着支配与服从的关系
9. 需要的特征,错误的是()
 - A. 对象性
 - B. 发展性
 - C. 有限性
 - D. 社会历史制约性
 - E. 独特性
10. 需要层次理论是由谁提出来的()
 - A. 贝塔朗菲

- B. 马斯洛
C. 塞里
D. 南丁格尔
E. 海尔
11. 不良的医院环境特征是()
A. 安全性
B. 独特性
C. 舒适性
D. 整洁性
E. 安静性
12. 病室湿度一般以多少为宜()
A. 10%~20%
B. 30%~40%
C. 50%~60%
D. 70%~80%
E. 90%~100%
13. 下列不符合护理目标陈述要求的是()
A. 护理活动的结果
B. 护理活动本身
C. 与医疗工作相协调
D. 必须具体
E. 必须切实可行
14. 不属于护理基本任务的是()
A. 促进健康
B. 预防疾病
C. 治疗疾病
D. 协助康复
E. 减轻病痛
15. 病室的温度应为()
A. 16~18℃
B. 18~22℃
C. 20~24℃
D. 18~20℃
16. 以下哪项不属于铺麻醉床的目的()
A. 便于麻醉手术后的护理
B. 保护被褥不被血液或呕吐物污染
C. 使患者安全、舒适
D. 保持病室清洁美观
17. 昏迷患者一般采取哪种卧位()
A. 主动卧位
B. 被动卧位
C. 被迫卧位
D. 以上均可
18. 产妇分娩时,采取的卧位是()
A. 膝胸卧位
B. 截石位
C. 头高足低位
D. 半坐卧位
E. 中凹卧位
19. 摩擦力的概念性错误为()
A. 摩擦力的方向与物体相对运动的方向一致
B. 摩擦力的方向与物体相对运动的方向相反
C. 摩擦力的大小取决于正压力的大小
D. 摩擦力的大小取决于摩擦系数的大小
E. 摩擦力的大小取决于接触面积的大小
20. 以下哪项属于生理舒适()
A. 自尊得到满足
B. 身体上感到舒适
C. 信仰得到满足
D. 心情感到愉悦
21. 口腔真菌感染时,口腔护理选用的漱口溶液是()
A. 生理盐水
B. 1%~3%过氧化氢溶液
C. 1%~4%的碳酸氢钠溶液
D. 呋喃西林溶液
E. 0.08%甲硝唑溶液
22. 皮肤为紫红色,压之不褪色,局部红肿变硬,则判断为压疮的哪一期()
A. 瘀血红润期

- B. 炎性浸润期
C. 浅度溃疡期
D. 坏死溃疡期
23. 不可用于压力蒸汽灭菌效果的监测是()
A. 用 100 °C 的留点温度计
B. 用 150 °C 的留点温度计
C. 化学指示胶带
D. 化学指示卡
E. 非致病性嗜热脂肪杆菌芽孢作为指示剂
24. 压力蒸汽灭菌时灭菌包的大小应为()
A. 40 cm×30 cm×25 cm
B. 30 cm×30 cm×25 cm
C. 30 cm×40 cm×20 cm
D. 30 cm×30 cm×35 cm
25. 紫外线灯消毒, 不正确的做法是()
A. 保持灯管清洁
B. 适宜温度为 20~40 °C, 相对湿度是 40%~60%
C. 关灯后, 可立即再启动
D. 定期检测灯管照射强度, 不合格时要及时更换
E. 定期进行空气培养
26. 下列操作违反无菌技术原则的是()
A. 操作前半小时, 停止扫地、更换床单等
B. 操作者身体与无菌区保持一定距离
C. 不可跨越无菌区
D. 取出的无菌物品未用可放回无菌容器中
E. 一套无菌物品只供一位患者使用
27. 无菌物品有效期错误的概念是()

- A. 无菌包的有效期为 1~2 周
B. 打开的无菌包所剩物品 24h 内可再使用
C. 铺好的无菌盘 12h 内可使用
D. 已开启的溶液瓶内的溶液 24h 内可使用
28. 错误的隔离技术操作是()
A. 接触严密隔离患者后, 应立即更换口罩
B. 取避污纸时, 从页面抓取
C. 离开污染区前, 将帽子、口罩放入特定的污物袋内
D. 流水洗手时, 腕部要高于肘部
E. 刷手时, 不能弄湿隔离衣, 隔离衣也不能污染水池
29. 不正确的肠道隔离措施是()
A. 不同病种最好分室居住
B. 护理同病种的患者须分别穿隔离衣
C. 病室内应有防蝇设备
D. 食具、便盆各自专用
30. 当环境温度高于人体皮肤时, 主要的散热形式是()
A. 辐射
B. 传导
C. 对流
D. 蒸发
31. 某患者口表量体温 38.8 °C, 则属于()
A. 正常体温
B. 低热
C. 中度热
D. 高热
E. 超高热
32. 高热持续在 42 °C 以上, 多长时间内常可导致严重并发症()
A. 0.5~1 min
B. 1~2 min

- C. 2~3 h
D. 2~4 h
33. 疟疾患者的热型一般为()
A. 稽留热
B. 弛张热
C. 间歇热
D. 不规则热
34. 中度体温过低的度数为()
A. 32~35 °C
B. 30~32 °C
C. 30 °C
D. 28 °C
35. 65 岁以上的老年人, 平均脉率每分钟为()
A. 60 次
B. 65 次
C. 70 次
D. 75 次
36. 心包填塞时, 易出现异常脉搏的是()
A. 洪脉
B. 交替脉
C. 奇脉
D. 细脉
E. 间歇脉
37. 某成年人血压值为 150/85 mmHg, 那么他属于()
A. 正常血压
B. 1 级高血压
C. 2 级高血压
D. 3 级高血压
E. 单纯收缩期高血压
38. 不属于测血压“四定”内容的是()
A. 定部位
B. 定操作者
C. 定时间
D. 定血压计
E. 定体位
39. Kussmaul 呼吸表现为()
A. 深大呼吸
B. 呼吸过速
C. 浅快呼吸
D. 潮式呼吸
E. 点头呼吸
40. 吸氧流量为 1L/ min, 吸氧浓度为()
A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%
E. 40%
41. 高浓度氧疗的吸氧浓度为()
A. 40%
B. 45%
C. 50%
D. 65%
42. 长时间吸氧时, 为预防氧中毒, 吸氧浓度应低于()
A. 25%
B. 28%
C. 32%
D. 30%
43. 为预防氧中毒, 一般采取的吸氧最大安全浓度是()
A. 28%
B. 40%
C. 50%
D. 80%
E. 100%
44. 雾化吸入错误的操作方法是()
A. 水槽内倒入生理盐水
B. 水槽内水温超过 50 °C 时应更换用水
C. 打开电源开关先预热 3~5 min

- D. 连续使用时,中间需间隔 30 min
- E. 水槽中的水应浸没透声膜
45. 一般成年人鼻饲时,胃管插入的长度为()
- A. 25~35 cm
- B. 30~40 cm
- C. 35~45 cm
- D. 45~55 cm
- E. 55~65 cm
46. 鼻饲患者,每次鼻饲量不应超过()
- A. 200 mL
- B. 250 mL
- C. 300 mL
- D. 400 mL
47. 判断成年人排便异常应为()
- A. 每天超过 2 次,或每周少于 2 次
- B. 每天超过 3 次,或每周少于 3 次
- C. 每天超过 1 次,或每周少于 1 次
- D. 每天没有大便或每周少于 5 次
48. 降温灌肠时,液体要保留的时间为()
- A. 可以立即排便
- B. 保留 5~10 min
- C. 不超过 20 min
- D. 保留 30 min
- E. 保留 1h
49. 常用的“1、2、3”灌肠液指的是()
- A. 50%硫酸镁 30 mL,甘油 60 mL,温开水 90 mL
- B. 甘油 30 mL,50%硫酸镁 60 mL,温开水 90 mL
- C. 温开水 30 mL,甘油 60 mL,50%硫酸镁 90 mL
- D. 甘油 30 mL,温开水 60 mL,50%硫酸镁 90 mL
- E. 50%硫酸镁 30 mL,温开水 60 mL,甘油 90 mL
50. 膀胱贮存多少尿液,就会产生尿意()
- A. 200~250 mL
- B. 250~300 mL
- C. 300~500 mL
- D. 600~700 mL
51. 成年人在正常情况下,尿比重波动的范围是()
- A. 1.020~1.030 之间
- B. 1.015~1.025 之间
- C. 1.150~1.250 之间
- D. 1.010~1.015 之间
52. 男性导尿时,应将阴茎提起,使之与腹壁形成的角度为()
- A. 40°
- B. 50°
- C. 55°
- D. 60°
53. “每日一次”的外文缩写是()
- A. qd
- B. bid
- C. tid
- D. pro
- E. sos
54. 某患者需要输液体 2000 mL,计划 10h 输完,所用输液器的滴系数为 15,每分钟滴数应为()
- A. 40 滴
- B. 50 滴
- C. 60 滴
- D. 70 滴
- E. 80 滴
55. 输液中如发生空气栓塞,应立即采取的卧位是()
- A. 头高足低左侧卧位

- B. 头高足低右侧卧位
C. 头低足高左侧卧位
D. 头低足高右侧卧位
56. 发生急性肺水肿时,在湿化瓶中加入乙醇的作用是()
A. 增加湿化效果
B. 降低肺泡表面张力
C. 增加肺泡表面张力
D. 降低肺泡内泡沫表面张力
57. 适合自体输血的是()
A. 异位妊娠破裂出血者
B. 有脓毒血症者
C. 凝血因子缺乏者
D. 腹腔开放损伤 4h 以上者
E. 血液可能受癌细胞污染者
58. 青霉素血清型反应,一般发生在()
A. 用药后 2~3 d
B. 用药后 3~4 d
C. 用药后 4~6 d
D. 用药后 7~12 d
59. 以下药物过敏试验液的剂量,错误的剂量为()
A. 青霉素皮试每次 20~50 U
B. 链霉素皮试每次 250 U
C. 破伤风皮试每次 20 IU
D. 碘过敏试验静脉注射每次 30% 泛影葡胺 1 mL
E. 碘过敏试验皮内注射法每次注射造影剂 0.1 mL
60. 用冷、热疗法适当的时间为()
A. 10~20 min
B. 20~30 min
C. 1 h 左右
D. 2h
E. 任何时间间隔均可
61. 适合热疗的病症是()
A. 未明确诊断的急腹症
B. 面部危险三角区感染
C. 牙痛
D. 局部扭伤 48h 后
E. 脏器出血
62. 不属于急救物品“五定”制度内容的是()
A. 定数量品种
B. 定点安置
C. 定时清点
D. 定人保管
E. 定期检查维修
63. 不是心肺复苏有效指征的是()
A. 恢复心跳和呼吸
B. 大动脉可触及搏动
C. 面色、口唇、甲床色泽转为红润
D. 瞳孔散大
E. 意识恢复
64. 单人心肺复苏时,人工呼吸与胸外心脏按压比例为()
A. 1 : 5
B. 2 : 15
C. 15 : 2
D. 5 : 1
E. 2 : 5
65. 正常瞳孔的平均范围为()
A. 1~2 mm
B. 2~3 mm
C. 3~4 mm
D. 4~5 mm
66. 成年人口对口人工呼吸频率一般为()
A. 14~16 次/ min
B. 16~18 次/ min
C. 18~20 次/ min
D. 20~22 次/ min
67. 心肺复苏的三个步骤顺序为()

- A. 胸外按压、人工呼吸、开放气道
- B. 人工呼吸、胸外按压、开放气道
- C. 开放气道、人工呼吸、胸外按压
- D. 开放气道、胸外按压、人工呼吸

68. 发现患者脑死亡后,应反复观察多长时间即可作出诊断()

- A. 4h
- B. 8h
- C. 12h
- D. 24h

69. DDT 中毒不能选用的洗胃溶液的是()

- A. 温开水
- B. 生理盐水
- C. 50%硫酸镁导泻
- D. 油性泻剂

70. 不正确的洗胃操作的是()

A. 口服催吐法时,1 次饮液量约为 400~500 mL

B. 电动吸引器洗胃法时,先灌入洗胃液 300~500 mL,然后开动吸引器吸出

C. 每次灌入量与吸出量基本相等

D. 洗胃液呈血性时,应停止洗胃,采取相应急救措施

71. 个体死亡后,最先发生的尸体现象是()

- A. 尸冷
- B. 尸僵

C. 尸斑

D. 尸体腐败

72. 根据罗斯博士的理论,某一接近死亡的患者产生“为什么是我,这不公平”的心理,那么该患者处于哪个反应阶段()

- A. 否认期
- B. 愤怒期
- C. 协议期
- D. 忧郁期
- E. 接收期

73. 临时医嘱的有效时间为()

- A. 4h
- B. 6h
- C. 12h
- D. 24h
- E. 48h

74. 临时备用医嘱在多长时间有效()

- A. 4h
- B. 6h
- C. 12h
- D. 24h
- E. 48h

75. $1^I/E$ 表示()

- A. 灌肠后排便 1 次
- B. 每日排便 1 次
- C. 灌肠后排便 2 次
- D. 自行排便 1 次,灌肠后又排便 1 次

护理学基础多选复习题

1. 现代护理学的四个最基本的概念是()
 - A. 人
 - B. 环境
 - C. 疾病
 - D. 健康
 - E. 护理
2. 医院的基本功能有()
 - A. 医疗
 - B. 教学
 - C. 科学研究
 - D. 预防和社区卫生服务
3. 抢救物品的准备要求是()
 - A. 要备好各种抢救物品和抢救设备
 - B. 抢救物品要做到“五定”
 - C. 要熟悉所有抢救物品的性能和使用方法
 - D. 急救物品完好率要达到 98% 以上
4. 现代护士的角色与功能有()
 - A. 患者代言人
 - B. 宗教形象
 - C. 护理研究者
 - D. 健康咨询者
 - E. 健康协调者
5. 按系统与环境的关系进行分类, 系统可分为()
 - A. 开放系统
 - B. 动态系统
 - C. 封闭系统
 - D. 静态系统
 - E. 生态系统
6. 根据马斯洛需要层次理论, 下列各项属于心理需要的有()
 - A. 安全需要
 - B. 尊重需要
 - C. 爱和归属需要
 - D. 满足个人独特潜能的需要
7. 倾听的技巧包括()
 - A. 适当的距离, 一般保持 0.5~1m
 - B. 避免与患者有目光交流
 - C. 避免不时地看表
 - D. 给对方及时地反馈和适当的鼓励
 - E. 核对自己的理解以获得反馈
8. 机体对压力反应的一般规律是()
 - A. 多种压力源可以引起一种压力反应
 - B. 大多数人能设法避免一般性压力源
 - C. 缺少压力源是有益的
 - D. 对极端的压力源和灾难性事件, 大部分人都会以类似的方式反应
9. 自力救助对抗压力源需要()
 - A. 正确对待问题
 - B. 正确对待情感
 - C. 利用可能得到的支援
 - D. 减少压力的生理诱因
10. 护理程序应包括的内容是()
 - A. 评估
 - B. 诊断
 - C. 计划
 - D. 实施和评价