Atlas und Praktikum der Dermatologie und Venerologie

Von Professor Dr. med. W. BURCKHARDT

Leiter der Städt. Poliklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Zürich

Zweite, verbesserte Auflage

Mit 65 einfarbigen und 99 mehrfarbigen Abbildungen

Verlag von Urban & Schwarzenberg · München und Berlin · 1958

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks, der photomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, behalten sich Urheber und Verleger vor. Es ist insbesondere nicht gestattet, ohne Genehmigung des Verlages das Buch oder Teile daraus auf photomechanischem Wege (Photokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen.

© Urban & Schwarzenberg, München-Berlin 1958. Printed in Switzerland.
Druck von Zollikofer & Co. AG, Buchdruckerei, St.Gallen (Schweiz).

W. BURCKHARDT · Atlas und Praktikum der Dermatologie und Venerologie

Vorwort zur ersten Auflage

Der Atlas der Dermatologie und Venerologie mit kurzem Textteil soll dem praktischen Arzt eine Hilfe bei der Diagnose und der Behandlung der Haut- und Geschlechtskrankheiten sein und den Spezialärzten anderer Fachgebiete, mit Einschluß des Zahnarztes, eine kurze Orientierung über unser Fachgebiet ermöglichen, dem Studenten aber den nötigen Lehrstoff vermitteln.

Meine Erfahrungen beim Unterrichten von Studenten und bei Fortbildungskursen für Allgemeinpraktiker haben mich gelehrt, daß voluminöse Lehrbücher über Spezialgebiete, die ein umfassendes Material bieten, relativ wenig benutzt werden, da bei den großen zeitlichen Ansprüchen, die Studium und Praxis stellen, Student und Arzt zu einer Ökonomie der Kräfte gezwungen sind.

Bei der Kürze der Darstellung sind nur die in der Praxis wichtigen Krankheiten dargestellt, auf seltene Affektionen wird kurz hingewiesen. Das Literaturverzeichnis am Ende des Buches soll denjenigen, die sich für ein Gebiet speziell interessieren, das eingehende Studium erleichtern. Die Neuherausgabe eines Buches ermöglicht es, bei der Behandlung, insbesondere der Geschlechtskrankheiten, nur diejenige Therapie aufzuführen, die heute gebraucht wird, und auf eine Schilderung der verlassenen Methoden zu verzichten. Bei der Einteilung der Krankheiten in einzelne Kapitel habe ich versucht, möglichst viele Krankheitsbilder nach Ätiologie und Pathogenese zu gruppieren. Die Gruppen allergische Krankheiten und Krankheiten wahrscheinlich infektiöser Natur mit noch unbekanntem Erreger sind teilweise hypothetisch. Sie entsprechen mehr einer Arbeitshypothese als wohlbegründeten Tatsachen. Die Zukunft wird zeigen, wieweit diese Einteilungen berechtigt waren.

Ein kurzes Lehrbuch hat immer eine persönliche Note, da auf die Darstellung anderer Auffassungen verzichtet werden muß. Meinen verehrten Lehrern BRUNO BLOCH und GUIDO MIESCHER verdanke ich meine wissenschaftliche Ausbildung. Ihre grundlegenden Arbeiten waren mir wegleitend.

Die Bilder stammen aus der von mir verfaßten Folia Dermatologica, die von J. R. Geigy AG, Basel, herausgegeben wurde. Sie wurden mir von dieser Firma in großzügiger Weise zur Verfügung gestellt.

Die Farbenphotographien wurden von Herrn Hans Hinz, Basel, ausgeführt. Die Schwarz-Weiß-Photos von Herrn Hermann Faden, die Zeichnungen von Abbildung 1–13 von Frau L. Lotz. Die Mikrophotographien von Herrn Kläui aus der Miescher'schen Klinik. Dr. Bigliardi half mir bei den Korrekturen, meine Frau leistete die Schreibearbeit. Ihnen allen danke ich für die Mitarbeit herzlich. Alle Patientenaufnahmen, mit Ausnahme von Abb. 132 und 157, die mir in freundlicher Weise von G. Miescher zur Verfügung gestellt wurden, stammen aus dem Krankengut der städtischen Poliklinik für Haut- und Geschlechtskrankheiten in Zürich.

W. BURCKHARDT

Vorwort zur zweiten Auflage

Die gute Aufnahme, die mein «Atlas und Praktikum der Dermatologie und Venereologie» gefunden hat, machte es nötig, daß schon knapp nach zwei Jahren eine Neuauflage erscheint.

Eine Erweiterung des Textes und des Bildmaterials wurde absichtlich nicht vorgenommen, um dem Buch den Charakter eines kurzgefaßten Hilfsmittels für Diagnose und Behandlung nicht zu nehmen, und auch, um eine Preiserhöhung zu vermeiden. Es wurden lediglich einige therapeutische Neuerungen, wie die Weiterentwicklung der Cortison-Therapie und die Behandlung mit Antibiotica, sowie einige kleinere Textkorrekturen und Ergänzungen vorgenommen. Die Wertschätzung, die das Buch auch in fremdsprachigen Gebieten gefunden hat, kommt darin zum Ausdruck, daß der Verlag Williams & Wilkins Co., Baltimore, eine von St. Epstein durchgeführte englische Übersetzung herausbringen wird, und der Verlag Alfa Graziano, Buenos Aires, eine spanische Ausgabe, übersetzt von I. R. Hörler, vorbereitet.

Zürich-Bächau, Herbst 1957

W. BURCKHARDT

Inhaltsverzeichnis

Anatomie der Haut	1	2. Urticaria	131
Effloreszenzenlehre	3	3. Purpura	137
I. Infektionskrankheiten der Haut	10	4. Arzneimittelexantheme	138
1. Tuberkulose der Haut	12	5. Pruritus	140
2. Lepra (Aussatz)	24	6. Prurigo	142
3. Cutane Leishmaniose (Orient- beule)	24	7. Erythrodermien	144
4. Mykosen	25	IV. Erkrankungen der Haut durch ein- fache chemische und physikalische Einflüsse	146
5. Pyodermien (Impetigo, Ekthyma, Folliculitis, Furunkel, Karbunkel)	44	1. Hautveränderungen durch Laugen, Säuren und technische Lösungs- mittel	146
6. Intertrigo	52	2. Hautveränderungen durch mechanische Einflüsse	147
7. Erysipel	52	3. Hautveränderungen durch Röntgenstrahlen	149
8. Erysipeloid	53	4. Erkrankungen der Haut durch Lichtstrahlen	149
9. Granuloma teleangiectaticum pyogenicum	53	V. Erbkrankheiten der Haut	156
10. Weitere bazilläre Erkrankungen der Haut	53	1. Epidermolysis bullosa hereditaria	156
11. Hauterkrankungen durch tierische Parasiten	54	2. Ichthyosis vulgaris und andere Verhornungsanomalien	156
Erkrankungen der Haut durch Milben	54	3. Recklinghausensche Krankheit	158
Erkrankungen der Haut durch Insekten	58	4. Adenoma sebaceum	163
Hauterkrankungen durch Würmer	59	VI. Stoffwechselstörungen der Haut	164
12. Viruskrankheiten der Haut	60	1. Xanthome der Haut	164
(Herpes simplex, Herpes zoster, Warzen, Spitze Kondylome)		2. Hautveränderungen bei Diabetes mellitus	164
II. Entzündliche Krankheiten, wahr- scheinlich infektiöser Natur, mit noch unbekanntem Erreger	75	3. Porphyrie	164
1. Pemphigusgruppe	75	4. Pellagra	165
2. Erythema exsudativum multi- forme	77	5. Amyloid der Haut	165
3. Erythema nodosum	79	VII. Zirkulationsstörungen und Gefäßerkrankungen der Haut	166
4. Erythematodes	79	1. Erkrankungen, welche vorwiegend die Arterien betreffen	166
5. Lichen ruber planus	85	2. Erkrankungen, die vorwiegend die Venen betreffen	169
6. Psoriasis (Schuppenflechte)	86	3. Erkrankungen der Lymphgefäße	171
7. Pityriasis rosea	95	VIII. Gutartige Tumoren	177
8. Verschiedene Granulomatosen	95	1. Naevi oder Muttermaler	177
9. Sklerodermien und Atrophien	99		
III. Die allergischen Hautkrankheiten	102		
1. Ekzemgruppe	105		

2. Fibrome	17	Extragenitale Komplikationen der Gonorrhoe	242
3. Andere gutartige Tumoren	179	Therapie der Gonorrhoe	243
IX. Präcancerosen der Haut	180	3. Ulcus molle (Weicher Schanker)	244
1. Senile Hyperkeratose	180	4. Lymphogranuloma inguinale	244
2. Morbus Bowen	180	5. Granuloma venereum	245
3. Morbus Paget	183	XV. Weitere Erkrankungen der Ge- schlechtsorgane	246
4. Melanotische Präcancerose	183	1. Nichtgonorrhöische Urethritis des Mannes	246
X. Bösartige Geschwülste der Haut	184	2. Balanitis (Eicheltripper)	246
1. Carcinome der Haut	184	3. Phimose	247
2. Melanom	186	4. Paraphimose	247
3. Sarkom	195	5. Induratio penis plastica	247
4. Hautmetastasen	195	6. Ulcus vulvae acutum	248
5. Leukämie der Haut	195	XVI. Technik einiger in der Dermato- logie gebrauchter Testmethoden	249
6. Sarcoma idiopathicum hämor- rhagicum Kaposi	195	1. Lappchenprobe (Ekzemp- probe)	249
XI. Erkrankungen der Anhangsgebilde der Haut	196	2. Sofortreaktion durch Kratztest oder Intracutaninjektion	249
1. Erkrankungen der Talgdrüsen	196	3. Tuberkulinreaktion	250
2. Erkrankungen der Haare und der Nägel	203	4. Trichophytin- und Epidermophy- tinreaktionen	250
3. Erkrankungen der Schweißdrüsen	207	5. Prüfung der Alkalinisation und Alkaliresistenz	250
XII. Pigmentveränderungen der Haut	208	6. Die Prüfung der spontanen Wie- dererwärmung der Haut nach einem kalten Teilbad	251
XIII. Erkrankungen an den Lippen und auf der Mundschleimhaut	213	7. Der Thrombocytensturztest	252
1. Veränderungen der Mundschleim- haut, die in das Gebiet der noch nicht krankhaften Varianten der normalen Anatomie gehören	213	XVII. Tabelle häufiger Ekzemnoxen mit Angabe über die bei den Ekzem- proben anzuwendenden Konzentra- tionen	253
2. Stomatitiden	213	Medikamentöse Ekzemnoxen	253
3. Cheilitis	214	Gewerbliche Ekzemnoxen	254
4. Leukoplakie	214	Kleider und Kosmetika als Ekzemnoxen	255
5. Mundschleimhautveränderungen bei Erkrankungen der Haut	215	Pflanzen als Ekzemnoxen	255
XIV. Geschlechtskrankheiten	216	Literatur	256
Allgemeines	216	Stichwortregister	261
1. Syphilis	221		
2. Gonorrhoe (Tripper)	238		
Gonorrhoe des Mannes	240		
Gonorrhoe der Frau	241		

Verzeichnis der Abbildungen

Anatomie der Haut

- 1 Mikroskopisches Bild der Epidermis 1
- 2 Mikroskopisches Bild der Epidermis mit ihren Anhangsgebilden und der Cutis 2

Effloreszenzenlehre

(Schematische mikroskopische Bilder)

- 3 Rote Macula 5
- 4 Braune Macula 5
- 5 Cutane Papel 5
- 6 Epidermale Papel 5
- 7 Gemischte Papel 5
- 8 Ekzemknötchen 5
- 9 Subcorneale Pusteln 7
- 10 Subepitheliale Blase 7
- 11 Intraepitheliale Blase 7
- 12 Erosion 7
- 13 Ulcus 7

Tuberkulose der Haut

- 14 Lupus vulgaris im Gesicht 14
- 15 Lupus vulgaris am Stamm 17
- 16 Tuberculosis verrucosa cutis 17
- 17 Papulonekrotisches Tuberkulid an den Beinen 18
- 18 Papulonekrotisches Tuberkulid an den Armen 19
- 19 Erythema induratum Bazin 20
- 20 Boecksches Sarkoid 22

Mykosen

- 21 Mikroskopisches Bild von Mycelfäden in einer Hautschuppe bei Epidermophytie 25
- 22 Fußmykose an der Fußsohle 27
- 23 Fußmykose an der seitlichen Fußpartie 28
- 24 Handmykose 28
- 25 Epidermophytid an der Hand 29
- 26 Ekzema marginatum in der Inguinalgegend 30
- 27 Ekzema marginatum (Gluteal-Sacralgegend) 31

- 28 Trichophytie der unbehaarten Haut (Herpes iris) an den Beinen 32
- 29 Trichophytie der unbehaarten Haut an den Armen 32
- 30 Trichophytie der unbehaarten Haut am Stamm 37
- 31 Phlegmatische Trichophytie im Nacken (Kerion Celsi) 38
- 32 Trichophytie der Bartgegend (Sykosis trichophytica) 39
- 33 Mikrosporie 40
- 34 Pityriasis versicolor 41
- 35 Pityriasis versicolor alba 42

Pyodermien

- 36 Impetigo contagiosa 47
- 37 Ekthyma 47
- 38 Nackenfurunkel 48
- 39 Karbunkel am Kinn 48
- 40 Furunkulose 49
- 41 Hidrosadenitis axillaris 49
- 42 Intertrigo (Pseudosyphilide posterosive) 50

Hauterkrankungen durch tierische

Parasiten

- 43 Mikroskopisches Bild eines Milbenganges bei Scabies 55
- 44 Scabies am Fuß 55
- 45 Scabies an Stamm und Extremitäten 55
- 46a Pediculus vestimenti mit Ei 56
- 46b Pediculus capitis mit Nisse 56
- 46c Pediculus pubis 56
- 47 Cutis vagantium 61
- 48 Pediculosis vestimenti 62
- 49 Pediculosis pubis 63
- 50 Mikroskopisches Bild einer Hauteffloreszenz bei Cercariendermatitis 64

Viruskrankheiten der Haut

- 51 Herpes simplex labialis 65
- 52 Herpes zoster thoracicus 69
- 53 Verrucae planae juveniles 69
- 54 Verrucae vulgares 70
- 55 Verrucae seniles 71

56 Mollusca contagiosa	72
57 Spitze Condylome	73

Entzündliche Krankheiten wahrscheinlich infektiöser Natur mit noch unbekanntem Erreger

58 Dermatitis herpetiformis.	74
59 Erythema exsudativum multiforme	78
60 Erythema nodosum	81
61 Lupus erythematodes (Chronische discoide Form)	82
62 Lupus erythematodes (Chronische discoide Form)	83
63 Lupus erythematodes acutus (Erysipelas perstans)	84
64 Lupus erythematodes acutus disseminatus (Herde auf dem Handrücken)	84
65 Lichen ruber planus am Rücken	87
66 Lichen ruber planus auf der Volarseite des Vorderarmes	88
67 Lichen ruber planus auf der Dorsalseite des Vorderarmes	88
68 Lichen ruber der Mundschleimhaut	89
69 Psoriasis vulgaris am Stamm	90
70 Psoriasis vulgaris auf der Streckseite des Knies	91
71 Psoriasis vulgaris auf der Streckseite der Ellenbogen	91
72 Psoriasis vulgaris am behaarten Kopf	92
73 Parapsoriasis guttata	92
74 Parapsoriasis lichenoides	94
75 Pityriasis rosea	97
76 Sklerodermie en plaques	98
77 Sklerodaktylie	98

Die allergischen Hautkrankheiten

78 Mikroskopisches Bild eines Ekzemenkötchens	105
79 Blasiges und nässendes Ekzem	107
80 Nickelekzem durch Strumpfbänder und Armband	108
81 Photoallergisches Ekzem nach Sulfanilamidsalbe	109
82 Positive Ekzemprobe mit Nickelmünze	109

83 Gesichtsekzem durch Mundwasser	110
84 Positive Läppchenprobe durch Mundwasser	111
85 Gesichtsekzem durch resorcinhaltigen Puder	112
86 Maurerekzem	113
87 Berufsekzem bei einer Färbearbeiterin durch Kaliumbichromat	113
88 Positive Läppchenprobe mit Kaliumbichromat	114
89 Handekzem durch eine vernickelte Schere	117
90 Seborrhoisches Ekzem über dem Brustbein	118
91 Seborrhoisches Ekzem hinter den Ohren	119
92 Unterschenkelekzem parasitärer Natur	120
93 Neurodermitis disseminata in den Kniekehlen	125
94 Neurodermitis an Gesicht und Hals	126
95 Lichenifizierter Ekzemherd	127
96 Positive Sofortreaktionen auf Hühnereiweiß	128
97 Kinderekzem	133
98 Urticaria	134
99 Lichturticaria	135
100 Purpura	135
101 Arzneimitteloxanthem durch Saridon	136
102 Prurigo vulgaris	143

Erkrankungen der Haut durch einfache chemische und physikalische Einflüsse

103 Schwielenartige Fingerknöchelpolster	148
104 Wiesengräserdermatitis	153
105 Frühlingslichtdermatose an den Ohren	153
106 Polymorphe Lichtdermatose	154

Erkrankungen der Haut

107 Epidermolysis bullosa hereditaria dystrophica	157
108 Ichthyosis vulgaris	159
109 Ichthyosis congenita	160

110	Angeborene ichthyosiforme Erythrodermie	161
111	(a u. b) Hyperkeratosis plantaris et palmaris	162
112	Recklinghausensche Krankheit	163

Zirkulationsstörungen der Haut

113a	Pernionen an den Händen	167
113b	Pernionen an den Unterschenkeln	168
114	Varicöser Symptomenkomplex mit Sklerose und Ulcus	173
115	Varicöser Symptomenkomplex mit Ulcus und Ekzem	173

Tumoren der Haut

116	Subcutane Fingerknöchelpolster	174
117	Senile Hyperkeratose	175
118	Senile Hyperkeratose, histologisches Bild	175
119	Morbus Bowen	176
120	Morbus Bowen, histologisches Bild	176
121a	Morbus Paget der Brustwarze	181
121b	Morbus Paget der Brustwarze, histologisches Bild	181
122	Melanotische Praecancerose	182
123	Melanotische Praecancerose, histologisches Bild	182
124	Carcinoma basocellulare	187
125	Carcinoma basocellulare terebrans	188
126	Pigmentiertes pagetoides Basal- zellencarcinom	189
127	Carcinoma basocellulare, histologisches Bild	189
128	Pigmentiertes pagetoides Basal- zellencarcinom, Herd am Stamm	190
129	Carcinoma spinocellulare an der Unterlippe	191
130	Carcinoma spinocellulare, histologisches Bild	191
131	Carcinoma spinocellulare am be- haarten Kopf	192
132a	Melanom	193
132b	Melanom, Histologie	193
133	Lymphatische Leukämie	194

Erkrankungen der Anhangsgebilde der Haut

134	Akne vulgaris im Gesicht	199
135	Akne vulgaris an der Stirne	200
136	Röhölakne	200
137	Aknerosacea	201
138	Koilonychie	202

Pigmentveränderungen

139	Vitiligo	209
140	Epheliden	211

Schleimhautveränderungen

141	Wismutsaum	212
-----	----------------------	-----

Geschlechtskrankheiten

142	Syphilispirochaeten	216
143	Syphilitischer Primäraffekt am Penis	217
144	Syphilitischer Primäraffekt an der Unterlippe	218
145	Syphilitische Roseola	219
146	Papulöses schuppendes Syphilid an den Handtellern	220
147	Papulöses schuppendes Syphilid an den Handtellern	220
148	Papulöses Syphilid an den Fuß- sohlen	223
149	Papulosquamöses Syphilid an den Fußsohlen	224
150	Papulöses Syphilid (Breite Con- dyrome am Genitale und After)	225
151	Luxurierende Papeln am Mund- winkel und am Naseneingang	225
152	Schleimhautpapeln	226
153	Serpiginöse tertiäre Syphilis	227
154	Serpiginöse papulonodöse Syphilis	228
155	Mesaortitis luetica (Röntgenbild)	229
156	Malum perforans bei Tabes dor- salis	230
157	Hutchinsonsche Zähne bei Lues congenita	239
158	Gonokokken	239

Anatomie der Haut

Die Haut besteht aus der Epidermis (Oberhaut) und der Cutis (Lederhaut). Darunter liegt das subcutane Fettgewebe.

Die Epidermis hat verschiedene Schichten. Zuunterst befindet sich die Basalschicht, die aus den zylindrischen Basalzellen besteht. Sie wird auch Keimschicht genannt, da in ihr das beständige Wachstum der Epidermis erfolgt. Die Basalzellen sind durch kleine Ausläufer mit der Cutis verankert. Der wellenförmige Verlauf der Papillarlinie trägt ebenfalls zur gegenseitigen Verankerung der Epidermis mit der Cutis bei. Die Basalschicht enthält die pigmentbildenden Zellen. Diese werden Melanoblasten, heute auch Melanocyten genannt. Die pigmentbildenden Elemente sind während der embryonalen Entwicklung aus der Neuralleiste ausgewandert und haben ihren dendritischen, den Nervenzellen ähnlichen morphologischen Charakter bewahrt. Über der Basalschicht liegt die Stachelzellenschicht, welche auch acanthopapilläre Schicht oder Malpighische Schicht genannt wird. Sie setzt sich aus rundlichen Zellen mit großen Kernen zusammen, die untereinander durch Intercellularbrücken, die sogenannten Stacheln, verbunden sind. Ein Netz von Intercellularfasern zieht sich durch diese Brücken über die ganze Epidermis und fixiert die Zellen dieser Schicht untereinander.

In den oberen Lagen der Stachelzellenschicht beginnt sich die Hornsubstanz in

Abb. 1

Abb. 2. Bild der Epidermis mit ihren Anhangsgebilden und der Cutis. Es ist der Haarfollikel mit den dazugehörigen Talgdrüsen und dem aus glatter Muskulatur bestehendem Erektor pilorum sichtbar. Am unteren Ende des Follikels liegt die Haarpapille mit der Haar-matrix. Die ekkri-nen Schweißdrüsen münden in die freie Epidermis. Die apo-kri-nen Schweißdrüsen stehen mit den Haarfollikeln in Verbindung. Die Blutgefäße reichen bis in den Papillar-körper.

Form von Keratohyalinkörnern zu bilden. Diesen Teil nennt man die Keratohyalinschicht. Das Zellplasma ist dicht mit dunkeln Körnern aufgefüllt. Über der Keratohyalinschicht sieht man im Schnitt eine schmale homogene Zone ohne Zellkerne, das Stratum lucidum. Es verdankt seine Durchsichtigkeit dem Gehalt an Eleïdin. Die Hornschicht ist die oberste Lage der Haut. Die Zellkerne sind verschwunden, die Zellen sind verhornt, die Zellgrenzen können in Nativpräparaten noch gesehen werden. An Handtellern und Fußsohlen sind die Keratohyalinschicht, das Stratum lucidum und die Hornschicht am deutlichsten ausgebildet.

Die Cutis enthält die Gefäße der Haut. Die Epidermis ist gefäßlos. Die Kapillaren reichen bis in den Papillarkörper. Größere Gefäße, Arterien und Venen, findet man erst in der Subcutis. Die Nervenfasern steigen aus der Subcutis in die Cutis auf und verzweigen sich in Form dendritischer Zellen zwischen den Elementen der Epidermis. Sie sind nur in Präparaten, die mit Silber- oder Goldlösungen imprägniert worden sind, deutlich sichtbar. In der Cutis findet man dabei spezielle Tastkörperchen. Die Anhangsgebilde der Haut: Haare, Nägel, Talgdrüsen, Schweißdrüsen, liegen in der Cutis. Die Haarfollikel sind Einstülpungen der Epidermis, die bis in die Subcutis reichen können. An ihrem unteren Ende findet man die gut mit Blutgefäßen versorgten Haarpapillen, welche die Matrix des Haarwachstums bilden. Es gibt zwei Arten von Schweißdrüsen: die ekkri-nen Schweißdrüsen, welche überall am Körper zu finden sind und welche direkt an die Hautoberfläche einmünden. Korkzieherartig gewundene Ausfüh-

zungsgänge führen zum drüsigen Anteil, der in Form zylindrischer Zellen an der Grenze zwischen Cutis und Subcutis gelegen ist. Die apokrinen Schweißdrüsen münden in einen Haarfollikel. Sie liegen in der Achselhöhle und in der Genitalregion. Die Cutis enthält ein dichtes Netz von kollagenen Fasern, elastischen Fasern und Gitterfasern. Sie geben ihr die kräftige Struktur, die zum Namen Lederhaut geführt hat.

Effloreszenzenlehre

Für die Diagnose einer Hautkrankheit ist die genaue Betrachtung des Hautausschlages wichtig. Der Patient soll vollständig entkleidet werden, damit die Verteilung der Veränderungen erkannt werden kann und auch gewöhnlich von den Kleidern bedeckte, dem Patienten selbst unbekanntes Effloreszenzen nicht übersehen werden. Von Bedeutung sind besonders die frischen einzelnen Primärelemente. Die Beleuchtung muß gut sein. Durch Drehen des Patienten und seitliches Licht sind feine Strukturen der Oberfläche am besten zu erkennen. Als technisches Hilfsmittel kann man eine Lupe gebrauchen. Durch vorsichtiges Kratzen, besser mit einer BROCSschen Curette als mit dem Fingernagel, erkennt man die Natur der Schuppen und Krustenbildung sowie das Aussehen der unter der Kruste liegenden Effloreszenzen. Mit einem Glasspatel, den man kräftig auf die Hautveränderung preßt, kann man das Blut aus der Haut wegdrücken und die Eigenfarbe der Hautveränderung durch Pigmentierung oder Granulationsgewebe erkennen.

Man sucht die Hautveränderungen in die folgenden Primär- und Sekundäreffloreszenzen einzugliedern:

1. Der Fleck oder die Macula

Umschriebene Farbveränderungen der Haut ohne Zunahme der Konsistenz. Es kann sich um eine umschriebene Rötung infolge Gefäßerweiterung handeln (Beispiel luetische Roseola Abb. 145), um eine Bräunung durch umschriebene Pigmentvermehrung in der Basalschicht (Beispiel Epheliden Abb. 140), um eine Blaufärbung infolge Pigmentvermehrung oder Einlagerungen in der Cutis (Beispiel blauer Naevus, S. 177), um eine Weißfärbung infolge Depigmentierung (Beispiel Vitiligo Abb. 139).

2. Die Quaddel oder Urtica

Umschriebene leicht erhabene Konsistenzvermehrung der Haut von weißlicher Farbe, umgeben von einem roten Hof. Sie entsteht durch Ödembildung in der

Cutis rasch innerhalb von 10 bis 20 Minuten und verschwindet wieder im Laufe einiger Stunden (Beispiel Urticaria Abb. 98, 99). Die weiße Farbe ist die Folge der Gefäßkompression durch das Oedem.

3. Die Papel

Umschriebene, deutlich palpable Substanzvermehrung von längerer Dauer, meist deutlich über das Niveau der Haut erhaben. Histologisch kann sie auf verschiedene Arten entstehen. Erstens epidermale Papel durch massive Verbreiterung der Epidermis, durch Acanthose (Beispiel Carcinoma basocellulare, Warze Abb. 54), zweitens cutane Papel durch Einlagerung entzündlicher Elemente in die Cutis (Beispiel Lues II Abb. 150–152), drittens gemischte Papel, durch Verbreiterung der Epidermis und gleichzeitige Einlagerung entzündlicher Elemente in der Cutis (Beispiel Lichen ruber Abb. 65).

4. Das Knötchen (Nodulus)

Das Knötchen ist eine spezielle Form der Papel. Es ist stecknadelkopfgroß, halbkugelig über die Hautoberfläche hervortretend und deutlich infiltriert. In dieser Form ist es die Primäreffloreszenz des Ekzems. Histologisch besteht das Ekzemknötchen aus einer Verbreiterung des Epithels, in welches schwammförmige, sogenannte spongiotische ödematöse Auflockerungen eingelagert sind. Ein anderer Typus des Knötchens ist das polygonale, flache Lichen-ruber-Knötchen. Durch Zusammenfließen von Ekzem- oder Lichen-ruber-Knötchen entsteht mit der Zeit eine Lichenifikation. Die Haut ist plateauartig erhaben, flächenförmig verdickt und weist eine schachbrettartige Zeichnung auf. Es besteht eine Vergrößerung der normalen Hautzeichnung. Nur histologisch ist mit Sicherheit zu erkennen, ob die Lichenifikation aus einem Lichen ruber, einem Ekzem oder einer anderen Hautkrankheit hervorgegangen ist.

5. Der Knoten (Tuber, Nodus)

Überschreitet ein infiltriertes Element der Haut die Größe einer Kirsche, so spricht man, wenn es die Haut deutlich überragt, von einem Tuber, wenn es mehr in der Tiefe der Haut liegt, von einem Knoten (Beispiel Erythema nodosum Abb. 60).

6. Die Blase (Bulla)

Durch Ansammlung von seröser Entzündungsflüssigkeit innerhalb oder unterhalb der Epidermis entstehen kleine, stecknadelkopfgroße Bläschen (Beispiel Epidermophytid, Ekzem Abb. 25, 84) oder größere Blasen (Beispiel Ekzem, Dermatitis herpetiformis Abb. 79, 58).

Abb. 3. *Rote Macula* durch umschriebene Gefäßerweiterung.

Abb. 4. *Braune Macula* durch umschriebene Pigmentvermehrung in der Basalschicht der Epidermis.

Abb. 5. *Cutane Papel* durch Einlagerung von Zellelementen in der Cutis.

Abb. 6. *Epidermale Papel* durch Verbreiterung der Epidermis.

Abb. 7. *Gemischte Papel* durch Verbreiterung der Epidermis inklusive Hornschicht und Einlagerung von Infiltratzellen in der Cutis.

Abb. 8. *Ekzemknötchen* durch Verbreiterung der Epidermis mit spongiotischem Ödem. Gleichzeitig Einlagerung entzündlicher Elemente in der Cutis und parakeratotisch verbreiterte und aufgelockerte Hornschicht.

7. Die Pustel (Pustula)

Trübt sich der Inhalt einer Blase durch Hinzutreten von Leukocyten, so nehmen die vorher hellen Elemente einen gelben bis grünlichen Farbton an (Beispiel Furunkel Abb. 40).

Blasen und Pusteln können histologisch in verschiedenen Schichten der Epidermis lokalisiert sein. Erstens, die subcorneale Pustel sitzt zwischen Epidermis und Hornschicht und hebt die letztere ab (Beispiel Impetigo Abb. 36), zweitens, die intraepitheliale Blase oder Pustel liegt zwischen den Schichten der Epidermis und drängt diese auseinander (Beispiel Pemphigus vulgaris), drittens, die subepitheliale Blase liegt zwischen Cutis und Epidermis und drängt die ganze Epidermis nach oben (Beispiel Dermatitis herpetiformis, Erythema exsudativum multiforme Abb. 58, 59). Neben diesen Primäreffloreszenzen gibt es folgende, mehr sekundäre Elemente:

8. Die Hyperkeratose

Die Hyperkeratose ist eine vermehrte Hornhautbildung, ohne wesentliche qualitative Veränderung derselben. Nimmt die Hornhaut durch Druck und mechanische Beanspruchung zu, so spricht man von einer Schwielen (Abb. 103). Viele entzündliche Elemente führen zu einer lokalisierten, unregelmäßigen, meist festhaftenden Vermehrung der Hornschicht (Beispiel Lichen ruber verrucosus, punktförmige, follikuläre Hyperkeratose bei Lupus erythematoses, unregelmäßige Hornbildung auf Carcinomen, Präcancerosen, Warzen Abb. 62, 117, 118).

9. Die Schuppe (Squama)

Schon normalerweise schuppt sich die ständig neugebildete Hornhaut in Form der Desquamatio insensibilis ab. Nach mehrwöchigem Liegenbleiben eines Gipsverbandes kann man das beträchtliche Ausmaß dieser normalen Hornbildung feststellen. Bei entzündlichen Erkrankungen der Haut ist die Hornbildung vermehrt und oft pathologisch verändert, indem infolge des beschleunigten Tempos der Hornbildung keine Keratohyalinschicht gebildet wird und die Hornhautlamellen noch Zellkerne enthalten (Parakeratose). Die parakeratotische Hornschicht ist locker und erfüllt ihre Schutzfunktion schlecht (Beispiel Psoriasis Abb. 69–72, Ekzem Abb. 86).

10. Die Kruste

Die gelbliche Kruste besteht aus eingetrocknetem Exsudat sowie Schuppen und Leukocyten. Sie bedeckt meistens erosive Veränderungen und muß zum Er-