



国家执业医师资格考试



直通车系列

2017

中西医结合执业医师资格考试 易混易错 2000 题

(第二版)

主编 周迎春 安海燕

- ▶ 高含金量 高频考点全覆盖，含历年真题
- ▶ 高针对性 前2000个易混易错知识点深度剖析（含真题）
- ▶ 高附加值 赠送《考试宝典》体验卡
- ▶ 高含金量+高针对性+高附加值=高通过率

中国医药科技出版社

国家执业医师资格考试直通车系列

2017

中西医结合执业医师资格考试 易混易错 2000 题

(第二版)

主 编 周迎春 安海燕

编 委 (按姓氏笔画排序)

冯思同 张文通 陈 玲

林俊豪 赵 迪 谢凌鹏

组织者 覃丽洁 杨丽芬

中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书立足于考试大纲,依托于《考试宝典》海量题库和强大的后台数据,选取2000道考生易错考点或易混淆知识点,且专业导师对易错考点进行了深度剖析,对易混淆的知识点进行了对比解析,能够让考生轻松掌握考试要点,特别是本书包含了部分历年真题中易混易错试题,供考生参考复习。

图书在版编目(CIP)数据

2017 中西医结合执业医师资格考试易混易错2000题/周迎春,安海燕主编. —2版. —北京:中国医药科技出版社,2017.2

(国家执业医师资格考试直通车系列)

ISBN 978-7-5067-9026-0

I. ①2… II. ①周… ②安… III. ①中西医结合—资格考试—习题集 IV. ①R2-031

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第003530号

美术编辑 陈君杞

版式设计 麦和文化

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲22号

邮编 100082

电话 发行:010-62227427 邮购:010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm^{1/16}

印张 15^{1/4}

字数 410千字

初版 2016年4月第1版

版次 2017年2月第2版

印次 2017年2月第1次印刷

印刷 三河市腾飞印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-9026-0

定价 35.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

前言

医师资格考试是行业准入考试，是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试包括实践技能和医学综合笔试两部分。

为了更好地帮助广大考生做好考前复习工作，特组织有关专业教师编写了《2017 中西医结合执业医师资格考试易混易错 2000 题》。本书适合考生在复习中期使用，立足于考试大纲，依托《考试宝典》海量题库和强大的考生后台数据，选取前 2000 道考生易错试题 + 易混淆知识点试题，名师对易错知识点进行深度剖析，对易混淆知识点试题进行对比解析，让考生轻松掌握试题要点！特别是本书包含了部分历年真题中易混易错试题，供考生参考复习。

本书亮点：

1. 专业的编写团队。编写专家组成员均是在高校任职并在中医院从事临床工作的一线教师或医师，对执业医师资格考试有着长达十几年的教学、培训经验。
2. 试题的含金量高。紧扣考试大纲，精选历年考生易混易错的试题。
3. 解析全面详细、举一反三。
4. 赠送《考试宝典》体验卡。更多试题讲解视频免费试听。本书封面配有《考试宝典》二维码，扫二维码下载软件，注册、激活体验卡使用。

最后预祝各位考生在本“直通车系列”的保驾护航下，顺利通过考试。

编者
2017 年 1 月

目 录

单元一	1
单元二	20
单元三	36
单元四	53
单元五	69
单元六	85
单元七	101
单元八	120
单元九	138
单元十	155
单元十一	177
单元十二	197
单元十三	218

单元一

一、A1/A2 型题

1. 甲型病毒性肝炎患者早期实验室诊断的标准是

- A. 血液中检出甲型肝炎抗体
- B. 血中检出甲型肝炎病毒抗原
- C. 丙氨酸氨基转移酶明显升高
- D. 血清中检出抗原-抗体复合物
- E. 排除乙型病毒性肝炎即可诊断

2. 按中国九分法计算烧伤面积, 成人双下肢、臀部的面积占

- A. 9%
- B. 18%
- C. 27%
- D. 36%
- E. 46%

3. 引起艾滋病肺部感染最常见的病原体是

- A. 结核杆菌
- B. 肺孢子虫
- C. 念珠菌
- D. 巨细胞病毒
- E. 疱疹病毒

4. 由逍遥散变化为黑逍遥散, 属于

- A. 药味加减的变化
- B. 药量增减的变化
- C. 剂型更换的变化
- D. 药味加减和药量增减变化的联合运用
- E. 药量增减和剂型更换变化的联合运用

5. 典型伤寒出现玫瑰疹的时间是

- A. 第3~5天
- B. 第7~10天
- C. 第14~21天
- D. 第22~28天
- E. 28天以后

6. 具有补气生血功用的方剂是

- A. 四君子汤
- B. 参苓白术散
- C. 当归补血汤
- D. 补中益气汤
- E. 生脉散

7. 大柴胡汤组成中无

- A. 大黄
- B. 人参
- C. 枳实
- D. 白芍
- E. 半夏

8. 枳实薤白桂枝汤中, 具有通阳散寒、降逆平冲作用的药物是

- A. 枳实
- B. 薤白
- C. 桂枝
- D. 厚朴
- E. 瓜蒌

9. 决定方剂功用、主治的主要因素是

- A. 药物
- B. 配伍
- C. 剂量
- D. 剂型
- E. 用法

10. 真武汤中白芍的主要作用有

- A. 缓急, 利小便
- B. 滋阴养血
- C. 调和营卫
- D. 敛阴止汗
- E. 柔肝息风

11. 银翘散和桑菊饮两方组成中均含有的药物是

- A. 连翘、杏仁、桔梗
- B. 银花、杏仁、桔梗
- C. 连翘、薄荷、芦根
- D. 银花、薄荷、芦根
- E. 杏仁、甘草、芦根

12. 旋覆代赭汤的病因病机是

- A. 痰热内阻, 胃失和降
- B. 食积内停, 胃失和降
- C. 胃虚痰阻, 气逆不降
- D. 胃虚有热, 气逆不降
- E. 胃中虚冷, 气逆不降

13. “壮水之主, 以制阳光”的治法, 最适合于治疗

- A. 阴盛则寒之证
- B. 阴虚则热之证

- C. 阴盛伤阳之证 D. 阴损及阳之证
E. 阳损及阴之证

14. 患者恶寒蜷卧，四肢厥冷，吐泻腹痛，口不渴，神衰欲寐，脉沉微。治疗应首选

- A. 理中丸 B. 肾气丸
C. 四逆散 D. 当归四逆汤
E. 回阳救急汤

15. 十二经脉的功能反应于体表的是

- A. 十二经别 B. 十二经筋
C. 十五别络 D. 十二皮部
E. 奇经八脉

16. 经脉有表里关系的是

- A. 手太阴与手少阳
B. 足厥阴与足少阳
C. 手少阴与手阳明
D. 足太阳与足太阴
E. 足少阴与足阳明

17. 视物旋转动荡，如在盘车之上，称为

- A. 目昏 B. 目痒
C. 目眩 D. 雀目
E. 内障

18. 下列除哪项外，均与瘀血的形成有关

- A. 气滞 B. 血寒
C. 饮食偏嗜 D. 气虚
E. 血热

19. 咽部红肿，溃烂成片属于

- A. 肺胃热轻 B. 肺胃热盛
C. 肺胃热毒 D. 阴虚火旺
E. 以上都不是

20. 主要与正气的强弱有关的是

- A. 居住的地域条件 B. 工作环境
C. 精神状态 D. 气候变化
E. 以上均非

21. 下列不宜入煎剂的药物是

- A. 大戟 B. 番泻叶
C. 甘遂 D. 商陆
E. 牵牛子

22. 在阴阳失调的病机变化中，“阴”的含义指

“阴邪”的是

- A. 阴虚则阳亢 B. 阳盛则阴病
C. 阴盛则阳病 D. 阴损及阳
E. 阳盛格阴

23. 普通型流脑的典型临床表现是

- A. 低热，头痛，皮肤、黏膜瘀点
B. 高热，循环衰竭，皮肤、黏膜大片瘀斑
C. 高热，皮肤、黏膜瘀斑，昏迷，呼吸衰竭
D. 高热，头痛，皮肤、黏膜瘀斑，脑膜刺激征阳性
E. 间歇性发热、反复皮肤瘀点、血培养可阳性

24. 暑淫证候的表现是

- A. 头昏沉，嗜睡，胸脘痞闷
B. 口渴饮水，口唇鼻咽干燥
C. 发热恶热，汗出，气短神疲
D. 突发皮肤瘙痒、丘疹
E. 肠鸣腹泻，脘腹拘急冷痛

25. 下列哪项被确定为我国卫生立法的重要原则和卫生工作的根本方针

- A. 预防为主
B. 促进国际交流
C. 保护公民健康
D. 推动卫生事业发展
E. 规范卫生工作行为

26. 甲状腺功能亢进引起的发热主要是因为

- A. 产热过多
B. 散热过少
C. 抗原-抗体反应
D. 坏死物质吸收
E. 自主神经功能紊乱

27. 实施卫生法中的行政处罚的卫生行政主管部门是县级以上的

- A. 司法部门
B. 卫生行政管理部门
C. 卫生组织、社会团体
D. 药品监督管理部门
E. 工商行政管理部门

28. 肝细胞性黄疸的黄疸颜色是

- A. 深黄 B. 黄绿
C. 褐绿 D. 浅柠檬色

E. 棕黄

29. 县级以上人民政府卫生行政部门可以责令考核不合格的医师暂停执业活动, 其暂停执业活动的期限是

- A. 3~6 个月
- B. 6~8 个月
- C. 6 个月以上 1 年以下
- D. 1~2 年
- E. 2 年以上

30. 关于颈静脉搏动, 正确的是

- A. 均为病理性
- B. 引起静脉压升高者皆可出现
- C. 视诊可见, 触诊可及
- D. 见于交界区心律、左心衰竭, 而不见于房室传导阻滞
- E. 指颈外静脉搏动

31. 关于药物体内过程, 下列说法正确的是

- A. 药物只有分布到血液外才会有消除效应
- B. 药物代谢后肯定会减弱其药理活性
- C. 药物代谢后会增加脂溶性
- D. 只有排出体外才能消除其活性
- E. 肝脏代谢和肾脏排泄是两种主要消除途径

32. 胸骨左缘第 3、4 肋间闻及舒张期叹气样杂音, 提示

- A. 主动脉瓣关闭不全
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 肺动脉瓣关闭不全
- D. 肺动脉瓣狭窄
- E. 二尖瓣关闭不全

33. 有机磷农药中毒后的抢救药物是

- A. 毛果芸香碱 + AChE 抑制剂
- B. 阿托品 + AChE 复活剂
- C. 单用阿托品
- D. 阿托品 + AChE 抑制剂
- E. 毛果芸香碱 + AChE 复活剂

34. 可出现高度脾大的是

- A. 伤寒
- B. 慢性肝炎
- C. 肝硬化
- D. 败血症
- E. 骨髓纤维化

35. 医学道德的特点是

- A. 阶级性、全人类性、协调性
- B. 稳定性、规范性、社会性
- C. 协调性、规范性、继承性
- D. 实践性、继承性、全人类性
- E. 实践性、阶级性、社会性

36. 某药按一级动力学消除, 半衰期为 7 小时, 采用恒速恒量连续给药, 达到稳态血药浓度 (99% 以上) 的最短时间是

- A. 10 小时左右
- B. 1 天左右
- C. 2 天左右
- D. 5 天左右
- E. 10 天左右

37. 生命神圣观的含义是

- A. 强调人的生命价值至高无上, 人的生命神圣不可侵犯
- B. 强调人的生命存在状态及其有价值的生命观
- C. 强调人的生命是一种自觉的合乎理性的存在
- D. 强调人的生命是生物学和社会学统一体
- E. 强调人的生存权、健康权是基本权利

38. 诊断慢性支气管炎的主要依据是

- A. 病史和症状
- B. 阳性体征
- C. 胸部 X 检查
- D. 心电图改变
- E. 肺功能检查

39. 医学伦理学具体原则中不包括的是

- A. 有利的原则
- B. 尊重的原则
- C. 不伤害的原则
- D. 自主的原则
- E. 公正的原则

40. 治疗肺结核阴阳两虚型, 应首选

- A. 补天大造丸
- B. 泻白散合黛蛤散
- C. 百合固金汤
- D. 保真汤
- E. 月华丸

41. 在经络系统中, 具有离、入、出、合循环特点的是

- A. 十二经别
- B. 奇经八脉
- C. 十二经筋
- D. 十二皮部
- E. 十五络脉

42. 肺炎球菌肺炎发病 1~2 天后, 其痰液特征是

- A. 白色黏液痰
- B. 黏液泡沫痰

- C. 黏液脓性痰 D. 铁锈色痰
E. 大量脓痰

43. 手太阴肺经的输土穴是

- A. 尺泽 B. 经渠
C. 列缺 D. 太渊
E. 少商

44. 喘促持续不解，逐渐加剧，张口抬肩，面唇青紫，心悸，烦躁，肢冷，汗出如珠，脉浮大无根。其病机是

- A. 肺肾气虚，痰浊内蕴
B. 肺肾两虚，气失摄纳
C. 阳虚水泛，上凌心肺
D. 中气虚弱，湿浊内蕴
E. 肺肾气虚，心阳欲竭

45. 前发际正中至后发际正中第 7 颈椎棘突下的骨度分寸是

- A. 12 寸 B. 14 寸
C. 15 寸 D. 16 寸
E. 18 寸

46. 下列哪种治法可以在寒哮发作期应用

- A. 补肺固卫 B. 温补脾阳
C. 补肾纳气 D. 温肺化痰
E. 疏肝理气

47. 下列常引起沿一侧肋间神经分布胸痛的变化是

- A. 皮下蜂窝织炎 B. 流行性胸痛
C. 颈椎病 D. 带状疱疹
E. 胸肌劳损

48. 治疗肺结核肺阴亏损证，应首选的方剂是

- A. 月华丸
B. 百合固金汤合秦艽鳖甲散
C. 保真汤
D. 补天大造丸
E. 《千金》苇茎汤

49. 引起皮肤黏膜出血的病因中，因血小板消耗过多所致的是

- A. 血友病
B. 急性白血病
C. 特发性血小板减少性紫癜

- D. DIC
E. 过敏性紫癜

50. 患者，女，15 岁。因突发咳嗽、喘息半小时就诊。症见：咳嗽阵作，气粗息涌，喉中痰鸣，面赤汗出，口渴，舌红苔黄腻，脉弦滑。应首先考虑的是

- A. 咳嗽 B. 喘病
C. 哮病 D. 肺癆
E. 肺胀

51. 肝源性水肿患者不出现的体征是

- A. 肝-颈静脉反流征阳性
B. 双下肢水肿
C. 蜘蛛痣
D. 腹壁静脉曲张
E. 脾肿大

52. 患者，咳逆喘满不得卧，气短气急，咳痰白稀，呈泡沫状，胸部膨满，口干不欲饮，周身酸楚，恶寒，面色青暗，舌体暗淡，苔白滑，脉浮紧。应考虑使用的方剂是

- A. 小青龙汤 B. 越婢加半夏汤
C. 麻黄汤 D. 麻杏石甘汤
E. 定喘汤

53. 小儿望诊中望神的重点是

- A. 察口 B. 察舌
C. 察耳 D. 察鼻
E. 察目

54. 患者，男，50 岁。反复咳嗽、咳痰 10 年，喉间痰鸣气促 3 年，伴咳黄稠痰，呼吸气粗，烦躁不安，面赤口苦。舌质红，苔黄腻，脉滑数。查体：双肺散在湿啰音，双肺满布哮鸣音。应首先考虑的诊断是

- A. 慢性支气管炎喘息型热哮
B. 慢性支气管炎喘息型寒哮
C. 慢性支气管炎单纯型痰热郁肺证
D. 慢性支气管炎喘息型风热犯肺证
E. 慢性支气管炎喘息型肝火犯肺证

55. 小儿应用脉诊的最早年龄是

- A. 1 周岁 B. 2 周岁
C. 3 周岁 D. 4 周岁
E. 7 周岁

56. 患者，男，58岁。有肺癌病史。症见咳嗽痰少，神疲乏力，纳差腹胀，口干喜饮，盗汗，大便干结，舌质红，脉细弱。可选用下列哪首方剂

- A. 血府逐瘀汤
- B. 导痰汤
- C. 六君子汤
- D. 六味地黄汤
- E. 生脉饮

57. 新生儿寒冷损伤综合征的病变脏腑是

- A. 心肾
- B. 肝肾
- C. 脾肾
- D. 肺肾
- E. 脾胃

58. 患者，男，48岁。身热头痛，干咳无痰，气逆而喘，鼻燥咽干，心烦口渴，胸满胁痛，舌干无苔，脉虚大而数。治疗应首选

- A. 杏苏散
- B. 桑杏汤
- C. 百合固金汤
- D. 清燥救肺汤
- E. 麦门冬汤

59. 下列各项中，不属于古籍中有关子宫的名称是

- A. 胞宫
- B. 女子胞
- C. 子处
- D. 子门
- E. 血室

60. 治疗高血压病阴阳两虚型，应首选

- A. 龙胆泻肝汤
- B. 天麻钩藤饮
- C. 镇肝息风汤
- D. 地黄饮子
- E. 二仙汤

61. 下列关于子宫的叙述，错误的是

- A. 位于盆腔中央，前方为直肠，后方为膀胱
- B. 呈倒置的梨形，为空腔器官，前面扁平，后面稍突出
- C. 子宫上端隆突部分称子宫底，子宫底两侧为子宫角，与输卵管相通
- D. 子宫体与子宫颈的比例，婴儿期为1:2，成人期为2:1
- E. 子宫体壁分为三层：浆膜层、肌层、黏膜层

62. 下列哪项不是风湿性心脏瓣膜病的病机

- A. 气虚
- B. 血虚
- C. 阴虚或阳虚
- D. 水饮内停
- E. 瘀血内阻

63. 下列不属于高危儿条件的是

- A. 产时感染
- B. 孕龄>37周
- C. 出生体重<2500g
- D. 手术产儿
- E. 出生体重>2500g

64. 减慢心率从而降低心肌耗氧量，缓解心绞痛的药物是

- A. 硝酸异山梨醇酯（消心痛）
- B. 硝苯地平（心痛定）
- C. 胺碘酮
- D. 美托洛尔
- E. 硝酸甘油

65. 与久咳发病密切相关的脏腑是

- A. 病位在肺，涉及脾、肾
- B. 病位在肺，涉及肝、脾、肾
- C. 病位在肾，涉及肺、脾
- D. 病位在肺，涉及肝、脾
- E. 病位在肾，涉及肺、心

66. 治疗心肌梗死心阳欲脱证，应首选的方剂是

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤
- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤
- D. 参附龙牡汤
- E. 当归四逆汤合苏合香丸

67. 广泛用于检出结核分枝杆菌感染的是

- A. 结核菌培养
- B. CT检查
- C. X线检查
- D. 痰涂片检查结核菌阳性
- E. 结核菌素试验

68. 患者，男，62岁。患高血压病8年，突发气促，端坐呼吸，咳吐粉红色泡沫痰。检查：双肺广泛水泡音，血压160/90mmHg（21/12kPa）。治疗应首选

- A. 氨茶碱
- B. 螺内酯（安体舒通）
- C. 地高辛
- D. 吗啡
- E. 多巴酚丁胺

69. 下列各项, 关于肺积的中医病因病机描述错误的是

- A. 病变部位在肺
- B. 发病以正虚为根本
- C. 发病以邪毒内侵为根本
- D. 实则不外乎气滞、血瘀、痰凝、毒聚
- E. 虚以阴虚、气阴两虚多见

70. 下列关于黄疸病因病机的叙述, 错误的是

- A. 黄疸的发生主要是湿邪为患
- B. 阳黄, 热重于湿者不易转阴黄
- C. 阳黄, 湿重于热者易迁延转阴黄
- D. 急性病毒性肝炎之黄疸以阳黄居多
- E. 萎黄与黄疸病因病机相同

71. 在正常压力下, 煮沸法灭菌所需时间为

- A. 20 分钟
- B. 40 分钟
- C. 60 分钟
- D. 80 分钟
- E. 100 分钟

72. 治疗消化性溃疡肝胃不和型, 应首选

- A. 理中丸合黄芪建中汤
- B. 一贯煎
- C. 化肝煎合左金丸
- D. 失笑散合丹参饮
- E. 柴胡疏肝散

73. 局麻药产生严重过敏反应, 紧急处理措施是

- A. 立即静脉注射肾上腺皮质激素
- B. 立即应用大量抗菌素
- C. 立即静脉注射氯胺酮
- D. 立即行心电图检查
- E. 立即送高压氧舱治疗

74. 提高胃癌治愈率的关键是

- A. 早期诊断
- B. 根治性手术
- C. 早期应用抗癌药物
- D. 术后放疗
- E. 综合治疗

75. 代谢性酸中毒最明显的表现是

- A. 呼吸变得又浅又快
- B. 呼吸变得又浅又慢
- C. 呼吸变得又深又快

D. 呼吸变得又深又快

E. 呼吸变得时浅时深

76. 患者, 男, 68 岁。肝硬化 10 年, 腹膨大如鼓, 按之坚满, 脘闷纳呆, 恶心呕吐, 便溏, 小便不利, 舌淡红, 苔白腻, 脉弦缓。其证型是

- A. 气滞湿阻
- B. 水湿内停
- C. 肝肾阴虚
- D. 脾肾阳虚
- E. 肝脾血瘀

77. 下列各项中, 不具有苦味药作用的是

- A. 燥湿
- B. 行气
- C. 清泄
- D. 降泄
- E. 通泄

78. 患者, 男, 36 岁。近一个月来, 不思饮食, 食少难消, 脘腹痞闷, 倦怠乏力, 大便溏薄, 舌苔腻微黄, 脉象虚弱。治疗应首选

- A. 枳术丸
- B. 健脾丸
- C. 保和丸
- D. 六君子汤
- E. 参苓白术散

79. 肺寒咳嗽应选的药物是

- A. 归肺经, 性温热
- B. 归肺经, 性寒凉
- C. 归肺经, 味辛甘
- D. 归心经, 性寒凉
- E. 归胃经, 性温热

80. 患者, 男, 50 岁。反复右胁肋疼痛 10 年。现症见肋下积块坚实, 痛定不移, 脘腹胀满, 甚则腹大如鼓, 面目发黄晦暗, 肌肤甲错, 高热烦渴, 小便黄赤, 大便干黑。舌红有瘀斑, 苔黄腻, 脉弦数。实验室检查: 血清 AFP 阳性, 定量检查 $>900\text{ng/ml}$ 。经诊断为“原发性肝细胞肝癌”。其治法是

- A. 运脾利湿、化气行水
- B. 清热利湿、解毒破结
- C. 疏肝理气、活血化瘀
- D. 理气活血、解毒排脓
- E. 养阴清热、解毒祛瘀

81. 相须与相使配伍的作用是

- A. 减轻毒副作用
- B. 消除毒副作用
- C. 增强毒副作用
- D. 拮抗作用, 降低疗效

E. 协同作用, 增进疗效

82. 患者, 男, 55 岁。少尿, 浮肿, 视物模糊 2 年, 伴有全身乏力, 皮肤干燥, 腰膝酸软, 口中有尿臭味, 舌红少苔, 脉细。检查: 血压 180/105mmHg (24/14kPa), 血清钾 6.8mmol/L, 血肌酐 640 μ mol/L。治疗应首选

- A. 降压药加羚角钩藤汤
- B. 降压药加镇肝息风汤
- C. 透析加杞菊地黄丸
- D. 透析加天麻钩藤饮
- E. 降压药加知柏地黄丸

83. 中医学“证”的概念是

- A. 疾病过程的症状
- B. 疾病总过程的病理概括
- C. 疾病过程中的症状和体征
- D. 疾病过程中的体征
- E. 疾病某一阶段的病理概括

84. 下列各项中, 除哪项外, 均是肾病综合征的临床表现

- A. 大量蛋白尿
- B. 高血压
- C. 高胆固醇血症
- D. 低血浆白蛋白
- E. 水肿

85. 构成宇宙本原的是

- A. 天气
- B. 地气
- C. 阳气
- D. 阴气
- E. 精气

86. 治疗水肿气滞湿阻型, 应首选

- A. 羚角钩藤汤
- B. 杞菊地黄丸
- C. 牛黄清心丸
- D. 真武汤
- E. 天仙藤散

87. 《内经》所说“阴阳之征兆”是

- A. 寒与热
- B. 水与火
- C. 上与下
- D. 内与外
- E. 动与静

88. 治疗慢性肾衰竭阴阳两虚证, 应首选的方剂是

- A. 济生肾气丸
- B. 参芪地黄汤
- C. 杞菊地黄丸
- D. 全鹿丸
- E. 六君子汤

89. 下列各项中, 属于中医诊断基本原理的是

- A. 审症求因
- B. 司外揣内
- C. 四诊合参
- D. 治病求本
- E. 脏腑经络

90. 患者, 男, 50 岁。反复浮肿, 尿血 3 年。症见: 面色无华, 少气乏力, 易感冒, 午后低热, 口干咽燥, 舌偏红少苔, 脉细。检查: 血压 140/95mmHg (18.6/12.6kPa), 尿蛋白 (++) , 定量 3g/d, 尿红细胞 20 个/高倍视野, 内生肌酐清除率 48%。其诊断是

- A. 慢性肾炎普通型气阴两虚证
- B. 慢性肾炎高血压型气阴两虚证
- C. 慢性肾炎肾病型肝肾阴虚证
- D. 慢性肾炎普通型肝肾阴虚证
- E. 慢性肾盂肾炎肾阴亏虚证

91. 下列各项, 不属于失神表现的是

- A. 目无精采
- B. 形羸色败
- C. 呼吸微弱
- D. 神志昏迷
- E. 少气懒言

92. 患者, 女, 22 岁。扁桃体发炎后 1 天突发肉眼血尿伴有全身不适而就诊。体检: 血压 110/60mmHg (14.6/7.9kPa), 无浮肿, 尿沉渣红细胞 20~30/HP, 蛋白定量 0.8g/d, 肾功能正常。临床诊断首先考虑

- A. IgA 肾病
- B. 急进性肾炎
- C. 慢性肾炎
- D. 肾病综合征
- E. 急性肾炎

93. 小儿发结如穗, 枯黄稀疏, 属于

- A. 先天不足
- B. 后天失养, 脾胃虚损
- C. 血热
- D. 肾精亏损
- E. 血虚

94. 网织红细胞绝对值减低, 最常见于

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 巨幼细胞性贫血

95. 十二经之别络从络穴分出后, 走向

- A. 相表里的经脉 B. 奇经八脉
C. 腹部 D. 头部
E. 背部

96. 患者,男,54岁。萎缩性胃炎多年,伴巨幼红细胞性贫血(恶性贫血)。其贫血发生机制是因为缺乏

- A. 铁 B. 蛋白质
C. 叶酸 D. 维生素 B₁₂
E. 内因子

97. 上消化道出血可单纯表现为呕血或黑粪,也可两者兼有,这取决于

- A. 原发病 B. 出血部位
C. 出血量 D. 在胃内停留时间
E. 以上均非

98. 甲亢之阴虚火旺证的主方是

- A. 逍遥散 B. 四逆散
C. 龙胆泻肝汤 D. 一贯煎
E. 黄连解毒汤

99. 下列关于 β 受体阻滞药的禁忌证,错误的是

- A. 严重左心室心功能不全
B. 支气管哮喘
C. 高血压
D. 重度房室传导阻滞
E. 窦性心动过缓

100. 下列关于消渴病机的叙述,错误的是

- A. 阴虚为本、燥热为标
B. 气阴两伤或阴阳俱虚
C. 多兼血瘀
D. 变证百出
E. 阴虚湿热

二、B 型题

(101~102 题共用备选答案)

- A. 糖正常,氯化物升高,蛋白明显下降,细胞数升高,以中性粒细胞为主
B. 糖明显下降,氯化物下降,蛋白明显升高,细胞数升高,以中性粒细胞为主
C. 糖明显下降,氯化物下降,蛋白明显升高,

细胞数升高,以淋巴增高为主

- D. 细胞数增高,淋巴为主,糖正常,氯化物正常,蛋白升高
E. 糖明显升高,氯化物正常,蛋白正常,细胞数正常

101. 病毒性脑膜炎脑脊液特点

102. 结核性脑膜炎脑脊液特点

(103~104 题共用备选答案)

- A. 石膏 B. 知母
C. 芦根 D. 天花
E. 夏枯草

103. 治疗胃热呕逆,宜选用

104. 治疗热淋涩痛,宜选用

(105~106 题共用备选答案)

- A. 慌张步态 B. 蹒跚步态
C. 醉酒步态 D. 偏瘫步态
E. 剪刀步态

105. 震颤麻痹可出现的是

106. 巴比妥中毒可出现的是

(107~108 题共用备选答案)

- A. 弱酸性或弱碱性药物解离常数
B. 弱酸性或弱碱性药物解离常数的负对数
C. 口服药物吸收时首次通过肝脏经转化而使进入体循环的药量减少
D. 收入血的药量
E. 药物随胆汁排泄到达小肠后被重新吸收的过程

107. 首过消除是

108. 肝肠循环是

(109~110 题共用备选答案)

- A. 鼠疫、霍乱
B. 流行性乙型脑炎、风疹
C. 流行性感、麻风病
D. 传染性非典型肺炎、肺炭疽
E. 传染性非典型肺炎、流行性感

109. 丙类传染病是

110. 甲类传染病是

(111 ~ 112 题共用备选答案)

- A. 氢氧化铝
- B. 三硅酸镁
- C. 碳酸氢钠
- D. 碳酸钙
- E. 氧化镁

111. 可保护溃疡面, 并有轻度致泻作用的药物是

112. 可保护溃疡面, 并引起便秘的药物是

(113 ~ 114 题共用备选答案)

- A. 锻炼身体, 增强体质
- B. 预防性服用异烟肼
- C. 定期做结核菌素试验
- D. 胸部 X 线检查
- E. 接种卡介苗

113. 与肺结核患者密切接触且结核菌素试验阳性者应

114. 发现肺结核的重要措施是

(115 ~ 116 题共用备选答案)

- A. 清热解毒, 清肺化痰
- B. 早期、联合、适量、规律、全程
- C. 早期、联合、大量、规律、间歇
- D. 祛邪利肺、纳气平喘
- E. 补虚培元、抗癆杀虫

115. 肺结核的用药原则是

116. 肺癆的治疗原则是

(117 ~ 118 题共用备选答案)

- A. 病原体被消灭或排出体外
- B. 病原携带状态
- C. 隐性感染
- D. 潜在性感染
- E. 显性感染

117. 人体与病原体处于相持状态, 不出现临床症状, 不排出病原体

118. 感染病原体后不出现临床表现, 但产生了特异性免疫

(119 ~ 120 题共用备选答案)

- A. 鳞状上皮细胞癌

B. 细支气管肺泡癌

C. 大细胞未分化癌

D. 腺癌

E. 小细胞未分化癌

119. 生长缓慢, 转移晚, 手术切除机会相对较多的是

120. 生长快, 侵袭力强, 远处转移早, 对化学药物治疗和放射治疗较敏感的是

(121 ~ 122 题共用备选答案)

- A. 钙离子拮抗剂
- B. 血管紧张素转换酶抑制剂
- C. 袢利尿剂
- D. β 受体阻滞剂
- E. α 受体阻滞剂

121. 治疗高血压病伴有外周动脉疾病的患者, 不宜使用的药物是

122. 治疗高血压病伴有房室传导阻滞的患者, 不宜使用的药物是

(123 ~ 124 题共用备选答案)

- A. 参附龙牡汤合桃红饮
- B. 柴胡疏肝散
- C. 生脉散合血府逐瘀汤
- D. 当归四逆汤
- E. 参附汤合枳实薤白桂枝汤

123. 治疗真心痛之阳气虚衰, 寒凝心脉型, 应首选

124. 治疗真心痛之气阴亏损, 心络瘀阻型, 应首选

(125 ~ 126 题共用备选答案)

- A. 24 小时内
- B. 1 ~ 3 日
- C. 3 ~ 4 日
- D. 7 日
- E. 10 日

125. 流感的潜伏期通常是

126. 流感发热持续时间通常是

(127 ~ 128 题共用备选答案)

- A. 氢氯噻嗪 (双氢克尿噻)
- B. 呋塞米 (速尿)

C. 卡托普利 (开搏通)

D. 甘露醇

E. 氨苯蝶啶

127. 治疗急性肺水肿, 利尿剂应首选

128. 治疗充血性心力衰竭时, 不宜使用

(129 ~ 130 题共用备选答案)

A. 益气活血 B. 温补心阳

C. 温阳利水 D. 健脾益肺

E. 滋阴安神

129. 治疗风湿性心脏瓣膜病之心肾阳虚证的治法是

130. 治疗风湿性心脏瓣膜病之心阳不足证的治法是

(131 ~ 132 题共用备选答案)

A. 增加心肌需氧量为因素诱发的心绞痛

B. 无明显心肌需氧增加的条件下发生的心绞痛

C. 心绞痛发作时, 心电图某些导联 ST 段抬高

D. 心尖部针刺样疼痛, 发作时无心电图异常

E. 心前区压迫疼痛 15 分钟以上, 心电图有病理性 Q 波

131. 劳力型心绞痛的诊断标准是

132. 变异型心绞痛的诊断标准是

(133 ~ 134 题共用备选答案)

A. 攻下冷积、温补脾阳

B. 润肠泄热、行气通便

C. 温里散寒、通便止痛

D. 泻热破瘀、散结消肿

E. 泄热通便、补益气血

133. 大黄牡丹汤的功用是

134. 温脾汤的功用是

(135 ~ 136 题共用备选答案)

A. 奥美拉唑

B. 雷尼替丁

C. 前列腺素 E

D. 甲氧氯普胺 (灭吐灵)

E. 枸橼酸铋钾

135. 常用的质子泵阻滞剂是

136. 能促进胃动力的药物是

(137 ~ 138 题共用备选答案)

A. 逐水 B. 降浊

C. 利尿 D. 通下

E. 发汗

137. 水肿治疗原则中, “洁净府”是指

138. 水肿治疗原则中, “去菀陈莖”是指

(139 ~ 140 题共用备选答案)

A. 银翘散

B. 小青龙汤

C. 越婢加术汤

D. 荆防败毒散

E. 防己黄芪汤

139. 慢性肾小球肾炎兼风寒表证, 治疗应首选

140. 慢性肾小球肾炎兼风热表证, 治疗应首选

(141 ~ 142 题共用备选答案)

A. 清营解毒、透热养阴

B. 清热开窍、豁痰解毒

C. 清热解毒、凉血散瘀

D. 清肺宁肝、凉血止血

E. 清热开窍、息风止痉

141. 犀角地黄汤的功用是

142. 清营汤的功用是

(143 ~ 144 题共用备选答案)

A. 五皮饮合五苓散 B. 防己黄芪汤

C. 异功散

D. 杞菊地黄丸

E. 真武汤

143. 治疗急性肾小球肾炎脾肾亏虚, 水气泛滥证, 应首选

144. 治疗慢性肾小球肾炎脾肾气虚证, 应首选

(145 ~ 146 题共用备选答案)

A. 效能

B. 效价强度

C. 治疗指数

D. 药物量效曲线

E. 曲线的斜率

145. 反映药物安全性的参数是

146. 反映药物量效变化速度的是

(147~148 题共用备选答案)

- A. 血压下降 B. 呼吸抑制
C. 恶心呕吐 D. 头痛
E. 尿潴留

147. 椎管内麻醉平面过高, 可致

148. 椎管内麻醉由于某种原因引起脑脊液压力过低, 可致

(149~151 题共用备选答案)

- A. 肺脓肿
B. 胸膜炎
C. 气管异物
D. 急性咽炎
E. 大片肺不张

149. 咳嗽、咯痰伴杵状指(趾)的是

150. 咳嗽伴哮喘的是

151. 清晨起床或夜间卧下时咳嗽加剧的是

答案与解析

一、A1/A2 型题

1. A. 血液中检出甲型肝炎抗体是甲型病毒性肝炎患者早期实验室诊断的标准。

2. E. 中国九分计算烧伤面积: 头颈部占 9%, 双上肢占 18%, 躯干前后包括会阴(1%)占 27%。

3. B. 引起艾滋病肺部感染最常见的病原体是肺孢子虫。胃肠系统以口腔和食管的念珠菌及疱疹病毒和巨细胞病毒感染较为常见。

4. D. 黑逍遥散(《医学六书·女科要旨》)由《局方》逍遥散加味化裁而成, 方中不仅加入生地(或熟地), 且药物配伍比例也作相应调整。

5. B. 伤寒大约一半以上的患者, 在病程 7~14 天可出现淡红色的小斑丘疹, 称为玫瑰疹。直径 2~4mm, 压之褪色, 多在 10 个以下, 主要分布在胸、腹及肩背部, 四肢罕见, 一般在 2~4 天内变暗淡、消失, 可分批出现。有时可变成压之不褪色的小出血点。

6. C. 补气可以生血。当归补血汤虽以当归命名, 但重用黄芪为君, 大补元气, 意在使气旺血

生, 所以 C 正确。补中益气汤虽亦重用黄芪、人参、白术等补气药, 少量配伍当归, 但其立法意在补气升阳举陷, 而不在补血, 故不是最佳。四君子汤、参苓白术散、生脉散的功用均与题目相去较远, 所以不选。

7. B. 大柴胡汤的组成包括: 柴胡、黄芩、白芍、半夏、枳实、大黄、生姜、大枣。

8. C. 枳实微寒, 瓜蒌甘寒, 均无通阳散寒之用; 厚朴虽性温且能降逆, 却无通阳之用; 薤白虽辛温通阳, 但无平冲之功, 所以 A、B、D、E 俱非正确选项。唯桂枝辛温, 具通阳散寒、降逆平冲之功, 故选 C。

9. A. 决定方剂功用、主治的主要因素是药物。

10. A. 真武汤为温阳利水之剂, 主治肾阳虚弱、水气为患所致腹痛下利诸证。《神农本草经》云: “芍药主邪气腹痛……止痛, 利小便。”本方配伍芍药, 既取其敛阴缓急而止腹痛, 兼取其利小便以助渗湿而除水患。所以 A 为最佳选择。

11. C. 银翘散组成: 金银花、连翘、苦桔梗、薄荷、竹叶、荆芥穗、淡豆豉、牛蒡子、芦根、甘草, 桑菊饮组成: 桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷、桔梗、生甘草、芦根。均含有连翘、薄荷、芦根。

12. C. 旋覆代赭汤原方主治云: “伤寒发汗, 若吐若下, 解后, 心下痞硬, 噎气不除者, 旋覆代赭汤主之。”伤寒之邪, 虽经发汗或吐、下而解, 但治不如法, 胃气已伤。中气既伤, 运化失健, 痰浊内生, 遂成胃虚痰阻, 气逆不降, 心下痞硬, 噎气不除之证。故 C 为正确。

13. B. 阴阳之间如果出现了平衡失调就会发生疾病。阴阳偏衰时机体就出现虚证的表现, 根据“虚则补之”, 即补其不足的治疗原则, 应采用补的方法进行治疗。分而言之, 阴偏衰产生的是“阴虚则热”的虚热证, 治疗当滋阴制阳, 用“壮水之主, 以制阳光”的治法进行治疗, 故本题选 B。

14. E. 《素问·厥论》云: “阳气衰于下, 则为寒厥。”寒邪深入少阴, 症见恶寒蜷卧, 神疲欲寐, 吐泻腹痛, 肢厥脉微者, 不仅肾阳衰微, 心脾之阳亦衰, 其阴寒独盛之危候。此际, 非大剂辛热不足以破阴回阳而救逆。回阳救急汤以大剂辛热与甘温益气之品同用, 脾肾同健, 破阴回阳, 有回阳救急、益气生脉之功, 于阴寒极盛、阳欲脱之证最宜, 所以 E 为最佳选项。理中丸为温中祛寒, 补气健脾之剂, 只宜于中焦虚寒, 吐利腹痛, 苔白脉迟

之证，用于寒厥则力弗能及。至于温阳补水之真武汤，透邪解郁、疏理肝脾之四逆散（主治热厥轻症），温经散寒、养血通脉之当归四逆汤（主治寒伤经脉，手足厥寒），均非治疗寒厥的方剂，所以 A、B、C、D 均非正确。

15. D。十二经脉的功能反应于体表的是十二皮部。故本题选 D。

16. B。十二经脉通过经别、经别、别络互相沟通，组成六对表里相合的关系，即：足太阳与足少阴互为表里，足少阳与足厥阴互为表里，足阳明与足太阴互为表里，手太阳与手少阴互为表里，手少阳与手厥阴互为表里，手阳明与手太阴互为表里。

17. C。目眩指病人自觉视物旋转动荡，如坐舟车，或眼前如有蚊蝇飞动的症状；目昏指视物昏暗、模糊不清的症状；目痒指自觉眼睑、眦内、目珠瘙痒的症状；雀目指白昼视力正常，每至黄昏以后视力减退、视物不清的症状；内障指有翳在黑暗内遮瞳子而言。故本题选 C。

18. C。瘀血的形成主要有两个方面：一是因气虚、气滞、血寒、血热等原因，使血行不畅而凝滞。气为血帅，气虚或气滞，不能推动血液的正常运行；或寒邪客入血脉，使经脉挛缩拘急，血液凝滞不畅；或热入营血，血热搏结等，均可形成瘀血。二是由于内外伤、气虚失摄或血热妄行等原因造成血离经脉，积存于体内形成瘀血。饮食偏嗜一般不会导致瘀血。故选 C。

19. C。咽部红肿，溃烂成片或凹陷属于肺胃火毒壅盛所致。肺胃热轻，咽喉腐烂表浅。肺胃热盛，咽喉腐烂，周围红肿。阴虚火旺多表现为咽部嫩红或淡红，肿痛不明显。

20. C。疾病的发生与内外环境都有着密切的关系。外环境，主要指生活、工作环境，包括气候变化、地理特点、环境卫生等等。内环境，主要是指人体本身的正气。正气强弱则与体质和精神状态有关。精神状态受情志因素的直接影 响，情志舒畅，精神愉快，则气机畅通，气血调和，脏腑功能协调，则正气旺盛。

21. C。甘遂性味：性寒，味苦；有毒。功能主治：泻水逐饮。用于水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚、气逆喘咳、二便不利。苦寒性降可单用研末服，不宜入煎剂，多入丸、散剂。其他选项可以入煎剂，也可以入丸、散剂。

22. C。阴寒之邪壅盛，日久必伤阳气，故阴盛

实寒病证，常可导致虚衰，出现机体生理功能活动减退情况，此即“阴胜则阳病”。其余答案中的“阴”均为“阴液”之意。

23. D。普通型流脑的典型临床特点为高热、头痛、皮肤黏膜瘀斑、脑膜刺激征阳性。低热、头痛、皮肤黏膜瘀点为轻型流脑临床特点。高热、循环衰竭、皮肤黏膜大片瘀斑为休克型流脑临床特点。高热，皮肤、黏膜瘀斑，昏迷，呼吸衰竭为脑膜脑炎型流脑临床特点。间歇性发热、反复皮肤瘀点、血培养可阳性为慢性败血症型流脑临床特点。

24. C。暑邪炎热升散，为病必见热象，最易耗气伤津，且多挟湿，常与湿邪相混成病，故可见发热、恶热，汗出，因其耗气故气短神疲。选 C。头昏沉，嗜睡，胸脘痞闷是湿淫证候；口渴饮水，口唇鼻咽干燥是燥淫证候；突发皮肤瘙痒、丘疹是风淫证候；肠鸣腹泻，脘腹拘急冷痛是寒淫证候。

25. A。1997 年 1 月 15 日，中共中央、国务院下达《关于卫生改革与发展的决定》明确指出：“新时期卫生工作方针是：以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技与教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”。故选 A。

26. A。甲状腺激素有促进新陈代谢的作用，使机体耗氧量和产热量增加，基础代谢率增高，引起体温升高。

27. B。卫生法中的行政处罚是国家特定行政主管机关（如县级以上人民政府卫生行政部门、工商管理机关、药品监督管理部门等）依法惩戒违法失职的个人、组织的一种行政行为，属于行政制裁，具有强制性。卫生行政主管机关是县级以上的卫生行政管理部门，故选 B。

28. A。肝细胞性黄疸是由各种肝病如病毒性肝炎、肝硬化、肝癌以及其他原因如钩端螺旋体病、败血症等，可因肝细胞广泛受损而引起的黄疸，皮肤和巩膜呈浅黄至深黄色，皮肤有时有瘙痒。血清总胆红素升高，其中以结合胆红素升高为主。尿中胆红素阳性，尿胆原常增加，同样粪中尿胆原含量可正常、减少或缺如。

29. A。《执业医师法》规定：对考核不合格的医师，县级以上人民政府卫生行政部门可以责令其暂停执业活动三个月至六个月，并接受培训和继续医学教育。暂停执业活动期满，再次进行考核，对考核合格的，允许其继续执业；对考核不合格的，