

● 传承千年的医药生活 呵护健康的知识源泉

主编 ◆ 林余霖 李葆莉

精编本草纲目

JingBian BenCao GangMu
YuanSe TuPu

原色图谱



中国医药学源远流长，是华夏文明宝库中一颗璀璨的明珠，随着人们对于自身保健意识的不断增强，中医药以其独特的疗效越来越多地被世人所认知，越来越多的人投身到中医药的世界里来。无病防病，有病治病，中医药在这些过程中越来越显示出优势，引起了全世界的重视。



中医古籍出版社


Publiclone House of Ancient Chinese Medical Books

精编本草纲目

◎主编 林余霖 李葆莉

原色图谱

中医古籍出版社



图书在版编目(CIP)数据

精编本草纲目原色图谱 / 林余霖, 李葆莉主编. —北京 :

中医古籍出版社, 2016. 10

ISBN 978 - 7 - 5152 - 1322 - 4

I. ①精… II. ①林… ②李… III. ①《本草纲目》
-图谱 IV. ①R281. 3-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第200216号

精编本草纲目原色图谱

主 编：林余霖 李葆莉

责任编辑：赵东升

封面设计：许永恺

出版发行：中医古籍出版社

社 址：北京市东直门内南小街16号（100700）

印 刷：北京彩虹伟业印刷有限公司

发 行：全国新华书店发行

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：14

字 数：300千字

版 次：2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷

书 号：ISBN 978 - 7 - 5152 - 1322 - 4

定 价：69.00元



前言

《本草纲目》是我国明代著名医学家李时珍汇集历代中药著作之精华，更是集中国古代医学所取得的最高成就为一体。同时对所涉及的相关生物、化学、天文、地理、地质、矿物、冶金等领域也有突出的贡献，被英国生物学家达尔文誉为“中国的百科全书”。

为继承发扬中医药的精华，开发利用药物资源，方便百姓使用，我们以《本草纲目》为基础，组织知名专家编写了《精编本草纲目原色图谱》一书。

本书从当代用药的实际出发，以临床常用中成药为基础，以地区优势特色药物为延伸，精选出340余味常用药物。全书按笔画分类进行编排，主要内容由文字说明和中药材原植物图片组成，准确地展现了药物形态特征。文字部分系统地介绍了每味药物的名称、别名、基源、形态特征、生境分布、采收加工、性味归经、功能主治、用量用



法、配伍应用、注意事项。其中选方部分以简明实用为原则，以传统经典名方、临床有效单方和验方为主要来源，以满足广大读者自我治疗和健康保健的需求。

本书既有科学性，又有实用性，既是从事医疗、教学、科学人员的案头必备之书，也是广大中医药爱好者和寻求治病保健人群的自学参考书籍。

本书在编写过程中得到了中国医学科学院药用植物研究所知名专家的大力支持，在此深表感谢！由于时间所限，本书难免有不足之处，敬请广大读者多加指正，以便及时修订。

编者

目 录

一枝黄花 Yi Zhi Huang Hua	1	大枫子 Da Feng Zi	15
丁 香 Ding Xiang	1	大青叶 Da Qing Ye	16
九节茶 Jiu Jie Cha	2	大腹皮 Da Fu Pi	17
九里香 Jiu Li Xiang	3	女贞子 Nü Zhen Zi	18
九香虫 Jiu Xiang Chong	3	小 薊 Xiao Ji	18
人 参 Ren Shen	4	小飞扬草 Xiao Fei Yang Cao	19
儿 茶 Er Cha	5	小茴香 Xiao Hui Xiang	19
八角枫 Ba Jiao Feng	6	山 奈 Shan Nai	20
八角莲 Ba Jiao Lian	6	山 药 Shan Yao	21
万年青根 Wan Nian Qing Gen	7	山 楂 Shan Zha	21
刀 豆 Dao Dou	7	山豆根 Shan Dou Gen	22
三 七 San Qi	8	山茱萸 Shan Zhu Yu	22
三白草 San Bai Cao	9	山茶花 Shan Cha Hua	23
三颗针 San Ke Zhen	9	山慈姑 Shan Ci Gu	24
千年健 Qian Nian Jian	10	川 乌 Chuan Wu	25
千里光 Qian Li Guang	11	川 莪 Chuan Xiong	25
千金子 Qian Jin Zi	11	川牛膝 Chuan Niu Xi	26
土茯苓 Tu Fu Ling	12	川贝母 Chuan Bei Mu	26
土荆皮 Tu Jing Pi	12	川楝子 Chuan Lian Zi	27
大 枣 Da Zao	13	干 姜 Gan Jiang	28
大 黄 Da Huang	14	马齿苋 Ma Chi Xian	28
大 蒜 Da Suan	14	马钱子 Ma Qian Zi	29
大 薤 Da Ji	15	马兜铃 Ma Dou Ling	29

马鞭草 Ma Bian Cao	30	水 萝 Shui Liao	48
丹 参 Dan Shen	30	水牛角 Shui Niu Jiao	48
乌 药 Wu Yao	31	水苦荬 Shui Ku Mai	49
乌 梅 Wu Mei	31	火炭母草 Huo Tan Mu Cao	49
乌骨鸡 Wu Gu Ji	32	火麻仁 Huo Ma Ren	50
乌柏根皮 Wu Jiu Gen Pi	32	牛 黄 Niu Huang	51
乌梢蛇 Wu Shao She	33	牛 膝 Niu Xi	51
乌蔹莓 Wu Lian Mei	34	牛蒡子 Niu Bang Zi	52
五加皮 Wu Jia Pi	34	王不留行 Wang Bu Liu Xing	53
五味子 Wu Wei Zi	35	车前子 Che Qian Zi	53
五倍子 Wu Bei Zi	35	丝瓜络 Si Gua Luo	54
凤仙花 Feng Xian Hua	36	仙 茅 Xian Mao	54
凤尾草 Feng Wei Cao	36	冬虫夏草 Dong Chong Xia Cao	55
凤凰衣 Feng Huang Yi	37	仙鹤草 Xian He Cao	55
升 麻 Sheng Ma	38	冬葵子 Dong Kui Zi	56
天 冬 Tian Dong	38	北沙参 Bei Sha Shen	57
天 麻 Tian Ma	39	半 夏 Ban Xia	57
天仙子 Tian Xian Zi	39	半边莲 Ban Bian Lian	58
天花粉 Tian Hua Fen	40	半枝莲 Ban Zhi Lian	58
天竺黄 Tian Zhu Huang	41	四季青 Si Ji Qing	59
天南星 Tian Nan Xing	41	玄 参 Xuan Shen	59
天葵子 Tian Kui Zi	42	玉 竹 Yu Zhu	60
太子参 Tai Zi Shen	42	玉米须 Yu Mi Xu	61
巴 豆 Ba Dou	43	瓜 萎 Gua Lou	61
巴戟天 Ba Ji Tian	43	甘 松 Gan Song	62
无花果 Wu Hua Guo	44	甘 草 Gan Cao	62
月见草 Yue Jian Cao	45	生 姜 Sheng Jiangang	63
木 瓜 Mu Gua	45	生地黄 Sheng Di Huang	64
木 香 Mu Xiang	46	白 及 Bai Ji	64
木 贼 Mu Zei	46	白 术 Bai Zhu	65
木槿皮 Mu Jin Pi	47	白 茯 Bai Shao	65

白 果 Bai Guo	66	红旱莲 Hong Han Lian	86
白 薇 Bai Wei	66	红景天 Hong Jing Tian	86
白头翁 Bai Tou Weng	67	羊 肉 Yang Rou	87
白豆蔻 Bai Dou Kou	68	羊 蹄 Yang Ti	87
白附子 Bai Fu Zi	68	肉 桂 Rou Gui	88
白茅根 Bai Mao Gen	69	肉苁蓉 Rou Cong Rong	89
白扁豆 Bai Bian Dou	70	肉豆蔻 Rou Dou Kou	90
石 韦 Shi Wei	70	西瓜皮 Xi Gua Pi	90
石 钩 Shi Hu	71	西洋参 Xi Yang Shen	91
石决明 Shi Jue Ming	72	防 己 Fang Ji	92
石菖蒲 Shi Chang Pu	73	防 风 Fang Feng	92
石榴皮 Shi Liu Pi	73	两面针 Liang Mian Zhen	93
艾 叶 Ai Ye	74	何首乌 He Shou Wu	93
龙 骨 Long Gu	74	佛 手 Fo Shou	94
龙眼肉 Long Yan Rou	75	吴茱萸 Wu Zhu Yu	95
关木通 Guan Mu Tong	76	杜 衡 Du Heng	95
冰 片 Bing Pian	76	沉 香 Chen Xiang	96
决明子 Jue Ming Zi	77	沙苑子 Sha Yuan Zi	97
合欢皮 He Huan Pi	78	灵 茗 Ling Zhi	97
地 龙 Di Long	78	牡 蛤 Mu Li	98
地 榆 Di Yu	79	牡丹皮 Mu Dan Pi	99
地肤子 Di Fu Zi	80	皂 荚 Zao Jia	99
地骨皮 Di Gu Pi	80	皂角刺 Zao Jiao Ci	100
当 归 Dang Gui	81	羌 活 Qiang Huo	101
朱 砂 Zhu Sha	82	芦 荟 Lu Hui	101
毕澄茄 Bi Cheng Qie	82	花 椒 Hua Jiao	102
灯心草 Deng Xin Cao	83	苍 术 Cang Zhu	102
百 合 Bai He	84	苍耳子 Cang Er Zi	103
竹 叶 Zhu Ye	84	苏 木 Su Mu	104
红 花 Hong Hua	85	补骨脂 Bu Gu Zhi	104
红 豆 Hong Dou	85	诃 子 He Zi	105

谷精草	Gu Jing Cao	105
赤小豆	Chi Xiao Dou	106
远志	Yuan Zhi	106
连翘	Lian Qiao	107
阿胶	E Jiao	108
附子	Fu Zi	108
鸡内金	Ji Nei Jin	109
鸡血藤	Ji Xue Teng	110
鸡冠花	Ji Guan Hua	110
鸡眼草	Ji Yan Cao	111
麦冬	Mai Dong	111
龟板	Gui Ban	112
京大戟	Jing Da Ji	112
侧柏叶	Ce Bai Ye	113
刺蒺藜	Ci Ji Li	114
板蓝根	Ban Lan Gen	115
枇杷叶	Pi Pa Ye	115
泥鳅	Ni Qiu	116
泽兰	Ze Lan	117
泽泻	Ze Xie	117
知母	Zhi Mu	118
罗汉果	Luo Han Guo	118
苦瓜	Ku Gua	119
苦参	Ku Shen	120
苦楝皮	Ku Lian Pi	120
茉莉花	Mo Li Hua	121
虎杖	Hu Zhang	121
虎耳草	Hu Er Cao	122
贯众	Guan Zhong	122
金荞麦	Jin Qiao Mai	123
金盏菊	Jin Zhan Ju	124
金钱草	Jin Qian Cao	124
金银花	Jin Yin Hua	125
金樱子	Jin Ying Zi	125
降香	Jiang Xiang	126
青皮	Qing Pi	126
青蒿	Qing Hao	127
青木香	Qing Mu Xiang	127
青风藤	Qing Feng Teng	128
鱼腥草	Yu Xing Cao	129
前胡	Qian Hu	129
南瓜子	Nan Gua Zi	130
南沙参	Nan Sha Shen	131
姜黄	Jiang Huang	132
枳实	Zhi Shi	133
枸杞	Gou Qi	133
柳叶	Liu Ye	134
栀子	Zhi Zi	134
洋金花	Yang Jin Hua	135
独活	Du Huo	136
砂仁	Sha Ren	136
穿山甲	Chuan Shan Jia	137
穿心莲	Chuan Xin Lian	138
胖大海	Pang Da Hai	138
胡荽	Hu Sui	139
胡椒	Hu Jiao	140
胡桃仁	Hu Tao Ren	140
茜草	Qian Cao	141
茵陈蒿	Yin Chen Hao	141
草石蚕	Cao Shi Can	142
草豆蔻	Cao Dou Kou	143
荜茇	Bi Ba	144

荞 麦	Qiao Mai	144	通 草	Tong Cao	163
芥 菜	Ji Cai	145	铁 茄 菜	Tie Xian Cai	164
钩 藤	Gou Tehg	146	鸭 跖 草	Ya Zhi Cao	165
韭 菜 子	Jiu Cai Zi	146	商 陆	Shang Lu	165
香 附	Xiang Fu	147	啤 酒 花	Pi Jiu Hua	166
骨 碎 补	Gu Sui Bu	147	接 骨 木	Jie Gu Mu	166
鬼 针 草	Gui Zhen Cao	148	淡 竹 叶	Dan Zhu Ye	167
鸦 胆 子	Ya Dan Zi	149	淫 羊 蕺	Yin Yang Huo	168
党 参	Dang Shen	150	猕 猴 桃	Mi Hou Tao	169
夏 枯 草	Xia Ku Cao	150	猪 苓	Zhu Ling	169
射 干	She Gan	151	猫 爪 草	Mao Zhua Cao	170
柴 胡	Chai Hu	151	续 断	Xu Duan	171
桂 枝	Gui Zhi	152	菊 花	Ju Hua	172
桑 叶	Sang Ye	152	菝 蕺	Ba Qia	172
桑 槲	Sang Shen	153	菟 丝 子	Tu Si Zi	173
桑 寄 生	Sang Ji shen	154	蛇 蜕	She Tui	174
桔 梗	Jie Geng	154	蛇 床 子	She Chuang Zi	174
梧 桐 子	Wu Tong Zi	155	野 菊 花	Ye Ju Hua	175
浙 贝 母	Zhe Bei Mu	156	银 耳	Yin Er	175
海 马	Hai Ma	156	银 柴 胡	Yin Chai Hu	176
海 藻	Hai Zao	157	雪 上 一 枝 蒿	Xue shang Yi Zhi Hao	177
海 风 藤	Hai Feng Teng	158	雪 莲 花	Xue Lian Hua	177
益 母 草	Yi Mu Cao	158	鸽	Ge	178
益 智 仁	Yi Zhi Ren	159	鹿 角	Lu Jiao	179
秦 皮	Qin Pi	159	鹿 茸	Lu Rong	179
秦 茄	Qin Jiao	160	麻 雀	Ma Que	180
荷 叶	He Ye	161	麻 黄	Ma Huang	181
荸 莺	Bi Qi	161	黄 瓜	Huang Gua	181
莪 术	E Zhu	162	黄 苓	Huang Qin	182
莲 子	Lian Zi	162	黄 茜	Huang Qi	182
透 骨 草	Tou Gu Cao	163	黄 连	Huang Lian	183

黄 柏 Huang Bo	184	蜈 蚣 Wu Gong	199
黄 精 Huang Jing	184	蜗 牛 Wo Niu	199
黄荆子 Huang Jing Zi	185	蜣 蠼 Qiang Lang	200
景 天 Jing Tian	186	路 路 通 Lu Lu Tong	200
款冬花 Kuan Dong Hua	186	酸 枣 仁 Suan Zao Ren	201
番泻叶 Fan Xie Ye	187	樟 脑 Zhang Nao	201
硫 磺 Liu Huang	187	雷 公 藤 Lei Gong Teng	202
紫 苏 Zi Su	188	薔 薇 花 Qiang Wei Hua	203
紫 菀 Zi Wan	189	蝉 蜕 Chan Tui	203
紫 菜 Zi Cai	189	樱 桃 Ying Tao	204
紫苏子 Zi Su Zi	190	鶴 鹤 An Chun	205
紫荆皮 Zi Jing Pi	191	榛 子 Zhen Zi	205
腊梅花 La Mei Hua	191	槟 榴 Bin Lang	206
葛 根 Ge Gen	192	罂粟壳 Ying Su Ke	207
葫 芦 Hu Lu	192	蔓 荆 子 Man Jing Zi	207
蛤 蛤 Ge Jie	193	橄 榄 Gan Lan	208
锁 阳 Suo Yang	193	熟 地 黄 Shu Di Huang	208
鹅不食草 E Bu Shi Cao	194	蕲 蛇 Fu She	209
黑木耳 Hei Mu Er	195	壁 虎 Bi Hu	209
黑芝麻 Hei Zhi Ma	195	橘 皮 Ju Pi	210
椿 皮 Chun Pi	196	燕 窝 Yan Wo	211
蒲公英 Pu Gong Ying	197	薄 荷 Bo He	211
蓖 麻 子 Bi Ma Zi	197	薏苡仁 Yi Yi Ren	212
蜂 房 Feng Fang	198		

一枝黄花 Yi Zhi Huang Hua

基 源 本品为菊科多年生草本植物一枝黄花的全草或带根全草。

植物形态 多年生草本，高35~100厘米。茎直立，通常细弱，单生或少数簇生，不分枝或中部以上有分枝。中部茎叶椭圆形、长椭圆形、卵形或宽披针形，长2~5厘米，宽1~1.5厘米，下部楔形渐窄，有具翅的柄，仅中部以上边缘有细齿或全缘；向上叶渐小；下部叶与中部茎叶同形，有长2~4厘米或更长的翅柄。全部叶质地较厚，叶两面、沿脉及叶缘有短柔毛或下面无毛。头状花序较小，长6~8毫米，宽6~9毫米，多数在茎上部排列成紧密或疏松的长6~25厘米的总状花序或伞房圆锥花序，少有排列成复头状花序的。总苞片4~6层，披针形或披针形，顶端急尖或渐尖，中内层长5~6毫米。舌状花舌片椭圆形，长6毫米。瘦果长3毫米，无毛，极少有在顶端被稀疏柔毛的。花果期4~11月。

生境分布 生长于阔叶林缘、林下、灌丛中、山坡草地上及路边。分布于全国大部分地区。

采收加工 夏、秋两季采收。



性味归经 辛、苦，凉；有小毒。归肝、胆经。

功能主治 疏风清热，消肿解毒。本品性凉则清热解毒，辛散则有疏风之能。

用量用法 9~15克，鲜品21~30克，煎服。外用：捣敷或煎水洗。

配伍应用 ①慢性支气管炎：一枝黄花全草（干）50克或（鲜）100克，水煎服，每日1剂，10日为1个疗程，连服2~3个疗程。②外伤出血：以一枝黄花晒干研末，撒于伤口；同时内服，每次5~10克。

丁 香 Ding Xiang

别 名 公丁香、丁子香、母丁香。

基 源 为桃金娘科植物丁香的干燥花蕾。

植物形态 常绿乔木，高达12米。单叶对生，革质，卵状长椭圆形至披针形，长5~12厘米，宽2.5~5厘米，先端尖，全缘，基部狭窄，侧脉平行状，具多数透明小油点。花顶生，复聚伞花序；萼筒先端4裂，齿状，肉质。花瓣紫红色，短管状，具4裂片，雄蕊多数，成4束与萼片互生，花丝丝状；雄蕊1枚，子房下位，2室，具多数胚珠，花柱锥状，细长。浆果椭圆形，长2.5厘米，红棕色。顶端有宿萼。稍似鼓槌状，长1~2厘米，上端蕾近似球形，下端萼





部类圆柱形而略扁，向下渐狭。表面呈红棕色或暗棕色，有颗粒状突起，用指甲刻划时有油渗出。萼片4，三角形，肥厚，外入，花瓣4，膜质，黄棕色，覆瓦状抱合成球形，花瓣内有多数向内弯曲的雄蕊。质坚而重，入水则萼管垂直下沉。香气浓郁，味辛辣，后有微麻舌感。

生境分布 生长于路边、草坪或向阳坡地或其他花木搭配栽植在林缘。主要分布于坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚，我国海南省也有栽培。

采收加工 于9月至次年3月，花蕾由绿转红时采收，晒干。

性味归经 辛，温。归脾、胃、肾经。

功能主治 温中降逆，散寒止痛，温肾助阳。本品辛散温通，入脾胃，温中焦降胃气，寒凝散而疼痛止；入肾经，温下焦而助肾阳。故有温中降逆，散寒止痛，温肾助阳之效。

用量用法 1.5~6克，煎服，或入丸、散。

配伍应用 ①慢性胃炎呕吐：丁香、柿蒂各3克，党参12克，生姜6克，水煎服。②头痛：公丁香3粒，细辛0.9克，瓜蒂7个，赤小豆7粒，冰片0.2克，麝香0.1克，共为细末，取黄豆大药末放入患侧鼻腔。③妊娠剧吐：丁香15克，半夏20克，共为细末，以生姜30克煎浓汁调成糊状，取适量涂敷脐部并用胶布固定。1日后呕吐渐止，再敷3日纳食如常。

九节茶 Jiu Jie Cha

别名 观音茶、肿节风、接骨茶、草珊瑚。

基源 本品为金粟兰科常绿亚灌木植物接骨金粟兰的枝叶。

植物形态 常绿亚灌木，茎高70~100厘米，绿色，无毛，节膨大，节间有纵行的脊和沟。叶对生，革质，卵状长圆形至披针状长圆形，长6~16厘米，宽3~7厘米，先端渐尖，基部尖或楔形，边缘除基部外有粗锯齿，齿端为硬骨质；叶柄长0.5~1.5厘米，无毛；托叶鞘状。花小，黄绿色，单性，雌雄同株；雌雄花合生，生于一极小的苞片的腋内，组成顶生短穗状花序；雄蕊1，药隔膨大成卵形，花药2室；子房1，卵形，柱头无柄。核果球形，直径约3毫米，熟时红色。花期6月，果期8~9月。

生境分布 生长于丛林阴湿处。分布于四川、湖南、广东、广西等地。

采收加工 夏季采收。除去杂质，晒干。

性味归经 辛，平。有小毒。

功能主治 清热解毒，祛风除湿，活血止痛。

用量用法 6~15克，煎服或浸酒服。外用：捣敷或煎水熏洗。

配伍应用 ①各种炎症性疾病（如肺炎、急性



阑尾炎、急性胃肠炎、细菌性痢疾、脓肿等）：通常采用口服煎剂，每日100克，分3次服。或全草加工制成注射液，每2毫升含生药2克或4克，每次肌肉注射1~4克，每日4次，连续2~3日或更长时间。对球菌和杆菌均有较高的抑制作用。②丝虫病：用浓度1:3的注射液，成人每日肌注2~4毫升，7日为1个疗程；疗程结束后3日以上血检未转阴者，再给第2~3个疗程。

九里香 Jiu Li Xiang

别名 千里香、满山香、过山香。

基源 本品为芸香科植物九里香的枝叶。

植物形态 九里香有时可长成小乔木样。株姿优美，枝叶秀丽，花香浓郁。嫩枝呈圆柱形，直径1~5毫米，表面灰褐色，具纵皱纹。质坚韧，不易折断，断面不平坦。羽状复叶有小叶3~9片，多已脱落；小叶片呈倒卵形或近菱形，最宽处在中部以上，长约3厘米，宽约1.5厘米；先端钝，急尖或凹入，基部略偏斜，全缘；黄绿色，薄革质，上表面有透明腺点，小叶柄短或近无柄，下部有时被柔毛。盆栽株高1~2米，多分枝，直立向上生长。干皮灰色或淡褐色，常有纵裂。奇数羽状复叶互生，小叶3~9枚，互生，卵形、匙状倒卵形或近菱形，全缘，浓绿色有光泽。聚伞花序，花白色，径约4厘米，花期7~10月。浆果近球形，肉质红色，果熟期10月至翌年2月。果实气香，味苦、辛，有麻舌感。

生境分布 性喜温暖、湿润气候，要求阳光充足、土层深厚、肥沃及排水良好的土壤，不耐寒。分布于广东、广西、福建等地。



采收加工 全年可采，晒干，切段。

性味归经 辛、苦，温。归心、肝、肺、胃经。

功能主治 行气活血，祛风除湿，止痛。本品辛行散，苦燥泄，温通胜寒而香窜，故有行气活血，祛风除湿，止痛之效。

用量用法 10~15克，煎服；或浸酒服。外用：适量捣敷或煎水洗涂。

九香虫 Jiu Xiang Chong

别名 九香虫。

基源 本品为蜻科昆虫九香虫的全虫。

形态特征 全体椭圆形，长1.7~2.2厘米，宽1~1.2厘米，体一般紫黑色，带铜色光泽，头部、前胸背板及小盾片较黑。头小，略呈三角形；复眼突出，呈卵圆形，位于近基部两侧；单眼1对，橙黄色；喙较短，触角5节，第1节较粗，圆筒形，其余4节较细长而扁，第2节长于第3节。前胸背板前狭后阔，九香虫前缘凹进，后缘略拱出，中部横直，侧角显著；表面密布细刻点，并杂有黑皱纹，前方两侧各有1相当大





的眉形区，色泽幽暗，仅中部具刻点。小盾片大。翅2对，前翅为半鞘翅，棕红色，内翅为膜质，纵脉很密。足3对，后足最长，跗节3节。腹面密布细刻及皱纹，后胸腹板近前缘区有2个臭孔，位于后足基前外侧，能由此放出臭气。雄虫第9节为生殖节，其端缘弧形，中央尤为弓凸。

生境分布 此虫以成虫越冬，隐藏于石隙间。分布于云南、贵州、四川、广西等地。

采收加工 11月至次年3月前捕捉，置适宜容器内，用酒少许将其闷死，取出阴干。或置沸水中烫死，取出，干燥。

性味归经 咸，温。归肝、脾、肾经。

功能主治 理气止痛，温肾助阳。本品以温为用，可温通肝脾气滞，又能温肾，故有理气止痛，温肾助阳之效。

用量用法 3~10克，煎服。

临床应用 ①血管瘤：九香虫若干只，盛于纸盒或瓶中备用。用时取镊子2把，1把夹住虫体前半部，另1把夹破虫体尾部，挤出其腹腔内容物，涂在血管瘤上，视其大小而定，涂布均匀为度。每日3~4次，连用数日。②急慢性腰肌劳损：九香虫、陈皮各适量，水煎服。

人 参 Ren Shen

别 名 力参、红参、参须、生晒参、边条参、高丽参、白糖参、人参水子（鲜品）。

基 源 本品为五加科植物人参的干燥根。

植物形态 多年生草本，根状茎（芦头）短，上有茎痕（芦碗）和芽苞；茎单生，直立，高40~60厘米。叶为掌状复叶，2~6枚轮生茎顶，小叶3~5，中部的1片最大，卵形或椭圆形，基部楔形，先端渐尖，边缘有细尖锯齿，上面沿中脉疏被刚毛。伞形花序顶生，花小，花被钟形；花瓣淡黄绿色。浆果状核果扁球形或肾形，成熟时鲜红色，扁圆形，黄白色。

生境分布 生长于昼夜温差小的海拔500~1100米山地缓坡或斜坡地的针阔混交林或杂木林中。分布于吉林、辽宁、黑龙江。以吉林抚松县产量最大，质量最好，称吉林参。野生者名“山参”；栽培者称“园参”。

采收加工 多于秋季9月间挖取生长5~7年的圆参根部，洗净干净，为圆参水子。山参于7月下旬至9月间果实成熟时采挖。用骨针拨开泥土，小心挖取，尽可能保持支根部和须根完整，去净泥土、茎叶，称野山参水子。将圆参剪去小支根，硫磺熏后晒干，即为生晒参；如不去小支根晒干，为全须生晒参；小支根及须根晒干，称白参须。圆参去支根及须根，洗



净，蒸2~3小时，至参根呈黄色，皮呈半透明状，取出晒干或烘干，为红参；其中带有较长支根者又称边条红参。剪下的支根和须根如上法蒸熟并干燥即为红参须。将洗净的圆参置沸水中浸泡3~7分钟，捞出，再入凉水中浸泡10分钟左右，取出晒干，再经硫磺熏过，然后用特制的针沿参体平行及垂直的方向扎小孔，浸于浓糖汁中24小时。取出后曝晒1天，再用湿毛巾打潮，使其软化，进行第二次扎孔，浸于浓糖汁中24小时。取出后，冲去浮糖，晒干或烤干，为糖参。鲜山参不去支根，极为精细地将整体晒干，即生晒山参。掐皮参加工方法与糖参相似。大力参为鲜参在沸水中浸片刻后晒干。

性味归经 甘、微苦，微温。归脾、肺、心经。

功能主治 大补元气，补脾益肺，生津止渴，

安神增智。本品甘重于苦，温而不燥。甘温主补，大补元气，为补虚扶正要药。入太阴补脾气，脾气旺则生气化血，血充则神宁，气旺则智聪。入肺经，补肺气，肺气旺则其他四脏元气皆旺，精自生，形自盛，水津四布，阳生阴长故有生津止渴之功。为虚劳内伤第一要药。

用量用法 5~10克，小火另煎兑服。研末吞服，每次1.5~2克，每日1~2次。用于急救15~30克，煎浓汁，数次灌服。野山参功效最

优；圆参作用较弱；生晒参适于气阴不足者；红参偏温，适于气弱阳虚者；白糖参同生晒参而力弱。

配伍应用 ①元气虚脱证：单用有效，如独参汤（《景岳全书》）。②气虚欲脱兼见汗出，四肢逆冷者：与附子同用，以补气固脱与回阳救逆，如参附汤（《正体类要》）。③气虚欲脱兼见汗出身暖，渴喜冷饮，舌红干燥者：与五味子、麦冬配伍，以补气养阴，敛汗固脱，如生脉散（《内外伤辨惑论》）。

儿 茶 Er Cha

别 名 孩儿茶、乌爹泥。

基 源 本品为豆科植物儿茶的去皮枝、干的干燥煎膏。

植物形态 落叶乔木，皮棕色或灰棕色，常呈条状薄片开裂，不脱落，小枝细，有棘刺。叶为偶数2回羽状复叶，互生。总状花序腋生，花黄色或白色。荚果扁而薄，紫褐色，有光泽，有种子7~8枚。


生境分布 生长于向阳坡地。分布于云南西双版纳傣族自治州，广西等地也有栽培。另一种为茜草科常绿藤本植物儿茶钩藤的带叶嫩枝煎汁浓缩而成，称方儿茶、棕儿茶。分布于印度尼西亚及中南半岛诸国。

采收加工 儿茶膏：一般在12月至翌年3月，采收儿茶的枝干，剥去外皮，砍成碎片，加水煎熬后，过滤，浓缩成糖浆状，冷却，倾于特制的模型中，干后即成。方儿茶：割取儿茶钩藤的带叶小枝，入铜锅内，加水煮沸6~8小时，并经常搅拌。使叶破碎，待叶变黄色时，取出枝叶，将浸出液过滤后，浓缩成糖浆状，倾入木盘中，待冷却凝固，切成方块状，干燥即成。

性味归经 苦、涩，凉。归肺经。

功能主治 收湿敛疮，生肌止血，清热化痰。本品苦涩，能燥湿敛疮而用于湿疮、溃疡等证，又能收敛止血用于各种出血证。本品性凉归肺经，故可清肺化痰，用于肺热咳嗽。

用量用法 1~3克，内服：多入丸、散，煎汤



可适当加量。外用：适量，研末撒或调敷。

配伍应用 ①外伤出血：与血竭、白及、降香、龙骨等同用，如止血散（《实用正骨学》）。②内伤出血，如吐血、便血、崩漏等：可单用内服；也可配虎杖、大黄等同用。③诸疮溃烂，久不收口：可与冰片、乳香、血竭、没药、龙骨等同用，研末外敷，如腐尽生肌散（《医宗金鉴》）。

八角枫 Ba Jiao Feng

基 源 本品为八角枫科植物八角枫或瓜木的根、须根、根皮、叶和花。

植物形态 落叶乔木，高达15米，胸径4厘米。常成灌木状。树皮淡灰色、平滑，小枝呈“之”字形曲折，疏被毛或无毛。叶柄下芽，红色。单叶互生，卵圆形，基部偏斜。全缘或微浅裂，表面无毛，背面脉腋簇生毛，基出脉3~5，入秋叶转为橙黄色。花为黄白色，花瓣狭带形，有芳香，花丝基部及花柱疏生粗短毛。核果卵圆形，黑色。花期5~7月，果期9~10月。

生境分布 分布于我国南北各省（区）。

采收加工 全年各季均可采集其根，但以秋季药效成分含量最高。支根、根皮和须根分别晒干。夏秋两季采集叶，春夏之交采集其花，采后晒干或鲜用。

性味归经 辛，温；有毒。归心、肝经。



功能主治 祛风，活血，通络，止痛。主治风湿筋骨疼痛，跌打损伤。

用量用法 根、茎枝、树皮6~12克，须根15~3克，煎服；作散剂内服当减量。外用：适量。

配伍应用 ①跌打损伤：八角枫根3~6克，水煎，临睡前服，每日1剂。②劳伤腰痛：八角枫根去皮6克，牛膝（醋炒）、生杜仲各30克，水煎服。③风湿性关节炎：八角枫侧根30克，白酒1000毫升，浸7日，每日早晚各饮酒15毫升。

八角莲 Ba Jiao Lian

别 名 鬼臼、八角莲、六角莲、独角莲。

基 源 本品为小檗科多年生草本植物八角莲的根茎及根。

植物形态 多年生草本，茎直立，高20~30厘米。不分枝，无毛，淡绿色。根茎粗壮，横生，具明显的碗状节。茎生叶1片，有时2片，盾状着生；叶柄长10~15厘米；叶片圆形，直径约30厘米，常深裂几达叶中部，边缘4~9浅裂或深裂，裂片楔状长圆形或卵状椭圆形，长2.5~9厘米，宽5~7厘米，先端锐尖，边缘具针刺状锯齿，上面无毛，下面密被柔毛。花5~8朵排成伞形花序，着生于近叶柄基处的上方近叶片处；花梗细，长约5厘米，花下垂，花冠深红色；萼片6，外面被疏毛；花瓣6，勺状倒卵形，长约2.5厘米；雄蕊6，蕴含隔突出；子房上位，1室，柱头大，盾状。浆果



椭圆形或卵形。种子多数。花期4~6月，果期8~10月。

生境分布 生长于海拔300~2200米的山坡林下阴湿处。分布于我国南部、西南部及东南部，分布于四川、广西、贵州等地。

采收加工 秋、冬两季采挖，洗净泥沙，晒干或鲜用。