

用药速查
畅销书

随书赠送电子书

全科用药指南 (第2版)

主 编 张抗怀



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

用药速查
畅销书

随书赠送电子书

全科用**药**指南

【第2版】

常州大学图书馆
藏书章

主 编 张抗怀
副主编 席枝侠 王清晖 王 娜 刘 娜
蔡 艳
编 委 (按姓氏笔画排序)
王 娜 王海涛 王清晖 毛文彬
刘 娜 李 亚 余静洁 张 莉
张抗怀 张丽娜 赵 宇 赵文娜
席枝侠 董卫华 鲍 和 蔡 艳
薛小荣 纛伟新



西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

全科用药指南/张抗怀主编. —2版. —西安:西安交通大学出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5605-9405-7

I. ①全… II. ①张… III. ①临床药学-指南 IV. ①R97-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 025593 号

书 名	全科用药指南(第2版)
主 编	张抗怀
责任编辑	问媛媛 赵丹青 黄 璐

出版发行	西安交通大学出版社 (西安市兴庆南路10号 邮政编码 710049)
------	---------------------------------------

网 址	http://www.xjtupress.com
电 话	(029)82668357 82667874(发行中心) (029)82668315(总编办)

传 真	(029)82668280
印 刷	西安明瑞印务有限公司

开 本	787mm×1092mm 1/32	印张	21.75	字数	800千字
版次印次	2017年3月第2版	2017年3月第1次印刷			
书 号	ISBN 978-7-5605-9405-7				
定 价	64.00元				

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题,请与本社发行中心联系、调换。

订购热线:(029)82665248 (029)82665249

投稿热线:(029)82668803 (029)82668804

读者信箱:med_xjup@163.com

版权所有 侵权必究

再版前言

为了向医务人员和社会大众提供一部可靠实用、内容全面、小巧便捷的药物参考书,我们于2011年组织西安市多名药师编写了《全科用药指南》一书。该书出版上市后得到了很多医师和药师朋友的肯定,一些非医学专业人士将其作为床头书以备需要时查阅,基本达到了我们的初衷。

从开始编写第1版到现在,已经过去了近5年的时间,这期间,一些新药上市了,一些药品由于安全性、有效性等原因逐渐被淘汰,一些药品的属性(如医保类型)发生了变化。还有一些热心读者对本书提出了进一步完善的建议。基于以上原因,我们决定对本书进行修订。全书整体编排结构仍延续第1版的思路,即按照固定的项目顺序依次说明药品的关键使用信息,但对每个项目的内容做了一些调整,包括:在“药品名称”项中删除了常用商品名,不再突出个别企业的品牌;在“作用类别”项中删除了有关作用机制的内容;在“用法”项中增加了服药时间与饮食的关系,以指导读者掌握正确的用药时机;删除了“制剂”项;新增了“相互作用”项,列出了与本药有重要相互作用的药物和食物;新增“贮藏”项,以指导大众正确储存药品。本版新增药品244种(西药158种,中成药86种);删除临床少用或市场淘汰的药品89种(西药81种,中成药8种);累计收录西药1399种,中成药765种,共2164种。

在编写过程中,我们坚持精益求精、与时俱进、服务社会的原则,以专业、严谨的态度收集相关权威资料,编排好每一种药品的使用信息。尽管如此,由于时间仓促,疏漏之处在所难免,在使用中如有异议,请以说明书为准。本书不作为医疗纠纷的依据。希望本书第2版能够继续得到广大读者的喜爱,并提出宝贵意见,以便我们进一步改进和完善。

编者

2016年10月

使用说明

本书正文中药品的使用信息包括如下内容：

药品名称 本项说明药品的名称和类别。

西药的药品名称包括规范的中文通用名、英文通用名和俗名，后两者在中文通用名后面的括号中注明。西药的药品类别以中文通用名的上标形式注明，包括基本药物（以上标^[基]表示）、麻醉药品（以上标^[麻]表示）、第一类精神药品（以上标^[精1]表示）、第二类精神药品（以上标^[精2]表示）以及兴奋剂（以上标^[兴]表示）。

中成药的药品名称由中文通用名和常用剂型组成，其他剂型在后面括号中注明。中成药的药品类别以中文通用名的上标形式注明，基本药物以上标^[基]表示，兴奋剂以上标^[兴]表示，如标注在括号后面则表示所有剂型均是基本药物或兴奋剂。

作用类别 本项阐述药物作用类别，必要时简述药物作用特点。中成药无此项。

组成 本项阐明了中成药的方剂组成。西药无此项。

适应证 本项列出了西药的所有临床适应证。中成药无此项。

功能主治 本项说明了中成药的功效及临床应用。西药无此项。

用法 本项详细说明了成人及儿童的用药方法，包括给药途径、给药剂量、给药频率、最大剂量、口服给药时间与饮食的关系等。用法用量可因剂型或临床适应证而异。

不良反应 本项简要列出了常见和重要的药品不良反应。

禁忌 本项指明了禁忌使用该药品的情况。所有药物均存在“对本品过敏者禁止使用”的情况，正文中不再单独说明。

注意 本项补充了药品的其他关键信息，包括使用注意事项、特殊人群用药注意事项等。

相互作用 本项分别列出了与该药品存在相互作用的药物和食物,在用药过程中应避免同时使用这些药物或食物。中成药无此项。

贮藏 本项说明了药物的特殊贮藏条件如避光、冷藏等。其他储存要求(如阴凉处等)不再单独说明。

妊娠分级 本项参考美国 FDA 药物妊娠期危险性分级以及《中国医师药师临床用药指南》(第 2 版)等资料对西药的妊娠分级情况进行了说明。中成药无此项。

医保 本项参考《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(2009 年版),说明了每种药物的医保类型,包括甲类、乙类和非医保。

西药部分 >>>

抗微生物药	(2)
抗生素	(2)
β -内酰胺类药物	(2)
氨基糖苷类抗生素	(26)
四环素类抗生素	(31)
酰胺醇类抗生素	(33)
大环内酯类抗生素	(33)
糖肽类抗生素	(37)
林可酰胺类抗生素	(39)
其他类抗生素	(40)
合成抗菌药	(42)
磺胺类抗菌药	(42)
喹诺酮类抗菌药	(45)
硝基咪唑类抗菌药	(49)
硝基呋喃类抗菌药	(51)
噁唑酮类抗菌药	(52)
抗分枝杆菌药	(52)
抗结核病类药	(52)
抗麻风病类药	(57)
抗真菌药	(59)
唑类抗真菌药	(59)
多烯类抗真菌药	(63)
棘白菌素类抗真菌药	(64)
其他抗真菌药	(65)
抗病毒药	(66)
其他抗微生物药	(74)
抗寄生虫病药	(76)
抗疟药	(76)
抗血吸虫病药	(80)
驱肠虫药	(81)
抗丝虫病及抗黑热病药	(83)
抗阿米巴病及抗滴虫病药	(85)
解热镇痛及非甾体抗炎药	(86)

解热镇痛及非甾体抗炎药	(86)
其他抗炎药	(94)
抗痛风药	(97)
镇痛药	(100)
阿片类镇痛药	(100)
非阿片类镇痛药	(104)
麻醉用药	(110)
全身麻醉药	(110)
吸入麻醉药	(110)
静脉麻醉药	(112)
局部麻醉药	(114)
麻醉辅助药	(119)
维生素及矿物质缺乏症用药	(126)
维生素类药	(126)
矿物质类药	(130)
营养药	(133)
肠内营养药	(133)
肠外营养药	(137)
氨基酸类制剂	(137)
脂肪乳制剂	(143)
多腔袋类制剂	(145)
其他	(146)
激素及调节内分泌功能药	(148)
下丘脑垂体激素相关药物	(148)
肾上腺皮质激素类药	(152)
雄激素、抗雄激素及同化激素类药	(155)
雌激素、抗雌激素、孕激素及抗孕激素类药	(158)
雌激素类药物	(158)
抗雌激素类药物	(161)
孕激素及抗孕激素类药物	(161)
胰岛素及其他影响血糖的药物	(164)
胰岛素	(164)
口服降糖药物	(167)
其他	(172)
甲状腺激素类及抗甲状腺药	(174)
甲状腺激素类药物	(174)
抗甲状腺药物	(175)
甲状旁腺及骨质疏松相关用药	(176)
调节免疫功能药	(180)
免疫抑制药	(180)
生物反应调节药	(182)

抗肿瘤药	(186)
细胞毒类药	(186)
作用于 DNA(脱氧核糖核酸)化学结构的药物	(186)
影响核酸合成药	(193)
作用于核酸转录的药物	(198)
拓扑异构酶抑制剂	(198)
作用于微管蛋白合成的药物	(199)
其他细胞毒类药物	(202)
激素类抗肿瘤药	(202)
生物靶向类抗肿瘤药	(205)
其他抗肿瘤药及辅助用药	(209)
抗变态反应药	(213)
神经系统用药	(218)
抗帕金森病药	(218)
抗重症肌无力药	(222)
抗癫痫药	(223)
脑血管病用药	(228)
抗阿尔茨海默病药	(234)
中枢兴奋药	(235)
镇静催眠药	(238)
抗偏头痛药	(240)
其他神经系统用药	(241)
治疗精神障碍药	(245)
抗精神病药	(245)
抗焦虑药	(251)
抗抑郁药	(255)
抗躁狂药	(261)
呼吸系统药物	(262)
化痰药	(262)
镇咳药	(263)
平喘药	(267)
茶碱类药物	(267)
抗胆碱类药物	(269)
β -肾上腺素受体激动药	(270)
激素类药物	(272)
白三烯拮抗药及抗过敏药	(273)
其他平喘药	(275)
其他呼吸系统用药	(276)
消化系统药物	(277)
治疗消化性溃疡和胃食管反流病药物	(277)
抗酸药	(277)

胃酸分泌抑制剂	(278)
胃黏膜保护剂	(282)
胃肠解痉药	(286)
助消化药	(289)
促胃肠动力药及止吐药和催吐药	(290)
促胃肠动力药	(290)
止吐药和催吐药	(292)
泻药和止泻药	(294)
泻药	(294)
止泻药	(296)
微生态药物	(298)
肝胆疾病辅助用药	(300)
治疗肝性脑病药	(300)
治疗肝炎辅助用药	(302)
利胆药	(306)
治疗炎性肠病药	(308)
其他消化系统用药	(309)
循环系统药物	(312)
强心药	(312)
抗心律失常药	(315)
硝酸酯类药	(320)
钙拮抗药	(321)
β -受体阻滞药	(326)
作用于 α -受体的药物	(331)
血管紧张素转化酶抑制药	(334)
血管紧张素II受体拮抗药	(338)
其他降压药	(340)
抗休克血管活性药	(343)
调血脂药	(347)
其他循环系统用药	(352)
泌尿系统用药	(355)
利尿药	(355)
脱水药	(357)
前列腺疾病用药	(358)
治疗性功能障碍药	(359)
其他泌尿系统用药	(360)
血液系统疾病用药	(362)
促凝血药	(362)
抗凝血药	(367)
溶栓药	(372)
血浆及血容量扩充药	(374)

抗贫血药	(378)
升白细胞药	(383)
抗血小板聚集药	(384)
调节水、电解质及酸碱平衡药	(390)
电解质平衡调节药	(390)
酸碱平衡调节药	(394)
葡萄糖及其他	(395)
复方电解质输液及透析液	(397)
皮肤科用药	(400)
皮肤抗细菌药	(400)
皮肤抗真菌药	(400)
皮肤用肾上腺皮质激素	(401)
银屑病用药	(403)
痤疮用药	(404)
皮肤用非甾体抗炎药	(405)
其他皮肤科用药	(405)
眼科用药	(408)
抗感染药	(408)
抗青光眼药	(408)
肾上腺皮质激素类药	(411)
其他眼科用药	(412)
耳鼻喉科用药	(418)
口腔科用药	(420)
妇产科用药	(422)
解毒药	(426)
重金属、类金属中毒解毒药	(426)
氧化物中毒解毒药	(428)
有机磷酸酯类中毒解毒药	(429)
其他解毒药	(430)
诊断用药	(432)
造影剂	(432)
其他诊断用药	(438)
生物制品	(440)

中成药部分▶▶

内科用药	(446)
解表剂	(446)
辛温解表剂	(446)
辛凉解表剂	(447)
表里双解剂	(450)
扶正解表剂	(450)

祛暑剂	(451)
解表祛暑剂	(451)
清热祛暑剂	(452)
健胃祛暑剂	(452)
泻下剂	(453)
清热剂	(454)
清热泻火剂	(454)
清热解毒剂	(455)
清脏腑热剂	(459)
温里剂	(464)
温中散寒剂	(464)
回阳救逆剂	(466)
化痰、止咳、平喘剂	(467)
温化寒痰剂	(467)
理肺止咳剂	(468)
清热化痰剂	(470)
润肺化痰剂	(472)
平喘剂	(473)
开窍剂	(476)
清热开窍剂	(476)
芳香、化痰开窍剂	(478)
固涩剂	(479)
固精止遗剂	(479)
固涩止泻剂	(479)
补肾缩尿剂	(480)
扶正剂	(480)
补气剂	(480)
养血剂	(482)
滋阴剂	(484)
温阳剂	(487)
阴阳双补剂	(488)
气血双补剂	(489)
益气养阴剂	(490)
益气复脉剂	(493)
安神剂	(495)
养心安神剂	(495)
益气养血安神剂	(496)
清肝安神剂	(497)
补肾安神剂	(498)
重镇安神剂	(499)
止血剂	(499)

祛瘀剂	(501)
益气活血剂	(501)
行气活血剂	(505)
养血活血剂	(508)
温阳活血剂	(509)
滋阴活血剂	(510)
补肾活血剂	(510)
化瘀宽胸剂	(511)
化瘀通脉剂	(513)
活血消癥剂	(514)
祛瘀化痰剂	(515)
理气剂	(516)
疏肝解郁剂	(516)
疏肝和胃剂	(517)
消导剂	(522)
治风剂	(524)
疏散外风剂	(524)
平肝熄风剂	(525)
平肝潜阳剂	(526)
化痰熄风剂	(527)
化瘀祛风剂	(528)
养血祛风剂	(529)
祛风通络剂	(529)
祛湿剂	(532)
散寒除湿剂	(532)
清热除湿剂	(534)
祛风除湿剂	(534)
化瘀祛湿剂	(536)
消肿利水剂	(537)
清热通淋剂	(538)
化瘀通淋剂	(541)
扶正祛湿剂	(542)
化浊降脂剂	(545)
外科用药	(548)
清热剂	(548)
清利肝胆剂	(548)
清热解毒剂	(549)
清热利湿剂	(553)
通淋消石剂	(556)
软坚散结剂	(557)
肿瘤用药	(558)

抗肿瘤药物	(558)
肿瘤辅助用药	(560)
妇科用药	(565)
理血剂	(565)
清热剂	(570)
扶正剂	(573)
消肿散结剂	(576)
外用药	(578)
儿科用药	(581)
解表剂	(581)
清热剂	(583)
止泻剂	(584)
消导剂	(585)
化痰止咳平喘剂	(586)
补益剂	(588)
眼科用药	(591)
清热剂	(591)
扶正剂	(593)
祛瘀剂	(595)
耳鼻喉科用药	(596)
耳病	(596)
鼻病	(597)
宣肺通窍剂	(597)
清热通窍剂	(597)
祛风通窍剂	(599)
祛痰通窍剂	(602)
咽喉病	(602)
开音爽咽剂	(602)
解毒利咽剂	(603)
润燥利咽剂	(605)
疏风利咽剂	(606)
骨伤科用药	(608)
活血化瘀剂	(608)
活血通络剂	(610)
补肾壮骨剂	(612)
外用药	(614)
皮肤科用药	(618)
英文缩写目录	(625)
参考文献	(626)
附录	(627)
药品名称索引	(630)

西药部分

抗微生物药

抗生素

β -内酰胺类药物

青霉素类

青霉素 G (Benzylpenicillin, 青霉素 G)

作用类别 天然青霉素类,对多数革兰阳性菌和革兰阴性球菌、个别阴性杆菌、螺旋体、放线菌有抗菌活性。**适应证** 敏感细菌所致的各种脓肿、菌血症、肺炎和心内膜炎等,尤其是溶血性链球菌、肺炎链球菌、不产青霉素酶葡萄球菌、梭状芽胞杆菌导致的感染以及炭疽、白喉、回归热、钩端螺旋体病、草绿色链球菌心内膜炎(与氨基糖苷类联用);也可用于流行性脑脊髓膜炎、放线菌病、淋病、樊尚咽峡炎、莱姆病、鼠咬热、李斯特菌感染、除脆弱拟杆菌以外的厌氧菌感染;风湿性心脏病或先天性心脏病患者进行口腔、牙科、胃肠道或泌尿生殖道手术和操作前,可用青霉素预防感染性心内膜炎发生。**用法** 成人:肌内注射,一日 80 万~200 万 U,分 3~4 次给药;静脉滴注,一日 200 万~2000 万 U,分 2~4 次给药。小儿:肌内注射,按体重 2.5 万 U/kg,一日 2 次;静脉滴注,每日每千克体重 5 万~20 万 U,分 2~4 次给药。新生儿:每次每千克体重 5 万 U,肌注或静滴,每日 2~4 次。早产儿:每次每千克体重 3 万 U,每日 2~4 次。**不良反应** 过敏性休克、皮疹、荨麻疹、发热、静脉炎、嗜酸性粒细胞增多等。**禁忌** 对本类药物过敏或皮试阳性者。**注意** 用药前应详细询问药物过敏史,并进行青霉素皮试;使用时需新鲜配制;肾功能损害严重者需调整剂量;使用钠盐注射时可使血钠值升高;大剂量给予钾盐时可出现高钾血症或钾中毒反应。**相互作用** 氯霉素、红霉素、四环素、磺胺类、丙磺舒、阿司匹林、吲哚美辛、保泰松、华法林。**妊娠分级** B。**医保** 甲类。

青霉素 V (Phenoxymethylpenicillin)

作用类别 天然青霉素类;抗菌谱与青霉素相同,对多数敏感菌株的活性较青霉素弱。**适应证** 青霉素敏感菌株所致的轻、中度呼吸道感染和皮肤软组织感染,螺旋体感染,作为风湿热复发和感染性心内膜炎的预防用药。**用法** 口服。成人:链球菌感染,每次 0.125~0.25g,每 6~8 小时 1 次,疗程 10 天;肺炎球菌感染,每次 0.25~0.5g,每 6 小时 1 次,疗程至退热后至少 2 天;葡萄球菌感染、螺旋体感染,每次 0.25~0.5g,每 6~8 小时 1 次;预防风湿热复发,每次 0.25g,每日 2 次;预防心内膜炎,在拔牙或上呼吸道手术前 1 小时口服本品 2g,6 小时后再服 1g(27kg 以下儿童剂量减半)。小儿:按体重一次 2.5~9.3mg/kg,一日 6 次;或一次 3.75~

14mg/kg,一日4次;或一次5~18.7mg/kg,一日3次。不良反应 过敏性休克、皮疹、荨麻疹、发热、静脉炎、嗜酸性粒细胞增多等。禁忌 青霉素类药物有过敏史者及青霉素皮试阳性反应者,传染性单核细胞增多症患者。注意 使用本品前,必须做青霉素皮肤试验;有过敏性疾病史者慎用;老年人可能需调整剂量;肾功能减退者应根据血浆肌酐清除率调整剂量或给药间期;长期或大剂量服用本品者,应定期检查肝、肾、造血系统功能和检测血清钾或钠;治疗链球菌感染时疗程需10日,治疗结束后宜做细菌培养,以确定链球菌是否已清除;对怀疑为伴梅毒损害之淋病患者,在使用本品前应进行暗视野检查,并至少在4个月内,每月接受血清试验一次。相互作用 别嘌醇、双硫仑、口服避孕药。余同青霉素。妊娠分级 B。医保甲类。

苄星青霉素 (Benzathine Benzylpenicillin, 长效西林)

作用类别 青霉素的二苄基乙二胺盐,抗菌活性成分为青霉素。适应证 预防风湿热复发,控制链球菌感染的流行。用法 临用前加注射用水配制为混悬液,肌内注射。成人一次60万~120万U,小儿一次30万~60万U,2~4周1次。不良反应 皮疹、过敏性休克、二重感染等。禁忌 对本类药物过敏或皮试阳性者。注意 用药前应详细询问药物过敏史,并进行青霉素皮试;有过敏性疾病者慎用;使用时需新鲜配制;仅供肌内注射,严禁静脉注射。相互作用 丙磺舒、阿司匹林、吲哚美辛、保泰松、磺胺药、华法林。医保乙类。

普鲁卡因青霉素 (Procaine Benzylpenicillin)

作用类别 本品为青霉素的普鲁卡因盐,其抗菌活性成分为青霉素。本品血药浓度较低。适应证 青霉素高度敏感菌所致的轻、中度感染,钩端螺旋体病,回归热和早期梅毒。用法 肌内注射:临用前加适量灭菌注射用水使成混悬液,每次40万~80万U,每日1~2次。不良反应 荨麻疹、过敏性休克、赫氏反应和治疗矛盾、二重感染等。禁忌 有青霉素类药物或普鲁卡因过敏史者以及青霉素或普鲁卡因皮试阳性者。注意 用药前应详细询问药物过敏史,并进行青霉素、普鲁卡因皮试;有过敏性疾病者慎用;本品不宜用于治疗严重的急性感染。相互作用 参照苄星青霉素。妊娠分级 B。医保乙类。

氟氯西林 (Flucloxacillin)

作用类别 耐青霉素酶青霉素类;抗菌谱同青霉素,对产青霉素酶葡萄球菌有良好的杀菌活性,对各种链球菌及不产青霉素酶的葡萄球菌活性较青霉素差。适应证 耐青霉素的葡萄球菌感染;葡萄球菌和链球菌所致的混合感染,包括骨和关节感染、心内膜炎、腹膜炎、肺炎、皮肤软组织感染、手术及伤口感染、中毒性休克等。用法 成人每次0.25g,一日4次,饭前至少30分钟服用。重症感染,剂量可加倍。不良反应 过敏、皮疹、腹泻、恶心、消化不良等。禁忌 青霉素过敏者或青霉素皮试阳性者。注意 用药