



实用中草药彩色图鉴大全集

皮茎木叶花树脂和菌藻类 中草药彩色图鉴

周德生 巢建国 主编



- **111** 种最常见皮茎木叶花树脂和菌藻类中草药
- **300** 多幅原植物、药材、饮片高清原色彩图
- **500** 多首精选验方，配以实用病症验方索引，方便查找



皮茎木叶花树脂和菌藻类 中草药彩色图鉴

主 编：周德生 巢建国

副主编：周 海 谷 巍 陈湘鹏 周达宇

编 委：（按拼音字母为序）

巢建国	陈湘鹏	陈 瑶	戴 莉	邓 龙	高 杰
耿 超	谷 巍	郭 彪	郭雅玲	侯皓然	胡 华
江元璋	黎秋凤	李彩云	李 琳	李孟洋	李 中
刘菊燕	刘利娟	刘圣金	马思雨	束晓云	孙亚昕
谭 灿	吴兵兵	肖志红	张 莹	周达宇	周德生
周 海	周娟娟	周 平	邹立思		

图书在版编目 (C I P) 数据

皮茎木叶花树脂和菌藻类中草药彩色图鉴 / 周德生, 巢建国主编.
-- 长沙 : 湖南科学技术出版社, 2016.6
(实用中草药彩色图鉴大全集)
ISBN 978-7-5357-7767-6

I . ①皮… II . ①周… ②巢… III. ①中草药—图谱
IV. ①R282-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 116565 号

实用中草药彩色图鉴大全集

PIJING MUYE HUASHUZHI HE JUNZAOLEI ZHONGCAOYAO CAISE TUJIAN

皮茎木叶花树脂和菌藻类中草药彩色图鉴

主 编：周德生 巢建国

责任编辑：李 忠 王跃军

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

湖南科学技术出版社天猫旗舰店网址：

<http://hnikjbs.tmall.com>

邮购联系：本社直销科 0731-84375808

印 刷：长沙超峰印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：宁乡县金洲新区泉洲北路 100 号

邮 编：410600

版 次：2016 年 6 月第 1 版第 1 次

开 本：710mm×1000mm 1/16

印 张：15.75

书 号：ISBN 978-7-5357-7767-6

定 价：58.00 元

(版权所有 · 翻印必究)

前 言

我国中草药种类繁多，资源丰富。一种中草药资源，当它作为一种植物存在时，它表现的是以枝、叶、花、果实的自然形态；当它作为药材应用时，它是天然的或经产地粗加工的原料药；当以配方入药应用时，它必须是按照有关规范进行加工炮制后的饮片。它的不同用途与形态带给我们不同的图像，给我们识别与鉴别中草药时带来一定的困难。

为了保证中草药的稳定、安全与有效，准确识别与鉴别常用中草药的植物自然形态以及药材、饮片，我们组织长期从事中草药鉴别的有关专家，根据他们在植物资源调查以及科研工作中所积累的大量图片，编写了这本《皮茎木叶花树脂和菌藻类中草药彩色图鉴》，以满足广大中医药爱好者、中医药院校学生的需要。

本书收载了常用中草药111种，重点突出了常用同种中草药的原植物形态、药材、饮片的特征，并配有彩色图片，图文并茂，使读者能够快速、准确地识别与鉴别常用中草药。

现将本书的内容与特色介绍如下：

① 本书精简明确地记载了皮、茎、木、叶、花、树脂和菌藻类常用中草药的别名、来源、产地、采收加工、原植物、药材性状、饮片特征、质量标志、性味功能、用法用量、常用验方。每味中草药均附有植物形态、药材形态、饮片形态3张图片。

② 常用验方主要是从古代和现代医药文献中精心挑选的经验方，具体应用时可随证加减，有毒药物及大剂量药方的应用应遵医嘱。

③ 每味中草药彩色照片均经专家鉴定，精心挑选，以保证照片的清晰度和科学性。

④ 本书的参考文献主要以最新版《中华人民共和国药典》一部与高等院校教材《中药鉴定学》等公开出版的权威著作或杂志文献为主，限于篇幅，未注明出处。

由于编者的水平有限，编写时间较为紧迫，不足或错漏之处在所难免，敬请广大读者多提宝贵意见。

周德生 巢建国

于湖南中医药大学
南京中医药大学

皮类

土荆皮	002
五加皮	004
白鲜皮	006
地骨皮	008
杜仲	010
牡丹皮	012
苦棟皮	014
厚朴	016
祖司麻	018
桂皮	020

桐皮	022
桑白皮	024
秦皮	026
黄柏	028
椿皮	030
香加皮	032

茎木类

丁公藤	036
大血藤	038
木通	040
石斛	042

灯心草	044
竹茹	046
肉苁蓉	048
西河柳	050
沉香	052
皂角刺	054
苏木	056
鸡血藤	058
爬山虎	060
降香	062
青风藤	064
首乌藤	066
络石藤	068

目 录

钩藤	070
鬼箭羽	072
桑寄生	074
通草	076
锁阳	078
槲寄生	080
檀香	082
九里香	086

十大功劳叶	088
大青叶	090
四季青	092
石韦	094
石楠叶	096
艾叶	098
牡荆叶	100
木芙蓉叶	102
侧柏叶	104
枇杷叶	106
罗布麻叶	108

苦丁茶	110
枸骨叶	112
柿叶	114
胡颓子叶	116
桑叶	118
臭梧桐	120
荷叶	122
银杏叶	124
番石榴叶	126
紫珠叶	128
紫杉	130

花类

丁香	134
千日红	136
月季	138
木槿花	140
玉米须	142
合欢花	144
红花	146
羊踯躅	148
杜鹃花	150
芫花	152

谷精草	154
辛夷	156
鸡冠花	158
松花粉	160
玫瑰花	162
金银花	164
洋金花	166
凌霄花	168
夏枯草	170
桃花	172
密蒙花	174
旋覆花	176
菊花	178
款冬花	180
番红花	182
葛花	184
槐花	186
蒲黄	188
蜡梅花	190

树脂类

天竺黄	194
安息香	196
血竭	198
没药	200

目录

苏合香	202
阿魏	204
乳香	206
松香	208
枫香脂	210
桃胶	212

菌藻类

马勃	216
冬虫夏草	218
灰树花	220
灵芝	222

昆布	224
茯苓	226
海藻	228
猪苓	230
蛹虫草	232

药名汉语拼音索引	234
病症验方索引	237

皮类

来 源	松科植物金钱松 <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson) Rehd. 的干燥根皮或近根树皮。
产 地	主产于江苏、浙江、安徽、江西、福建、湖南等地。多为栽培。
采收加工	于立夏前后采收根皮或近根树皮，除去杂质，晒干。
原 植 物	落叶乔木，高 20~40 米，干径达 1.5 米。树干直，树皮灰褐色，粗糙，不规则鳞片状开裂。一年生枝淡红褐色或淡红黄色，有光泽，老枝及短枝呈灰色或暗灰色。叶线形，柔软，扁平，长 2~5.5 厘米，宽 1.5~4 毫米，先端锐尖，上面绿色，中脉稍明显，下面蓝绿色，中脉明显，每边有 5~14 条气孔线，长枝上叶辐射伸展，短枝上叶簇生。雄球花黄色，圆柱状，下垂；雌球花紫红色，直立，椭圆形，长约 1.3 厘米，有短梗。球果卵圆形或倒卵圆形，长 6~7.5 厘米，直径 4~5 厘米，熟时淡红褐色；中部种鳞卵状披针形，长 2.8~3.5 厘米，两侧耳状，先端钝有凹缺，脊上密生短柔毛；苞鳞长为种鳞的 1/4~1/3。卵状披针形，边缘有细齿。种子卵圆形，白色，种翅三角状披针形，淡黄色或淡褐黄色，有光泽。花期 4~5 月，果熟期 10~11 月上旬。喜生于多阳光处。

药 材 性 状	根皮呈不规则的长条状或稍扭曲而卷成槽状，长短及宽度不一，厚 2~5 毫米。外表面粗糙，深灰黄色，具纵横皱纹，并有横向灰白色皮孔，粗皮呈鳞片状剥落，内表面黄棕色至红棕色，平坦，有细致的纵向纹理。质坚韧，折断面呈裂片状，可层
---------	--



土荆皮

tujingpi

别名：土槿皮、荆树皮、金钱松皮、水树皮、金叶松皮

层剥离。气微，味苦而涩。

饮 片 特 征	为长条状或稍扭曲的树皮，外表面深灰黄色，断面棕色，内表面黄棕色，质坚韧，气微，味苦而涩。
---------	--

质量标志	以形大、黄褐色、有纤维质而无栓皮者为佳。
------	----------------------

性 味 功 能	性温，味辛，有毒。归肺、脾经。功能杀虫，止痒。用于手脚癣、局限性神经性皮炎、湿疹、癫痫头等。
---------	--

用 法 用 量	外用：适量，醋或酒浸涂擦，或研末调涂患处。
---------	-----------------------

常 用 验 方	①治局限性神经性皮炎：土荆皮、蛇床子、百部根各 30 克，五倍子 24 克，密陀僧 18 克，轻粉 6 克。共研细末备用。先以皂角煎水洗患处，再以食醋调药粉呈糊状，涂敷患部。②治湿疹、皮肤瘙痒：土荆皮、雄黄、苦参、黄柏、白矾、蛇床子各适量。做散剂用酒调涂患处。③治湿癣癫痫风：土荆皮、吴茱萸、硫黄、砒石、斑蝥、番木鳖、明矾、川椒、细辛、海桐皮、槟榔、胆矾、煅皂矾、皮硝、巴豆仁、蛇床子、烟胶、雄黄、桃仁、牡丹皮各 9 克。研为细末。烧酒浸搽。
---------	---



原植物

图1 土荆皮



药材



饮片

来 源 五加科植物细柱五加 *Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith 的干燥根皮。

产 地 分布于陕西、河南、山东、安徽、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、四川、云南、贵州、广西、广东等地。生长于山坡或丛林间。

采收加工 栽后3~4年于夏、秋两季采收，挖取根部，除掉须根，刮皮，抽去木心，晒干。

原 植 物 落叶灌木，有时蔓生状，高2~3米。枝灰棕色，无刺或在叶柄基部单生扁平的刺。叶为掌状复叶，在长枝上互生，在短枝上簇生；叶柄长3~8厘米，常有细刺；小叶5，稀为3或4，中央一片最大，倒卵形至倒披针形，长3~8厘米，宽1~3.5厘米，先端尖或短渐尖，基部楔形，两面无毛，或沿脉上疏生刚毛，下面脉腋间有淡棕色簇毛，边缘有细锯齿。伞形花序腋生或单生于短枝顶端，直径约2厘米；总花梗长1~2厘米；花梗长6~10毫米；萼5齿裂；花黄绿色，花瓣5，长圆状卵形；雄蕊5，花丝细长；子房2室，花柱2，分离或基部合生，柱头圆头状。核果浆果状，扁球形，直径5~6毫米，成熟时黑色，宿存花柱反曲。种子2粒，细小，淡褐色。花期4~7月，果期7~10月。

药材质性状 呈不规则卷筒状，长5~15厘米，直径0.4~1.4厘米，厚约0.2厘米。外表面灰褐色，有稍扭曲的纵皱纹及横长皮孔；内表面淡黄色或灰黄色，有细纵纹。体轻，质脆，易折断，断面不整齐，灰白色。气微香，味微辣而苦。



五加皮

wujiapi

别名：南五加皮、五谷皮、红五加皮、白刺、目骨、追风使

饮片特征 为不规则卷筒状树皮，外表面灰褐色，内表面淡黄色或灰黄色，体轻质脆，气微香，味微辣而苦。

质量标志 以皮厚、气香、断面灰白色者为佳。

性味功能 性温，味辛、苦。归肝、肾经。祛风湿，补肝肾，强筋骨。用于风寒湿痹，腰膝疼痛，筋骨痿软，小儿行迟，体虚羸弱，跌打损伤，骨折，水肿，脚气，阴下湿痒。

用法用量 内服：煎汤，6~9克，鲜品加倍；浸酒或入丸、散。外用：适量，煎水洗或外敷。

常用验方 ①治脚气：五加皮、远志（酒浸令透，易为剥皮）各120克。上药曝干，为末，春秋冬用浸药酒为糊，夏则用酒为糊，丸如梧桐子大。每服40~50丸，空心温酒送下。

②治腰痛：五加皮、杜仲（炒）各等份。为末，酒糊丸，如梧桐子大。每服30丸，温酒下。

③治四五岁不能行：真五加皮、川牛膝（酒浸2日）、木瓜各等份。上为末，每服6克，空心米汤调下，每日2服。④治阴囊水肿：五加皮9克，仙人头30克。水煎服。

⑤治水肿、小便不利：配合茯苓皮、大胶皮、生姜皮、地骨皮等药同用。⑥治足跟痛：五加皮适量。研末，每服6克，每日2服。⑦治神经衰弱：五加皮、菌灵生（先煎）、首乌藤各30克，五味子、合欢皮、当归、茯神各15克，磁石40克。水煎服。



图2 五加皮



药材



饮片

来 源 芸香科植物白鲜 *Dictamnus dasycarpus* Turez. 的干燥根皮。

产 地 分布于东北、河北、山东、河南、安徽、江苏、江西、四川、贵州、陕西、甘肃、内蒙古等地。主产于辽宁、河北、四川、江苏、浙江、安徽等地。多生长于山坡及丛林中。

采收加工 北方于春、秋两季采收，南方于夏季采收。挖出后，洗净泥土，除去须根及粗皮，趁鲜时纵向剖开，抽去木心，晒干。

原 植 物 多年生草本，全株有特异的刺激味。根木质化，数条丛生，外皮淡黄白色。茎直立，高 50~65 厘米。单数羽状复叶互生；有叶柄；叶轴有狭翼，小叶通常 9~11 片，无柄，卵形至长圆状椭圆形，长 3.5~9 厘米，宽 2~4 厘米，先端锐尖，边缘具细锯齿，表面密布腺点，叶两面沿脉有柔毛，尤以背面较多，至果期脱落，近光滑。总状花序；花轴及花梗混生白色柔毛及黑色腺毛；花梗基部有线状苞片 1 枚；花淡红色而有紫红色线条；萼片 5，长约花瓣的 1/5；花瓣 5，倒披针形或长圆形，基部渐细呈柄状；雄蕊 10；子房 5 室。蒴果，密被腺毛，成熟时 5 裂，每瓣片先端有一针尖。种子 2~3 枚，黑色，近圆形。花期 4~5 月，果期 5~6 月。

药材性状 呈筒状或双卷筒状，长 7~12 厘米，直径 1~2 厘米，厚 2~5 毫米，外表面黄白色至淡棕色，稍光滑，有时有纵皱和侧根痕。内表面淡黄色，光滑而具侧根

白鲜皮

baixianpi

别名：白藓皮、八股牛、山牡丹、羊鲜草

形成的圆孔。质松脆，易折断，断面乳白色，呈层状。在日光或灯光下，可见闪烁的白色细小结晶物。气膻，味微苦。

饮片特征 为卷筒状根皮，外表面淡棕色，断面乳白色，内表面淡黄色，质脆易断，气膻，味微苦。

质量标志 以卷筒状、无木心、皮厚、块大者为佳。

性味功能 性寒，味苦。归脾、胃、膀胱经。清热燥湿，祛风解毒。用于湿热疮毒，黄水淋漓，湿疹，风疹，疥癣疮癩，风湿热痹，黄疸尿赤。

用法用量 内服：4.5~9 克。外用：适量，煎汤洗或研粉敷。

常用验方 ①治皮肤瘙痒症：白鲜皮、防风（去叉）、人参、知母、沙参各 30 克，黄芩（去黑心）3 克。上 6 味捣罗为散。每服 10 克，水 120 毫升，煎至 75 毫升，温服，服后临卧。②治阳黄：白鲜皮、茵陈蒿各等份。水 120 毫升煎服，每日 2 服。③治产后中风：白鲜皮 90 克。以水 3 升，煮取 1 升，分服。耐酒者可酒、水各等份煮之。④治小儿心肺风热壅滞、胸膈不利：白鲜皮、防风、犀角、黄芩、知母、沙参、人参各 15 克，炙甘草 30 克。水煎服。每服 3 克。




原植物

图3 白鲜皮



药材



饮片

来 源 茄科植物枸杞 *Lycium chinense* Mill. 或宁夏枸杞 *L. barbarum* L. 的干燥根皮。

产 地 主产于山西、河南、浙江、江苏；全国大部分地区均产。生长于山坡、田野向阳干燥处；有栽培。

采收加工 春初或秋后采挖根部，洗净，剥取根皮，晒干。

原 植 物 落叶灌木，植株较矮小，高1米左右。蔓生，茎干较细，外皮灰色，具短棘，生于叶腋，长0.5~2厘米。叶片稍小，卵形、卵状鞭形、长椭圆形或卵状披针形，长2~6厘米，宽0.5~2.5厘米，先端尖或钝，基部狭楔形，全缘，两面均无毛。花紫色，边缘具密缘毛；花萼钟状，3~5裂；花冠管部和裂片等长，管之下部急缩，然后向上扩大成漏斗状，管部和裂片均较宽；雄蕊5，着生花冠内，稍短于花冠，花药丁字形着生，花丝通常伸出。浆果卵形或长圆形，长10~15毫米，直径4~8毫米，种子黄色。花期6~9月，果期7~10月。

药材性状 为短小的筒状或槽状卷片，大小不一，一般长3~10厘米，宽0.6~1.5厘米，厚约3毫米。外表面灰黄色或棕黄色，粗糙，有错杂的纵裂纹，易剥落。内表面黄白色，较平坦，有细纵纹。质松脆，易折断，断面不平坦，外层棕黄色，内层灰白色。气微，味微甘。



地骨皮

digupi

别名：杞根、地节、狗奶子根、红月坠根、枸杞根、枸杞根皮

饮片特征 为卷状短小树皮。外表面灰黄色或棕黄色，内表面黄白色，质松脆，气微，味微甘。

质量标志 以筒粗，肉厚，整齐，无木心及碎片者为佳。

性味功能 性寒，味甘。归肺、肝、肾经。功能凉血止血，清热退蒸，清泄肺热。用于虚劳潮热盗汗，肺热咳喘，吐血，衄血，血淋，消渴。

用法用量 内服：煎汤，9~15克；或入丸、散。外用：煎水含漱、淋洗，研末撒或调敷。

常用验方 ①治虚烦躁，生津液：地骨皮、防风各30克，甘草3克。研细末，每服6克，或水100毫升，生姜3片，竹叶7片，煎服。②治血淋：地骨皮适量。酒煎服。若新地骨皮加水捣汁，每盏入酒少许，空心温服更妙。③治消渴：地骨皮（锉皮）60克，石膏15克，小麦40克。上3味切，以水煮，麦熟汤成，去渣，适寒温饮之。④治小儿喘嗽：地骨皮、桑白皮（炒）各30克，甘草（炙）3克。上锉散，入粳米1撮，水两小盏，煎七分，食前服。⑤治吐血、下血：地骨皮、枸杞子各30克。为散。水煎服。⑥治毛囊炎：鲜品焙黄研末，香油调敷。⑦治风虫牙痛：单味用醋煎，漱口。



原植物

图4 地骨皮



药材



饮片

来 源	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. 的干燥树皮。
产 地	主产于四川、陕西、湖北、河南、贵州、云南。
采收加工	在清明至夏至间，选取生长 15 年以上的植株，剥下树皮，刨去粗皮，晒干。
原 植 物	落叶乔木，高达 20 米。小枝光滑，黄褐色或较淡，具片状髓。皮、枝及叶均含胶质。单叶互生；椭圆形或卵形，长 7~15 厘米，宽 3.5~6.5 厘米，先端渐尖，基部广楔形，边缘有锯齿，幼叶上面疏被柔毛，下面毛较密，老叶上面光滑，下面叶脉处疏被毛；叶柄长 1~2 厘米。花单性，雌雄异株，与叶同时开放，或先叶开放，生于 1 年生枝基部苞片的腋内，有花柄；无花被；雄花有雄蕊 6~10 枚；雌花有一裸露而延长的子房，子房 1 室，顶端有 2 叉状花柱。翅果卵状长椭圆形而扁，先端下凹，内有种子 1 粒。花期 4~5 月，果期 9 月。

药材性状 为平坦的板片状或卷片状，大小厚薄不一，一般厚 3~10 毫米，长 40~100 厘米。外表面灰棕色，粗糙，有不规则纵裂槽纹及斜方形横裂皮孔，有时可见淡灰色地衣斑。但商品多已削去部分糙皮，故外表面淡棕色，较平滑。内表面光滑，暗紫色。质脆易折断，断面有银白色丝状物相连，细密，略有伸缩性。气微，味稍苦，嚼之有胶状残余物。



杜仲 | *duzhong*

别名：扯丝皮、思仲、丝棉皮、玉丝皮

饮片特征 为卷状或片状薄片。外表面淡棕色，较平滑，内表面暗紫色，质脆，气微，味稍苦。

质量标志 以皮厚而大，糙皮刮净，外面黄棕色，内面黑褐色而光，折断时白丝多者为佳，皮薄、断面丝少或皮厚带粗皮者质次。

性味功能 性温，味甘、微辛。归肝、肾经。功能补肝肾，强筋骨，安胎。用于腰脊酸痛，足膝痿弱，小便余沥，阴下湿痒，胎漏欲堕，胎动不安，高血压。

用法用量 内服：煎汤，9~15 克；浸酒或入丸、散。

常用验方

- ①治腰椎间盘突出：川木香 3 克，八角茴香、杜仲（炒去丝）各 9 克。水 100 毫升，酒 50 毫升，煎服，渣再煎。
- ②治腰肌劳损、腰肌筋膜炎：杜仲（去粗皮，炙微黄，锉）、丹参各 60 克，川芎 45 克，桂心 30 克，细辛 1 克。上药捣粗罗为散，每服 12 克，以水 75 毫升，煎至五分，去渣，次入酒 5 毫升，再煮沸，每于食前温服。
- ③治中风：杜仲（去粗皮，炙，锉）45 克，川芎 30 克，附子（炮裂，去皮脐）15 克。上 3 味，锉如麻豆，每服 15 克，水 150 毫升，入生姜一枣大，拍碎，煎至 75 毫升，去渣，空心温服。
- ④治高血压：牛膝 9 克，水芹菜 90 克，鱼鳅串 30 克。煨水服。每日 3 次。



原植物

图5 杜仲



药材



饮片