

紧扣考试大纲
反映最新命题趋势

卫生专业技术资格考试辅导丛

2016 护师资格考试

全真模拟与解析

主编 黄叶莉 蔡伟萍 王文珍

 军事医学科学出版社

卫生专业技术资格考试辅导丛书

2016 护师资格考试全真模拟与解析

主 编 黄叶莉 蔡伟萍 王文珍

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

2016 护师资格考试全真模拟与解析/黄叶莉,蔡伟萍,王文珍主编.

- 北京:军事医学科学出版社,2015.9

(卫生专业技术资格考试辅导丛书)

ISBN 978-7-5163-0684-0

I. ①2… II. ①黄… ②蔡… ③王… III. ①护理学-资格考试-题解
IV. ①R47-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 204547 号

策划编辑:赵艳霞 于庆兰 责任编辑:吕连婷

出版:军事医学科学出版社

地址:北京市海淀区太平路 27 号

邮编:100850

联系电话:发行部:(010)66931049

编辑部:(010)66931038,66931127,66931039

传真:(010)63801284

网址:<http://www.mmssp.cn>

印装:中煤涿州制图印刷厂北京分厂

发行:新华书店

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:21

字数:532 千字

版次:2015 年 9 月第 1 版

印次:2015 年 9 月第 1 次

定价:48.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

卫生专业技术资格考试辅导丛书——

2016 护师资格考试全真模拟与解析

答案与解析

主 编 黄叶莉 蔡伟萍 王文珍

副主编 朱晓法 王洪瑛 赵美娜 李淑娥

编 委 (以姓氏笔画为序)

马英霞 王 珏 王文珍 王洪瑛

支 晨 邢 梅 朱宗红 朱晓法

孙艳杰 杨小燕 李玉玲 李淑娥

张 萍 张志敏 金慧玉 赵美娜

荣 加 胡海燕 夏 菁 黄 瑾

黄叶莉 黄海燕 蔡伟萍 蔡昌兰

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

前 言

卫生专业初、中级技术资格考试工作实行全国统一考试制度。为帮助广大考生更好地适应全国卫生专业技术护理学专业(护师)资格考试的变化和要求,使考生在有限时间内掌握考试要点,提高复习效率,顺利通过考试,我们根据最新护理学(护师)考试大纲要求,深入总结历年考试的命题规律,编写了《2016 护师资格考试全真模拟与解析》,特别适合考生进行考前强化训练,是考前最后冲刺的重要用书。

军事医学科学出版社拥有一支专门研究相关考试的临床资深专家和编辑队伍,具有多年丰富的培训、出版经验,考试通过率逐年提升。编者深入研究多年来护师考试命题规律,同时广泛征求各院校历届考生意见,编写了此套试题。本书共有6套全真模拟试题,每套全真模拟试题由基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力四部分组成。在编写过程中,我们着重突出四个特点:一是内容全面,基本涵盖了考试大纲主要知识点;二是重点突出、详略得当、条理分明,注重把握每章的重点内容,避免遗漏与不必要的重复;三是立足基础、强化“三基”;四是简洁实用。本书的编写注重理论与临床的结合,有效提高考生实践能力和对模块试题的应试能力。着眼于实际护理操作技术,内容与文字详略得当,安排合理。

在编写过程中,编者参考了多个版本的护理、临床医学教材及参考书,力求内容编写得准确、精炼。但由于时间紧迫、难度大,书中难免有疏漏之处,敬请使用本书的读者与护理同仁不吝指正,使我们能够坚持不断地改进!

编者

基础知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

1. 心源性呼吸困难最先出现的症状是
 - A. 劳力性呼吸困难
 - B. 阵发性夜间呼吸困难
 - C. 心源性哮喘
 - D. 端坐呼吸
 - E. 急性肺水肿
2. 引起风湿性心脏瓣膜病的主要病原菌是
 - A. 肺炎链球菌
 - B. 乙型溶血性链球菌
 - C. 金黄色葡萄球菌
 - D. 厌氧杆菌
 - E. 流感嗜血杆菌
3. 产褥感染中最常见的病理表现是
 - A. 急性子宫内膜炎
 - B. 急性宫颈炎
 - C. 急性输卵管炎
 - D. 急性盆腔腹膜炎
 - E. 急性外阴炎
4. 外阴炎的病因不正确的是
 - A. 阴道分泌物刺激外阴皮肤
 - B. 穿棉质内裤
 - C. 细菌感染
 - D. 外阴清洁不及时
 - E. 紧身衣致局部不透气
5. 急性白血病患者高热的主要原因是
 - A. 代谢亢进
 - B. 严重贫血
 - C. 白血病细胞浸润
 - D. 化疗过敏反应
 - E. 感染
6. 慢性风湿性心脏病患者易发生昏厥或猝死的病变基础是
 - A. 主动脉瓣关闭不全
 - B. 肺动脉瓣关闭不全
 - C. 主动脉瓣狭窄
 - D. 三尖瓣关闭不全
 - E. 肺动脉瓣狭窄
7. 导致短暂性脑缺血发作最常见的病因是
 - A. 吸烟
 - B. 饮酒
 - C. 动脉硬化
 - D. 脑血管畸形
 - E. 情绪激动
8. 支气管扩张最常见的病因是
 - A. 肿瘤压迫
 - B. 肺结核
 - C. 先天性支气管发育缺损
 - D. 支气管
 - E. 大气污染
9. 常规临床检测的类风湿因子的抗体类型是
 - A. IgA
 - B. IgM
 - C. IgE
 - D. IgG
 - E. IgD
10. 多源性室性期前收缩是指
 - A. 多个室性期前收缩均起源于房室结
 - B. 多个室性期前收缩均起源于结间束

- C. 多个室性期前收缩均起源于心房肌
D. 多个室性期前收缩起源于多个异位起搏点
E. 多个室性期前收缩均起源于窦房结
11. 心室颤动最常见的病因是
A. 心脏瓣膜病
B. 急性心肌梗死
C. 心肌病
D. 心肌炎
E. 感染性心内膜炎
12. 导致右心衰竭症状的主要原因是
A. 体循环淤血所致
B. 高血压所致
C. 肺循环淤血所致
D. 肺动脉高压所致
E. 小动脉阻力增高所致
13. 位于乳房内侧的乳腺癌其淋巴转移最先到达
A. 同侧腋窝
B. 对侧腋窝
C. 同侧锁骨上
D. 同侧锁骨下
E. 胸骨旁
14. 下列体征中可以提示壁层腹膜有炎症的是
A. 腹部压痛
B. 腹肌紧张
C. 腹部反跳痛
D. 腹部拒按
E. 恶心、呕吐
15. 心力衰竭最常见的诱发因素是
A. 肺部感染
B. 寒冷
C. 过度劳累
D. 精神紧张
E. 进食过多
16. 胆囊的生理功能不包括
A. 分泌胆汁
B. 调节胆管内压力
C. 浓缩胆汁
D. 储存胆汁
E. 排出胆汁
17. 新生儿肺透明病的病因是
A. 颅内出血
B. 糖化血红蛋白也可以反映当时血糖的水平
C. 糖尿病患者每日的主食越少越有助于降低血糖
D. 糖尿病患者为避免低血糖的发生,可适当加餐,但每日总热量不变
E. 阿卡波糖可刺激正常 B 细胞分泌胰岛素
18. 慢性肾衰竭时高血压的发生机制,下列正确的是
A. 肾素 - 血管紧张素水平增高
B. 血容量与肾素 - 血管紧张素平衡失调
C. 交感神经兴奋性改变
D. 激肽系统的作用
E. 血容量扩张
19. 患者面容晦暗,口唇微绀,两面颊呈淤血性发红,考虑为
A. 急性面容
B. 甲状腺功能亢进
C. 满月面容
D. 高血压面容
E. 二尖瓣面容
20. 与肝硬化合并肝肾综合征有关的是
A. 肾淀粉样变
B. 肾小管坏死
C. 肾皮质血流量减少

- D. 血氨对肾脏的毒性作用
E. 肾小球坏死
21. 医院获得性肺炎最常见的病原菌为
A. 流感嗜血杆菌
B. 革兰阴性杆菌
C. 厌氧菌
D. 支原体
E. 肺炎链球菌
22. 下列药物不会诱发消化性溃疡的是
A. 肾上腺皮质激素
B. 布洛芬
C. 吡哌美辛
D. 前列地尔
E. 阿司匹林
23. 临床上区分直肠和肛管的解剖标志是
A. 肛瓣
B. 齿状线
C. 直肠柱
D. 肛柱
E. 肛乳头
24. 直接引起心脏后负荷加重的瓣膜病是
A. 主动脉瓣狭窄
B. 主动脉瓣关闭不全
C. 二尖瓣狭窄
D. 二尖瓣关闭不全
E. 三尖瓣关闭不全
25. 房颤心电图特征说法正确的是
A. 窦性 P 波规律出现, 频率 > 100 次/分, P - P 间隔 < 0.6 秒
B. 窦性 P 波或 R - R 间隔长短不一, 相差 > 0.12 秒
C. 窦性 P 波消失, 代之以大小及规律不一的 f 波, QRS 波群形态正常
D. QRS 波群与 T 波消失, 呈完全无规律的波浪状曲线
E. 心室率通常在 250 ~ 360 次/分
26. 人体最大的腺体器官是
A. 胃
B. 食管
C. 胆
D. 胰腺
E. 肝
27. 引起夏季小儿腹泻的病原体主要是
A. 溶血性链球菌
B. 金黄色葡萄球菌
C. 流感嗜血杆菌
D. 致病性大肠杆菌
E. 轮状病毒
28. 急性胰腺炎最常见的病因是
A. 胆道结石
B. 胰管结石
C. 大量饮酒
D. 暴饮暴食
E. 十二指肠炎
29. 新生儿败血症感染的主要途径是
A. 呼吸道
B. 消化道
C. 产道
D. 脐部
E. 胎盘
30. 室性心动过速最常见的病因是
A. 心肌病
B. 急性心肌梗死
C. 心肌炎
D. 心脏瓣膜病
E. 甲亢
31. 为低体重儿进行蓝光治疗时, 应调节床内

温度为

- A. 22 ~ 24℃
- B. 25 ~ 28℃
- C. 29 ~ 31℃
- D. 32 ~ 36℃
- E. 37℃

32. 关于消化性溃疡的发病因素,不包括

- A. 胃酸和胃蛋白酶
- B. 非甾体类消炎药
- C. 遗传因素
- D. 持久或过度精神紧张
- E. 前列腺素

33. 呼气性呼吸困难多见于

- A. 重症肺结核
- B. 气管异物
- C. 气胸
- D. 支气管哮喘
- E. 重症肺炎

34. 下列由红细胞破坏过多引起的贫血是

- A. 溶血性贫血
- B. 缺铁性贫血
- C. 急性失血
- D. 再生障碍性贫血
- E. 营养性巨幼细胞贫血

35. 下列哪项属于肠内营养的适应证

- A. 低位肠痿
- B. 严重肠道炎症
- C. 胃癌晚期
- D. 肠梗阻
- E. 胃肠道有活动性出血

36. 急性胰腺炎出现下列哪种情况提示预后不佳

- A. 低钙血症
- B. 低血钾

- C. 低血镁
- D. 代谢性酸中毒
- E. 代谢性碱中毒

37. 人体胃肠道中最主要的消化液是

- A. 胃液
- B. 胰液
- C. 胆汁
- D. 胰岛素
- E. 十二指肠液

38. 系统性红斑狼疮突出的病理表现是

- A. 关节滑膜炎
- B. 周围神经病变
- C. 骨质增生
- D. 血管炎和血管病变
- E. 关节畸形

39. 痛风的疼痛特点为

- A. 固定于少数关节,剧痛难忍
- B. 多呈游走性
- C. 活动后减轻
- D. 多为对称分布
- E. 常累及远端关节

40. 不属于肝性脑病的病理基础是

- A. 氨中毒
- B. 假性神经递质聚集
- C. 色氨酸增多
- D. 芳香族氨基酸增多而支链氨基酸减少
- E. 低蛋白饮食

41. 胎盘早期剥离的主要病理变化是

- A. 壁蜕膜出血
- B. 包蜕膜出血
- C. 底蜕膜出血
- D. 真蜕膜出血
- E. 基蜕膜下出血

42. 关于糖尿病病因和发病机制的论述,正确的是
- 主要与遗传及免疫因素有关
 - 遗传与环境因素共同参与
 - 自身免疫反应为主要发病因素
 - 主要由环境因素导致
 - 遗传易感性为主要发病因素
43. 心绞痛发作的典型部位是
- 胸骨体上段或中段之后
 - 心前区
 - 剑突下
 - 心尖区
 - 肩背部
44. 无分流型的先天性心脏病是
- 室间隔缺损
 - 动脉导管未闭
 - 房间隔缺损
 - 法洛四联症
 - 肺动脉狭窄
45. 婴幼儿易出现肝、脾、淋巴结等骨髓外造血,其原因是
- 骨髓造血功能尚不成熟
 - 骨髓造血器官功能活跃
 - 缺乏红骨髓
 - 缺乏黄骨髓,造血储备能力很小
 - 红骨髓过多,造血储备能力很大
46. 子宫后倾产妇,为促进其产后子宫复原,宜采用
- 去枕仰卧位
 - 膝胸位
 - 头低足高位
 - 头高足低位
 - 截石位
47. 下壁心肌梗死易发生
- 室性心动过速
 - 多源性室性期前收缩
 - 心脏破裂
 - 栓塞
 - 房室传导阻滞
48. X 线检查,心脏外形呈梨形的是
- 二尖瓣狭窄
 - 二尖瓣关闭不全
 - 主动脉瓣狭窄
 - 主动脉瓣关闭不全
 - 三尖瓣病变
49. 机体调节酸碱平衡最迅速的途径是
- 肺脏
 - 血液缓冲系统
 - 细胞内外离子交换
 - 肾脏
 - 神经-内分泌系统
50. 慢性阻塞性肺疾病,加强腹式呼吸的原因是
- 有利于痰液排出
 - 增加肺泡张力
 - 增加肺泡通气量
 - 借助腹肌进行呼吸
 - 间接增加肋间肌活动
51. 下列检查可判断共济失调的是
- 角膜反射
 - 肌力反射
 - 轮替试验
 - 复合感觉试验
 - 腱反射
52. 系统性红斑狼疮标志性的免疫学检查指标是
- 抗核抗体
 - 抗 SM 抗体

- C. 抗双链 DNA 抗体
D. IgG 抗体
E. 狼疮细胞
53. 预防羊水栓塞的正确措施是
A. 产程中避免使用催产素
B. 发现宫缩过强时, 宜行人工破膜缓解宫缩
C. 人工破膜口宜大, 便于羊水迅速流出
D. 观察产程, 随时做好手术准备
E. 人工破膜宜在宫缩间歇期
54. 主要由免疫因素引起的疾病是
A. 乳腺癌
B. 慢性胃炎
C. 急性胰腺炎
D. 白血病
E. 特发性血小板减少性紫癜
55. 巨幼细胞贫血患儿, 出现神经系统症状的主要原因
A. 叶酸缺乏
B. 维生素 B₁₂ 缺乏
C. 叶酸、维生素 B₁₂ 缺乏
D. 铁缺乏
E. G-6-PD 缺乏
56. 缺铁性贫血的患儿出现非造血系统症状的原因是
A. 酶活力降低, 细胞功能紊乱
B. 血红蛋白生成不足
C. 红细胞游离原卟啉增加
D. 血清铁蛋白生成不足
E. 运铁蛋白饱和度减低
57. 单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻的主要区别在于
A. 梗阻的部位不同
B. 梗阻的时间不同
C. 梗阻的程度不同
D. 肠管壁血运有无障碍
E. 有无并发症
58. 类风湿关节炎最基本的病理改变是
A. 血管炎和血管病变
B. 骨质增生
C. 软骨增生
D. 周围神经病变
E. 关节滑膜炎
59. 患者, 男性, 60 岁。行毕 II 式胃大部切除术第 1 天, 查访时见胃管内吸出咖啡色胃液约 200 ml, 正确的处理是
A. 继续观察, 不需特殊处理
B. 输血
C. 应用止血药
D. 胃管内灌注冰盐水
E. 马上做好手术止血准备
60. 患者, 女性, 32 岁, 主因头晕、乏力半年, 加重 3 天入院, 骨髓象提示中、晚幼红细胞增生活跃, 骨髓细胞外铁黄素消失, 幼红细胞内含铁颗粒减少。该患者可能是
A. 巨幼细胞贫血
B. 生理性贫血
C. 缺铁性贫血
D. 再生障碍性贫血
E. 溶血性贫血
61. 某瓣膜性心脏病患者, 稍事活动即可引起乏力、心悸、气急, 休息后症状能够缓解。其心功能属于
A. 一级
B. 二级
C. 三级
D. 四级
E. 五级

62. 患者,男性,66岁。患高血压病8年,近半年来间断胸骨后或心前区疼痛,持续3~5分钟,经入院检查确诊为冠心病心绞痛,医嘱用硝酸甘油,责任护士讲解用药知识,其中哪项不妥

- A. 应卧位或坐位服药,以防发生体位性低血压
- B. 该药应舌下含服,不可吞服或嚼服
- C. 该药可扩张外周血管,减轻心脏负担
- D. 该药不良反应有头面部皮肤潮红、搏动性头痛等
- E. 出现不良反应需立即停药,不可再服用

63. 某新生女婴,出生后第4天,下列评估提示异常的是

- A. 体温 37℃
- B. 脐带未脱落
- C. 体重比出生时下降 12%
- D. 阴道外口少量血迹
- E. 皮肤轻度黄染

64. 患者,女性,27岁。G1P1,自然分娩1男婴,体重3.5 kg,胎盘娩出后半小时内阴道出血500 ml,色红。查看胎盘完整,见有血管中断于胎膜边缘。其出血原因最可能是

- A. 胎膜残留
- B. 子宫收缩乏力
- C. 胎盘剥离不全
- D. 软产道损伤
- E. 宫颈裂伤

65. 某产妇,26岁,宫口开全胎膜破裂后突然出现呛咳、烦躁、呼吸困难,随即昏迷,血压55/30 mmHg。应考虑为

- A. 胎膜早破
- B. 子宫破裂
- C. 产时子痫
- D. 胎儿窘迫
- E. 羊水栓塞

66. 患者,男性,30岁,脑外伤后10小时,出现下列哪项主要体征应警惕可能发生小脑幕切迹疝

- A. 进行性意识障碍
- B. 瞳孔先小后大,对光反应迟钝或消失
- C. 患者剧烈头痛,反复呕吐
- D. 病变对侧肢体瘫痪、肌张力增加
- E. 生命体征改变出现较早,瞳孔忽大忽小

67. 孕妇,30岁,孕36周,因抽搐数次急诊入院。查体:眼球固定,瞳孔散大,牙关紧闭,双手紧握,血压170/120 mmHg。应考虑为

- A. 轻度妊娠高血压综合征
- B. 中度妊娠高血压综合征
- C. 重度妊娠高血压综合征
- D. 先兆子痫
- E. 子痫

68. 4个月婴儿,母乳喂养,家长述说已添加鱼肝油、米面糊,现应指导家长再添加的辅食为

- A. 饼干
- B. 碎肉末
- C. 面片
- D. 馒头
- E. 鱼泥

69. 患儿,男,出生时Apgar评分4分,生后2天,嗜睡,肌张力减退,瞳孔缩小,时而出现惊厥,头颅CT扫描,可见右叶有低密度影。该患儿临床诊断最大可能为

- A. 新生儿窒息
- B. 新生儿缺氧缺血性脑病
- C. 新生儿蛛网膜下腔出血
- D. 新生儿硬膜下出血
- E. 核黄疸

70. 女性,35岁,Ⅱ期内痔多年,几小时前排便后,痔核没有还纳,现肿胀,疼痛,伴肿物压痛,考虑是

- A. 血栓性外痔
B. 内痔嵌顿
C. I 期内痔
D. II 期内痔
E. III 期内痔
71. 患者,男性,48 岁,因十二指肠溃疡后行胃大部切除术,术后 2 个月出现头晕、乏力。查 Hb 80 g/L。其贫血的原因是
- A. 铁吸收不良
B. 铁摄入不足
C. 铁损失过多
D. 铁需要量增加
E. 铁利用障碍
72. 患者,男性,65 岁,近期诊断高血压,既往患有慢性阻塞性支气管疾病,下列哪种降压药物应禁用
- A. 利尿药
B. β 受体阻滞剂
C. 钙通道阻滞剂
D. 血管紧张素转换酶
E. α_1 受体阻滞剂
73. 患者,男,30 岁,5 天前被汽车撞伤左上腹,当时有左上腹胀痛和局部压痛,暂留院观察。今晨上厕所时突然昏倒,查体见患者面色苍白、出冷汗,血压下降,脉细速,无明显腹膜刺激征。首先考虑为
- A. 脾破裂
B. 肝破裂
C. 胰腺破裂
D. 左肾破裂
E. 肠系膜血管破裂
74. 患者,男性,45 岁,腹部叩及移动性浊音,估计腹水量为
- A. 300 ml 以上
B. 500 ml 以上
C. 600 ~ 800 ml
D. 1000 ml 以上
E. 1500 ml 以上
75. 患者,女性,45 岁,5 年来时常便血,量少,滴出或附在粪便表面,无痛,经检查,诊为内痔,其扩大曲张的血管主要是
- A. 直肠上静脉丛
B. 直肠下静脉丛
C. 直肠上下静脉丛
D. 直肠上动脉
E. 直肠下动脉
76. 为患儿实施心肺复苏术程序 CAB,其中 B 是指
- A. 开放气道
B. 人工呼吸
C. 心电监护
D. 胸外心脏按压
E. 脑复苏
- 二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的字母所属的方框涂黑。
- (77 ~ 79 题共用题干)
- 患者,女性,35 岁。近 2 年来梳头时脱发较多,经常反复发作口腔黏膜无痛性溃疡,2 年来冬季遇冷时手指苍白疼痛及发紫,保暖后正常。两颊部有红斑,查尿蛋白(++)。
77. 该患者可能患有的疾病为
- A. 白塞病
B. 干燥综合征
C. 类风湿关节炎
D. 多发性皮肤炎
E. 系统性红斑狼疮
78. 为进一步确诊,下列检查最具有确诊意义的是

- A. CRP 增快
- B. RF(+)
- C. ESR 增快
- D. 高滴度 RNP 抗体
- E. 抗双链 DNA 抗体(+),抗 Sm 抗体(+)

79. 该病最常累及的器官是

- A. 肺
- B. 肝
- C. 肾
- D. 皮肤
- E. 关节

(80 ~ 81 题共用题干)

男性,45 岁,头痛数月,经检查诊断为颅内占位性病变,颅内压增高,拟行开颅手术。

80. 术前患者出现便秘时,不正确的处理方法是

- A. 使用开塞露
- B. 腹部按摩
- C. 使用缓泻药
- D. 用肥皂水灌肠
- E. 鼓励患者多食粗纤维食物

81. 此患者开颅术后当天最危险的并发症是

- A. 出血
- B. 感染
- C. 癫痫发作
- D. 尿崩症
- E. 中枢性高热

(82 ~ 85 题共用题干)

患者,女性,38 岁,初产妇。因胎动明显减少 1 日入院。体格检查:血压 95/65 mmHg,脉率 110 次/分,胎膜已破,胎儿左枕前位,头先露 S⁺,胎心率 100 次/分。胎心检测提示多个晚期减速,宫体压痛,宫口开大 3 cm。询问病史了解到:24 小时前有大量清亮液体从阴道流出,8 小时前开始规律宫缩痛。血常规提示:白细胞 $18 \times 10^9/L$,中性粒细胞 $0.95 \times 10^9/L$,淋巴细胞 $0.05 \times 10^9/L$ 。

82. 对于患者的诊断,错误的是

- A. 胎膜早破
- B. 高龄产妇
- C. 产时感染
- D. 先兆子宫破裂
- E. 胎儿窘迫

83. 此时采用的处理方法不恰当的是

- A. 静滴广谱抗生素
- B. 静注缩宫素促进产程进展
- C. 吸氧
- D. 行剖宫产术
- E. 静滴 10% 葡萄糖 + 维生素 C

84. 2 小时后,再次测得患者体温 40℃,心率 130 次/分,血压 65/40 mmHg,子宫压痛明显,下腹部存在轻度反跳痛。正确的处理是

- A. 使用肾上腺皮质激素抗休克
- B. 静滴甲硝唑抗感染
- C. 使用喹诺酮类抗生素抗感染
- D. 抗感染的同时输注人血白蛋白
- E. 抗休克抗感染的同时剖宫产

85. 患者产出一女婴,其皮肤颜色苍白、肌张力松弛、反射消失、心率慢且心音弱,则该新生儿是

- A. 轻度窒息
- B. 重度窒息
- C. 先天性心脏病
- D. 正常新生儿
- E. 重症肌无力

(86 ~ 89 题共用题干)

3 岁患儿,平时口唇无青紫,哭闹时可出现暂时性青紫,易患肺部感染。听诊胸骨左缘第 3 ~ 4 肋间可闻 3 ~ 5 级全收缩期反流性杂音。

86. 最有可能的诊断是

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 法洛三联症
- D. 动脉导管未闭

- E. 肺动脉狭窄
87. 该患者的血流动力学改变主要为
- 体循环血流量增加,肺循环血流量减少
 - 肺循环血流量增加,体循环血流量减少
 - 体循环、肺循环血流量无变化
 - 有双向分流存在
 - 有右向左分流存在
88. 该患儿最典型的心电图改变为
- 右房、右室肥大
 - 左房、左室肥大
 - 左、右心室肥大
 - 右心房肥大
 - 右心室肥大
89. 该患者的首要治疗措施
- 强心治疗
 - 扩血管药物
 - 手术根治
 - 利尿治疗
 - 治疗肺部感染

三、以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(90 ~ 92 题共用备选答案)

- 叶酸
 - 钾盐
 - 钙剂
 - 铁剂
 - 内因子
90. 营养性缺铁性贫血主要补充
91. 营养性巨幼细胞性贫血主要补充

92. 恶性贫血主要由于缺乏

(93 ~ 94 题共用备选答案)

- 凝血功能异常
 - 自身免疫引起
 - 血小板功能异常
 - 脾破坏血小板增加
 - 微血管的变态反应性炎症
93. 特发性血小板减少性紫癜最主要的发病机制是
94. 过敏性紫癜最主要的发病机制是

(95 ~ 97 题共用备选答案)

- 孕 8 周末
 - 孕 16 周末
 - 孕 24 周末
 - 孕 28 周末
 - 孕 32 周末
95. B 超有心搏,头占身体的一半,妊娠周数是
96. 外生殖器可辨男女,头发长出,孕妇可感到胎动,妊娠周数是
97. 头发、指甲已长出,皮肤发红,面部皱纹多,出生后能啼哭及吞咽。妊娠周数是

(98 ~ 100 题共用备选答案)

- 乙肝疫苗
 - 脊髓灰质炎疫苗
 - 麻疹疫苗
 - 百白破混合制剂
 - 乙型脑炎疫苗
98. 出生 24 小时内应接种
99. 8 个月以上小儿应接种
100. 1.5 ~ 2 岁小儿应复种

相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的字母所属的方框涂黑。

1. 诊断宫颈癌最可靠的方法是

- A. 宫颈刮片细胞学检查
- B. 碘试验
- C. 氮激光肿瘤固有荧光诊断法
- D. 阴道镜检查
- E. 宫颈活组织检查

2. 确诊下肢静脉疾病最可靠的辅助检查是

- A. 深静脉回流试验
- B. 下肢静脉压测定
- C. 下肢静脉造影
- D. 多普勒超声检查
- E. 交通支瓣膜功能试验

3. 硫酸镁中毒时应立即

- A. 注射尼可刹米
- B. 注射肾上腺素
- C. 注射地塞米松
- D. 注射 10% 葡萄糖酸钙
- E. 注射 25% 葡萄糖溶液

4. 手术区皮肤消毒不可使用碘酊的是

- A. 胸部
- B. 会阴部
- C. 腹部
- D. 腋窝部
- E. 颈部

5. 二尖瓣狭窄患者,左心房肥大时心电图异常主要表现在

- A. P 波
- B. QRS 波

C. T 波

D. ST 段

E. Q-T 间期

6. 下列哪项不属于骨折晚期并发症

- A. 内脏损伤
- B. 关节僵硬
- C. 创伤性关节炎
- D. 缺血性骨坏死
- E. 畸形愈合

7. 急性感染性多发性神经根神经炎,血清免疫球蛋白显著增高的是

- A. IgA
- B. IgM
- C. IgG
- D. IgD
- E. IgE

8. 早期诊断急性心肌梗死最简单有效的方法是

- A. 心电图检查
- B. 超声心电图检查
- C. 冠脉造影
- D. 心脏 CT
- E. 血生化检查

9. 上消化道出血伴休克时,首要的治疗措施是

- A. 禁食
- B. 积极补充血容量
- C. 内镜止血
- D. 介入治疗
- E. 气囊管压迫止血

10. 早期发现肺结核的最主要方法是

- A. 结核菌素试验
B. 胸部 X 线检查
C. 痰菌检查
D. 血沉检查
E. CT 检查
11. 确诊肺结核最特异的方法是
A. CT 检查
B. X 线检查
C. 痰结核菌检查
D. 结核菌素试验
E. 纤维支气管镜检查
12. 能提示肾衰竭早期的化验是
A. 酚红排泄试验
B. 内生肌酐清除率
C. 血肌酐测定
D. 尿蛋白测定
E. 血尿素氮测定
13. T 管拔除的指征是
A. 无引流液引出
B. 引流液颜色正常
C. 大便颜色正常, 食欲好转
D. 黄疸逐日消退, 无发热、腹痛
E. T 管造影无残余结石, 夹管试验无异常变化
14. 以下哪种情况应使用呼吸兴奋剂
A. 呼吸道梗阻或分泌物潴留
B. 严重广泛肺部病变
C. 神经肌肉疾病者
D. 长期哮喘致呼吸肌疲劳
E. 呼吸表浅、不规则
15. 骨折牵引时, 预防过度牵引的措施是
A. 患肢抵床尾
B. 患肢功能锻炼
C. 定时测量肢体长度
D. 防止牵引针左右移动
E. 定时放松牵引装置
16. 原发性肝癌早期转移的常见部位是
A. 肺
B. 骨
C. 肝内
D. 腹腔
E. 锁骨上淋巴结
17. 为了避免诱发下肢放射痛, 腰椎间盘突出症患者患肢直腿抬高一般不能超过
A. 60°
B. 50°
C. 40°
D. 30°
E. 20°
18. 下列关于头围的说法正确的是
A. 出生时平均 30 cm
B. 3 个月时 34 cm
C. 1 岁时 46 cm
D. 2 岁时 50 cm
E. 5 岁时 58 cm
19. 再生障碍性贫血的特点是
A. 全血细胞减少
B. 红细胞减少
C. 网织红细胞减少
D. 白细胞减少
E. 血小板减少
20. 有关小儿营养性缺铁性贫血辅助检查的描述, 错误的是
A. 转铁蛋白饱和度降低
B. 骨髓象以中、晚幼红细胞增生为主
C. 血清铁蛋白降低
D. 血红蛋白降低较红细胞数减少明显
E. 总铁结合力降低