

卫生专业技术资格考试辅导丛书

WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI FUDAO CONGSHU



主管护师资格考试

核心试题与全真模拟

纵览历年真题

把握命题趋势

指导复习方向

主编 高艳红 刘万芳



军事医学科学出版社

卫生专业技术资格考试辅导丛书

2016 主管护师资格考试核心试题与 全真模拟

(第十版)

主 编：高艳红 刘万芳

副主编：周小双 朱 臻 林牡丹

编 者：(按姓氏笔画排序)

于 鹏 王 娜 田爱旭 齐伟玲
严向芳 李美妮 陈 玉 陈 星
尚伦伦 赵 锐 姜 旻 能 寒
葛 杰

军事医学科学出版社

· 北 京 ·

内容提要

本书依据护理学专业(主管护师)资格考试新版大纲的要求,结合多年从事护理学专业资格考试考前辅导的实践经验,将大纲内容与同步练习整合在一起,配套编写了包含所有考试题型同步练习题,在第九版的基础上进一步浓缩考点,扩增考题。核心试题针对考试大纲中各学科的重点难点进行强化训练,考题细化到每章节内容,重点题及易错题后附有详细的解析,全面分析考点、答题思路和方法。本书附有两套模拟卷,对部分重点、难点问题有简单解析。

图书在版编目(CIP)数据

2016 主管护师资格考试核心试题与全真模拟/高艳红,刘万芳主编.

-10版. -北京:军事医学科学出版社,2015.9

(卫生专业技术资格考试辅导丛书)

ISBN 978-7-5163-0672-7

I. ①2… II. ①高… ②刘… III. ①护理学-资格考试-习题集

IV. ①R47-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第193081号

策划编辑:赵艳霞 于庆兰

责任编辑:孟丹丹

出版人:孙宇

出版:军事医学科学出版社

地址:北京市海淀区太平路27号

邮编:100850

联系电话:发行部:(010)66931049

编辑部:(010)66931127,66931039,66931038

传真:(010)63801284

网址:<http://www.mmsp.cn>

印装:中煤涿州制图印刷厂北京分厂

发行:新华书店

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:27.25

字数:916千字

版次:2015年10月第10版

印次:2015年10月第1次

定价:68.00元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

前言

护理学专业(主管护师)资格考试分为4卷,分别为基础知识卷、相关专业知识卷、专业知识卷和专业实践能力卷,内容涉及内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学和护理健康教育学、医院感染护理学、护理管理学、社区护理,全部为选择题,每份试卷100道题。护理学专业基础知识和相关专业知识考核内容相同,专业知识和专业实践能力根据所报考亚专业的不同,所考核内容不同,在本书中,考生可根据自己所报的专业选择相应的试题,快速检验自己对知识的掌握程度。

为了使备考读者顺利通过2016年护理学专业(主管护师)资格考试,我们依据最新版大纲的要求,结合多年从事护理学专业资格考试考前辅导的实际经验,编写了《2016主管护师资格考试核心试题与全真模拟》,本书的特点是将大纲内容与同步练习整合在一起,配套编写了包含所有考试题型的强化试题,帮助考生复习巩固知识和检测对各知识点的掌握程度。同时,我们在第九版的基础上进一步浓缩考点,删除旧题,扩增新题,希望能为广大考生在短时间内掌握考试重点、熟悉考试题型、高效率地全面复习带来帮助。

一、主管护师资格考试作为国家级考试,考试范围和难度严格遵照大纲,大纲要求的核心知识点万变不离其宗,考生必须脚踏实地地复习,切实掌握大纲要求的内容,才能从容轻松地应对考试,千万不要抱着侥幸心理去猜题。

二、强化试题针对考试大纲中各学科的重点、难点进行强化训练,考题细化到每章节内容,重点突出,使考生复习更有针对性,易于将每章节知识点掌握透彻。重点题及易错题后附有详细的解析,全面分析考点、答题思路和方法,帮助考生尽快理解和掌握知识点,做到举一反三,考生可以随学随测,检测学习效果,强化记忆,达到事半功倍的效果。

三、本书附有两套模拟卷,严格遵照大纲要求,覆盖了绝大部分考核知识点,全面模拟考试真题,针对考生临考备战进行综合性巩固,部分重点、难点问题有简单的解析,希望考生在复习好书本知识的基础上,认真做好每一道题。在做题过

程中,将自己认为的难点、难题做适当标注,有时间的话一定要回过头复习,特别是曾经做错的题,多温习几遍,对应考非常有益。

由于本书涉及的知识内容广泛,虽然编者竭尽全力,反复修改,但由于编者水平和能力有限,难免存在错误和疏漏,恳请广大同仁和考生给予指正,以便我们进一步改正。

编者

2015年9月

目 录

第一部分 内科护理学	(1)
第一章 呼吸系统疾病患者的护理	(1)
第二章 循环系统疾病患者的护理	(11)
第三章 消化系统疾病患者的护理	(23)
第四章 泌尿系统疾病患者的护理	(32)
第五章 血液及造血系统疾病患者的护理	(40)
第六章 内分泌代谢性疾病患者的护理	(49)
第七章 风湿性疾病患者的护理	(53)
第八章 理化因素所致疾病患者的护理	(58)
第九章 传染病患者的护理	(62)
第十章 神经系统疾病患者的护理	(67)
第二部分 外科护理学	(74)
第一章 水、电解质、酸碱代谢失调患者的护理	(74)
第二章 外科休克患者的护理	(77)
第三章 多器官功能障碍综合征	(78)
第四章 麻醉患者的护理	(79)
第五章 复苏	(81)
第六章 重症患者的监护	(82)
第七章 外科围术期的护理	(82)
第八章 营养支持患者的护理	(84)
第九章 外科感染患者的护理	(85)
第十章 损伤患者的护理	(87)
第十一章 肿瘤患者的护理	(89)
第十二章 颈部疾病患者的护理	(89)
第十三章 乳房疾病患者的护理	(91)
第十四章 腹外疝患者的护理	(93)
第十五章 急性化脓性腹膜炎患者的护理	(94)
第十六章 腹部损伤患者的护理	(95)
第十七章 胃、十二指肠疾病患者的护理	(96)
第十八章 肠疾病患者的护理	(100)
第十九章 直肠、肛管疾病患者的护理	(101)
第二十章 门静脉高压症患者的护理	(102)
第二十一章 肝脏疾病患者的护理	(103)
第二十二章 胆道疾病患者的护理	(106)

第二十三章 胰腺疾病患者的护理	(107)
第二十四章 外科急腹症患者的护理	(109)
第二十五章 周围血管疾病患者的护理	(110)
第二十六章 颅内压增高患者的护理	(111)
第二十七章 颅脑损伤患者的护理	(113)
第二十八章 常见颅脑疾病患者的护理	(114)
第二十九章 胸部损伤患者的护理	(115)
第三十章 脓胸患者的护理	(118)
第三十一章 肺部疾病外科治疗患者的护理	(118)
第三十二章 食管癌患者的护理	(119)
第三十三章 心脏疾病患者的护理	(120)
第三十四章 泌尿、男性生殖系统疾病的主要症状和检查	(123)
第三十五章 泌尿系统损伤患者的护理	(124)
第三十六章 泌尿系结石患者的护理	(126)
第三十七章 泌尿及男性生殖系统结核患者的护理	(128)
第三十八章 泌尿系统梗阻患者的护理	(129)
第三十九章 泌尿及男性生殖系统肿瘤患者的护理	(130)
第四十章 男性性功能障碍及节育者的护理	(132)
第四十一章 肾上腺疾病外科治疗患者的护理	(133)
第四十二章 骨科患者的一般护理	(134)
第四十三章 骨与关节损伤患者的护理	(136)
第四十四章 骨与关节感染患者的护理	(142)
第四十五章 腰腿痛及颈肩痛患者的护理	(144)
第四十六章 骨肿瘤患者的护理	(146)
第三部分 妇产科护理学	(149)
第一章 女性生殖系统解剖生理	(149)
第二章 妊娠期妇女的护理	(154)
第三章 分娩期妇女的护理	(159)
第四章 产褥期妇女的护理	(162)
第五章 新生儿保健	(164)
第六章 高危妊娠妇女的护理	(165)
第七章 妊娠期并发症妇女的护理	(169)
第八章 妊娠期合并症妇女的护理	(175)
第九章 异常分娩的护理	(179)
第十章 分娩期并发症妇女的护理	(181)
第十一章 产后并发症妇女的护理	(183)
第十二章 遗传咨询与产前诊断	(186)
第十三章 妇科护理病历	(186)
第十四章 女性生殖系统炎症患者的护理	(187)

第十五章 月经失调患者的护理	(192)
第十六章 妊娠滋养细胞疾病患者的护理	(195)
第十七章 妇科恶性肿瘤化疗患者的护理	(197)
第十八章 妇科腹部手术患者的护理	(198)
第十九章 外阴、阴道手术患者的护理	(201)
第二十章 不孕症妇女的护理	(204)
第二十一章 计划生育妇女的护理	(206)
第二十二章 妇女保健	(208)
第二十三章 妇产科常用护理技术	(209)
第二十四章 妇产科诊疗及手术患者护理	(210)
第四部分 儿科护理学	(214)
第一章 绪论	(214)
第二章 生长发育	(215)
第三章 小儿保健	(217)
第四章 小儿营养与喂养	(219)
第五章 小儿心理、用药护理及护理技术	(221)
第六章 新生儿及新生儿疾病患儿的护理	(223)
第七章 营养性疾病患儿的护理	(227)
第八章 消化系统疾病患儿的护理	(230)
第九章 呼吸系统疾病患儿的护理	(232)
第十章 循环系统疾病患儿的护理	(233)
第十一章 血液系统疾病患儿的护理	(235)
第十二章 泌尿系统疾病患儿的护理	(236)
第十三章 内分泌系统疾病患儿的护理	(238)
第十四章 神经系统疾病患儿的护理	(239)
第十五章 免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理	(241)
第十六章 遗传性疾病患儿的护理	(242)
第十七章 常见传染病患儿的护理	(242)
第十八章 结核病患儿的护理	(245)
第十九章 寄生虫病患儿的护理	(246)
第二十章 急性中毒和常见急症患儿的护理	(246)
第五部分 护理学健康教育	(249)
第一章 健康教育与健康促进	(249)
第二章 人类行为与健康相关行为	(249)
第三章 健康传播方法与技巧	(250)
第四章 健康教育的步骤	(251)
第五章 医院健康教育	(252)
第六部分 医院感染护理学	(255)
第一章 医院感染护理学绪论	(255)

第二章	医院感染的微生物学原理	(256)
第三章	医院感染监测	(258)
第四章	消毒与灭菌	(258)
第五章	手、皮肤的清洁和消毒	(260)
第六章	医院环境的消毒	(261)
第七章	隔离	(262)
第八章	合理使用抗感染药物	(264)
第九章	医院感染与护理管理	(265)
第十章	特殊病原菌的传播途径与消毒	(266)
第七部分	护理管理学	(268)
第一章	绪论	(268)
第二章	管理理论在护理管理中的应用	(269)
第三章	计划	(269)
第四章	组织	(270)
第五章	护理人力资源管理	(270)
第六章	领导工作	(271)
第七章	组织沟通	(271)
第八章	冲突与协调	(272)
第九章	控制工作	(273)
第十章	护理质量管理	(273)
第十一章	社区护理	(274)
模拟试卷一		(276)
模拟试卷二		(352)

第一部分 内科护理学

第一章 呼吸系统疾病患者的护理

1. 干性支气管扩张是指

- A. 干咳为主
- B. 病变局限于上叶
- C. 仅有早晨咳嗽及咳痰
- D. 仅有反复咯血,一般无咳嗽、咳痰
- E. 纤维支气管镜检见支气管黏膜干燥、萎缩

2. 下列哪种细胞可以分泌表面活性物质调节肺泡表面张力

- A. I型肺泡上皮细胞
- B. II型肺泡上皮细胞
- C. 巨噬细胞
- D. 纤毛细胞
- E. 杯状细胞

3. 下列呼吸困难的护理措施中,错误的是

- A. 取坐位或半坐卧位
- B. 保持呼吸道通畅
- C. 保持口鼻腔清洁
- D. 摄入足够热量
- E. 一律给予氧气吸入

4. 下列关于胸膜腔的描述错误的是

- A. 胸膜腔是一个潜在的开放腔隙
- B. 胸膜腔内为持续负压
- C. 正常人胸膜腔内有少量浆液起润滑作用
- D. 呼气时胸膜腔内负压减小
- E. 胸膜腔内压力是促进胸腔内静脉血和淋巴液回流的重要因素

5. 造成急性上呼吸道感染的病原体临床最常见

- A. 细菌
- B. 病毒
- C. 衣原体
- D. 支原体
- E. 立克次体

6. 下列哪项是慢性支气管炎急性发作的最常见

原因

- A. 吸烟
- B. 感染
- C. 大气污染
- D. 气温下降
- E. 过敏

7. 引起细菌性咽-扁桃体炎最主要的致病菌为

- A. 葡萄球菌
- B. 溶血性链球菌
- C. 肺炎球菌
- D. 肺炎杆菌
- E. 大肠埃希菌

8. 慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是

- A. 支气管扩张
- B. 慢性支气管炎
- C. 支气管哮喘
- D. 尘肺
- E. 肺纤维化

9. 呼吸衰竭时应特别慎用

- A. 呼吸兴奋剂
- B. 祛痰平喘剂
- C. 镇静安眠剂
- D. 脱水利尿剂
- E. 强心剂

10. 下列关于排痰的措施,不妥的是

- A. 多饮水以利于痰液稀释
- B. 勤翻身、叩背可促进排痰
- C. 痰多且无力咳嗽者应以祛痰治疗为主
- D. 咳嗽反射减弱或消失的患者应给予机械吸痰
- E. 为了增加患者的耐受能力,体位引流应该在餐后半小时进行

11. 超声雾化吸入操作正确的是

- A. 水槽内加冷蒸馏水 50 ml
B. 用冷蒸馏水稀释药液至 10 ml
C. 添加药液应先关机
D. 治疗毕,先关电源开关
E. 雾化罐、螺纹管治疗毕需浸泡消毒
12. 与支气管哮喘发作有关的免疫球蛋白是
A. IgE
B. IgG
C. IgA
D. IgD
E. IgM
13. 支气管哮喘长期反复发作,最常见的并发症是
A. 上呼吸道感染
B. 阻塞性肺气肿
C. 肺结核
D. 肺不张
E. 自发性气胸
14. 防治哮喘最有效的药物是
A. 糖皮质激素
B. 抗胆碱能药物
C. 茶碱类
D. 肥大细胞膜稳定剂
E. β_2 -受体激动剂
15. 下列关于氨茶碱的应用描述不正确的是
A. 是中效支气管舒张剂
B. 常用给药途径为肌肉注射
C. 静脉注射应使用葡萄糖稀释后慢推
D. 速度过快可引起心律失常、头晕、血压下降
E. 浓度过高可引起心搏骤停
16. 下列最适用于慢性支气管炎缓解期的措施是
A. 口服抗生素预防感染
B. 应用平喘药物
C. 间断吸氧
D. 增强体质,进行缩唇腹式呼吸
E. 使用祛痰药物
17. 支气管扩张大咯血窒息患者,应采取的正确卧位是
A. 头低位
B. 俯卧位
C. 平卧位
D. 端坐卧位
E. 半坐卧位
18. 肺炎球菌肺炎患者,出现哪种表现提示有并发症发生
A. 体温退后复升
B. 体温持续上升
C. 体温先升后退
D. 咯铁锈色痰
E. 咯粉红色泡沫样痰
19. 肺炎球菌肺炎高热患者降温不宜采用
A. 温水擦身
B. 酒精擦浴
C. 多饮水
D. 大血管区放置冰袋
E. 退热药
20. 下列关于肺脓肿的描述,错误的是
A. 吸入性肺脓肿的好发部位与支气管解剖、重力作用有关
B. 典型临床表现为高热、咳嗽,脓肿破溃后可咳出大量脓痰或脓臭痰
C. 吸入性肺脓肿最常见致病菌为金黄色葡萄球菌,而血源性肺脓肿则为厌氧菌
D. 抗菌和痰液引流是关键治疗
E. 肺脓肿患者反复感染、大咯血者应考虑手术治疗
21. 患者,女性,20岁,支气管哮喘发作1小时,烦躁,发绀,呼吸 28 次/分,心率 120 次/分,律齐,以下哪项措施不当
A. 协助患者采取舒适的坐位
B. 给予吸氧 3 L/min
C. 守候在患者床旁,给予心理护理
D. 忌用心得安
E. 禁用氨茶碱
22. 胸廓两侧呼吸运动减弱见于
A. 肺气肿
B. 肺不张
C. 肺炎
D. 胸膜粘连
E. 气胸
23. 慢性肺源性心脏病急性加重期的诱因是
A. 过度劳累
B. 使用镇静剂
C. 使用支气管扩张剂
D. 大量利尿
E. 呼吸道感染
24. 缓解肺气肿患者呼吸困难的首选措施是
A. 胸腔引流
B. 通畅呼吸道,持续低流量吸氧

- C. 镇静剂
D. 强心剂
E. 呼吸兴奋剂
25. 肺脓肿的关键性治疗方法是
- A. 抗菌和痰液引流
B. 支持疗法
C. 手术治疗
D. 处理原发灶
E. 对症治疗
26. 缓解气胸患者呼吸困难首选措施为
- A. 胸腔引流
B. 吸氧
C. 镇静剂
D. 抗生素
E. 呼吸兴奋剂
27. 用 5 U 结素做结素试验的主要目的是
- A. 判断患者是否患有结核
B. 判断人体是否受过结核菌感染
C. 判断结核菌有无活动性
D. 增强机体对结核菌的免疫力
E. 明确肺结核患者是否需要隔离治疗
28. 肺结核好发于
- A. 肺尖
B. 左肺上叶
C. 左肺下叶
D. 右肺上叶
E. 右肺下叶
29. 下列属于全杀菌药的抗结核药物是
- A. 链霉素
B. 异烟肼
C. 对氨基水杨酸
D. 乙胺乙醇
E. 阿司匹林
30. 肺癌的早期症状是
- A. 咳嗽, 痰中带血
B. 咳脓痰
C. 大咯血
D. 声音嘶哑
E. 剧烈胸痛
31. 哪种病理类型的肺癌对化疗最敏感
- A. 鳞状上皮癌
B. 肺泡细胞癌
C. 腺癌
D. 小细胞未分化癌
E. 大细胞癌
32. 根据病情, 慢性支气管炎可分为
- A. 急性发作期、慢性迁延期、临床缓解期
B. 急性发作期、慢性迁延期
C. 急性发作期、临床缓解期
D. 潜伏期、急性发作期、临床缓解期
E. 潜伏期、急性发作期、慢性迁延期
33. 诊断早期肺心病的主要依据是
- A. 长期慢性胸、肺疾患病史
B. 胸廓呈桶状、语颤减弱
C. 肺动脉瓣区第二心音增强
D. 肺动脉高压及右心室增大征象
E. 三尖瓣区收缩期杂音
34. 肺源性心脏病的心电图表现, 以下哪项是错误的
- A. 肺型 P 波
B. 额面平均电轴 $>90^\circ$
C. V_1 导联 $R/S > 1$
D. V_{1-3} 呈 QS 波
E. 肢体导联高电压
35. 咳出大量脓臭痰后体温下降, 全身毒性症状随之减轻, 主要见于以下哪种疾病
- A. 支气管肺癌
B. 上呼吸道感染
C. 肺脓肿
D. 肺炎
E. 肺结核
36. 急性肺水肿时患者应采取的体位是
- A. 平卧位
B. 右侧卧位
C. 左侧卧位
D. 俯卧位
E. 半坐位或坐位
37. 为判断呼吸衰竭患者代谢紊乱情况, 应首选的辅助检查是
- A. 血常规
B. 肺功能测定
C. 血气分析
D. 痰培养
E. 肺 CT 检查
38. 肺心病呼衰时, 严重缺氧及二氧化碳潴留, 鼻导管供氧原则是
- A. 低流量间断给氧
B. 低流量持续给氧
C. 中流量间断给氧
D. 中流量持续给氧

- E. 高流量持续给氧
39. 下列急性肺水肿的护理措施中, 哪项不正确
- 指导患者取坐位或半坐卧位双腿下垂
 - 给予持续低流量吸氧
 - 遵医嘱给予毛花苷 C 缓慢静脉注射
 - 皮下注射或静推吗啡
 - 给予氨茶碱缓慢静脉推注
40. 纠正呼吸性酸中毒的主要措施是
- 增加通气
 - 控制感染
 - 静滴碱性药物
 - 提高吸氧浓度
 - 使用糖皮质激素
41. 进行腹式呼吸锻炼时, 下列动作中应予以纠正的是
- 吸气时腹部用力挺出
 - 呼气时腹部尽力收缩
 - 深吸快呼
 - 鼻吸口呼
 - 深吸慢呼
42. 关于支气管哮喘的临床表现特征, 下列哪项描述不正确
- 典型发作属呼气性呼吸困难
 - 为发作性疾病, 可自行或用药后缓解
 - 发作时伴哮鸣音
 - 常在午间发作或加重
 - 每次发作, 可历时数小时至数天
43. 慢性阻塞性肺气肿患者突感呼吸困难伴胸痛, 首选的检查方法是
- 胸部 X 线检查
 - 肺功能检查
 - 血气分析
 - CT
 - 核磁共振
44. 下列关于纤维支气管镜检查术的护理措施, 正确的是
- 术前 8 小时禁食、禁饮
 - 术后嘱被检者卧床休息, 尽量避免咳嗽
 - 术后禁食半小时, 以防误吸
 - 术后鼓励患者尽快说话, 以恢复声带功能
 - 术后咽喉部疼痛者, 可给予雾化吸入
45. 下列关于急性上呼吸道感染的描述错误的是
- 成人普通感冒多由细菌感染引起
 - 普通感冒主要表现为咽干、喉痒、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞, 一般肺部无干、湿性啰音
 - 急性细菌性扁桃体炎患者可有高热、咽部明显充血, 扁桃体肿大、充血, 表面常有黄色点状渗出物
 - 感冒患者如出现耳痛、耳鸣、听力减退、外耳道流脓等常提示并发中耳炎
 - 受凉、淋浴、过度疲劳常为急性上呼吸道感染的诱因
46. 肺炎链球菌肺炎咳铁锈色痰的最主要原因是
- 痰里有大量红细胞
 - 痰里混有大量肺泡巨噬细胞
 - 是纤维蛋白和红细胞结合的产物
 - 红细胞破坏后释放含铁血黄素
 - 以上都不是
47. 急性肺水肿患者使用地高辛主要用于
- 增强心脏搏动
 - 排钾利尿
 - 纠正心律失常
 - 减慢心率
 - 扩张冠脉
48. 肺炎球菌肺炎在炎症消散后常见有
- 肺部遗留纤维化
 - 肺泡受损产生肺气肿
 - 造成胸膜粘连、增厚
 - 肺组织结构多无破坏, 不留纤维瘢痕
 - 以上都不是
49. 在肺癌的普查和诊断中占重要地位的检查是
- X 线检查
 - CT
 - MRI
 - 痰脱落液细胞学检查
 - 纤维支气管镜检查
50. 呼吸衰竭患者表现为头痛头胀, 日轻夜重, 昼眠夜醒, 神志恍惚等, 应考虑
- 窒息先兆
 - 休克早期
 - 肺性脑病
 - 呼吸性酸中毒
 - 脑疝出现
51. 最常见的肺炎是
- 细菌性肺炎
 - 病毒性肺炎
 - 非典型病原体肺炎

- D. 真菌性肺炎
E. 军团菌肺炎
52. 呼吸衰竭治疗的主要目的是
- A. 控制感染
B. 纠正酸碱失衡
C. 纠正缺氧和 CO_2 潴留
D. 纠正电解质紊乱
E. 纠正心力衰竭
53. 患者, 女性, 50 岁。干咳 2 个月, 近 2 周左侧胸痛、气急、胸闷。X 线胸片示左上叶前段 $2\text{ cm} \times 2.5\text{ cm}$ 块状阴影, 边缘短毛刺, 肺门扩大, 左侧胸腔积液。该患者最可能的诊断是
- A. 肺炎
B. 肺脓肿
C. 肺结核
D. 胸膜炎
E. 肺癌
54. 慢性阻塞性肺气肿最主要的并发症是
- A. 肺结核
B. 自发性气胸
C. 肺不张
D. 慢性肺源性心脏病
E. 肺炎
55. 慢支并发阻塞性肺气肿患者, 主要表现为在原有症状基础上又出现
- A. 反复感染发热
B. 反复发绀
C. 咳多量脓痰
D. 逐渐加重的呼吸困难
E. 剧烈咳嗽
56. 阻塞性肺气肿患者胸廓呈
- A. 漏斗胸
B. 鸡胸
C. 桶状胸
D. 扁平胸
E. 一侧胸廓局限性膨隆
57. 少量咯血, 尤其是持续痰中带血, 常提示
- A. 支气管哮喘
B. 慢性支气管炎
C. 肺气肿
D. 肺癌
E. 心脏病
58. 支气管扩张及肺脓肿患者痰液的典型表现是
- A. 只有少量黏痰
B. 草绿色
C. 红棕色胶冻状
D. 灰黑色
E. 痰液分层现象
59. 大咯血患者发生窒息时, 首要的护理措施是
- A. 保持呼吸道通畅
B. 输血
C. 吸氧
D. 安慰患者
E. 补液
60. 肺结核大咯血最主要的致死原因是
- A. 呼吸衰竭
B. 重度贫血
C. 失血性休克
D. 窒息
E. 心力衰竭
61. 对于痰液过多且无力咳痰者, 为防止窒息, 护士在翻身前首先应
- A. 给予患者吸氧
B. 给予患者吸痰
C. 指导患者有效咳嗽
D. 给予患者雾化吸入
E. 慢慢移动患者
62. 患者出现下列哪种情况时常提示有厌氧菌感染
- A. 大量脓痰
B. 咳出痰液有恶臭味
C. 痰中带血
D. 有持续存在的湿性啰音
E. 咳嗽伴有高热
63. 下列哪项不是慢性阻塞性肺气肿的病因
- A. 吸烟
B. 细菌、病毒感染
C. 不良饮食习惯
D. 气候
E. 大气污染
64. 哮喘的典型症状是
- A. 反复发作的吸气性呼吸困难
B. 反复发作的呼气性呼吸困难
C. 一过性混合性呼吸困难
D. 逐渐加重的咳嗽、咳痰
E. 逐渐加重的呼吸困难
65. 对老年体弱的慢性阻塞性肺气肿患者的治疗中不恰当的是
- A. 急性发作期以抗感染为主

- B. 痰液黏稠者可雾化吸入
- C. 剧烈咳嗽者可用强镇咳剂缓解痛苦
- D. 病情缓解期可做全身锻炼和呼吸肌锻炼
- E. 应给予高蛋白、高维生素饮食

66. 患者张某,女,55岁,吸入性肺脓肿,病原菌为金黄色葡萄球菌。关于该病原菌下列叙述正确的是

- A. 革兰阴性球菌
- B. 广泛分布于自然界、水、土壤中
- C. 人群中带菌状态相当普遍
- D. 很少对全身各系统引起感染性疾病
- E. 凝固酶阴性的金黄色葡萄球菌是人感染的主要致病菌

67. 患者,男性,60岁。诊断为慢性阻塞性肺疾病。现需判断患者气流受限情况,应采取的检查是

- A. 痰培养
- B. X线检查
- C. 血细胞计数
- D. 肺功能检查
- E. 动脉血气分析

68. 患者,女性,48岁。确诊肺脓肿后经抗生素治疗3个月,仍咳脓痰,X线片显示脓腔直径6cm。下一步治疗应首先考虑

- A. 手术治疗
- B. 加大抗生素用量
- C. 中医中药治疗
- D. 加强体位引流
- E. 气管内滴注抗生素

69. 患者,男性,23岁。4天前出现频繁干咳,伴有胸骨后不适、乏力,未予重视。昨日出现咳嗽、咳吐黏液脓痰,痰中偶有血丝。体检:肺部散在干、湿啰音,X线示肺纹理增粗。该患者最有可能的诊断是

- A. 普通感冒
- B. 急性病毒性支气管炎
- C. 急性气管-支气管炎
- D. 肺结核
- E. 急性支气管哮喘

(70~74题共用题干)

患者,男性,71岁。慢性咳嗽、咳痰20余年,每年持续3~4个月。今日晨起突感左上胸针刺样痛,与呼吸有关,继之出现呼吸困难、大汗、不能平卧,来院就诊。

70. 询问病史的重点应是

- A. 胸痛的部位、性质及伴随症状

- B. 冠心病、心绞痛病史
- C. 近期心电图检查情况
- D. 吸烟史
- E. 近期胸部X线检查情况

71. 体检重点应是

- A. 肺部啰音
- B. 心脏听诊
- C. 肺下界位置
- D. 胸膜摩擦音
- E. 胸部叩诊音及呼吸音双侧对比

72. 以下检查中最有价值的是

- A. 血常规检查
- B. X线检查
- C. 心电图检查
- D. 超声波检查
- E. 血气分析

73. 该患者诊断为自发性气胸,左肺萎缩70%,此时最重要的治疗方法是

- A. 持续低流量吸氧
- B. 卧床休息
- C. 使用抗生素
- D. 排气治疗
- E. 使用支气管扩张剂

74. 该患者进行胸腔插管水瓶封闭式引流,下列护理措施正确的是

- A. 引流瓶内注入适量生理盐水
- B. 引流瓶位置略高于胸腔
- C. 防止引流瓶被踢倒或打破
- D. 嘱患者绝对卧床休息
- E. 若引流管不慎滑出胸腔时,嘱患者屏气,立即通知医生

(75~78题共用题干)

患者男性,68岁。刺激性咳嗽8个月,近两个月痰中带血、胸痛,伴有低热、乏力、食欲减退、消瘦明显,胸片示右肺肺门毛刺状阴影

75. 患者最可能的诊断是

- A. 肺炎
- B. 肺脓肿
- C. 肺结核
- D. 肺癌
- E. 慢性阻塞性肺气肿

76. 为明确诊断并指导治疗,首选的辅助检查是

- A. 胸部CT
- B. 淋巴结活检
- C. 肿瘤标记物检查

D. 纤维支气管镜检查

E. 痰脱落细胞检查

77. 患者经检查确诊为小细胞肺癌,首选的治疗方案是

A. 手术治疗

B. 化学治疗

C. 放射治疗

D. 免疫治疗

E. 中医中药治疗

78. 治疗期间对患者的护理措施正确的是

A. 饮食定时定量,避免刺激性食物

B. 治疗在饭后半小时进行

C. 使用普通牙刷,并常用盐水漱口

D. 从近心端到远心端选择血管进行输液

E. 定期查血常规,观察骨髓抑制情况

(79~80 题共用题干)

某支气管哮喘患者发作时,强迫端坐位,发绀明显,大汗淋漓,不能讲话,于一阵剧咳后突感一侧胸痛,气急加剧,检查发现疼痛侧胸部叩诊呈鼓音,听诊呼吸音消失。

79. 该患者发生了

A. 阻塞性肺气肿

B. 自发性气胸

C. 左心衰竭

D. 右心衰竭

E. 肺不张

80. 对该患者的下列处理措施中,首要的是

A. 立即排气减压,以解除气急,使肺复张

B. 使用糖皮质激素

C. 静点氨茶碱

D. 开放静脉通道

E. 给予高浓度吸氧

(81~83 题共用题干)

患者,男性,70岁。有慢性阻塞性肺气肿病史。咳嗽、咯脓痰伴气急加重2周,今晨神志恍惚,体检:嗜睡,口唇发绀,两肺湿性啰音,心率116次/分,血压185/105 mmHg。

81. 最可能的诊断是

A. 急性左心衰

B. 脑血管意外

C. 右心衰竭

D. 呼吸衰竭

E. 高血压危象

82. 为明确诊断还需做哪项检查

A. CT

B. 心电图

C. 动脉血气分析

D. 脑电图

E. 肾动脉造影

83. 此时最主要的治疗在于

A. 用降压药

B. 使用抗生素

C. 去除诱因

D. 纠正缺氧和二氧化碳潴留

E. 用利尿剂

(84~86 题共用题干)

患者,男性,60岁。咳嗽20年,近日咳大量脓痰、气憋,诊断为慢性阻塞性肺气肿。

84. 为缓解此种呼吸困难,应告诉患者

A. 超声雾化吸入

B. 口服祛痰药

C. 插管吸痰

D. 缩唇腹式呼吸

E. 使用呼吸机辅助呼吸

85. 用氧护理措施正确的是

A. 低流量间断吸氧

B. 低流量持续吸氧

C. 高流量间断吸氧

D. 高流量持续吸氧

E. 高压氧治疗

86. 下列护理措施中,最能有效避免合并慢性肺心病及Ⅱ型呼吸衰竭

A. 低钠饮食

B. 低脂饮食

C. 戒烟

D. 劳逸结合

E. 避免肺部感染

(87~88 题共用题干)

患者,女性,60岁,因肺炎住院治疗,因长期输液需要,预留置静脉套管针。

87. 护士在对留置针部位进行护理时,下列哪项措施不正确

A. 选择口径合适的导管

B. 局部使用透明敷料

C. 局部涂擦抗生素软膏

D. 3~5天更换导管插入部位

E. 输液器每24小时更换一次

88. 输液第3天,患者诉注射部位疼痛,局部沿静脉出现条索状红肿、灼热,考虑患者发生了静脉炎。下列哪项处理不正确

- A. 抬高患肢
- B. 减慢输液速度
- C. 更换注射部位
- D. 局部 50% 硫酸镁湿热敷
- E. 送导管尖端进行培养

(89~92 题共用题干)

患者,男性,60 岁。咳嗽两个月,干咳为主,有午后低热,今上午突然咯血 400 ml,来院急诊。

89. 咯血时,患者应采取的体位是

- A. 端坐位
- B. 仰卧位
- C. 头低脚高卧位
- D. 健侧卧位
- E. 患侧卧位

90. 对此患者的病情观察,尤其要密切注意

- A. 体温变化
- B. 脉搏变化
- C. 呼吸变化
- D. 有无窒息先兆
- E. 有无休克早期表现

91. 急诊处理首选

- A. 输血
- B. 建立人工气道
- C. 垂体后叶素
- D. 卡巴克络

E. 云南白药 + 安络血(卡巴克络)

92. 观察此患者,如果出现下列哪种情况,提示病情严重,应加强护理

- A. 低热盗汗
- B. 疲乏软弱
- C. 食欲减退
- D. 高热持续不退,呼吸急促,脉搏快速
- E. 胸闷、胸痛、咳嗽

(93~94 题共用题干)

男,28 岁,自感低热、乏力、食欲减退,有盗汗、体重下降、呼吸困难、胸痛等表现,就医诊断为浸润型肺结核,收入院抗结核治疗。

93. 入院后应采取的隔离种类为

- A. 严密隔离
- B. 消化道隔离
- C. 保护性隔离
- D. 接触性隔离
- E. 呼吸道隔离

94. 关于疾病防治及护理措施不妥的是

- A. 患者痰液用 20% 漂白粉溶液搅拌静置 2

小时后倒掉

B. 护士在病室里不密切接触患者时,可不戴

口罩

C. 病室每日用紫外线照射进行空气消毒

D. 病室通向走廊的窗子需关闭

E. 给予异烟肼、链霉素治疗

(95~97 题共用备选答案)

A. 原发型肺结核

B. 血行播散型肺结核

C. 浸润型肺结核

D. 慢性纤维空洞型肺结核

E. 结核性胸膜炎

95. 病程最长的肺结核类型是

96. 可在肺部形成哑铃形阴影的结核类型是

97. 干酪型肺炎和结核球属于的结核类型是

(98~100 题共用备选答案)

A. 末梢神经炎

B. 胃肠道不适

C. 肝损害

D. 听力障碍

E. 球后视神经炎

98. 异烟肼主要不良反应为

99. 乙胺丁醇主要不良反应为

100. 链霉素主要不良反应为

(101~105 题共用备选答案)

A. 少量白黏痰

B. 草绿色痰

C. 红棕色胶冻状痰

D. 铁锈色痰

E. 脓臭痰

101. 克雷白杆菌肺炎患者咳

102. 肺炎球菌肺炎患者咳

103. 慢性支气管炎患者咳

104. 铜绿假单胞菌肺炎患者咳

105. 厌氧菌感染所致肺炎患者咳

(106~109 题共用备选答案)

A. 支气管哮喘

B. 肺结核

C. 支气管肺癌

D. 支气管扩张

E. 阻塞性肺气肿

106. 胸部听到局限而固定的湿性啰音常见于

107. 锁骨上、下部位在咳嗽后听到湿性啰音常

见于

108. 骨、关节病变或内分泌紊乱等常见于