

- 以《中华人民共和国药典》(2015年版一部)为蓝本
- 多达300余种常用的中草药识别应用原色图片


精编

主编 ◆ 林余霖 李葆莉

中国药典中药

JingBian ZhongGuo YaoDian
ZhongYao YuanSeTuPu

原色图谱



本书分别从别名、来源、植物形态、生境分布、采收加工、炮制及饮片、性味功能、主治用法等方面予以详细介绍。并以彩色图片形式重点突出了常用中草药的植物形态，图文并貌，使广大读者能够快速、准确地识别常用中草药，并能轻松应用。



中医古籍出版社

Publishing House of Ancient Chinese Medical Books

精编中国药典中药

◎ 编著 林余霖 李葆莉

原色图谱

中医古籍出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

精编中国药典中药原色图谱 / 林余霖, 李葆莉编著. —北

京: 中医古籍出版社, 2016

ISBN 978 - 7 - 5152 - 1323 - 1

I. ①精… II. ①林… ②李… III. ①中草药—图谱

IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第200213号

精编中国药典中药原色图谱

编 著: 林余霖 李葆莉

责任编辑: 赵东升

封面设计: 许永恺

出版发行: 中医古籍出版社

社 址: 北京市东直门内南小街16号 (100700)

印 刷: 北京彩虹伟业印刷有限公司

发 行: 全国新华书店发行

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 14

字 数: 300千字

版 次: 2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5152 - 1323 - 1

定 价: 69.00元



《精编中国药典中药原色图谱》编写范例

一、本书以《中华人民共和国药典》2015 版为蓝本(以下简称药典), 详尽收录了《药典》中普遍常用的 300 余种中药材, 精选原中药物种高度清晰彩色图片 300 余幅, 填补了国家药典没有原物种图片的空白。

二、本书按药材性能排列, 方便读者查阅。

三、每一味药物主要设药材名称、别名、来源、原形态、生境分布、采收加工、炮制及饮片、性味功能、主治用法共九项。

1、药材名称: 以《药典》2015 版的中药材名为正名, 并附汉语拼音、药材拉丁学名及正名。

2、别名: 介绍该药的常用异名。

3、基源: 说明中药材的名称及该药材的入药部位。严格依照《药典》2015 版的规范。



- 4、原药材：原药材的拉丁学名使用《药典》2015年版的记述。
 - 5、生境分布：记述该物种的生长环境和分布地区。
 - 6、采收加工：记述该药材的采收时间和产地的加工方法。
 - 7、药材性状：记述药材的形态特征，依据《药典》2015版规范。
 - 8、炮制与饮片：依《药典》2015版描述，按净制、切制、炮炙工艺描述。
 - 9、性味功能：记述该药材的性味和功能。
 - 10、主治用法：记述该药物的主要用途和用量。
- 四、所收载药材图片，包括原药材及饮片图为便于读者使用。

目 录

解表药

生姜 SHENGJIANG	2
白芷 BAIZHI	2
防风 FANG FENG.....	3
鹅不食草 ERBUSHICAO.....	4
木贼 MUZEI.....	4
牛蒡子 NIUBANGZI.....	5
升麻 SHENGMMA.....	6
荷叶 HEYE.....	6
柴胡 CHAI HU.....	7
葛根 GEGEN	8
桑叶 SANGYE	8
菊花 JUHUA	9
薄荷 BOHE	9
一枝黄花 YIZHIHUANGHUA.....	10

清热药

天花粉 TIANHUAFEN	12
决明子 JUEMINGZI	12
芦根 LUGEN.....	13
谷精草 GUJINGCAO	14
青果 QINGGUO	14

青箱子 QINGXIANGZI	15
功劳木 GONGLAOMU.....	16
龙胆 LONGDAN	17
关黄柏 GUANGUANGBAI.....	17
苦参 KUSHEN.....	18
鸦胆子 YADANZI	19
秦皮 QINPI.....	19
积雪草 JIXUECAO	20
黄芩 HUANGQIN	21
黄柏 HUANGBAI	21
黄连 HUANGLIAN.....	22
三颗针 SANKEZHEN	23
当药 DANGYAO.....	23
木棉花 MUMIANHUA.....	24
土贝母 TUBEIMU	24
土茯苓 TUFULING.....	25
天葵子 TIANKUIZI	26
木蝴蝶 MUHUDIE	26
水飞蓟 SHUIFEIJI.....	27
半枝莲 BANZHILIAN	28
地锦草 DIJINCAO.....	28



- | | | | |
|------------------------|----|--------------------------------|----|
| 连翘 LIANQIAO..... | 29 | 白薇 BAIWEI..... | 45 |
| 板蓝根 BANLANGEN..... | 30 | 地骨皮 DIGUPI..... | 46 |
| 苦地丁 KUDIDING..... | 30 | 青蒿 QINGHAO..... | 46 |
| 金荞麦 JINQIAOMAI..... | 31 | 枸骨叶 GOUGUYE..... | 47 |
| 金银花 JINYINHUA..... | 31 | | |
| 鱼腥草 YUXINGCAO..... | 32 | 泻下药 | |
| 南板蓝根 NANBANLANGEN..... | 32 | 大黄 DAHUANG..... | 49 |
| 穿心莲 CHUANXINLIAN..... | 33 | 火麻仁 HUOMAREN..... | 50 |
| 射干 SHEGAN..... | 34 | 亚麻子 YAMAZI..... | 50 |
| 拳参 QUANSHEN..... | 34 | 郁李仁 YULIREN..... | 51 |
| 野菊花 YEJUHUA..... | 35 | 千金子 QIANJINZI..... | 52 |
| 紫花地丁 ZIHUADIDING..... | 35 | 巴豆 BADOU..... | 53 |
| 漏芦 LOULU..... | 36 | 甘遂 GANSUI..... | 53 |
| 蓼大青叶 LIAODAQINGYE..... | 37 | 芫花 YUANHUA..... | 54 |
| 蒲公英 PUGONGYING..... | 37 | 京大戟 JINGDAJI..... | 55 |
| 千里光 QIANLIGUANG..... | 38 | 牵牛子 QIANNIUZI..... | 55 |
| 飞扬草 FEIYANGCAO..... | 38 | 商陆 SHANGLU..... | 56 |
| 杠板归 GANGBANGUI..... | 39 | 祛风湿药 | |
| 苦玄参 KUXUANSHEN..... | 39 | 川乌 CHUANWU; 制川乌 ZHICHUANWU ... | 58 |
| 翼首草 YISHOUCAO..... | 40 | 木瓜 MUGUA..... | 59 |
| 翻白草 FANBAICAO..... | 40 | 两面针 LIANGMIANZHEN..... | 59 |
| 青黛 QINGDAI..... | 41 | 伸筋草 SHENJINCAO..... | 60 |
| 马勃 MABO..... | 41 | 青风藤 QINGFENGTEG..... | 61 |
| 地黄 DIHUANG;..... | 42 | 闹羊花 NAOYANGHUA..... | 61 |
| 熟地黄 SHOUDIHUANG..... | 42 | 草乌 CAOWU; 制草乌 ZHICAOWU..... | 62 |
| 赤芍 CHISHAO..... | 43 | 独活 DUHUO..... | 63 |
| 牡丹皮 MUDANPI..... | 43 | 夏天无 XIATIANWU..... | 64 |
| 肿节风 ZHONGJIEFENG..... | 44 | 路路通 LULUTONG..... | 64 |
| 大青盐 DAQINGYAN..... | 44 | 金铁锁 JINTIESUO..... | 65 |

油松节 YOUSONGJIE	66	薏苡仁 YIYIREN	85
防己 FANGJI	66	黄蜀葵花 HUANGSHUKUIHUA	86
丝瓜络 SIGUALUO	67	川木通 CHUANMUTONG	86
马钱子 MAQIANZI	68	小通草 XIAOTONGCAO	87
老鹳草 LAOQUANCAO	68	木通 MUTONG	88
络石藤 LUOSHITENG	69	车前子 CHEQIANZI	88
秦艽 QINJIAO	70	冬葵果 DONGKUIGUO	89
桑枝 SANGZHI	70	地肤子 DIFUZI	90
野木瓜 YEMUGUA	71	灯心草 DENGXINCAO	90
千年健 QIANNIANJIAN	72	连钱草 LIANQIANCAO	91
五加皮 WUJIAPI	72	海金沙 HAIJINSHA	91
狗脊 GOUJI	73	通草 TONGCAO	92
香加皮 XIANGJIAPI	74	篇蓄 BIANXU	93
菝葜 BAQIA	74	瞿麦 QUMAI	93
鹿衔草 LUXIANCAO	75	鸡骨草 JIGUCAO	94
槲寄生 HUJISHENG	76	垂盆草 CHUIPENCAO	94
天山雪莲 TIANSHANXUELIAN	76	金钱草 JINQIANCAO	95
化湿药		虎杖 HUZHANG	96
红豆蔻 HONGDOUKOU	78	洪连 HONGLIAN	96
苍术 CANGZHU	78	温里药	
豆蔻 DOUKOU	79	丁香 DINGXIANG;	98
佩兰 PEILAN	79	母丁香 MUDINGXIANG	98
草豆蔻 CAODOUKOU	80	八角茴香 BAJIAOHUIXIANG	98
利水渗湿药		干姜 GANJIANG	99
冬瓜皮 DONGGUAPI	82	小茴香 XIAOHUIXIANG	100
赤小豆 CHIXIAODOU	82	肉桂 ROUGUI	100
泽泻 ZEXIE	83	附子 FUZI	101
茯苓 FULING	84	澄茄子 CHENGQIEZI	102
猪苓 ZHULING	84	胡椒 HUJIAO	102

高良姜 GAOLIANGJIANG 103

理气药

刀豆 DAODOU 105

土木香 TUMUXIANG 105

九里香 JIULIXIANG 106

大腹皮 DAFUPI 106

山柰 SHANNAI 107

乌药 WUYAO 108

甘松 GANSONG 108

佛手 FOSHOU 109

陈皮 CHENPI 109

荔枝核 LIZHIHE 110

枳壳 ZHIQIAO 111

柿蒂 SHIDI 111

厚朴花 HOUPUHUA 112

梅花 MEIHUA 113

薤白 XIEBAI 113

消食药

山楂 SHANZHA 115

麦芽 MAIYA 115

谷芽 GUYA 116

莱菔子 LAIFUZI 116

稻芽 DAOYA 117

驱虫药

苦楝皮 KULIANPI 119

使君子 SHIJUNZI 119

槟榔 BINGLANG; 120

止血药

大蓟 DAJI 122

白茅根 BAIMAOGEN 122

地榆 DIYU 123

鸡冠花 JIGUANHUA 124

侧柏叶 CEBAIYE 124

槐花 HUAIHUA 125

紫珠叶 ZIZHUYE 125

三七 SANQI 126

茜草 QIANCAO 127

莲房 LIANFANG 127

蒲黄 PUHUANG 128

藕节 OUIE 128

大叶紫珠 DAYEZIZHU 129

仙鹤草 XIANHECAO 130

白及 BAIJI 130

松花粉 SONGHUAFEN 131

艾叶 AIYE 132

活血化瘀药

川芎 CHUANXIONG 134

片姜黄 PIANJIANGHUANG 134

延胡索 YANHUSUO 135

姜黄 JIANG HUANG 136

桃枝 TAOZHI 136

泽兰 ZELAN 137

川牛膝 CHUANNIUXI 137

王不留行 WANGBULIUXING 138

月季 YUEJIHUA 139

丹参 DANSHEN 139

凌霄花 LINGXIAOHUA 140

红花 HONGHUA 141

卷柏 JUANBAI	141	紫花前胡 ZIHUAQIANHU	161
桃仁 TAOREN	142	海藻 HAIZAO.....	161
益母草 YIMUCAO.....	142	洋金花 YANGJINHUA.....	162
北刘寄奴 BEILIUJINU.....	143	马兜铃 MADOULING.....	162
骨碎补 GUSUIBU.....	144	白果 BAIGUO.....	163
苏木 SUMU	144	苦杏仁 KUXINGREN.....	164
小驳骨 XIAOBOGU.....	145	枇杷叶 PIPAYE	164
三棱 SANLENG.....	146	罗汉果 LUOHANGUO	165
水红花子 SHUIHONGHUAZI	147	桑白皮 SANGBAIPI.....	166
莪术 EZHU.....	147	银杏叶 YINXINGYE.....	166
水蛭 SHUIZHI.....	148	款冬花 KUANDONGHUA.....	167
化痰止咳平喘药		紫菀 ZIYUAN	167
天南星 TIANNANXING	150	紫苏子 ZISUZI	168
白前 BAIQIAN	151	瓜子金 GUAZIJIN.....	169
半夏 BANXIA 法半夏 FABANXIA	151	石吊兰 SHIDIAOLAN	169
芥子 JIEZI.....	152	安神药	
猫爪草 MAOZHUACAO	153	紫石英 ZISHIYING	171
旋覆花 XUANFUHUA.....	153	朱砂 ZHUSHA	171
白附子 BAIFUZI.....	154	合欢皮 HEHUPI	171
大皂角 DAZAOJIAO	155	合欢花 HEHUIHUA	172
制天南星 ZHITIANNANXING	155	远志 YUANZHI.....	173
清半夏 QINGBANXIA.....	156	柏子仁 BAIZIREN.....	173
平贝母 PINGBEIMU	156	酸枣仁 SUANZAOREN	174
瓜蒌 GUALOU.....	157	平肝息风药	
明党参 MINGDANGSHEN.....	158	罗布麻叶 LUOBUMAYE.....	176
胖大海 PANGDAHAI.....	158	蒺藜 JILI.....	176
前胡 QIANHU.....	159	珍珠母 ZHENZHUMU.....	177
桔梗 JIEGENG.....	159	天麻 TIANMA	178
浙贝母 ZHEBEIMU	160	钩藤 GOUTENG.....	178

牛黄 NIUHUANG 179

开窍药

石菖蒲 SHICHANGPU 181

藏菖蒲 ZANGCHANGPU 181

苏合香 SUHEXIANG 182

补虚药

甘草 GANCAO 184

沙棘 SHAJI 184

人参 RENSHEN 185

大枣 DAZAO 186

山药 SHANYAO 186

白扁豆 BAIBIANDOU 187

刺五加 CIWUJIA 187

莲子 LIANZI 188

巴戟天 BAJITIAN 189

冬虫夏草 DONGCHONGXIACAO 189

杜仲 DUZHONG 190

沙苑子 SHAYUANZI 191

补骨脂 BUGUZHIZHI 191

葫芦巴 HULUBA 192

韭菜子 JIUCAIZI 193

胡桃仁 HUTAOREN 193

菟丝子 TUSIZI 194

蛇床子 SHECHUANGZI 194

海马 HAIMA 195

龙眼肉 LONGYANROU 196

白芍 BAISHAO 196

灵芝 LINGZHI 197

山麦冬 SHANMAIDONG 198

女贞子 NUZHENZI 198

石斛 SHIHU 199

北沙参 BEISHASHEN 200

桑椹 SANGSHEN 200

鳖甲 BIEJIA 201

收涩药

麻黄根 MANGHUANGGEN 203

五味子 WUWEIZI 204

五倍子 WUBEIZI 204

石榴皮 SHILIUPI 205

肉豆蔻 ROUDOUKOU 206

南五味子 NANWUWEIZI 206

罂粟壳 YINGSUQIAO 207

芡实 QIANSHI 208

金樱子 JINYINGZI 208

莲须 LIANXU 209

攻毒杀虫止痒药

木鳖子 MUBIEZI 211

土荆皮 TUJINGPI 211

皂角刺 ZAOJIAOCI 212

解表药

1

解表药

凡是能以发散表邪、治疗表证为主的药物，称为解表药。根据解表药的药性及功效主治差异，可分为发散风寒药和发散风热药两类，又称辛温解表药与辛凉解表药。

解表药物大多辛散轻扬，主入肺经、膀胱经，偏行肌表，能促进机体发汗，使表邪由汗出而解，达到治愈表证的目的。主要用于治恶寒发热、头身疼痛、无汗或有汗不畅、脉浮等表证。其它可用于水肿、咳喘、麻疹、风湿痹痛、疮疡初起等兼有表证者。

现代药理研究表明，解表药具有解热、镇痛、抑菌、抗病毒及祛痰、镇咳、平喘、利尿等作用，其它还有降压及改善心脑血管血液循环的作用。



发散风寒药

生姜 SHENGJIANG

别名 大肉姜，鲜生姜。

来源 生姜为姜科（ZINGIBERACEAE）植物姜的新鲜根状茎。

植物形态 姜 *Zingiber officinale* Rosc. 多年生草本，高40~100cm。根状茎横走，肥厚，扁平，具分枝，断面黄白色，具辛辣味。叶2列，无柄，具抱茎叶鞘；叶舌膜质，长2~4mm；叶片披针形至条状披针形，长15~30cm，宽约2cm，先端渐尖，基部渐窄，光滑无毛。花亭单独从根茎抽出，直立，长15~25cm，被覆瓦状排列的鳞片；穗状花序卵形或椭圆形，花密，长4~5cm；苞片淡绿色，卵圆形，长约2.5cm，先端具硬尖，覆瓦状排列；花冠黄绿色，管长2~2.5cm，裂片披针形，长不及2cm；唇瓣中央裂片矩圆状倒卵形，短于花冠裂片，具紫色条纹及淡黄色斑点，侧裂片卵形，长约6mm，具紫色边缘；雄蕊1；子房3室，无毛。花期7~8月，果期12月至翌年1月。

生境分布 原产亚洲热带，我国除东北外，大部分地区有栽培。

采收加工 立秋至冬至前采挖根茎，去除茎叶及须根，贮于阴湿处或埋于沙土中备用。



姜 *Zingiber officinale*

炮制及饮片 生姜：除去杂质，洗净，用时切厚片。

姜皮：取净生姜，削取外皮。

性味功能 味辛，性微温。有发汗解表，温中止呕，解毒的功能。

主治用法 用于风寒感冒，咳嗽，胃寒呕吐以及由生半夏、生南星中毒引起的喉舌肿痛麻木等。用量3~9g，水煎服。生姜挥发油注射液用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、关节、软组织伤痛等症。

白芷 BAIZHI

别名 芳香，泽芬。

来源 白芷为伞形科（Umbelliferae）植物白芷和杭白芷的干燥根。

植物形态 白芷 *Angelica dahurica* (Fisch.ex Hoffm.) Benth.et Hook.f. var. *formosana* (Boiss.) Shan et Yuan. 别名：祁白芷，禹白芷。多年生草本，高1~2.5m。根粗大，圆柱形，黄褐色。茎粗2~5cm或可达7~8cm，常带紫色。茎



白芷花枝 *Angelica dahurica*

下部叶羽状分裂，有长柄；茎中部叶2~3回羽状分裂，叶柄下部囊状膨大成膜质鞘，稀有毛；末回裂片长圆形、卵形或披针形，基部沿叶轴下延成翅，边缘有不规则白色软骨质粗锯齿；茎上部叶有膨大的囊状鞘。复伞形花序，花序梗长达20cm，伞辐多达70，无总苞片或有1~2，长卵形，膨大成鞘状，小总苞片5~10或更多；花小，无萼齿；花瓣5，白色，先端内凹；雄蕊5；子房下位，2室。双悬果长圆形至卵圆形，黄棕色或带紫色，长5~7mm，宽4~6mm，背棱扁、钝圆，较棱槽为宽，侧棱翅状，棱槽中有油管1，合生面2。花期7~9月，果期9~10月。

生境分布 白芷生于湿草甸中、灌木丛中、河旁沙土中，分布于东北、华北等地区，北方多有栽培。杭白芷在浙江、福建、台湾、湖北、湖南、四川等省有栽培。

采收加工 夏、秋间叶黄时，采挖根部，除去地上部、须根，洗净泥沙，晒干或低温干燥。

炮制及饮片 除去杂质，分开大小个，略浸，润透，切厚片，干燥。

性味功能 味辛，性温。有祛风，祛寒，燥湿，通窍止痛，消肿排脓的功能。

主治用法 用于风寒感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿痛。用量3~9g，水煎服。

防风 FANG FENG

别名 铜芸，茴草，百枝，屏风。

来源 防风为伞形科(Umbelliferae)植物防风的干燥根。

植物形态 防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 别名：关防风。多年生草本，高30~80cm。根粗壮，根颈处密生纤维状叶残基。茎单生，两歧分枝，分枝斜上升，与主茎近等长，有细棱。基生叶簇生，有长柄，基部鞘状，稍抱茎；叶卵形或长圆形，2~3回羽状深裂，第一次裂片卵形，有小叶柄，第二次裂片在顶部的无柄，在下部的有短柄，再分裂成狭窄的裂片，先端尖锐；茎生叶较小，有较宽叶鞘。复伞形花序，花多数，形成聚伞状圆锥花序，伞辐5~7，不等长，无总苞片，小总苞片4~6，披针形；萼齿三角状卵形；花瓣5，白色；雄蕊5；子房下位，2室，花柱2，花柱基部圆锥形。双悬果卵形，幼时具疣状突起，成熟时光滑，每棱槽中常有油管1，合生面有油管2。花期8~9月。果期9~10月。

生境分布 生于草原、丘陵、多石砾的山坡。分布于东北及河北、山东、山西、内蒙古、陕西、宁夏等。



防风花株 *Saposhnikovia divaricata*

采收加工 除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

炮制及饮片 除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

性味功能 味甘、辛，性温。有发表、祛风、除湿的功能。

主治用法 用于感冒，头痛，发热，无汗，风湿痹痛，四肢拘挛，皮肤瘙痒，破伤风等。用量4.5~9g，水煎服。




鹅不食草 ERBUSHICAO

别名 鸡肠草, 山胡椒, 猪屎草, 铁拳头。

来源 鹅不食草为菊科 (Compositae) 植物石胡荽的全草。

植物形态 石胡荽 *Centipeda minima* (L.) A. Br. et Aschers. 别名: 球子草, 白地茜, 蚊子草。一年生匍匐草本, 高 15cm 左右, 微臭, 揉碎有辛辣味。茎基部多分枝, 枝广展, 匍匐, 着地生根, 无毛或略被细柔毛。叶互生, 无柄, 叶片小, 匙形或倒卵状披针形, 长 0.8 ~ 2cm, 宽 3 ~ 5mm, 先端钝, 基部楔形, 边缘有不规则疏齿。头状花序扁球形, 单生于叶腋, 无柄, 直径 3 ~ 4mm; 总苞片 2 层, 椭圆状披针形, 边缘膜质, 外层较大; 花托平坦或稍凸起; 花杂性, 淡黄色, 花序外围为雌花, 多列, 花管极细而短, 中央为两性花, 数朵, 花冠筒钟状, 细小, 顶端 4 裂; 雄蕊 4, 聚药, 花药基部钝形; 子房下位, 柱头 2 裂。瘦果四棱形, 棱上有毛, 无冠毛。花期 4 ~ 8 月, 果期 6 ~ 10 月。



石胡荽花枝 *Centipeda minima*

生境分布 生于稻田、阴湿山地及路旁或湿润草地。分布于全国大部分省区。

采收加工 夏季开花后采收, 洗净, 晒干。

性味功能 味辛, 性温。有清热止咳, 祛风通窍, 散瘀消肿, 退翳明目的功能。

主治用法 用于鼻塞不通, 急、慢性鼻炎, 过敏性鼻炎, 头痛, 百日咳, 慢性气管炎, 结膜炎, 风湿关节痛, 湿疮肿毒, 跌打肿痛, 毒蛇咬伤等症。用量 3 ~ 9g, 煎服, 或捣汁。外用适量, 捣烂塞鼻, 研末捣敷或搐鼻。

发散风热药

木贼 MUZEI

别名 木贼草, 节节草, 无心草, 节骨草, 笔头草, 锉草。

来源 木贼为木贼科 (Equisetaceae) 植物木贼的地上部分。

植物形态 木贼 *Equisetum hiemale* L. 多年生常绿草本, 高 50 ~ 100cm。根茎黑色, 地上茎直立, 单一或于基部簇生, 中空, 直径 6 ~ 10mm, 具棱 20 ~ 30 条, 脊上有疣状突起 2 行, 触之有粗糙感, 沟中有气孔线。叶鞘筒贴于茎上, 长 7 ~ 10mm, 灰绿色, 顶部与基部有 2 黑色圈, 鞘齿顶部尾尖早落, 成钝头, 鞘片背面有棱脊 2 条, 形成浅沟。孢子囊穗生于茎顶, 长椭圆形, 无柄, 长



木贼 *Equisetum hiemale*

0.7 ~ 1.5cm, 有小尖头, 由多数轮状排列的六角形盾状孢子叶组成, 沿孢子叶边缘生数个孢子囊; 孢子圆球形, 有2条弹丝, “十”字形着生, 卷绕在孢子上。夏季生孢子囊穗。

生境分布 生于林下湿地、山坡、山谷溪旁、沟边、疏林下或杂草地。分布于东北及河北、山西、内蒙古、陕西、甘肃、湖北、新疆和四川等省区。

采收加工 夏、秋季割取地上部分, 除去杂质, 及时晒干或阴干。

炮制及饮片 除去枯茎及残根, 喷淋清水, 稍润, 切段, 干燥。

性味功能 味甘、苦, 性平。有疏风散热, 退翳, 止血的功能。

主治用法 用于目赤肿痛, 目生云翳, 迎风流泪, 喉痛, 痈肿, 便血, 血痢, 脱肛, 崩漏, 外伤出血。用量3 ~ 9g, 水煎服。

牛蒡子 NIUBANGZI

别名 鼠粘子, 大力子, 恶实。

来源 牛蒡子为菊科(Compositae)植物牛蒡的果实。

植物形态 牛蒡 *Arctium lappa* L. 二年生草本, 高1 ~ 2m。根粗壮, 圆锥形。茎粗壮, 带紫色, 有纵条棱, 上部多分枝, 有稀疏乳突状短毛及棕黄色小腺点。基生叶丛生, 叶柄长, 粗壮, 被疏毛, 上部叶渐小; 茎生叶互生; 叶长卵形或广卵形, 长20 ~ 50cm, 宽15 ~ 40cm, 先端钝, 有刺尖, 基部心形, 全缘或有不整齐波状齿, 上面生疏毛, 下面密生灰白色短柔毛。头状花序簇生于枝顶或排成伞房状, 花序梗长3 ~ 7cm, 密生细毛; 总苞球形, 绿色, 苞片多数, 覆瓦状排列, 披针形或线状披针形, 先端有软骨质倒钩刺。花紫红色, 全为管状花, 花冠先端5浅裂; 聚药雄蕊5, 与花冠裂片互生; 子房下位, 1室, 顶端圆盘状, 着生短刚毛状冠毛, 花柱细长, 柱头2裂。瘦果长圆形或长圆状倒卵形, 灰褐色, 有纵棱, 冠毛短刺状。花期6 ~ 8月。果期8 ~ 10月。

生境分布 生于山野路旁、沟边、荒地、山坡、向阳草地或村镇附近。分布于东北、华北及江苏、安徽、浙江、江西、湖北、湖南、广西、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆、云南、贵州、四川等省区。

采收加工 秋季果实成熟时采收果序, 晒干,



牛蒡果枝 *Arctium lappa*

打下果实, 除去杂质, 再晒干。

炮制及饮片 牛蒡子: 除去杂质, 洗净, 干燥。用时捣碎。

炒牛蒡子: 取净牛蒡子, 至热锅中炒至略鼓起、微有香气。用时捣碎。

性味功能 味辛、苦, 性寒。有疏散风热, 宣肺透疹, 消肿, 解毒, 利咽的功能。

主治用法 用于风热感冒, 咳嗽痰多, 麻疹, 风疹, 荨麻疹, 咽喉肿痛, 腮腺炎, 痈肿疮毒。用量4.5 ~ 9g, 水煎服。脾胃虚寒, 泄泻者忌服。

升麻 SHENGMMA

别名 周麻，鸡骨升麻，鬼脸升麻。

来源 升麻为毛茛科(Ranunculaceae)植物兴安升麻、升麻或大三叶升麻的干燥根茎。

植物形态 升麻 *Cimicifuga foetida* L. 别名：西升麻，川升麻，绿升麻。多年生草本。根茎大型，坚实，黑色，有多数内陷的圆洞状老茎残迹。茎直立，高1~2m，圆形，中空，上部分枝。下部叶具长达15cm的叶柄，叶片三角形，2~3回三出羽状全裂；顶生小叶菱形，长7~10cm，宽4~7cm，常浅裂，边缘有锯齿，侧生小叶斜卵形；上面无毛，下面沿脉疏被白色柔毛。茎上部的叶较小，具短柄或近无柄，常一至二回三出羽状全裂。圆锥花序，具分枝3~20条，花序轴和花梗密被灰色或锈色的腺毛及短毛；苞片钻形，比花梗短；花两性；萼片5，花瓣状，倒卵状圆形，白色或绿白色；退化雄蕊位于萼片内面，顶端微凹或二浅裂，能育雄蕊多数；心皮2~5，密被灰色毛。果长圆形，被贴伏柔毛，基部渐狭成长2~3mm的柄，顶端有短喙；种子3~8，椭圆形，全体生膜质鳞翅。花期7~9月，果期8~10月。

生境分布 兴安升麻生于山地、林缘、灌丛及草地中，分布于东北及河北、山西、内蒙古



升麻 *Cimicifuga foetida*

等省区。升麻生于山地林缘、林中或路旁草丛中，分布于河南西部、山西南部、湖北、陕西、宁夏、甘肃、青海、四川、云南、西藏等省区。大三叶升麻分布于黑龙江、吉林、河北、山西、内蒙古等省、自治区。

采收加工 秋季采挖根茎，去泥沙，晒至八、九成干后，燎去或除去须根，晒干。

炮制及饮片 除去杂质，略泡，洗净，润透，切厚片，干燥。

性味功能 味微苦、甘，性微寒。有发表，透疹，清热解毒，升提中气的功能。


主治用法 用于风热头痛，齿龈肿痛，咽痛口疮，麻疹不透，胃下垂，久泻，脱肛，子宫脱垂。用量1.5~4.5g，水煎服。

荷叶 HEYE

别名 莲叶。

来源 荷叶为睡莲科(Nymphaeaceae)植物莲的干燥叶。

植物形态 莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 多年生水生植物。根茎横生，肥厚多节，白色，节部缢缩，中有多条孔洞，节上生鳞叶及须根；叶伸出水面，叶柄长，多刺，着生于叶下中央，圆柱形，长12cm，中空；叶基生，盾圆形，直径20~80cm，全缘或微波状，上面深绿色光滑，下面淡绿色，有白粉。花单生，大型，生于花梗顶端，花粉红色或白色；萼片4~5，



莲的花萼 *Nelumbo nucifera*